

ارتباط پلیمورفیسم G/A-۹۷۱-ژن کلسترول استر ترانسفر پروتئین با الگوی لیپیدی در هیپرلیپیدمی اولیه

چکیده

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۰۵/۱۱

زمینه و هدف: در میان عوامل خطرساز بیماری کرونری قلب، هیپرلیپیدمی از عوامل خطرساز اصلی می‌باشد. با توجه به نقش هیپرلیپیدمی در بیماری‌های قلبی - عروقی به عنوان اولین عامل مرگ و میر انسان و انجام مطالعات بسیار کم روی پلیمورفیسم‌های ژن کلسترول استر ترانسفر پروتئین در ایران، ما در این مطالعه پلیمورفیسم G/A-۹۷۱-ژن ژن را در بیماران هیپرلیپیدمی اولیه بررسی نمودیم. روشن بررسی: در این مطالعه مورد - شاهدی، تعداد ۲۰۰ بیمار دارای هیپرلیپیدمی اولیه و ۲۰۰ فرد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. قطعات ژنی واحد تغییرات ژنتیکی با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) تکثیر و ژنتوتیپ‌های پلیمورفیسم G/A-۹۷۱-با تکنیک Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) تعیین گردید. فعالیت ژن کلسترول استر ترانسفر پروتئین به وسیله کیت فلوریمتر و با استفاده از دستگاه Fluorescence spectrometer اندازه‌گیری گردید.

یافته‌ها: فراوانی ژنتوتیپ‌ها و آلل‌ها بین دو گروه شاهد و بیمار اختلاف معنی‌داری نداشت (در گروه کنترل: AA ۲۴ درصد، GA ۴۷/۵ درصد و GG ۲۸/۵ درصد و در گروه بیمار: AA ۱۸ درصد، GA ۵۱ درصد و GG ۳۱ درصد) ($P > 0.05$). در گروه بیمار افراد هموژیگوت واحد آلل A (ژنتوتیپ AA) دارای کلسترول و HDL-C بالاتری نسبت به سایر افراد (ژنتوتیپ‌های GG و GA) بودند. در هر دو گروه بیمار و کنترل، افراد واحد ژنتوتیپ AA، CETP کمتری داشتند.

نتیجه‌گیری: پلیمورفیسم G/A-۹۷۱-در پروموتور ژن CETP می‌تواند الگوی لیپیدی و فعالیت CETP را در جمعیت مورد مطالعه تحت تاثیر قرار دهد.

کلمات کلیدی: کلسترول استر ترانسفر پروتئین، پلیمورفیسم G/A-۹۷۱، هیپرلیپیدمی اولیه.

این بیماری‌ها به صورت یک روند رو به افزایش در کشور ارزیابی شده است.^{۱,۲}

هیپرلیپیدمی علت اصلی آترواسکلروز و شرایط مرتبط با آترواسکلروز مانند بیماری کرونری قلب (Coronary Heart Disease, CHD)، بیماری عروق مغزی ایسکمیک، و بیماری عروق محيطی است.^{۱,۲} در میان عوامل خطرساز متعددی که برای CHD وجود دارد، هیپرکلسترولمی یکی از عوامل خطرساز اصلی است و افزایش غلظت

تقی حسن‌زاده^{۱*}
حسکر برخورداری^۲

۱- مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

۲- گروه بیوشیمی و تنفسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

* نویسنده مسئول: همدان، خیابان شهید فهیده، رویه روی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی و تنفسی
تلفن: ۰۸۱۱-۸۳۸۰۴۶۲
E-mail: hassanzadeh@umsha.ac.ir

مقدمه

بیماری‌های قلبی - عروقی (Cardiovascular diseases) اولین عامل مرگ و میر انسان در سرتاسر جهان محسوب می‌شوند.^{۱,۲} در ایران شیوع بیماری‌های قلبی - عروقی و عوامل خطرساز آن‌ها بالاست.^{۳,۴} هم‌چنین بیماری‌های قلبی - عروقی به عنوان اولین عامل مرگ و میر در کشور محسوب می‌شوند و نرخ مرگ و میر ناشی از

نشان داد که پلی‌مورفیسم G/A ۹۷۱- نمی‌تواند به طور مستقیم فعالیت رونویسی ژن CETP را تحت تاثیر قرار دهد.^{۲۰} شاید این پلی‌مورفیسم در تعامل با سایر پلی‌مورفیسم‌های ناحیه پروموتور ژن CETP (نظیر C/T ۶۲۹ و C/T ۱۳۳۷-)، عمل نموده و فعالیت ژن CETP را تحت تاثیر قرار می‌دهد.^{۲۱}

با توجه به تاثیر هیپرلیپیدمی در ایجاد بیماری‌های قلبی- عروقی به عنوان اولین عامل مرگ و میر انسان،^۱ شیوع بالای هیپرلیپیدمی در ایران^{۲۲ و ۲۳} و نتایج متفاوت قبلی، انجام مطالعات مختلف و بررسی این مسئله از زوایای مختلف ضروری به نظر می‌رسد. تاکنون مطالعات بسیار کمی بر روی پلی‌مورفیسم‌های ژن CETP، به‌ویژه این پلی‌مورفیسم، در ایران انجام شده است:^{۲۴ و ۲۵} ما در این مطالعه ارتباط پلی‌مورفیسم G/A ۹۷۱- ژن CETP با بیماری هیپرلیپیدمی اولیه را بررسی نمودیم.

روش بررسی

کلیه ملاحظات اخلاقی در این مطالعه رعایت شده و به تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان رسیده است. هزینه انجام این طرح تحقیقاتی توسط معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی همدان فراهم گردید. کیت استخراج DNA، MgCl₂, Taq, PCR Buffer10X, dNTP Mix، پرایمرها، Taq Polymerase، لودینگ بافر X6، اتیدیوم برومید و آنزیم محدودساز از شرکت (CinnaGen Co., Iran) خریداری شدند. آگاروز و Ladder از شرکت (Fermentas Co., Germany) و کیت اندازه‌گیری Ladder از شرکت (Roar Biomedical Inc., USA) تهیه گردید. در این مطالعه مورد- شاهدی، ۲۰۰ بیمار هیپرلیپیدمی اولیه و ۲۰۰ نفر شاهد، مراجعه کننده به آزمایشگاه دی شهر همدان، طی سال ۱۳۸۹، بررسی گردیدند.

نمونه‌هایی که کلسترول توتال آنها بیش از ۲۵۰ mg/dl و یا میزان تری‌گلیسرید آنها بیش از ۲۰۰ mg/dl بود به عنوان گروه هیپرلیپیدمی اولیه انتخاب شدند. در گروه کنترل ۲۰۰ فرد سالم بدون خویشاوندی انسانی و بدون هیچ نوع سابقه بیماری و عالیم بالینی این بیماری که از نظر سن و جنس با گروه بیمار مشابه بودند و در آزمایشات پاراکلینیک تری‌گلیسرید و کلسترول طبیعی داشته باشند به عنوان گروه

LDL-C سرم ارتباط مثبتی با آن دارد.^{۲۶} ارتباط معکوسی بین غلاظت کلسترول HDL و خطر CHD وجود دارد.^۹ یکی از مکانیسم‌هایی که HDL در برابر CHD محافظت کننده است، از طریق انتقال معکوس کلسترول و با همکاری کلستریل استر ترانسفر پروتئین (Cholestryl Ester Transfer Protein, CETP) است که به‌وسیله آن خروج کلسترول از سلول‌ها افزایش می‌یابد و پس از انتقال به کبد به اسیدهای صفراءوی تبدیل شده یا دفع می‌شود.^{۱۰} عامل خطرساز دیگر برای CHD، هیپرتری‌گلیسریدمی است. در هیپرتری‌گلیسریدمی تعداد ذرات VLDL بزرگ افزایش می‌یابد و انتقال کلستریل استر توسط CETP از HDL به لیپوپروتئین‌های غنی از تری‌گلیسرید (TRL) و TG از TRL به LDL و HDL افزایش می‌یابد.^{۱۱ و ۱۲}

ژن CETP به صورت یک کپی منفرد وجود داشته و شامل ۲۵ کیلو باز DNA ژنومی می‌باشد. این ژن روی بازوی بلند کروموزوم ۱۶، نزدیک به ژن لسیتین کلسترول آسیل ترانسفراز (Lecithin-Cholesterol Acyltransferase, LCAT) قرار گرفته و دارای ۱۶ اگزون و ۱۵ ایترون است.^{۱۳ و ۱۴} اندازه اگزون‌ها از ۳۲ زوج باز (اگزون ۱۳) تا ۵۰ زوج باز (اگزون ۱۶) و اندازه ایترون‌ها از ۸۷ زوج باز (ایترون ۳) تا ۶۰۰۰ زوج باز (ایترون ۲) متغیر است.^{۱۳ و ۱۵} پروتئین CETP انسان یک گلیکوپروتئین پلاسمایی هیدروفوب با وزن مولکولی ۷۴ کیلو دالتون و ۴۷۶ جزو اسید آمینه بوده که به‌وسیله کبد، بافت چربی، طحال و روده کوچک سنتز می‌شود.^{۱۶} معمولاً مقدار آن در پلاسمما ۱-۳ mg/ml است و به طور عمده همراه با ذرات HDL است.^{۱۷ و ۱۸}

عمل CETP، انتقال کلسترول استر از HDL به لیپوپروتئین‌های غنی از تری‌گلیسرید (TRLs) و LDL، و در مقابل انتقال تری‌گلیسرید از TRLs به HDL و LDL است. بنابراین انتقال کلسترول استر با میانجیگری CETP از HDL به VLDL و LDL، مسیر غیر مستقیمی ایجاد می‌کند که به‌وسیله آن کلسترول استر از HDL می‌تواند به کبد تحويل داده شود.^{۱۹}

پلی‌مورفیسم G/A ۹۷۱- در ناحیه پروموتور ژن CETP دیده می‌شود و باعث تغییر گوائین به آدنین می‌شود. در برخی از مطالعات ارتباط این پلی‌مورفیسم با HDL پلاسمما و غلاظت CETP به اثبات رسیده است. در افراد واجد ژنوتیپ GG کاهاش HDL-C و افزایش CETP گزارش شده است.^{۲۰} مطالعات بر روی سلول‌های HepG2

DNA برنامه دمایی به کار گرفته شده برای تکثیر قطعه واجد پلی مورفیسم G/A-۹۷۱ به صورت زیر بود: ابتدا مخلوط واکنش در ۹۴ °C به مدت سه دقیقه گرم شد. سپس ۳۰ سیکل از برنامه زیر تکرار گردید: ۹۴ °C به مدت ۳۰ ثانیه، دمای اتصال ۵۶ °C به مدت ۳۰ ثانیه، ۷۲ °C به مدت ۶۰ ثانیه. پس از اتمام ۳۰ سیکل، مخلوط واکنش به مدت پنج دقیقه در ۷۲ °C گرم می‌شود. توالی پرایمرهای Reverse (R) و Forward (F) دارای پلی مورفیسم G/A-۹۷۱ عبارت بود از:

Upstream primer: 5'- tgg gaa aca gtg agg gtc ag -3'

Downstream primer: 5'- tct gtg gca ttt caa ttc tg -3'

برای آزمایشات RFLP به ۱۰ میکرولیتر از محصول PCR واحد آنزیم Aval، پنج میکرولیتر از بافر مربوطه و ۱۰ میکرولیتر آب عاری از نوکلئاز اضافه شد و به مدت یک شب در دمای ۳۷ °C قرار گرفت. برای الکتروفورز محصولات PCR و قطعات RFLP از ژل اگاروز و رنگآمیزی اتیدیوم برومید استفاده شد. قطعات مربوط به پلی مورفیسم G/A-۹۷۱ در آگاروز ۲/۵ درصد الکتروفورز شدند و با (Intas, Germany) UV Transilluminator

تحلیل آماری یافته‌های به دست آمده با نرم افزار SPSS ویراست ۱۶ انجام گرفت. اطلاعات کمی به صورت میانگین \pm انحراف معیار ارایه گردیده است. تفاوت‌های آماری بین پارامترهای پلاسمای خون با استفاده از آزمون Independent sample t-test محاسبه شد. مقایسه فراوانی آللها و ژنتوتیپ‌ها بین بیماران با گروه شاهد با استفاده از آزمون χ^2 انجام شد. برای مقایسه میانگین غلظت لیپیدها و فعالیت CETP در میان ژنتوتیپ‌های مختلف از آنالیز واریانس یک‌طرفه (ANOVA) استفاده گردید. $P < 0.05$ اختلاف معنی‌دار منظور گردید.

یافته‌ها


مقایسه خصوصیات بالینی و بیوشیمیایی دو گروه کترول و بیماران هیپرلیپیدمی اولیه نشان داد دو گروه از نظر شاخص توده بدنی (BMI)، سن و جنس اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند. کلسترول، تری‌گلیسرید و LDL-C در گروه هیپرلیپیدمی اولیه به طور معنی‌داری بالاتر بود (در مقایسه بین گروه‌ها $P < 0.05$) به عنوان اختلاف معنی‌دار در نظر گرفته شد (جدول ۱).

کترول انتخاب شدند. افراد مبتلا به دیابت، فشار خون بالا، بیماری‌های کبدی، کلیوی، تیروییدی و همچنین خانم‌های باردار از کل جمعیت مورد مطالعه حذف گردیدند. علاوه بر این افراد مصرف کننده داروهای موثر بر سطح پلاسمای لیپیدها از این مطالعه خارج شدند. از هر فرد پس از ۱۲-۱۴ ساعت ناشتا بودن در طول شب، ۱۰ میلی‌لیتر خون سیاهرگی ناشتا جمع‌آوری گردید. دو میلی‌لیتر از هر نمونه در لوله‌های حاوی Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) جهت استخراج DNA ریخته شد و مابقی برای تهیه سرم جهت اندازه‌گیری لیپیدها، فعالیت CETP و پارامترهای دیگر به کار رفت.


اندازه‌گیری‌های بیوشیمیایی: برای جدا کردن سرم جهت اندازه‌گیری پارامترهای بیوشیمیایی شامل تری‌گلیسرید، کلسترول تام، LDL-C و HDL-C، نمونه‌های خون به مدت ۱۵ دقیقه با سرعت ۲۰۰۰ g سانتریفیوژ شدند. میزان تری‌گلیسرید، کلسترول تام، LDL-C و HDL-C به روش‌های آنریماتیک و با استفاده از کیت‌های شرکت پارس آزمون ایران اندازه‌گیری شد. فعالیت CETP به وسیله کیت کمپانی Roar Biomedical Inc., USA و با استفاده از دستگاه Fluorescence Spectrometer (PerkinElmer Inc., Massachusetts) اندازه‌گیری گردید. نمونه‌ها به وسیله این دستگاه در طول موج‌های ۴۶۵ نانومتر (Excitation) و ۵۳۵ نانومتر (Emission) خوانده شد. در نهایت منحنی استاندارد رسم و فعالیت (pmoL/ μ L.h) CETP محاسبه شد.

آزمایشات مولکولی: استخراج DNA ژنومی از خون تام با استفاده از کیت ساخت شرکت سیناژن و بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد. قطعات ژنی وارد تغییرات ژنتیکی با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) تکثیر شدند و با تکنیک Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) ژنتوتیپ شدند. پلی مورفیسم G/A-۹۷۱ در ناحیه پروموتور ژن CETP قرار گرفته است. یک قطعه بازی با استفاده از پرایمرهای مربوطه با روش PCR تکثیر گردید.

واکنش PCR جهت تکثیر قطعه موجود در پروموتور در حجم ۲۰ میکرولیتر انجام شد و شرایط PCR به صورت زیر بود: پرایمر F و R هر کدام ۰/۲ میکرومول، MgCl₂ ۰/۵ میلی‌مول، dNTP Mix با غلظت ۱/۵ میلی‌مول، Taq PCR Buffer ۱۰X با غلظت ۰/۲ میلی‌مول، دو میکرولیتر از Polymerase ۰/۰۲۵ واحد در میکرولیتر، ۱۰۰-۲۰۰ نانوگرم



نمودار-۱: فراوانی ژنوتیپ‌های پلی‌مورفیسم G/A-۹۷۱ پرموتور ژن CETP در گروه کنترل و بیمار ($P>0.05$).



نمودار-۲: فراوانی آلل‌های پلی‌مورفیسم G/A-۹۷۱ پرموتور ژن CETP در گروه کنترل و بیمار ($P>0.05$).

بیماران در جدول-۲ نشان داده شده است. در گروه هیپرلیپیدمی اولیه میزان HDL-C و کلسترول در ژنوتیپ AA در مقایسه با ژنوتیپ GG اختلاف معنی داری دارد. سایر ویژگی‌ها در گروه کنترل و هیپرلیپیدمی اولیه هیچ اختلاف معنی داری ندارند. نتایج حاصل از مطالعه میانگین فعالیت CETP پلاسما در سه ژنوتیپ AA، AG و GG پلی‌مورفیسم G/A-۹۷۱ در گروه هیپرلیپیدمی اولیه در جدول-۲ ارایه شده است. میانگین فعالیت CETP پلاسما در سه ژنوتیپ مورد نظر اختلاف معنی داری را نشان داد ($P=0.001$).

ویژگی	گروه بیمار		گروه کنترل		گروه	P*
	N=۲۰۰	N=۲۰۰	N=۲۰۰	N=۲۰۰		
سن (سال)	۵۰/۶±۱۱/۹	۴۹/۴±۱۲/۹	NS			
جنس (مرد/زن)	۹۸/۱۰۲	۹۵/۱۰۵	NS			
(kg/m ^۲) BMI	۲۵/۸±۶/۶	۲۵/۵±۵/۹	NS			
سابقه خانوادگی (درصد)	۳۷/۴	۹/۲	۰/۰۰۱			
کلسترول (mg/dl)	۲۴۸/۹±۴۵/۳	۱۸۴/۸±۳۱/۵	۰/۰۰۱			
تری‌گلیسرید (mg/dl)	۲۸۲/۹±۱۲۱/۳	۱۳۱/۱±۵۱/۱	۰/۰۰۱			
(mg/dl) HDL-C	۴۸/۴±۱۴/۱	۵۳/۶±۱۰/۹	۰/۰۰۱			
(mg/dl) LDL-C	۱۴۴/۶±۴۰/۴	۱۰۴/۶±۲۵/۹	۰/۰۰۱			
(pmol/µL.h) CETP	۱۴۹/۱±۳۴/۸	۱۰۷/۳±۱۸	۰/۰۰۱			

* آزمون آماری: $P<0.05$ معنی دار می‌باشد.

BMI: Body Mass Index, HDL-C: High Density Lipoprotein-Cholesterol, LDL-C: Low Density Lipoprotein-Cholesterol, CETP: Cholesteryl Ester Transfer Protein

پلی‌مورفیسم G/A-۹۷۱ G/A در ناحیه پرموتور ژن CETP ایجاد می‌گردد. الکتروفورز محصول هضم شده با آنزیم محدودساز Aval روی آگارز ۲/۵٪ انجام شد. آلل G (۹۷۱G) دارای جایگاه شکست برای آنزیم محدودساز Aval می‌باشد، در صورتی که آلل A (۹۷۱A) فاقد این جایگاه است.^{۲۰} برای ژنوتیپ GG سه قطعه ۷۱ و ۷۲، ژنوتیپ GA چهار قطعه ۱۹۱، ۱۴۲ و ۷۲ و در نهایت برای ژنوتیپ AA دو قطعه ۱۹۱ و ۱۴۲ جفت‌بازی مشاهده می‌شود.

فراوانی آللی و توزیع ژنوتیپ‌ها در نمودارهای ۱ و ۲ نشان داده شده است. فراوانی ژنوتیپ‌های AA، AA و AG در گروه کنترل به ترتیب ۴۷/۵٪، ۲۸/۵٪ و در گروه بیمار به ترتیب ۵۱٪ و ۳۱٪ بود. فراوانی آلل A در گروه کنترل ۷/۷٪ و در گروه بیمار ۴۳٪ به دست آمد.

مقایسه ویژگی‌های بالینی جمعیت مورد مطالعه در سه ژنوتیپ AA و AG پلی‌مورفیسم G/A-۹۷۱ پرموتور ژن CETP گروه

جدول-۲: مقایسه ویژگی‌های بالینی ژنوتیپ‌های مختلف پلی مورفیسم A/G-۹۷۱ در گروه بیماران هیپرلیپیدمی اولیه

P	AA N=۳۸	GA N=۹۹	GG N=۶۳	ژنوتیپ‌ها	ویژگی‌ها
NS	۵۲/۳±۱۱/۷	۵۱/۵±۱۲	۵۱/۲±۱۲/۶		سن (سال)
۰/۰۴۹	۲۵۸±۳۷/۷	۲۳۱/۹±۴۴/۳	۲۳۷/۸±۵۱/۸		کلسترول (mg/dl)
NS	۲۵۱/۲±۹۷/۳	۲۹۵/۷±۱۳۹/۶	۲۸۲/۲±۱۱۶/۳		تری‌گلیسرید (mg/dl)
۰/۰۰۱	۶۶/۹±۱۲/۶	۵۴/۷±۱۳/۹	۵۴/۳±۱۲/۱		(mg/dl) HDL-C
NS	۱۴۴/۴±۳۶/۵	۱۲۵/۹±۴۰/۴	۱۳۳/۶±۴۳/۱		(mg/dl) LDL-C
NS	۴۵/۸±۱۴/۴	۵۰/۹±۱۸/۸	۴۹/۶±۱۹/۱		(mg/dl) VLDL
NS	۲/۱۶±۰/۵۴	۲/۳±۰/۵۹	۲/۴۴±۰/۵۵		
۰/۰۰۱	۱۲۳/۷±۲۲/۵	۱۵۶/۹±۳۴/۲	۱۵۵/۴±۳۴/۸		LDL-C/HDL-C (pmoL/µL.h) CETP

NS: Not Significant

* آزمون آماری: $P<0/05$ معنی دار می‌باشد.

HDL-C: High Density Lipoprotein-Cholesterol, LDL-C: Low Density Lipoprotein-Cholesterol, VLDL: Very Low Density Lipoprotein, CETP: Cholesteryl Ester Transfer Protein

بحث

آلل G ۵۴ درصد و فراوانی آلل A ۴۶ درصد مشاهده گردید.^{۲۰} در مطالعه‌ای که روی مردان ژاپنی صورت گرفت فراوانی آلل G ۷۴ درصد و فراوانی آلل A ۲۶ درصد گزارش گردید، در حالی که فراوانی ژنوتیپ‌های GG، AA و GA به ترتیب ۵۴/۳، ۳۹ درصد و ۶/۷ درصد بود.^{۲۸}

در مطالعه‌ی دیگری که در سال‌های ۱۹۹۸-۲۰۰۰ در ایالت واشینگتن غربی انجام شد، بین فراوانی آلل و ژنوتیپ‌های این پلی مورفیسم در دو گروه کترل و بیمار (Non-fetal MI) هیچ‌گونه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.^{۲۹}

با مقایسه نتایج حاصل از مطالعات متفاوت در مورد فراوانی آلل‌ها و ژنوتیپ‌های این پلی مورفیسم مشخص می‌شود که در هیچ مطالعه‌ای تفاوت معنی داری بین گروه شاهد و بیمار دیده نشده است. از طرف دیگر در اکثر جمعیت‌ها ژنوتیپ GA و آلل G به عنوان ژنوتیپ و آلل غالب (Major) معرفی شده‌اند.^{۲۰،۲۹} نتایج مطالعه ما نیز با این یافته‌ها سازگاری دارد. در مطالعه حاضر فراوانی آلل G در گروه کترل ۵۲/۳ درصد و در گروه هیپرلیپیدمی اولیه ۵۶/۵ درصد بود، در حالی که فراوانی ژنوتیپ GA در دو گروه کترل و بیمار به ترتیب ۴۷/۵ درصد و ۵۱ درصد به دست آمد، که بالاترین میزان ژنوتیپ‌ها را در هر دو گروه تشکیل می‌داد. در مطالعه حاضر مشخص گردید که پلی مورفیسم G/A-۹۷۱ در ناحیه پروموتور ژن CETP با HDL-C و

در حال حاضر نیمی از موارد از بیماری عروق کرونر به اختلالات لیپید خون مربوط می‌شود. مطالعات دهه اخیر در ایران حاکی از افزایش میزان بروز هیپرلیپیدمی، چاقی و بیماری قلبی-عروقی می‌باشد.^{۳۰} از زمان کشف پروتئین CETP و تعیین آن به عنوان یک تعدیل کننده میزان HDL-C، مطالعات بسیاری درباره نقش این پروتئین در بیماری‌های انسانی انجام شده است.^{۲۶،۲۷} در این مطالعه ارتباط پلی مورفیسم A/G-۹۷۱ با بیماری هیپرلیپیدمی اولیه و فراوانی پلی مورفیسم فوق در گروه کترل و در بیمار را بررسی نمودیم. هم‌چنین ارتباط هر یک از این تغییرات ژنتیکی با الگوی لیپیدی سرم در گروه کترل و بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت.

در مطالعه حاضر فراوانی ژنوتیپ‌ها و آلل‌ها بین دو گروه کترل و بیمار اختلاف معنی داری نداشت. در مطالعه Le Goff، که بر روی یک جمعیت از بلغارستان و گلاسکو و در دو گروه کترل و بیمار MI انجام شد، هیچ‌گونه اختلاف معنی داری در فراوانی آلل‌ها و ژنوتیپ‌ها بین دو جمعیت ذکر شده و هم‌چنین بین دو گروه بیمار (MI) و کترل، مشاهده نگردید. در مطالعه Le Goff در گروه کترل، فراوانی آلل G ۵۱ درصد و فراوانی آلل A ۴۹ درصد و در گروه بیمار، فراوانی

آوردن و نشان دادند که این پلی‌مورفیسم در مطالعات *In vitro* نیز بر روی فعالیت رونویسی اثر می‌نماید و بنابراین آن را یک پلی‌مورفیسم عملکردی معرفی نمودند.^{۲۱}

بسیاری از مطالعات ارتباط بین هاپلوتیپ‌های CETP و تغییر در غلظت یا فعالیت CETP و همچنین تغییر در غلظت‌های HDL-C را بررسی و به اثبات رسانده‌اند. اگر چه در برخی موارد نتایج حاصل از این‌گونه مطالعات (مطالعه ارتباط بین هاپلوتیپ‌ها) با نتایج حاصله از آنالیز و بررسی‌های پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی به صورت منفرد و مجزا، مشابه می‌باشد، ولی سایر مطالعات یک ارتباط قوی‌تری را بین هاپلوتیپ‌های CETP و تغییر در سطوح HDL-C در مقایسه با آنالیز پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی گزارش نموده‌اند که این موضوع سودمندی آنالیز و بررسی هاپلوتیپ‌ها برای بررسی SNPs را به اثبات می‌رساند.^{۲۸ و ۲۹}

در دیس لیپیدمی‌های مختلف انسان مانند هیپرکلسترولمی که با تسريع آتروواسکلروز در ارتباط هستند، غلظت CETP و سرعت انتقال از HDL به لیپوپروتین‌های حاوی آپو B افزایش می‌یابد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که در افراد هیپرکلسترولمی، CETP به‌واسطه افزایش تجمع کلسترول در لیپوپروتین‌های محتوی آپو B، پروآتروزنیک باشد.^{۳۰} نتایج مطالعات نشان می‌دهد که در افراد مبتلا به هیپرتری‌گلیپریدمی افزایش غلظت و تعداد ذرات VLDL معمولاً با افزایش سرعت انتقال کلسترول استر از HDL به VLDL همراه می‌باشد. در این دیس لیپیدمی آتروژنیک، CETP پلاسمای فاکتور محدود کننده واکنش انتقال کلسترول استر می‌باشد.^{۳۱} به‌علت محدود کننده واکنش انتقال کلسترول استر از HDL به VLDL بزرگ، به‌نظر می‌رسد که CETP در این بیماران به‌عنوان یک فاکتور پروآتروزنیک عمل نماید. در حقیقت در اثر فعالیت CETP در این بیماران VLDL₁ به سرعت غنی از کلسترول استر می‌گردد، در نتیجه پیش‌سازهای ذرات LDL کوچک و متراکم را فراهم می‌نماید.^{۳۵} در مطالعه دیگری که ما روی پلی‌مورفیسم $C>A$ -۶۲۹-۶۲۹ G/A انجام دادیم احتمال تعامل این دو پلی‌مورفیسم ($C>A$ -۶۲۹ G/A-۶۲۹ G/A) مطرح شده است که برای اثبات آن به مطالعات بیشتری نیاز می‌باشد.^{۳۶} در مطالعه حاضر ارتباط عمدہ‌ای بین فعالیت CETP و سایر لیپیدها و لیپوپروتین‌ها مشاهده نگردید. علت این تفاوت‌ها کاملاً مشخص نیست ولی می‌تواند به دلایل گوناگون مانند تفاوت در حجم

فعالیت CETP در ارتباط می‌باشد. در مطالعه حاضر میانگین فعالیت CETP پلاسمای در سه ژنوتیپ AG، AA و GG تغییر ۹۷۱ G/A-۹۷۱ G/A مقایسه شد. میانگین فعالیت CETP پلاسمای در سه ژنوتیپ مورد نظر اختلاف معنی‌داری را نشان داد ($P=0.001$). در بسیاری از مطالعات دیگر نیز ثابت شده که واریانت‌های ژن CETP با غلظت و یا فعالیت CETP و همچنین HDL-C در ارتباط می‌باشد.^{۳۰ و ۳۱}

در مطالعه Le Goff نشان داده شده که پلی‌مورفیسم ۹۷۱ G/A در ناحیه پروموتور ژن CETP با HDL-C در ارتباط می‌باشد. افراد واجد ژنوتیپ AA بالاترین میزان HDL-C (51.3 ± 8 mg/dl) و افراد دارای ژنوتیپ GG دارای کمترین مقدار HDL-C (51.3 ± 8 mg/dl) می‌باشند ($P=0.006$). در همین مطالعه مشخص شده که این پلی‌مورفیسم با غلظت پلاسمایی CETP در ارتباط می‌باشد. مشاهده شده است که ژنوتیپ GG در مقایسه افراد با ژنوتیپ AA، CETP بالاتری دارند (1972 ± 79 µg/l در مقابل 2204 ± 72 µg/l) ($P=0.0094$).

تصور بر این است که غلظت CETP با فعالیت این پرتوتین در ارتباط باشد.^{۳۰} از طرف دیگر ثابت شده فعالیت پلاسمایی CETP دارای یک رابطه معکوس با میزان HDL-C پلاسمایی باشد. نتایج ما نیز با این یافته‌ها سازگار می‌باشد، به عنوان مثال افراد واجد ژنوتیپ GG دارای بالاترین فعالیت CETP و کمترین میزان HDL-C می‌باشند. مکانیسم اثر این پلی‌مورفیسم روی فعالیت CETP و میزان HDL-C به‌طور دقیق مشخص نشده است. در حال حاضر دو فرضیه وجود دارد: ۱- اثر مستقیم این پلی‌مورفیسم روی پارامترهای مذکور و ۲- تعامل بین این پلی‌مورفیسم با سایر پلی‌مورفیسم‌های موجود در پروموتور ژن CETP. ارزیابی و بررسی تعامل بین این پلی‌مورفیسم (۹۷۱ G/A-) با سایر پلی‌مورفیسم‌های عملکردی شناخته شده در این ناحیه از CETP (یعنی C/A-۶۲۹ و TAQIB)، نشان داده که اثر این پلی‌مورفیسم روی HDL-C تا حدود زیادی مربوط به تعامل این پلی‌مورفیسم با دو پلی‌مورفیسم دیگر می‌باشد، در حالی که در مورد اثر این پلی‌مورفیسم روی CETP چنین چیزی صادق نمی‌باشد.^{۳۰} این مطالعات *In vitro* نشان داده که این پلی‌مورفیسم بر روی فعالیت رونویسی پروموتور این ژن هیچ‌گونه تاثیری ندارد. تمام این نتایج وجود یک پلی‌مورفیسم عملکردی ناشناخته در ژن CETP را پیشنهاد می‌نماید.^{۳۰} اما در سال ۲۰۰۵ همین گروه نتایج متضادی را به‌دست

کلسترول استر ترانسفر پروتئین (CETP) در افراد هیپرلیپیدمی اولیه با افراد سالم و ارتباط آن با الگوی لیپیدی "مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان در سال ۱۳۸۷ به کد ۸۷۰۲۱۰۱۷۴۷۲ می‌باشد که با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان انجام گردیده است. نویسنده‌گان مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از این نهاد اعلام می‌دارند.

نمونه مطالعات مختلف، معیارهای انتخاب نمونه‌های کنترل و بیمار، عوامل محیطی، فاکتورهای منطقه‌ای، نژادی و قومی و سبک زندگی باشد. نتایج ما نشان داد که پلی‌مورفیسم G/A-۹۷۱ در پروموتور ژن CETP می‌تواند الگوی لیپیدی و فعالیت CETP را در جمعیت مورد مطالعه تحت تأثیر قرار دهد.

سپاسگزاری: این مقاله حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی تحت عنوان "مقایسه فراوانی پلی‌مورفیسم G/A-۹۷۱ پرموتور ژن

References

- Murray CJ, Lopez AD. Alternative projections of mortality and disability by cause 1990-2020: Global Burden of Disease Study. *Lancet* 1997;349(9064):1498-504.
- Rosamond WD, Chambless LE, Folsom AR, Cooper LS, Conwill DE, Clegg L, et al. Trends in the incidence of myocardial infarction and in mortality due to coronary heart disease, 1987 to 1994. *N Engl J Med* 1998;339(13):861-7.
- Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. *World Health Organ Tech Rep Ser* 2000;894:i-xii, 1-253.
- Sarraf-Zadegan N, Sayed-Tabatabaei FA, Bashardoust N, Maleki A, Totonchi M, Habibi HR, et al. The prevalence of coronary artery disease in an urban population in Isfahan, Iran. *Acta Cardiol* 1999;54(5):257-63.
- Ghassemi H, Harrison G, Mohammad K. An accelerated nutrition transition in Iran. *Public Health Nutr* 2002;5(1A):149-55.
- Hadaegh F, Harati H, Ghanbarian A, Azizi F. Prevalence of coronary heart disease among Tehran adults: Tehran Lipid and Glucose Study. *East Mediterr Health J* 2009;15(1):157-66.
- Kromhout D. Epidemiology of cardiovascular diseases in Europe. *Public Health Nutr* 2001;4(2B):441-57.
- Stamler J, Dyer AR, Shekelle RB, Neaton J, Stamler R. Relationship of baseline major risk factors to coronary and all-cause mortality, and to longevity: findings from long-term follow-up of Chicago cohorts. *Cardiology* 1993;82(2-3):191-222.
- Assmann G, Schulte H, von Eckardstein A. Hypertriglyceridemia and elevated lipoprotein(a) are risk factors for major coronary events in middle-aged men. *Am J Cardiol* 1996;77(14):1179-84.
- Barter PJ, Nicholls S, Rye KA, Anantharamaiah GM, Navab M, Fogelman AM. Antiinflammatory properties of HDL. *Circ Res* 2004;95(8):764-72.
- Barter PJ, Brewer HB Jr, Chapman MJ, Hennekens CH, Rader DJ, Tall AR. Cholesteryl ester transfer protein: a novel target for raising HDL and inhibiting atherosclerosis. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2003;23(2):160-7.
- Barter PJ, Chang LB, Newham HH, Rye KA, Rajaram OV. The interaction of cholesteryl ester transfer protein and unesterified fatty acids promotes a reduction in the particle size of high-density lipoproteins. *Biochim Biophys Acta* 1990;1045(1):81-9.
- Agellon LB, Quinet EM, Gillette TG, Drayna DT, Brown ML, Tall AR. Organization of the human cholesteryl ester transfer protein gene. *Biochemistry* 1990;29(6):1372-6.
- Callen DF, Hildebrand CE, Reeders S. Report of the Second International Workshop on Human Chromosome 16 Mapping. *Cytogenet Cell Genet* 1992;60(3-4):158-67.
- Wang S, Deng L, Milne RW, Tall AR. Identification of a sequence within the C-terminal 26 amino acids of cholesteryl ester transfer protein responsible for binding a neutralizing monoclonal antibody and necessary for neutral lipid transfer activity. *J Biol Chem* 1992;267(25):17487-90.
- Lagrost L. Regulation of cholesteryl ester transfer protein (CETP) activity: review of in vitro and in vivo studies. *Biochim Biophys Acta* 1994;1215(3):209-36.
- Bruce C, Davidson WS, Kussie P, Lund-Katz S, Phillips MC, Ghosh R, et al. Molecular determinants of plasma cholesteryl ester transfer protein binding to high density lipoproteins. *J Biol Chem* 1995;270(19):11532-42.
- Fukasawa M, Arai H, Inoue K. Establishment of anti-human cholesteryl ester transfer protein monoclonal antibodies and radioimmunoassaying of the level of cholesteryl ester transfer protein in human plasma. *J Biochem* 1992;111(6):696-8.
- Goldberg DI, Beltz WF, Pittman RC. Evaluation of pathways for the cellular uptake of high density lipoprotein cholesterol esters in rabbits. *J Clin Invest* 1991;87(1):331-46.
- Le Goff W, Guerin M, Nicaud V, Dachet C, Luc G, Arveiler D, et al. A novel cholesteryl ester transfer protein promoter polymorphism (-971G/A) associated with plasma high-density lipoprotein cholesterol levels. Interaction with the TaqIB and -629C/A polymorphisms. *Atherosclerosis* 2002;161(2):269-79.
- Frisdal E, Klerkx AH, Le Goff W, Tanck MW, Lagarde JP, Jukema JW, et al. Functional interaction between -629C/A, -971G/A and -1337C/T polymorphisms in the CETP gene is a major determinant of promoter activity and plasma CETP concentration in the REGRESS Study. *Hum Mol Genet* 2005;14(18):2607-18.
- Azizi F, Salehi P, Etemadi A, Zahedi-Asl S. Prevalence of metabolic syndrome in an urban population: Tehran Lipid and Glucose Study. *Diabetes Res Clin Pract* 2003;61(1):29-37.
- Azizi F, Raiszadeh F, Salehi P, Rahmani M, Emami H, Ghanbarian A, et al. Determinants of serum HDL-C level in a Tehran urban population: the Tehran Lipid and Glucose Study. *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 2002;12(2):80-9.
- Ghasabeh TH, Firoozraei M, Zonouz AE, Radmehr H, Zavarehei A, Paoli M. One common polymorphism of cholesteryl ester transfer protein gene in Iranian subjects with and without primary hypertriglyceridemia. *Pak J Biol Sci* 2007;10(23):4224-9.
- Hassanzadeh T, Firoozraei M, Zonouz AE, Zavarehei A, Paoli M. TaqIB polymorphism of cholesteryl ester transfer protein (CETP) gene in primary combined hyperlipidaemia. *Indian J Med Res* 2009;129(3):293-8.
- Kuivenhoven JA, de Knijff P, Boer JM, Smalheer HA, Botma GJ, Seidell JC, et al. Heterogeneity at the CETP gene locus. Influence on plasma CETP concentrations and HDL cholesterol levels. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 1997;17(3):560-8.

27. Wu JH, Lee YT, Hsu HC, Hsieh LL. Influence of CETP gene variation on plasma lipid levels and coronary heart disease: a survey in Taiwan. *Atherosclerosis* 2001;159(2):451-8.
28. Lu H, Inazu A, Moriyama Y, Higashikata T, Kawashiri MA, Yu W, et al. Haplotype analyses of cholesteryl ester transfer protein gene promoter: a clue to an unsolved mystery of TaqIB polymorphism. *J Mol Med (Berl)* 2003;81(4):246-55.
29. Meiner V, Friedlander Y, Milo H, Sharon N, Ben-Avi L, Shpitzen S, et al. Cholesteryl ester transfer protein (CETP) genetic variation and early onset of non-fatal myocardial infarction. *Ann Hum Genet* 2008;72(Pt 6):732-41.
30. Ghasabeh TH, Firoozraei M, Zonouz AE, Radmehr H, Zavarehei A, Paoli M. Association between cholesteryl ester transfer protein Taq1B polymorphism with lipid levels in primary hyperlipidemic patients. *Eur J Lipid Sci Technol* 2008;110:225-31.
31. Barkhordari A, Hassanzadeh T, Saidijam M, Esmaeili R, Paoli M. Association between cholesteryl ester transfer protein D442G polymorphism on serum lipid levels and CETP activity in hypercholesterolemic patients. *Tehran Univ Med J (TUMJ)* 2012;69(12):737-43.
32. McPherson R, Mann CJ, Tall AR, Hogue M, Martin L, Milne RW, et al. Plasma concentrations of cholesteryl ester transfer protein in hyperlipoproteinemia. Relation to cholesteryl ester transfer protein activity and other lipoprotein variables. *Arterioscler Thromb* 1991;11(4):797-804.
33. Mann CJ, Yen FT, Grant AM, Bihaïn BE. Mechanism of plasma cholesteryl ester transfer in hypertriglyceridemia. *J Clin Invest* 1991;88(6):2059-66.
34. Guérin M, Bruckert E, Dolphin PJ, Chapman MJ. Absence of cholesteryl ester transfer protein-mediated cholesteryl ester mass transfer from high-density lipoprotein to low-density lipoprotein particles is a major feature of combined hyperlipidaemia. *Eur J Clin Invest* 1996;26(6):485-94.
35. Packard CJ, Shepherd J. Lipoprotein heterogeneity and apolipoprotein B metabolism. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 1997;17(12):3542-56.
36. Akbarzadeh M, Hassanzadeh T, Saidijam M, Esmaeili R, Borzouei S, Hajilooi M, et al. Cholesteryl ester transfer protein (CETP) -629C/A polymorphism and its effects on the serum lipid levels in metabolic syndrome patients. *Mol Biol Rep* 2012.

Association of -971 G/A cholesteryl-ester transfer protein gene polymorphism with lipid profile in primary hyperlipidemia

Abstract

Received: October 03, 2011 Accepted: August 01, 2012

Taghi Hassanzadeh Ph.D.^{1,2*}
Asgar Barkhordari M.Sc.²

1- Research Center for Molecular Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.

2- Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.

Background: Coronary heart disease (CHD) is a leading cause of death worldwide and hypertriglyceridemia and hypercholesterolemia are major risk factors for the disease. Considering the role of hyperlipidemia as the underlying cause of cardiovascular mortalities and morbidities, and the limited and conflicting results of studies on CETP gene polymorphisms in Iran, we aimed to study -971 G/A polymorphism of cholesterol ester transfer protein gene in patients with primary hyperlipidemia.

Methods: In this case-control study performed in Hamadan University of Medical Sciences (from May 2010 to April 2011), we recruited 200 patients with primary hyperlipidemia (total cholesterol >250 mg/dl and/or triglyceride >200 mg/dl) as the cases and 200 healthy individuals with normal cholesterol and triglyceride as the control group. Gene segments were replicated by polymerase chain reaction (PCR) and -971 G/A polymorphism genotypes were identified by RFLP technique. Subsequently, plasma CETP activity was measured enzymatically by a kit in a fluorescence spectrometer.

Results: The allele and genotype frequencies were not significantly different ($P>0.05$) between the two groups (in the control group: AA 24%, GA 47% and GG 28.5% and in the case group: AA 18%, GA 51% and GG 31%). In the case group, homozygous individuals with A alleles (AA genotype) had greater cholesterol and HDL-c concentrations than those with other alleles (GG and GA). In both cases and controls, individuals with AA genotype had lower CETP concentrations.

Conclusion: We conclude that -971 G/A polymorphism in CETP gene promoter can affect lipid profile and alter CETP activity.

Keywords: cholesteryl ester transfer protein, hyperlipidemia, polymorphism.

* Corresponding author: Dept. of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Shahid Fahmideh St., Hamadan, Iran.
Tel: +98-811-8380462
E-mail: hassanzadeh@umsha.ac.ir