

بررسی رابطه میزان افزایش بیلی‌روビین در ۴۸-۲۴ ساعت اول تولد با فصل تولد

چکیده

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۰۴/۱۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۰۸/۲۰

زمینه و هدف: رابطه فصل تولد با بروز بیماری‌ها شناخته شده و چنین رابطه‌ای ممکن است مربوط به نقش فصل و عوامل محیطی در مراحل اولیه نمو خارج رحمی باشد. تجربه متخصصین نوزادان این است که درجه زردی نوزادان ممکن است به دلیل تغییر در شدت تابش آفتاب که باشند و تغییر فصل است باشد ولی اطلاعات مبتنی بر شواهد در این زمینه بسیار کم است. بنابراین نقش فصل را در میزان افزایش بیلی‌روビین در دوره نوزادی مورد بررسی قرار دادیم. روشن بررسی: این یک مطالعه آینده‌نگر و کوچورت بود که ۶۲۹ نوزاد ترم و سالم که در بیمارستان شریعتی متولد شدند به ترتیب وارد مطالعه شدند. سطح بیلی‌روビین بدناف و سطح آن نزدیک به ۴۸ ساعت بعد از تولد اندازه‌گیری شد و تفاوت فصلی میزان افزایش بیلی‌روビین مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: میزان افزایش بیلی‌روビین در فصل بهار 3.95 ± 1.4 mg/dl، در فصل تابستان 1.69 ± 0.76 mg/dl، در فصل پاییز 3.51 ± 1.60 mg/dl و در فصل زمستان 4.79 ± 1.99 mg/dl بود. میزان بیلی‌روビین بدناف رابطه‌ای با فصل تولد نداشت. بعد از تصحیح نقش احتمالی سایر متغیرها رابطه فصل تولد با میزان افزایش بیلی‌روビین قابل ملاحظه بود. میزان افزایش بیلی‌روビین به طور قابل توجهی در فصل زمستان بیشتر از سایر فصول بود ($P < 0.0001$).

نتیجه‌گیری: فصل به عنوان یک فاکتور مستقل در ایجاد زردی نوزادی عمل می‌کند و میزان افزایش بیلی‌روビین در فصل زمستان از سایر فضول بیشتر است. این مطالعه اطلاعاتی را جهت آگاهی پرستاران و در شناسایی عوامل خطر زردی و پیشگیری از بستری مجدد نوزادان ارایه می‌نماید.

کلمات کلیدی: فصل، زردی نوزادان، بیلی‌روビین.

*نگار سجادیان^۱

حمدیده شجری^۱، روزا مفید^۲

رامین جهادی^۳، پیمانه علیزاده طاهری^۴

۱- گروه کودکان، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۲- پژوهش عمومی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه

علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۳- گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان، ایران.

۴- گروه کودکان، بیمارستان کودکان بهرامی،

دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

*نویسنده مسئول: تهران خیابان کارگر، بیمارستان

تلفن: ۰۲۱-۸۴۹۰۲۵۴۱ شریعتی

.

E-mail: Nsajadian@yahoo.com

مقدمه

متخصصین بوده است. چنین رابطه‌ای می‌تواند مربوط به نقش فصل و عوامل محیطی بر روی مراحل اولیه زندگی خارج رحمی باشد.^{۳-۵} عوامل متابولیسم بیلی‌روビین در نوزاد تازه متولد شده در مرحله گذر از دوره متابولیسم بیلی‌روビین سالی است و اتفاق مهمی که بعد از تولد چنینی به مرحله بزرگ‌سالی است. بیلی‌روビین در بدن نقش می‌افتد افزایش ثابت بیلی‌روビین سرم است. بیلی‌روビین در استعداد ابتلا به بیماری‌ها ایفا می‌کند. از آنجایی که نوزادان به صدمات اکسیداتیو بسیار حساس هستند^۶ ممکن است تفاوت‌های فصلی سطح بیلی‌روビین خون در چند روز اول عمر در نمو آن‌ها و استعداد ابتلا به بیماری‌ها و تظاهرات پاتولوژیکی بعدی مؤثر باشد.

زردی نوزادی jaundice (Neonatal) یکی از شایع‌ترین بیماری‌های نوزادی است به طوری که قریب به ۶۰ درصد نوزادان رسیده و ۸۰ درصد نوزادان نارس در طی هفته اول عمر دچار زردی می‌شوند.^۱ میزان شدت زردی در بین افراد مختلف متفاوت بوده و ممکن است با فاکتورهایی مثل نژاد، روش تغذیه، اقلیم منطقه و فصل تولد مرتبط باشد.^۷ نقش احتمالی فصل تولد روی خصوصیات فیزیکی و روانی و استعداد ابتلا به بیماری سال‌هاست که مورد توجه

یافته‌ها

هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین میزان افزایش بیلی روین سرم نوزادان ترم در ۴۸-۲۴ ساعت اول بعد از تولد و فصل سال بود. در این تحقیق ۶۲۹ نوزاد ترم که شرایط ورود به مطالعه را داشتند از اول دی ماه ۸۶ تا اول دی ماه ۸۷ وارد مطالعه شدند. تعداد نوزادان مورد بررسی در فصل بهار ۱۵۲ (۲۴ درصد کل تولد) در تابستان ۱۷۵ مورد (٪۲۷)، پاییز ۱۵۷ مورد (٪۲۵) و در زمستان ۱۴۵ نوزاد (٪۲۳) بود. درصد نوزادان پسر و ۴۸ درصد دختر بودند. میانگین وزن نوزادان ۵۲ کرم و میانگین سن حاملگی $38/6 \pm 0/9$ هفته بود. میانگین افزایش سطح بیلی روین خون وابسته به فصل بود و پیش‌ترین میزان افزایش سطح بیلی روین خون در فصل زمستان و کم‌ترین میزان در فصل پاییز بود (جدول ۱). سطح بیلی روین خون بدنده رابطه‌ای با فصل تولد نداشت. میزان افزایش بیلی روین نزدیک به ۴۸ ساعت بعد از تولد با سایر متغیرها مثل سن مادر، روش زایمان، میزان هماتوکریت در بدو تولد، حضور بیماری زمینه‌ای مادر، سن حاملگی، وزن تولد و جنس نوزاد رابطه معنی‌داری را نشان داد. بعد از تصحیح ارتباط احتمالی این متغیرها رابطه بین افزایش بیلی روین خون و فصل تولد هم‌چنان معنی‌دار بود به طوری که تفاوت میانگین افزایش بیلی روین در فصل زمستان نسبت به سایر فصول از نظر آماری معنی‌دار بود ($P < 0/0001$) (جدول ۲). ولی میزان افزایش بیلی روین در سایر فصول نسبت به یکدیگر رابطه معنی‌داری را نشان نداد. میانگین افزایش بیلی روین در جنس مؤنث $4/08 \pm 1/93$ و در جنس مذکور $3/9 \pm 1/6$ بود که ارتباط معنی‌داری با جنس نداشت ($P = 0/16$).

جدول ۱: ارتباط بین میزان افزایش بیلی روین در فصول مختلف سال

فصل	میانگین افزایش بیلی روین \pm انحراف معیار
بهار	$3/95 \pm 1/4$
تابستان	$3/76 \pm 1/69$
پاییز	$3/51 \pm 1/60$
زمستان	$4/79 \pm 1/99$
	($P \leq 0/0001$)

آزمون آماری ANOVA، مقادیر معنی‌دار $P < 0/05$.

مطالعات اندکی در مورد میزان افزایش بیلی روین خون و رابطه آن با فصل تولد انجام گرفته است که نتایج متفاوتی داشته است.^{۷-۹} با توجه به نبود اطلاعات کافی مبنی بر شواهد در مورد نقش فصل در میزان افزایش بیلی روین بر آن شدیدم که برای اولین بار این تحقیق را در ایران با توجه به اقلیم متفاوت آن انجام دهیم و رابطه افزایش میزان بیلی روین در ۴۸-۲۴ ساعت اول عمر را با فصل تولد بررسی کنیم.

روش بررسی

مطالعه به صورت آینده‌نگر و کوهورت بر روی کلیه نوزادان ایرانی و ترم و سالمندی که از تاریخ اول دی ماه ۸۶ تا اول دی ماه ۸۷ در بیمارستان شریعتی تهران متولد شده‌اند، برای بررسی رابطه میزان افزایش سطح بیلی روین در ۴۸-۲۴ ساعت اول عمر با فصل تولد انجام شد که نوزادان واجد شرایط به ترتیب وارد مطالعه شدند. اندازه‌گیری بیلی روین در بدو تولد با نمونه‌گیری از خون بدنده نوزاد و بعد نزدیک به ۴۸ ساعت بعد از تولد با نمونه‌گیری از خون وریدی محیطی به دست آمد. قبل از نمونه‌گیری رضایت‌نامه کتبی جهت انجام مداخله از والدین اخذ شد. سنجش میزان بیلی روین سرم به روش کالوری‌متري با کيت (Human, Germany) در آزمایشگاه بیمارستان شریعتی انجام شد. نوزادانی که کمبود آنزيم گلوکز-۶-فسفات دهیدروژناز (G6PD) داشتند و هم‌چنین کلیه نوزادانی که ظرف ۴۸ ساعت اول زندگی فتوترایپی دریافت کرده بودند، از مطالعه حذف شدند.

برای مقایسه میزان افزایش بیلی روین در فصول مختلف از تست ANOVA و برای مقایسه افزایش بیلی روین بر حسب متغیرهای دو حالتی از استفاده شد و برای تعیین هم‌بستگی Pearson correlation بین افزایش بیلی روین با متغیرهای کمی از analysis بهره جستیم. حجم نمونه حداقل ۶۰۰ نوزاد محاسبه شد. هزینه انجام آزمایش به طور کامل به عهده اجراءکنندگان طرح بود و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که شامل اطلاعات دموگرافیک مثل سن، جنس، وزن، فصل تولد و غیره و میزان بیلی روین بدنده و بیلی روین ۴۸-۲۴ ساعت بعد از تولد بود. سطح معنی‌دار در آزمون‌ها $P < 0/05$ در نظر گرفته شد و آنالیز آماری با SPSS ویراست ۱۶ صورت گرفت.

می باشد. رابطه سیکل های فصلی و افزایش بیلی رو بین سرم در ساعت های او لیه عمر به تأثیرات مهم عوامل محیطی در طی مرحله بحرانی رشد و نمو اشاره دارد. سایر پدیده های نموی هم ممکن است یک سیکل فصلی را دنبال کنند و بنابراین شاید به الگوی فصلی واکنش به وقایع عفونی و آنتی ژنی را توضیح دهد.^۸ در مطالعه Bottini که بر روی ۳۴۳ نوزاد برای بررسی ارتباط میزان افزایش بیلی رو بین در روز اول زندگی با فصل تولد انجام شده بود نشان داد که میزان افزایش بیلی رو بین در فصل پاییز از سایر فصول به طور معنی داری کمتر است و سایر فصول نیز با هم تفاوت آماری معنی داری را نشان ندادند. در ضمن این افزایش (در فصل بهار و تابستان) در جنس مؤنث به طور معنی داری بیشتر از جنس مذکور بود و بر این اساس نتیجه گرفت که عواملی غیر از عوامل محیطی در ارتباط فصل و میزان افزایش بیلی رو بین تأثیرگذار هستند.^۹

در مطالعه ما، جنسیت نقشی مؤثر در میزان افزایش بیلی رو بین سرم نداشت بنابراین تأثیرات احتمالی عوامل محیطی مربوط به فصل به طور مشترک و به یک اندازه روی نوزاد مذکور و مؤنث تأثیرگذار بوده است و ما تفاوتی در میزان افزایش بیلی رو بین سرم در بین دو جنس مشاهده نکردیم و فصل تولد به عنوان یک فاکتور مستقل در این افزایش مؤثر بوده است. با وجود این که میزان بیلی رو بین بندناه هیچ گونه الگوی فصلی را نشان نداد که احتمال وجود بیاز را در مطالعه ما منتفی می سازد.

در مطالعه Gonazales که بر روی ۶۱ نوزاد با هیپر بیلی رو بین پاتولوژیک انجام شد میزان افزایش بیلی رو بین به طور معنی داری در فصل تابستان بیشتر از سایر فصول بود که ذکر شده بود، احتمالاً درجه حرارت بالاتر در طی تابستان و احتمال بیشتر وقوع دهیدراتاسیون متعاقب آن می تواند این تفاوت را توضیح دهد.^{۱۰} در مطالعه Bottini در سال ۲۰۱۰ رابطه بین فصل و سطح بیلی رو بین را در دوره نوزادی با آنالیز میزان فتوترابی در ۵۵۴۰ نوزاد بررسی کرد. وی نشان داد که بیشترین میزان استفاده از فتوترابی در بین ماه می و آگوست دیده می شود و بین فصل تولد و میزان استفاده از فتوترابی و احتمال وقوع زردی رابطه معنی دار وجود دارد.^{۱۱} در مطالعه Cerna که میزان افزایش بیلی رو بین در دو فصل زمستان و تابستان در نوزادان ترم و سالم مقایسه شده بود، میزان افزایش بیلی رو بین در فصل زمستان بیشتر از تابستان و میزان استفاده از فتوترابی نیز در تابستان

جدول ۲: مقایسه میزان افزایش بیلی رو بین در فصول مختلف سال نسبت به فصل زمستان

فصل نسبت به فصل زمستان	میانگین تفاوت افزایش بیلی رو بین	انحراف معیار	P*
بهار	۰/۸۳۴	۰/۱۹۶	$\leq 0/0001$
تابستان	۱/۰۳۳	۰/۱۹۰	$> 0/0001$
پاییز	۱/۲۸۳	۰/۱۹۵	$> 0/0001$

* آزمون آماری ANOVA، مقادیر معنی دار $P < 0/05$

بحث

در چند روز اول زندگی اکثریت نوزادان دچار افزایش سطح بیلی رو بین خون می شوند و علایم زردی را نشان می دهند. این یک واقعه فیزیولوژیک بوده که به علت نقصان نسی مکانیزم های مسئول دفع بیلی رو بین می باشد.^۱ بیلی رو بین غیر کوتز و گه برای سیستم عصبی مرکزی سمی است ولی از سوی دیگر نقش محافظتی بیلی رو بین در برابر استرس های اکسیداتیو را نبایستی از نظر دور داشت. فاکتور هایی مثل نژاد، مذهب، روش تغذیه و تفاوت های فصلی می توانند در شدت زردی در جمعیت های مختلف تأثیرگذار باشند^{۱۲} و ما در این تحقیق نقش فصل را در میزان افزایش بیلی رو بین در روزهای اول زندگی جویا شدیم، این مطالعه نشان داد که فصل تولد به عنوان یک فاکتور مؤثر در میزان افزایش بیلی رو بین در ۴۸-۲۴ ساعت اول عمر نقش دارد و در فصل زمستان میزان افزایش بیلی رو بین خون به طور معنی داری نسبت به سایر فصول بیشتر است. در حالی که سایر فصل ها نسبت به هم تفاوت آماری معنی داری را نشان ندادند. در ضمن میزان سطح بیلی رو بین بندناه هایی شکل گرفته در پروسه های اکسیداتیو حفاظتی در برابر اکسیدان هایی تقویت کرده است. این مطالعات مسئله تعادل بین صدماتی که ممکن است افزایش متوسط بیلی رو بین خون داشته باشد را با تأثیرات منفی احتمالی فتوترابی مورد توجه قرار داده است.^{۱۳} مکانیزم های دفاعی در نوزاد ضعیف هستند. نوزاد بسیار در مقابل صدمات اکسیداتیو حساس است. در ضمن بایستی به حاطر داشت که مراحل اولیه زندگی خارج رحمی یک دوره بسیار بحرانی از نظر نمو سیستم ایمنی

ممکن است این تفاوت را توضیح دهد که نیازمند مطالعات بیشتری می‌باشد. به هر حال با توجه به عدم وجود مطالعاتی در این زمینه در ایران و توجه به اقلیم منطقه و فاکتورهای محیطی، انجام تحقیقات گسترده‌تر جهت یافتن علتهای محیطی دخیل در افزایش میزان بیلی‌روビین خون در فضول مختلف لازم به نظر می‌رسد.

این مطالعه می‌تواند اطلاعات مفیدی برای بهبود آگاهی پرسنل پزشکی مسئول حمایت نوزاد در جهت شناسایی فاکتورهای خطر و احتمال زردی نوزاد در فضول خاص ارایه کند.

سپاسگزاری: این مقاله حاصل پایان‌نامه دکتر روزا مفید می‌باشد که با عنوان "بررسی ارتباط میزان افزایش بیلی‌روビین طی ۴۸ ساعت بدو تولد با فصل سال در نوزادان ترم متولد شده در بیمارستان شریعتی" از آغاز زمستان ۸۶ تا پایان پاییز ۸۷ در مقطع دکترای عمومی که در سال ۱۳۸۹ و کد ۲۰۶۰۹ و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران اجرا شده است.

به طور معنی‌داری بیشتر بوده و نویسنده نقش تابش نور آفتاب بر میزان بیلی‌روビین سرم در نوزادان را متفقی دانسته بود.^{۱۲} با توجه به مستقل بودن افزایش بیلی‌روビین خون نسبت به سایر متغیرهای ذکر شده به نظر می‌رسد که فصل به صورت یک عامل مستقل در افزایش بیلی‌روビین خون نوزادان نقش داشته باشد.

در مطالعه‌ما، در فصل زمستان این میزان افزایش بیشتر است. در فضول زمستان جهت پیشگیری از هیپوتورمی درجه حرارت محیط نگه‌داری نوزاد افزایش می‌باید که باعث دهیدراتاسیون نوزاد و افزایش میزان بیلی‌روビین خون می‌شود. در ضمن در فصل زمستان تابش آفتاب کم‌تر بوده که می‌تواند تجزیه بیلی‌روビین خون را کاهش داده و مقدار سرمی آن را افزایش دهد. از سایر دلایل احتمالی که نیازمند انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه است تفاوت تغذیه و عادات تغذیه مادر در فضول مختلف سال است. ابتلای بیشتر مادر به بیماری‌های ویروسی و احتمالاً مصرف دارو در فصل زمستان

References

1. Ambalavanan N, Carlo WA. Jaundice and hyperbilirubinemia in the newborn. In: Kliegman RM, Stanton BF, St. Geme JW, Schor NF, Behrman RE, editors. Nelson Textbook of Pediatrics 19th ed. Philadelphia: Elsevier; 2011. p. 603-7.
2. Ding G, Zhang S, Yao D, Na Q, Wang H, Li L, et al. An epidemiological survey on neonatal jaundice in China. *Chin Med J (Engl)* 2001;114(4):344-7.
3. Maimburg RD, Bech BH, Vaeth M, Møller-Madsen B, Olsen J. Neonatal jaundice, autism, and other disorders of psychological development. *Pediatrics* 2010;126(5):872-8.
4. Dudink A. Birth date and sporting success. *Nature* 1994;368: 592.
5. Sven Reher D, Gimeno AS. Marked from the outset: season of birth and health during early life in Spain during the demographic transition. *Continuity Change* 2006;21(1):107-29.
6. Bélanger S, Lavoie JC, Chesseix P. Influence of bilirubin on the antioxidant capacity of plasma in newborn infants. *Biol Neonate* 1997;71(4):233-8.
7. Dailly E, Urien S, Barré J, Reinert P, Tillement JP. Role of bilirubin in the regulation of the total peroxy radical trapping antioxidant activity of plasma in sickle cell disease. *Biochem Biophys Res Commun* 1998;248(2):303-6.
8. Dahlquist G, Källén B. Early neonatal events and the disease incidence in nonobese diabetic mice. *Pediatr Res* 1997;42(4):489-91.
9. Bottini N, Dituri F, Bottini FG. Season of birth and early neonatal events. The rise of serum bilirubin. *Biol Rhythm Res* 2000;31:50-5.
10. González de Dios J, Moya Benavent M, Sirvent Mayor MC, Durá Travé T. Seasonal differences in neonatal jaundice. *An Esp Pediatr* 1996;45(4):403-8.
11. Bottini M, Meloni GF, Bottini FG. Seasonal pattern of phototherapy: A study in the Sardinian population. *Biol Rhythm Res* 2003;34:13-21.
12. Cerna M, Vitek L, Mala K, Konickova R. 1185 seasonal nature of neonatal jaundice. *Pediatr Res* 2010;68:586.

The relation of increasing serum bilirubin during 24-48 hours of birth and birth season

Negar Sajjadian M.D.^{1*}
 Hamideh Shajari M.D.¹
 Rosa Mofid M.D.²
 Ramin Jahadi M.D.³
 Paymaneh Alizadeh Taheri M.D.⁴

1- Department of Pediatric, Shariati Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 2- General Physician, Shariati Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 3- Department of Surgery, Hormozgan University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 4- Department of Pediatric, Bahrami Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Abstract

Received: June 30, 2012 Accepted: November 10, 2012

Background: The relationship between season of birth and human diseases is well known and such a relationship could be mediated by seasonal and environmental effects on early events of extrauterine life. Empirical neonatological experience suggests that prevalence and degree of neonatal jaundice might be dependent on seasonal variation, mainly due to the sunshine duration. However, evidence based data on this issue are scarce. Thus, we have analyzed the seasonal effect on the rise of serum bilirubin level during the neonatal period.

Methods: A prospective cohort study was done on a sample of 629 term and healthy infants born consecutively in Shariati Hospital, Tehran, Iran, during the years 2008-2009. The cord bilirubin level and then the serum bilirubin level near to 48 hour of age were measured. Seasonal differences in rise of serum bilirubin were studied.

Results: Rise of serum bilirubin in spring was 3.95 ± 1.4 mg/dl, in summer 3.76 ± 1.69 mg/dl, in fall 3.51 ± 1.60 mg/dl and in winter 4.79 ± 1.99 mg/dl. Serum bilirubin level in cord blood did not appear to be correlated with season of birth. After correction for the possible effect of these variables the relation between season of birth and rise of serum bilirubin remained significant. The rise of serum bilirubin in winter was significantly higher than other season ($P < 0.0001$).

Conclusion: Season acts as an independent etiological factor of neonatal hyperbilirubinemia. Mean rise of serum bilirubin in winter is higher than other season. This provided information to improve education for nurses in identifying risk factors and the prevention of hyperbilirubinemia readmissions.

Keywords: Bilirubin, neonatal jaundice, season.

* Corresponding author: Shariati Hospital, Karez Ave., Tehran, Iran.
 Tel: +98- 21- 84902541
 E-mail: Nsajjadian@yahoo.com