

## ارتباط بین رتینوپاتی نارسی و شاخص خطر بالینی برای نوزادان

### چکیده

آنلاین: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ دریافت: ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ پذیرش: ۱۳۹۳/۰۲/۱۳

**زمینه و هدف:** چندین فاکتور خطر در رابطه با بروز رتینوپاتی نارسی (ROP) در نوزادان با وزن تولد کم دخالت دارند ولی به رابطه آن با نمره Clinical Risk Index for Babies (CRIB) کمتر پرداخته شده، از این روی این مطالعه جهت بررسی ارتباط بین شاخص CRIB با وقوع رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارس طراحی گردید.

**روش بررسی:** در این مطالعه مقطعی تمام نوزادان بسته شده با وزن تولد کمتر از ۱۵۰۰ گرم و سن حاملگی کمتر از ۲۸ هفته و نوزادانی که سن حاملگی ۲۹-۳۴ هفته با وزن تولد ۱۵۰۰-۲۰۰۰ گرم دارند به شرط داشتن سیرکلینیکی ناپایدار، وارد مطالعه شدند. معاینه چشم پزشکی توسط رتینولوژیست که بی خبر از نمره CRIB بوده انجام و طبقه‌بندی ROP براساس طبقه‌بندی بین‌المللی آن انجام شد. نمره CRIB هر نوزاد در ۱۲ ساعت اول بسته محاسبه و با بروز یا عدم بروز ROP و همچنین با شدت آن مقایسه گردید و K متراز  $0/05$  معنadar تلقی گردید.

**یافته‌ها:** از ۲۵۶ نوزاد نارس بسته، ۷۰٪ (۱۸۰ نوزاد) مبتلا به درجاتی از ROP شدند که در  $0/68/0/88$  (۱۲۴ نوزاد) سیر پسرفت (بی‌بودی) داشتند و لی در  $0/11/0/21$  (۵۶ نوزاد) نیاز به درمان برای ROP پیدا کردند. در جمعیت نوزادان نیازمند به درمان  $0/75$  (۴۲ نوزاد) با تزریق Avastin و  $0/25$  (۱۴ نوزاد) با Laser درمان شدند. میانگین نمره CRIB در گروه با ROP و در گروه بدون ROP  $0/479 \pm 0/002$  بود ( $P=0/004$ ) ولی رابطه نمره CRIB با شدت ROP رابطه معناداری نبود ( $P=0/052$ ).

**نتیجه‌گیری:** شاخص CRIB قادر است در نوزادان تاریخ بروز ROP را پیش‌بینی کند اما نمی‌تواند شدت، پیشرفت و یا پسرفت آن را پیش‌گویی نماید.

**کلمات کلیدی:** رتینوپاتی نارسی، خطر، شیرخوار، نوزاد نارس.

### مقدمه

وازوپرولیفراتیو است که اساساً (نه مطلقاً) در نوزادان نارس رخ می‌دهد. ROP فرآیند طبیعی آثیوژنیس شبکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نوعی توالی هیپرپرولیفراتیو عروقی در پاسخ به ایسکمی رتین ایجاد می‌نماید.<sup>۱</sup>

در سال ۱۹۵۱ Campbell پیشنهاد نمود، شاید ROP با استفاده درمانی از اکسیژن در نوزادان نارس مرتبط باشد.<sup>۲</sup> به دنبال آن شواهد دیگری در تأیید نظریه وی پیدا شد که پزشکان را به محدودیت استفاده از اکسیژن ترغیب کرد. اگرچه با این جریان کاهش

Retinopathy Of Prematurity (ROP) در شبکیه نوزادان نارس که به‌طور کامل واسکولاریزه نشده است، ایجاد می‌گردد و به عنوان عارضه‌ای سمی از اکسیژن درمانی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند باعث کوری گردد.<sup>۱</sup> این بیماری اولین بار در اوایل دهه ۱۹۴۰ با نام فیبرولیازی Retrolental Fibroplasia (RLF) توصیف شد. رتینوپاتی نارسی نوعی رتینوپاتی

موسى احمد پور کچو<sup>\*</sup>

یدالله زاهد پاشا<sup>۱</sup>

سید احمد رسولی نژاد<sup>۲</sup>

محمد حاجی احمدی<sup>۳</sup>

پریسا پورداد<sup>۴</sup>

۱- مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر

کودکان، گروه نوزادان، بیمارستان کودکان امیرکلا، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران.

۲- گروه چشم، بیمارستان آیت‌الله روحانی،

دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران.

۳- گروه آمار و پژوهشکی اجتماعی، مرکز

تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر کودکان،

بیمارستان کودکان امیرکلا، دانشگاه علوم پزشکی

بابل، ایران.

۴- گروه مراقبت و پرور نوزادان، بیمارستان

کودکان امیرکلا، دانشگاه علوم پزشکی بابل،

ایران.

\* نویسنده مسئول: بابل، امیرکلا، بیمارستان کودکان.

مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر کودکان

تلفن: ۰۱۱-۳۲۲۴۲۰۰۷

E-mail:  
mousa\_ahmadpour@hotmail.com

## روش بررسی

این مطالعه مقطعی (Cross-sectional) و تحلیلی بر روی تمامی نوزادان نارس با وزن تولد کمتر از ۱۵۰۰ گرم و سن حاملگی کمتر از ۲۸ هفته و تمام نوزادانی که سن حاملگی ۲۹-۳۴ هفته با وزن تولد ۱۵۰۰-۲۰۰۰ گرم دارند به شرط داشتن سیرکلینیکی ناپایدار، که از اول فروردین ۸۸ لغایت اول آذر ۹۱ در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان کودکان شفیع زاده امیرکلا و بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل بستری شده بودند، انجام شد. طی این مطالعه، تمامی اطلاعات از طریق خلاصه پرونده، پرونده و اطلاعات موجود در بخش‌ها جمع‌آوری شد.

معیار خروج از مطالعه: ۱) نوزادانی که در سیر مطالعه (در دوره نوزادی و پس از آن) فوت شدند. ۲) نوزادانی که اطلاعات نامعلومی در پرونده داشتند و یا دسترسی به آنها ممکن نبود.

از ۲۷۵ نوزادی که در فاصله‌ی زمانی ذکر شده در دو بیمارستان بستری گردیدند و معیارهای لازم جهت ورود به مطالعه را دارا بودند تعداد ۱۸ نوزاد به دلایل زیر از مطالعه خارج گردیدند.

۱) نوزادانی که در سیر مطالعه (در دوره نوزادی و پس از آن) فوت شدند (۱۴ نوزاد، ۵٪).

۲) نوزادانی که اطلاعات نامعلومی در پرونده داشتند و دسترسی به آنها ممکن نبود (چهار نوزاد، ۱/۵٪).

از ۲۵۶ نوزادی که بررسی و معاینه شدند، ۱۰۲ نوزاد (۳۹٪) از بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل و ۱۵۴ نوزاد (۶۰٪) از بیمارستان کودکان شفیع زاده امیرکلا بودند.

حجم نمونه (با برآورد  $P < .20$  و  $CI = .95\% / .95\%$ ) برابر با ۲۵۶ نفر تعیین گردید. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه CRIB و معاینات چشم‌پزشکی و براساس پروتکل داخل بخشی برای رتینوپاتی نارسی انجام گردید. معاینه دقیق چشم‌پزشکی مطابق جدول پروتکل معاینه چشم و در فاصله‌ی بین ۴-۶ هفتگی پس از تولد توسط فوق‌شخص شبکیه انجام شد. نوزادانی که در اولین معاینه چشم عدم رشد رتینال داشتند معاینات هر هفته تکرار شد و سپس هر ۲-۳ هفته تا واسکولاریزاسیون شبکیه کامل گردید. اگر در اولین معاینه چشم نشان داده شد نوزاد هر هفته معاینه گردید، که تکرار معاینه بستگی به شدت یافته‌های بالینی داشت.

چشمگیری در شیوع ROP به وقوع پیوست، ولی میزان مرگ و میر نوزادان و تقایص نوروولژیکی آن‌ها همچون فلچ مغزی Cerebral Palsy (CP) افزایش قابل توجهی نشان داد.<sup>۱</sup> در کارآزمایی بالینی STOP-ROP زمانی که بررسی‌ها بر روی درصد اشیاع اکسیزن خون شریانی و نقش اکسیزن تكمیلی معطوف گردید، نشان داد که اکسیزن تكمیلی باعث کاهش خطر پیشرفت به سمت ROP آستانه‌ای شد (از ۴٪ به ۴۱٪)، ولی این یافته‌ها از نظر بالینی معنادار نبود.<sup>۲</sup>

در سال‌های اخیر با گسترش و بهبودی مراقبت‌های نوزادی شناس بقا در نوزادان نارس افزایش یافته است که موجب افزایش میزان بروز ROP، گردیده است. البته عوامل دیگری غیر از اکسیزن درمانی نیز در پاتوژن آن نقش دارند.

با توجه به اهمیت این بیماری و پیشگیری از آن و با تأکید اینکه ROP در حال حاضر به عنوان اپیدمی سوم در کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌شود، کشورهایی که مراقبت ویژه از نوزادان را در بخش‌های مراقبت ویژه Neonatal Intensive Care Units (NICUs) انجام می‌دهند، در معرض خطر می‌باشند.<sup>۳</sup>

از این روی استفاده از ابزاری که در بدرو بستری نوزاد، بتواند بیمار بدخل را شناسایی نماید در ارزیابی نتیجه عمل تیم پزشکی و پرستاری کمک‌کننده خواهد بود. با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی شاخص CRIB در تعیین شدت بیماری و پیش‌گویی مرگ نوزادان ابزار برتر شناخته شده است و کسب نمره‌ی بالاتر نشان دهنده‌ی بیماری شدیدتر است.<sup>۴</sup> رابطه این شاخص با ROP در این مطالعه بررسی شده است.

در نتیجه جهت ضرورت تشخیص زودتر این بیماری، استفاده از ابزارهایی که برای شناخت نوزادان بدخل در ابتدای بستری در بخش‌های ویژه نوزادان و تطبیق شدت بیماری اولیه با وضعیت نوزاد، شاخص CRIB در پیش‌بینی شدت بیماری و حتی پیش‌گویی مرگ نوزادان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه جهت بررسی ارتباط بین شاخص CRIB در پیش‌بینی وقوع و پیشرفت یا پسرفت رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارس انجام گردید تا ابزاری را جهت معتبر ساختن پیش‌گویی خطر بیماری زایی ROP در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان معرفی کرده و مورد استفاده قرار گیرد.

منحنی، حساسیت و ویژگی نیز به دست آمد. کلیه آنالیزها با نرم‌افزار SPSS ویراست ۲۰ آن انجام شد و همچنین سطح معناداری آزمون‌ها کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

## یافته‌ها

۲۵۶ نوزاد در این مطالعه بررسی و معاینه شدند. ۱۲۷ نوزاد (۴۹/۶٪) جمعیت را نوزادان پسر و ۱۲۹ نوزاد (۵۰/۴٪) جمعیت را نوزادان دختر تشکیل دادند. در جمعیت پسر میانگین وزن زمان تولد ۱۵۷۳/۷۸±۳۲۲/۲۳ گرم و میانگین سن حاملگی ۳۱/۳۲±۲/۰۰ هفته و در جمعیت دختر میانگین وزن زمان تولد ۱۴۰۶/۶۷±۳۳۷/۶۸ گرم و میانگین سن حاملگی ۲۰/۸۵±۲/۳۸ هفته بوده است. بالاترین درصد تشخیص اولیه و نهایی در کل نوزادان بستره شده مربوط به سندروم دیسترنس تنفسی (به ترتیب ۷۰/۳٪ و ۵۲/۳٪) بود. در جمعیت نوزادان مبتلا به ROP، نیز بالاترین درصد تشخیص اولیه و نهایی مربوط به سندروم دیسترنس تنفسی (به ترتیب ۷۳/۹٪ و ۵۷/۸٪) بود. در نوزادان مبتلا به ROP، ۱۱۳ نوزاد (۶۲/۸٪) احیا شدند که بیشترین گام در احیا نوزادان مبتلا، تأمین گرما، وضعیت مناسب و خشک کردن (نخستین گام احیا) ۶۳/۳٪ بود. در این نوزادان، تهییه با فشار مثبت (PPV) ۶۱/۱٪، لوله‌گذاری داخل تراشه ۳۵/۶٪، فشردن قفسه سینه ۲/۸٪ و تجویز اپی‌نفرین ۰/۶٪ نیز استفاده شده بود. نحوه اکسیژن درمانی در کل نوزادان و نوزادان مبتلا به ROP (انکوباتور، هود، فشار هوای مثبت مداوم CPAP و تهییه مکانیکی)، با بالاترین درصد مربوط به هود بود (به ترتیب ۸۳/۲٪ و ۸۴/۴٪). در این مطالعه از ۲۵۶ نوزادی که بررسی و معاینه چشم شدند، ۱۸۰ نوزاد مبتلا به درجاتی از ROP شدند که در میان نوزادان مبتلا به ROP، ۱۲۴ نوزاد (۶۸/۸٪) در معاییات هفتگی خود روند پسرفت را طی کرده و به مرحله درمان نرسیدند و تنها ۵۶ نوزاد (۳۱/۱۱٪) درمان شدند. در جمعیت نوزادان مبتلا به ROP، فراوان‌ترین Stage در گیر در فاز پیشرفته بیماری مربوط به Stage III و فراوان‌ترین Stage در گیر در گیر در فاز I بود. در حالی که فراوان‌ترین Stage در گیر در گیر در فاز III بود. در جمعیت نوزادان مورد مطالعه، ۵۶ نوزاد (۲۱/۹٪) نیاز به درمان داشتند و ۲۰۰ نوزاد (۷۸/۱٪) نوزادانی بودند که روند پسرفت

طبقه‌بندی مراحل و شدت بیماری ROP بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی بیان گردید.<sup>۲</sup> جهت توضیح امتداد خلفی و قدامی، چشم به سه منطقه (Zone) تقسیم می‌شود، Zone I خلفی‌ترین و Zone III قدامی‌ترین منطقه است.

Zone I: دایره‌ای است که مرکز آن منطبق بر دیسک و شعاع آن دو برابر فاصله دیسک تا ماکولاست.

Zone II: از انتهای Ora serrata شروع و تا نازال و تقریباً تا استوا در سمت تمپورال ادامه دارد.

Zone III: مابقی شبکیه که نواحی گیجگاهی فوقانی و تحتانی را در بر می‌گیرد و در قدام Zone II قرار دارد.

مرحله‌بندی (Stage): شدت ROP در پنج مرحله (Stage) تعریف می‌شود که بیماری به‌طور سریالی از این مراحل عبور می‌نماید، اگرچه Stage I تا Stage IV ممکن است به صورت همزمان در یک چشم حضور داشته باشد.<sup>۹</sup>

شاخص CRIB شامل متغیرهای وزن زمان تولد، سن حاملگی، مالفورماتیون مادرزادی، حداقل افزایش باز در ۱۲ ساعت اول، حداقل و حداقل Fractional Concentration of Inspired Oxygen (FIO<sub>2</sub>) مورد نظر در ۱۲ ساعت اول می‌باشد که امتیازدهی بر اساس این عوامل صورت گرفته است<sup>۷</sup> همچنین اطلاعات مربوط به نمره آپگار، یک یا چندقلوی بودن بارداری، نحوه درمان با اکسیژن (در انکوباتور یا با هود یا با دستگاه تهییه مکانیکی)، نوردرمانی، سندروم دیسترنس تنفسی، سپسیس و تزریق خون نیز جمع‌آوری گردید.

در هنگام بستره نوزادان، شاخص CRIB بر اساس جدول نمره‌دهی آن برای هر نوزادی که وارد مطالعه شد، محاسبه گردید. بعد از معاینه چشم توسط چشم پزشک که از نمره CRIB نوزاد بی‌اطلاع بود، وجود یا عدم وجود ROP تعیین شده و در صورت وجود، شدت و یا بهبودی خودبه‌خودی آن در فرمی که بدین منظور تهیه شد ثبت گردید. سپس نمره CRIB هر نوزاد با وجود یا عدم وجود ROP، پیشرفت یا پسرفت آن، نیاز به درمان جهت ROP و وضعیت نهایی دید نوزاد مقایسه گردید. سپس داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Mann-Whitney، Student's t-test همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد مقایسه قرار گرفتند. نقطه برش (Cut off) و قدرت تمایز شاخص CRIB با استفاده از منحنی Receiver Operating Characteristic (ROC) تعیین شد. سطح زیر

میانگین سن حاملگی نوزادانی که ROP داشتند و نداشتند ارتباط معناداری مشاهده شد ( $P=0.000$ ). همچنین ارتباط معناداری در میانگین وزن زمان تولد نوزادانی که دچار ROP شدند و نشدنده یافت شد ( $P=0.000$ ). میانگین نمره CRIB نیز در دو گروه مورد نظر ارتباط معناداری دارد ( $P=0.004$ ) (جدول ۱).

با انجام آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک (پیرسون و اسپیرمن) ارتباط معناداری بین Stage progression و Stage regression با Stage progression یافت نشد (به ترتیب پارامتریک،  $P=0.110$  و  $P=0.414$  ( $P=0.414$ ) (به ترتیب ناپارامتریک،  $P=0.164$  و  $P=0.605$ ). با انجام ROP تست ANOVA نیز بین شاخص CRIB با شدت بیماری زایی ROP در نوزادان نارس ارتباطی مشاهده نشد. بین میانگین نمره CRIB با Zone regression و Zone progression ارتباط معناداری پیدا نشد (به ترتیب  $P=0.060$  و  $P=0.910$ ). همچنین ارتباط معناداری بین میانگین نمره CRIB با Stage progress و Stage regression یافت شد (به ترتیب  $P=0.152$  و  $P=0.180$ ).

مطابق جدول ۲، شاخص CRIB در جمعیت نوزادان نارس مبتلا به ROP، نمی‌تواند پیشرفت و یا پسرفت آن را پیش‌گویی نماید. با توجه به جدول ۳ سطح زیر منحنی برای CRIB،  $CRIB = 0.608 \pm 0.037$  که از نظر آماری معنادار بود ROC (Cut off) مناسب بر اساس منحنی ROC، عدد  $4/50$  است. منحنی ROC، جهت پیش‌بینی وجود ROP توسط شاخص CRIB رسم شد و در نمودار ۱ آورده شد. حساسیت و ویژگی برای نقاط برش CRIB به دست آمد. با توجه به

را طی نمودند یا نوزادانی که به طرف واسکولاریزاسیون طبیعی پیش رفتند. در نوزادان نیازمند به درمان، ۱۴ نوزاد با لیزر ( $25\%$ ) و ۴۲ نوزاد با تزریق آواستین ( $75\%$ ) درمان شدند.


در وضعیت نهایی دید در جمعیت نوزادان مبتلا به ROP، کاهش بینایی سمت چپ  $1/1\%$ ، کاهش بینایی سمت راست  $0/6\%$ ، دید قابل قبول با عینک  $5/78\%$  می‌باشد. در وضعیت نهایی دید در نوزادان بستره شده از اول مرداد ۹۱ آذر ۹۱ لغایت اول آذر  $17/2\%$  از این نوزادان (۳۱ نوزاد) وضعیت نهایی دید آنها Not reported گزارش شده است. آنها نوزادانی بودند که تا زمان گزارش نهایی طرح همچنان معایبات چشمی روئین را انجام می‌دادند و عروق سازی آنها کامل نشده بود. طیف نمرات CRIB در نوزادان مبتلا به ROP، وسیع و از  $0-13$  متغیر بوده است. بالاترین نمره CRIB در جمعیت نوزادان مبتلا به ROP، مربوط به نمره پنج با  $26/7\%$  و پایین‌ترین نمره مربوط به نمره ۱۲ با  $1/1\%$  می‌باشد. بالاترین نمره CRIB در کل نوزادان مربوط به نمره ۱۲ با  $28/9\%$  و پایین‌ترین نمره مربوط به نمره  $12$  با  $0/8\%$  می‌باشد.

با توجه به جدول ۱، در نوزادانی که ROP داشتند میانگین وزن زمان تولد  $1403/47 \pm 333/44$  گرم و میانگین سن حاملگی  $30/54 \pm 2/28$  هفته و میانگین نمره CRIB آنها  $4/79 \pm 2/74$  می‌باشد. در حالی که در نوزادانی که ROP نداشتند میانگین وزن زمان تولد  $1693/49 \pm 259/99$  گرم و میانگین سن حاملگی  $32/38 \pm 1/32$  هفته و میانگین نمره CRIB این نوزادان  $3/78 \pm 2/00$  می‌باشد. در نتیجه در

جدول ۱: ارتباط Birth Weight (BW)، CRIB و Gestational Age (GA) با بروز ROP

P*	انحراف معیار	میانگین	تعداد	ROP	
<0.001	۳۳۳/۴۴	۱۴۰۳/۴۷	۱۸۰	ROP با	<b>BW</b>
	۲۵۹/۹۹	۱۶۹۳/۴۹	۷۶	ROP بدون	
<0.001	۲/۲۸	۳۰/۵۴	۱۸۰	ROP با	<b>GA</b>
	۱/۳۲	۳۲/۳۸	۷۶	ROP بدون	
0.004	۲/۷۴	۴/۷۹	۱۸۰	ROP با	<b>CRIB</b>
	۲/۰۰	۳/۷۸	۷۶	ROP بدون	

\* آزمون Student's t-test



نمودار ۱: منحنی ROC برای شاخص CRIB جهت پیش‌بینی وقوع ROP

جدول ۲: ارتباط بین شاخص CRIB و سیر پیشرفت و پسرفت ROP

P*	فرآوانی	میانگین ± انحراف معیار	ROP
۰/۸۹۰	۴/۷۶±۲/۸۳	۵۶	پیشرفت
۰/۸۹۱	۴/۸۱±۲/۶۹	۱۲۴	پسرفت

\* آزمون Student's t-test

جدول ۳: سطح زیر منحنی ROC

سطح	خطای معیار	P	فاصله اطمینان٪۹۵	مرز پایین	مرز بالا
۰/۶۰۸	۰/۰۰۶	۰/۰۳۷	۰/۶۰۸	۰/۵۳۷	۰/۶۸۰

\* آزمون Z-test

۲/۲٪، بروز ROP شدید (مرحله سه یا بالاتر)، ۴۸/۴٪ محاسبه شد که بیشترین میزان ROP و بقا و کمترین میزان مرگ و میر را داشته است.<sup>۱۰</sup> در مطالعه ما بروز ROP شدید (مرحله سه یا بالاتر)، ۲۱/۹٪ محاسبه شد، که این میزان وقوع ROP شدید در مقایسه با مطالعه Vyas میانگین وزن زمان تولد (۱۴۰۳/۴۷ گرم) و سن حاملگی (۳۰/۵۴ هفته) بالاتری داشتند ولی نمره CRIB (نمره پنج با ۲۶/۷٪) و میانگین آن (۴/۷۹٪) در نوزادان مبتلا پایین‌تر بود.

Fortes و همکارانش در مطالعه‌ای که بر استفاده از SNAPPE-II در پیش‌گویی وقوع رتینوپاتی نارسی در نوزادان Very Low Birth Weigh (VLBW) انجام دادند، نوزادانی که مبتلا به ROP بودند میانگین سن حاملگی (۳۰/۳ هفته) و میانگین وزن تولد (۱۲۰۹/۲ گرم) بیشتری داشتند. میانه SNAPPE-II در میان نوزادان ROP داشتند و نوزادانی که ROP نداشتند به ترتیب ۱۵ و ۶ مورد بود و تفاوت معناداری نشان داده شد. اما سطح زیر منحنی ROC برای شاخص SNAPPE-II ۰/۶۲ و مناسب‌ترین نقطه بررش با حساسیت ۵۴٪ و ویژگی ۶۸٪ بود. بر اساس نتایج منحنی ROC گزارش شد که شاخص SNAPPE-II در زمان پذیرش جهت تشخیص وقوع و ارزیابی خطر ROP شاخصی سریع نمی‌باشد.<sup>۱۱</sup>

محدوده‌ی وسیع حساسیت و ویژگی که برای نقاط برش به دست آمده، حاکی از ارزش این روش نمره‌دهی می‌باشد. حساسیت و ویژگی برای نقطه برش CRIB (عدد ۴/۵۰) جهت پیش‌بینی وقوع ROP، به ترتیب ۵۰٪ و ۷۰٪ محاسبه شد.

## بحث

مطالعه حاضر نشان داد که شاخص CRIB می‌تواند میزان وقوع ROP را در جمعیت نوزادان نارس پیش‌بینی نماید. در حالی که نمی‌تواند شدت بیماری‌زایی و سیر پیشرفت و یا پسرفت ROP را پیش‌بینی نماید. عمدۀ مطالعات انجام شده در زمینه‌ی شاخص CRIB در نوزادان نارس، معطوف به ارزش و اعتبار این شاخص در زمینه‌ی مقایسه‌ی آن با سایر سیستم‌ها و پیش‌بینی میزان مرگ و میر نوزادان بوده و مطالعات اندکی بر روی شاخص CRIB و میزان وقوع ROP و مطالعات مقایسه‌ای میان میزان بقا و میزان ROP شدید (مرحله سه یا بالاتر)، توسط شاخص CRIB در نوزادان نارس در پنج شهر کشور انگلیس انجام شد. نشان داده شد که شهر شماره ۱ با دارا بودن سن حاملگی کمتر از ۲۶ هفته با ۴۷/۵٪ و وزن تولد ۷۵۱ گرم با ۴۱/۲٪ نمره CRIB بیشتر از ۱۰ با

که ROP داشتند در مقایسه با نوزادانی که ROP نداشتند افزایش یافت.<sup>۱۲</sup>

در مطالعه ما، میانگین نمره CRIB در دو گروه مورد نظر (با ROP و بدون ROP) به ترتیب  $4/79$  و  $3/78$  بود و ارتباط معناداری یافت شد ( $P=0/004$ ). بالاترین نمره CRIB در جمعیت نوزادان مبتلا به ROP، مربوط به نمره پنج با  $26/7\%$  و بالاترین نمره CRIB در کل نوزادان مربوط به نمره چهار با  $28/9\%$  بود. در میان نوزادان مبتلا بیشترین نمره  $13$  و کمترین نمره صفر گزارش شد. درصد نمرات ROP در نوزادانی که ROP داشتند در مقایسه با نوزادانی که ROP نداشتند افزایش چندانی نداشت.

در مطالعه Karkhaneh و همکاران، میانگین سن حاملگی در نوزادان دارای ROP،  $29/39$  هفته و در نوزادان بدون ROP،  $31/96$  هفته بود ( $P<0/001$ ). میانگین وزن تولد در نوزادان دارای ROP،  $1283/48$  گرم و در نوزادان بدون ROP،  $1668/55$  گرم بود ( $P<0/001$ ). در  $18/6\%$  از نوزادان با سن حاملگی کمتر از  $32$  هفته و در  $26/2\%$  از نوزادان با وزن تولد کمتر از  $1250$  گرم مشاهده شد.<sup>۱۳</sup>

در مطالعه ما، نوزادانی که ROP داشتند میانگین وزن زمان تولد (نوزادان  $1403/47$  گرم) و سن حاملگی ( $30/54$  هفته) بالاتری داشتند، ولی نوزادانی که ROP نداشتند میانگین وزن زمان تولد ( $1693/49$  گرم) و سن حاملگی ( $32/38$  هفته) تقریباً مشابهی داشتند. ROP در  $18/9\%$  از نوزادان با سن حاملگی کمتر از  $32$  هفته و در  $35/18\%$  از نوزادان با وزن تولد کمتر از  $1250$  گرم مشاهده شد. ملاحظه می‌شود که میزان بروز ROP در این دو مطالعه با سن پایین حاملگی و وزن پایین تولد رابطه مستقیمی دارد. مطلبی که اکثر مطالعات در مورد آن اتفاق نظر دارند تعیین کننده بودن سن حاملگی و وزن زمان تولد بر روی میزان بروز ROP بود.<sup>۱۴</sup> در مطالعه ما نیز سن حاملگی و وزن زمان تولد با بروز ROP رابطه معناداری داشتند.

به طور خلاصه مطالعه حاضر نشان داد که بین شاخص CRIB و میزان وقوع ROP در نوزادان نارس ارتباط معناداری وجود دارد. شاخص CRIB قادر نبود شدت ROP را در نوزادان نارس مبتلا پیش‌بینی نماید. همچنین ارتباطی بین شاخص CRIB و سیر پیشرفت یا پسرفت ROP در نوزادان نارس مبتلا به آن یافت نشد. سپاسگزاری: این مقاله حاصل پایان‌نامه دانشجوی کارشناسی

در حالی که در مطالعه حاضر، میانگین سن حاملگی و وزن تولد نوزادانی که ROP داشتند بالاتر بوده و میانگین CRIB در گروه مبتلا و غیرمبتلا به ROP به ترتیب  $4/79$  و  $3/78$  بود، که تفاوت مشاهده شده معنادار بود. سطح زیر منحنی برای CRIB ( $0/608$ ) با سطح زیر منحنی برای شاخص SNAPPE-II تقریباً نزدیک به هم می‌باشد که هر دو از نظر آماری معنادار گزارش شدند ( $P=0/006$ ). حساسیت و ویژگی CRIB به ترتیب  $50\%$  و  $70\%$  محاسبه شد. که حساسیت و ویژگی شاخص CRIB جهت پیش‌گویی وقوع رتینوپاتی نارسی در مطالعه حاضر به نسبت بالا می‌باشد. همچنین بر اساس نتایج منحنی ROC، شاخص CRIB در زمان پذیرش جهت تشخیص وقوع ROP شاخص با ارزشی می‌باشد.

در مطالعه دیگری ارزش سه شاخص CRIB، Score for Neonatal Acute Physiology (SNAP) در تعیین شدت بیماری و پیش‌گویی مرگ نوزادان مورد بررسی قرار گرفت. نقطه برش مناسب بر اساس منحنی ROC، برای CRIB عدد شش و برای SNAP عدد  $10$  و برای SNAP-PE عدد  $12$  بود. سطح زیر منحنی برای CRIB،  $0/918$  و برای SNAP-PE،  $0/886$  و برای SNAP  $0/89$  محاسبه شد که هر سه از نظر آماری معنادار بودند. حساسیت و ویژگی CRIB جهت پیش‌گویی مرگ نوزادان به ترتیب  $85/85\%$  و  $61/61\%$  گزارش شد که حاکی از ارزش بالای این شاخص است.<sup>۶</sup> در مطالعه حاضر بر اساس منحنی ROC، برای CRIB نقطه برش مناسب عدد  $4/50$  و سطح زیر منحنی، کمتر گزارش شد. حساسیت و ویژگی CRIB جهت ارتباط با ROP به ترتیب  $50/50\%$  و  $70/70\%$  است. بنابراین مشاهده می‌شود که شاخص CRIB، دارای حساسیت و ویژگی بالای جهت ارتباط با ROP در مطالعه حاضر و جهت پیش‌گویی مرگ نوزادان در مطالعه Ghaffari است که حاکی از ارزش این روش نمره‌دهی می‌باشد.

در مطالعه Vakrilova و همکاران، شاخص CRIB به طور معناداری در میان نوزادانی که فوت شده بودند بالاتر بود ( $12/7\%$ )، که این میزان با نوزادانی که زنده مانده بودند ( $6/2\%$ ) مقایسه شد. همچنین میزان مرگ و میر نوزادانی که نمره CRIB  $0/5-0/5$  داشتند  $2/9\%$  و زمانی که این میزان به  $78/6\%$  رسید نوزادان نمره CRIB بیشتر از  $15$  داشتند. درصد نمرات CRIB به طور معناداری در نوزادانی

تحقیقات بالینی بیمارستان کودکان امیرکلا و پرستنل آن مرکز سرکار خانم فائزه آقاجانپور و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

ارشد مراقبت ویژه نوزادان سرکار خانم پریسا پورداد مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل و کد طرح تحقیقاتی به شماره ۹۰۳۲۴۳۶ می‌باشد. بدین وسیله از واحد توسعه و

## References

- Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC, editors. *Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine*. 9<sup>th</sup> ed. St. Louis, Mo: Mosby Elsevier; 2010: p. 1595-99.
- An international classification of retinopathy of prematurity. II. The classification of retinal detachment. The International Committee for the Classification of the Late Stages of Retinopathy of Prematurity. *Arch Ophthalmol* 1987;105(7):906-12. Erratum in: *Arch Ophthalmol* 1987;105(11):1498.
- Campbell K. Intensive oxygen therapy as a possible cause of retrorenal fibroplasia; a clinical approach. *Med J Aust* 1951;2(2):48-50.
- Supplemental Therapeutic Oxygen for Prethreshold Retinopathy Of Prematurity (STOP-ROP), a randomized, controlled trial. I: primary outcomes. *Pediatrics* 2000;105(2):295-310.
- Mousavi Z, Riazi Esfahani M, Roohipoor R, Jabbarvand M, Ghalichi L, Nili Ahmadabadi M, et al. Characteristics of advanced stages of retinopathy of prematurity. *Iranian J Ophthalmol* 2010;22(2):19-24.
- Ghaffari Saravi V, Khani S, Kosarian M, Zaeri Aqamshhady H. Predictive value of SNAP-PE, SNAP, CRIB indices for prediction of disease severity and determination of death in infants admitted to NICU. *J Mazand Univ Med Sci* 2009;19(73):2-9.
- Yang MB, Donovan EF, Wagge JR. Race, gender, and clinical risk index for babies (CRIB) score as predictors of severe retinopathy of prematurity. *J AAPOS* 2006;10(3):253-61.
- The CRIB (clinical risk index for babies) score: a tool for assessing initial neonatal risk and comparing performance of neonatal intensive care units. The International Neonatal Network. *Lancet* 1993;342(8865):193-8.
- Riordan-Eva P, Asbury T, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's General Ophthalmology. 16<sup>th</sup> ed. London: Appleton and Lange; 2002: p. 110-23.
- Vyas J, Field D, Draper ES, Woodruff G, Fielder AR, Thompson J, et al. Severe retinopathy of prematurity and its association with different rates of survival in infants of less than 1251 g birth weight. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 2000;82(2):F145-49.
- Fortes Filho JB, Dill JC, Ishizaki A, Aguiar WW, Silveira RC, Proicianoy RS. Score for Neonatal Acute Physiology and Perinatal Extension II as a predictor of retinopathy of prematurity: study in 304 very-low-birth-weight preterm infants. *Ophthalmologica* 2009;223(3):177-82.
- Vakrilova L, Emilova Z, Sluncheva B, Kalaizdzieva M, Pramatarova T, Iarukova N. Using the CRIB as an early prognostic index for very low birthweight infants, treated in neonatal intensive care unites. *Akush Ginekol (Sofia)* 2007;46 Suppl 1:66-73.
- Karkhaneh R, Riazi Esfahani M, Ghojehzadeh L, Kadivar M, Nayeri F, Chams H, et al. Incidence and risk factors of retinopathy of prematurity. *Bina J Ophthalmol* 2005;11(1):81-90. [Persian]
- Bührer C, Metze B, Obladen M. CRIB, CRIB-II, birth weight or gestational age to assess mortality risk in very low birth weight infants? *Acta Paediatr* 2008;97(7):899-903.

## Correlation between retinopathy of prematurity and clinical risk index for babies score

Mousa Ahmadpour-kacho

M.D.<sup>1\*</sup>

Yadollah Zahed Pasha M.D.<sup>1</sup>

Seyed Ahmad Rasoulinejad

M.D.<sup>2</sup>

Mahmoud Hajiahmadi Ph.D.<sup>3</sup>

Parisa Pourdad M.Sc.<sup>4</sup>

1- Non-Communicable Pediatric Disease Research Center, Department of Pediatrics, Amirkola Children's Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.

2- Retinologist, Rohani Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.

3- Department of Biostatistics, Non-Communicable Pediatric Disease Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

4- Student of Neonatal Intensive Care Nursing , Amirkola Children's Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.

### Abstract

Received: 03 May. 2014 Accepted: 16 Aug. 2014 Available online: 11 Sep. 2014

**Background:** Several risk factors like prematurity, hyperoxia, hyperglycemia, duration of mechanical ventilation and supplemental oxygen use have been attributed to the occurrence of retinopathy of prematurity (ROP) in low birth weight infants. Clinical Risk Index for Babies (CRIB) score have been used to assess the severity of the newborn's disease and neonatal mortality. The relation between the CRIB score and the incidence of retinopathy of prematurity is less assessed. This study was carried out to determine the relation between the CRIB score and retinopathy of prematurity in preterm infants.

**Methods:** In a cross-sectional study all preterm infants admitted to NICU from March 2009 to November 2012, with a birth weight less than 1500 grams and gestational age less than 28 weeks and other premature infants with birth weight 1500 to 2000 grams and gestational age 29 to 34 weeks with an unstable clinical condition, were included. The CRIB score was recorded in first 12 hours of admission to the NICU. Ophthalmologic examination was done by a retinologist unaware of CRIB score. ROP classification was done according to the international classification of ROP. The CRIB score compared with presence or non-presence of ROP and its stage, progression or regression of disease. A P-value less than 0.05 are considered significant.

**Results:** One hundred and eighty (70%) neonates out of 256 neonates developed ROP. In 124 (68.88%) neonates it resolved spontaneously on serial ophthalmologic examination, but fifty-six (31.11%) neonates were required treatment for ROP which 42 (75%) received Avastin and 14 (25%) neonates treated with Laser.

The Mean $\pm$ SD for CRIB score in ROP group was  $4.79\pm2.74$  and in a group without ROP it was  $3.78\pm2.00$  ( $P=0.004$ ). No correlation was found between the severity of ROP and CRIB score ( $P=0.152$ ).

**Conclusion:** The CRIB score can predict the occurrence of ROP, but can't predict its severity and progression or regression.

**Keywords:** retinopathy of prematurity, risk, infant, premature.

\* Corresponding author: Non-Communicable Pediatric Diseases Research Center, No 19, Amirkola Children's Hospital, Amirkola, Babol, Mazandaran Province, 47317-41151, Iran. Tel: +98- 11- 32342007

E-mail:  
mousa\_ahmadpour@hotmail.com