

بررسی بیان ژن *Tsga10* در فرایند تمایز سلول‌های بنیادی جنینی موشی به سلول‌های ژرمینال در محیط آزمایشگاهی

چکیده

دریافت: ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ آنلاین: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

زمینه و هدف: تولید سلول‌های ژرمینال در محیط آزمایشگاهی می‌تواند نویددهنده درمان تعدادی از موارد ناباروری مردان باشد. مطالعه حاضر ضمن بررسی فرایند تمایز سلول‌های بنیادی جنینی موش به سلول‌های ژرمینال، بیان ژن *Tsga10* (Testis specific 10) را نیز برای اولین بار در این فرایند مورد بررسی قرار داده است.

روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه آزمایشگاهی (*In vitro*) است که در گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از بهمن ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۱ انجام شده است. سلول‌های بنیادی جنینی موشی توسط رتینویک اسید (Retinoic acid, RA) به سمت سلول‌های ژرمینال القا شدند. در نمونه سلول‌های در حال تمایز روزهای هفت، ۱۲ و ۲۵ بیان سه گروه از ژن‌های Pre-meiotic و Post-meiotic با استفاده از Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) بررسی شد. برای بررسی بیان ژن *Tsga10* به عنوان یک ژن اختصاصی اسپرماتوژنر، RT-PCR انجام گرفت و نتایج تفسیر گردید. حضور پروتئین TSGA10 در سلول‌های تمایزیافته با وسترن بلاستینگ و ایمونوآیتوشیمی (Immunocytochemistry) تایید شد.

یافته‌ها: در مراحل اولیه روند تمایز (روز ۱۲) میزان نسبی بیان *Tsga10* به ۰/۳۲ مقدار پایه آن در سلول‌های غیر تمایزیافته کاهش یافت. پس از بیان ژن‌های Post-meiotic (روز ۲۵) میزان نسبی بیان *Tsga10* به مقدار ۲/۲ افزایش یافت. همچنین میزان بیان نسبی *Tsga10* در بیضه موش پیچ، ۱۰ و ۱۵ روزه به ترتیب ۱۲۵، ۱۵۰ و ۱۷۰ بود. این میزان در بیضه موش بالغ برابر ۱۶۵۰ برابر شد.

نتیجه‌گیری: در طی فرایند تمایز سلول‌های بنیادی جنینی، بیان *Tsga10* پس از بیان ژن‌های Post-meiotic نسبت به مرحله Meiotic حدود ۶/۶ برابر افزایش داشت. افزایش بیان *Tsga10* در طی عبور از مرحله Meiotic به Post-meiotic نقش این ژن و محصول پروتئین آنرا در مراحل تکامل سلول‌های ژرمینال نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی: بیان ژن، *Tsga10*، سلول‌های بنیادی جنینی، تمایز سلولی، ناباروری مردان، موش.

سید محمد میریونسی^۱

زینب جمالی^۲

مصطفویه رضایی‌پور^۲

الله‌علی نژاد^۲

* محمد حسین مدرسی^۲

۱- مرکز تحقیقات ژنومیک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

۲- گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۵۳۰۰۵ E-mail: modaresi@tums.ac.ir

مقدمه

بسیاری نیز همچنان ناشناخته مانده‌اند. از علل اصلی ناباروری در مردان کاهش تعداد اسپرم، کاهش اسپرم‌های با مورفوЛОژی طبیعی یا اسپرم‌های فاقد حرکت پیشرونده است.^۲ پژوهش‌های انجام شده درباره علل مولکولی اختلال حرکت اسپرم در سال‌های اخیر، اجازه بررسی ژن‌ها و پروتئین‌های مؤثر در تولید اسپرم سالم را به پژوهشگران داده است. ژن‌ها و پروتئین‌های مربوط به ساختار اسپرم،

حدود ۱۰-۱۵٪ زوج‌ها در سراسر دنیا از مشکل ناباروری رنج می‌برند که نیمی از آنها را مردان نابارور تشکیل می‌دهند.^۱ اگرچه برخی از موارد ناباروری مردان با علل شناخته شده‌ای مانند مشکلات مجاری تناسلی یا اختلالات هورمونی قابل توجیه هستند، اما موارد

زنده را دارند. به طور کلی سلول‌های ژرمینال تولیدی توسط مورفولوژی، پروفایل بیان ژنی، مارکرهای پروتئینی سطحی و الگوی متیلاسیون ویژه ژرمینال قابل تشخیص هستند.^۹ با توجه به مطالعات گذشته هنوز مسایل بسیاری در مورد تولید گامت‌های مردانه از سلول‌های بنیادی جنینی ناشناخته باقی مانده است. در این مطالعه چگونگی بیان ژن Tsga10 به عنوان یک مارکر نهایی تولید گامت‌های مردانه، در طول تمایز سلول‌های بنیادی جنینی به سلول‌های ژرمینال در موش مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین جنبه‌های جدیدی از این فرایند روشن گردید.

روش بررسی

این مطالعه از نوع آزمایشگاهی (In vitro) بوده و از بهمن ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۱ در گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. در این مطالعه از سلول‌های فیبروبلاست‌های جنینی موشی (Mouse embryonic fibroblasts (MEFs)) به عنوان لایه‌ی سلولی تغذیه‌کننده (Feeder) استفاده شد، جهت تهیه این سلول‌ها، جنین‌ها را در روز ۱۲/۵ بارداری موش‌ها خارج کرده، کیسه زرده، آمنیون و جفت از آن جدا شده و جنین‌ها پس از چندین مرحله شست و شو قطعه‌قطعه می‌شوند، سپس این قطعات درون ۱۰ ml محلول Trypsin/EDTA ریخته و پس از چرخش مغناطیسی و سانتریفیوژ، رسوب سلولی تشکیل می‌شود که آنرا در محیط کشت قرار داده سپس این محلول را به دو فلاسک کشت سلولی ۷۵ cm² منتقل می‌شوند. از میتومایسین C برای متوقف کردن تکثیر این سلول‌ها استفاده شد.

سلول‌های بنیادی جنینی روی این محیط کشت داده شدند. جهت القای فرایند تمایز، سلول‌های بنیادی جنینی با به کارگیری تریپسین از سلول‌های MEF جدا می‌شوند. پس از آن، مراحل تمایز برای سلول‌ها شروع شد. برای شروع تمایز ابتدا لازم است Leukemia inhibitory factor (LIF) از مواد محیط کشت حذف شود. در این مطالعه از رتینویک اسید (Retinoic acid, RA) با غلظت M^{-۵} برای القای تمایز استفاده شد. پس از اضافه کردن RA به محیط کشت، تعدادی از سلول‌های بنیادی جنینی وارد مرحله میوز می‌شوند. برای اینکه سلول‌ها بتوانند میوز را به پایان برسانند باید سلول‌هایی که وارد میوز

سیگنال‌های کلسمی، فسفوریلاسیون پروتئینی و متاپولیسم هر یک می‌توانند در کارکرد طبیعی اسپرم مؤثر باشند. تاکنون عوامل ژنتیکی مختلفی به عنوان عامل مؤثر در اختلال حرکتی اسپرم مطرح شده‌اند. یکی از این بیماری‌ها، سندروم کارتازنر (Kartagener syndrome) است که به عنوان بیماری اتوزومال مغلوب با اختلال عمومی در سلول‌های مژکدار بدن از جمله اسپرم و مسیرهای تنفسی شناخته می‌شود.

تاکنون سه ژن مؤثر در ساختمان آکسونم به عنوان عوامل مولکولی این بیماری شناخته شده‌اند و به نظر می‌رسد همچنان ژن‌های دیگری در این بیماری مؤثر باشند.^{۱۰} در قطعه میانی دم اسپرم، آکسون متوسط با ۹ فیبر فشرده خارجی (Outer dense fibers, ODF) احاطه شده و با پوشش میتوکندریال در برگرفته می‌شود. در بخش انتهایی که پس از قطعه میانی قرار گرفته است، این پوشش میتوکندریال به وسیله پوشش فیبری (Fibrous sheath, FS) جایگزین می‌گردد. در FS دو عدد از ODF به وسیله قطعات طولی جایگزین می‌شود که این قطعات توسط طناب‌های عرضی بهم وصل می‌شوند. مطالعاتی که در ساختار و متاپولیسم FS انجام شده، نشان داده است که به احتمالی این جزء نقش مهمی در توانایی حرکت اسپرم دارد.^{۱۱} ژن Tsga10 جزو دسته ژن‌های اختصاصی بیضه است که بر روی کروموزوم یک موش و کروموزوم دو انسان واقع شده است. این ژن در مراحل آخر اسپرماتوژن بیان می‌شود و به ظاهر نقش مهمی در پوشش فیبری دم اسپرم دارد. این ژن در بیضه افراد نرمال بیان می‌شود اما در افراد مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی بیان نمی‌شود.^{۱۲}

توانایی تولید سلول‌های ژرمینال از سلول‌های بنیادی جنینی (Embryonic stem cells, ESCs) الگو قدرتمندی را برای بررسی تکامل سلول‌های ژرمینال ایجاد کرده است. این الگو به ویژه در انسان که برداشت و دستکاری بافت‌ها در محیط داخل بدن دشوار است ارزشمند است.^{۱۳} به تازگی در چندین آزمایشگاه تولید سلول‌های شبیه اووسیت و سلول‌های ژرمینال مردانه از ESC نشان داده شده است.^{۱۴} طبق این مطالعات تعداد کمی از ESCs می‌توانند به طور خودبه‌خودی یا در حضور فاکتورهای رشد ویژه مثل BMP4, BMP7 (Primordial germ cells) یا BMP8 به سلول‌های ژرمینال پریموردیال، PGCs که پیش‌ساز اسپرم هستند تبدیل شوند.^{۱۵} در یک مورد هم ثابت شده که سلول‌ها وارد میوز شده‌اند و توانایی لقا و تولید نوزاد

استفاده از محلول رنگزا DAB (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA)، بودن پروتئین TSGA10 بررسی شد.

یافته‌ها

ژن‌های پرتوانی (Pluripotency) در سلول‌های بنیادی جنینی ژن‌های *Nanog* و *Oct4* بیان بالایی داشتند ولی در نمونه‌های کنترل منفی بیانی نداشت.

بیان ژن‌های *Meiotic* و *Post-meiotic* (به عنوان ژن *Stra8* (Pre-meiotic) و *Spata19* (Post-meiotic)) بعد از شروع RA به شدت افزایش یافته و این به معنی ورود سلول‌ها به مرحله میوز است. در همین زمان است که سلول‌های بنیادی جنینی که ناقل وارد آنها شده است به رنگ سبز در می‌آیند. بیان *Stra8* در تمامی نمونه‌های روزهای هفت و ۱۲، ۲۵ بالا بود. بیان ژن‌های *Dazl* و *Sycp3* (Meiotic) از هفت روز پس از شروع RA آغاز شد. ژن *Dazl* روز هفت و ژن *Sycp3* در نمونه‌های روز ۱۲ شروع به بیان کردند. به نظر می‌رسد آغاز ورود سلول‌ها به میوز از روز هفت پس از شروع RA باشد (شکل ۱). بیان ژن‌های *Prml* (به عنوان مارکرهای Post-meiotic) در تمامی نمونه‌های ES غیرتمایزیافته و نمونه‌های روزهای هفت و ۱۲ منفی بود. پس از گذشت ۲۵ روز از شروع فرایند تمایز بیان این ژن‌ها مثبت شد.

واکنش Real-time برای برسی بیان ژن *Tsga10* در تمامی نمونه‌های موجود انجام شد. واکنش‌ها به صورت دوتایی (Duplicate) StepOne™ Real-Time PCR Systems طراحی و در دستگاه StepOne Software (Applied Biosystems, Austin, TX, USA) انجام شد.

سلول‌های بنیادی جنینی غیرتمایزیافته بیان پایینی از *Tsga10* را نشان دادند. در آنالیز میزان بیان ژن با نرم‌افزار StepOne Software این میزان بیان در سلول‌ها را معادل بیان پایه در نظر گرفته شد و عدد یک به آن اختصاص داده شد. نتایج نشان داد که در مراحل اولیه روند تمایز سلول‌های بنیادی جنینی به سلول‌های ژرمنیال (یعنی در روز ۱۲) میزان *Tsga10* به ۰/۳۲ کاهش یافت. پس از بیان ژن‌های Post-meiotic نسبی بیان *Tsga10* به ۰/۲۵ میزان نسبی بیان *Tsga10* meiotic یعنی در نمونه مربوط به روز ۲۵ میزان نسبی بیان *Tsga10* به مقدار ۰/۲۲ افزایش یافت. در این مطالعه از نمونه بیضه موش پنج، ۱۰ و ۱۵ روزه و نیز موش بالغ به عنوان کنترل استفاده شد. میزان بیان نسبی


نشده‌اند را از بقیه جدا کرد. سلول‌های بنیادی جنینی مورد استفاده در این مطالعه حاوی ناقل pEGFP1 بودند که پیش‌تر، پرمووتر ژن *Stra8* پیوست به سکانس EGFP در آن کلون گردیده بود. بنابراین با ورود سلول‌ها به میوز، GFP در آنها بیان می‌شود و سلول‌ها سبزرنگ می‌شوند، که اساس جداسازی سلول‌ها است. جداسازی سلول‌ها با دستگاه BD FACSAria II (BD Biosciences, San Jose, CA, USA) انجام گرفت. طول موج دستگاه برای این آزمایش روی ۵۰۷ nm به عنوان سیگنال Emission تنظیم شد. پس از انجام Cell sorting سلول‌های جداشده به یک فلاسک ۲۵ cm² حاوی MEF غیرفعال شده منتقل شدند.

برای تمایز نهایی، از سلول‌هایی که بر اساس بیان GFP جدا شده‌اند استفاده شدند. این سلول‌ها را تحت اثر RA با غلظت M ۱۰^{-۸} قرار داده و هر روز محیط کشت سلول‌ها را تعویض شد و در طی این مدت مورفو‌لوژی سلول‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌هایی از سلول‌ها در فواصل زمانی هفت، ۱۲ و ۲۵ روز پس از آغاز RA از سلول‌ها تهیه شد. RNA از سلول‌ها و نیز از بافت بیضه موش پنج و ۱۰ و ۱۵ روزه استخراج شد.


بررسی بیان سه گروه ژن *Meiotic*، *Post-meiotic* و *Reverse* (به عنوان مارکرهای *Stra8*, *Dazl* و *Spata19*) به عنوان مارکرهای *Pluripotency* (به عنوان مارکرهای *Oct4* و *Nanog*) در این مطالعه بیان ژن‌های *Tsga10* با استفاده از تکنیک RT-PCR بررسی شد.

بررسی تغییرات بیان ژن *Tsga10*: بیان این ژن به عنوان یک ژن اختصاصی اسپرمانوژن توسط Real-time RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت و در کنار آن از ژن *Tbp* نیز به عنوان یک ژن House keeping استفاده شد. برای آنالیز داده‌ها از StepOne™ software version 2.1 (Applied Biosystems, Austin, TX, USA) استفاده گردید.


بررسی حضور پروتئین TSGA10 در سلول‌های تمایزیافته: جهت انجام وسترن بلاستینگ سلول‌های تمایزیافته لیز شده و الکتروفورز-SDS PAGE بر روی محصول لیز سلولی و همچنین لیز بافت بیضه انجام شد پس از آن بلاستینگ صورت گرفت. واکنش ایمونوسایتوشیمی با استفاده از آنتی‌بادی اولیه منوکلونال TSGA10 Mouse Anti Human Ig-HRP انجام شد. پس از آن با آنتی‌بادی ثانویه Goat Anti Mouse Ig-HRP




شکل ۲: میزان بیان نسی *Tsga10* در نمونه‌های مختلف: A: سلول‌های بنیادی جنینی غیرتمایزیافته، B: روز ۱۲، C: روز ۲۵، D: تمایز به کاردیومیوسیت، E: بیضه موش ۱۵ روزه و F: بیضه موش بالغ.



شکل ۱: A-1: بیان ژن *Star8* در (۱) سلول‌های ES پس از RA و (۲) سلول‌های بنیادی جنینی غیرتمایزیافته. B: بیان *Dazl* در (۱) نمونه روز هفت و (۲) سلول‌های بنیادی جنینی غیرتمایزیافته و C: بیان *Sycp3* در (۱) نمونه روز ۱۴ و (۲) سلول‌های بنیادی جنینی غیرتمایزیافته. (Ladder 100bp).



شکل ۴: A و B: کلونی‌های سلول‌های بنیادی جنینی در طی تمایز بیان پروتئین TSGA10. C: کنترل منفی (کلونی‌های بدون آنتی‌بادی اولیه)



شکل ۳: بیان پروتئین TSGA10 در سلول‌های تمایزیافته (۱) و بیضه موش بالغ (۲)

پنج روزه بود. میزان بیان *Tsga10* در بیضه موش بالغ حدود ۹/۷ برابر بیان در موش ۱۵ روزه بود. جهت بررسی وجود پروتئین TSGA10 در سلول‌های بنیادی جنینی تمایزیافته به سلول‌های ژرمینال و نمونه بیضه موش از تست وسترن بلاست استفاده شد. در نمونه بیضه موش یک باند قوی ۶۵ کیلو Dalton و یک باند ضعیفتر در محدوده ۲۷ کیلو Dalton دیده شد. در نمونه سلول‌های تمایزیافته هم این دو باند باشد کمتر دیده شد (شکل ۳). بر اساس پرتوگلکل، سلول‌های بنیادی جنینی تمایزیافته به ژرم سل با آنتی‌بادی پلی‌کلونال TSGA10 مورد بررسی قرار گرفتند.

Tsga10 در بیضه موش پنج روزه برابر ۱۲۵، در بیضه موش ۱۰ روزه برابر ۱۵۰ و در بیضه موش ۱۵ روزه ۱۷۰ بود. میزان این بیان در بیضه موش بالغ برابر ۱۶۵۰ بود (شکل ۲).

بر اساس این داده‌ها در طی تمایز سلول‌های بنیادی جنینی به سلول‌های ژرمینال در هنگام ورود سلول‌ها به میوز میزان بیان *Tsga10* به حدود ۱/۳ کاهش یافت. سپس در طی گذراز میوز به مرحله Post-meiotic *Tsga10* حدود ۶/۹ برابر افزایش یافت. در محیط *In vivo* نیز میزان بیان *Tsga10* در بیضه موش ۱۵ روزه ۱/۱۳ برابر موش ۱۰ روزه و در موش ۱۰ روزه ۱/۲ برابر موش

سلول‌های ژرمنیال از فاز میوزی (موش ۱۵ روزه) به Post-meiotic و اسپرم بالغ میزان بیان *Tsga10* به شدت افزایش می‌یابد و همچنین در طی فرایند تمایز سلول‌های بنیادی جنینی، بیان *Tsga10* در روز ۲۵ پس از شروع RA (پس از بیان ژن‌های Post-meiotic) نسبت به کشت روز ۱۲ (فاز میوزی) حدود ۶/۶ برابر افزایش داشت. افزایش *Tsga10* در طی عبور از فاز Meiotic به Post-meiotic نقش این ژن و محصول پروتئین آنرا در مراحل تکامل سلول‌های ژرمنیال نشان می‌دهد. اگرچه هم در محیط In vitro و هم در محیط In vivo افزایش بیان *Tsga10* مشاهده شد اما این افزایش در محیط In vivo بیش از محیط In vitro بود. این تفاوت بیان ممکن است به علت تفاوت در میزان کارایی فرایند تمایز در بیضه موش نسبت به کشت تک لایه در محیط In vitro باشد.

در آزمایش وسترن بلات در نمونه بیضه موش ما دو باند مجزا مشاهده کردیم که باند بزرگتر مربوط به پروتئین کامل TSGA10 و باند کوچکتر مربوط به بخش شکسته شده است که در ساختار دم اسپرم نقش دارد. در نمونه سلول‌های ژرمنیال حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی جنینی نیز ما به طور ریزبینانه همین الگو را مشاهده کردیم که بیانگر مسیر درست تمایزی است. در این مطالعه جهت پیگیری تمایز سلول‌های بنیادی به مرحله Post-meiotic از ژن *Stra8* به عنوان ژن Pre-meiotic، ژن‌های *Dazl* و *Sycp3* به عنوان ژن‌های Meiotic و ژن‌های *Prm1* و *Spata19* به عنوان ژن‌های Post-meiotic استفاده شد.

یکی از روش‌های بررسی اثرات یک ژن در موجودات زنده غیرفعال کردن این ژن و مطالعه تغییر در بیان ژن‌های هدف و یا اختلالات عملکردی در موجود است. تولید موجود زنده به این روش یعنی تولید حیوان Knockout روش زمانبر و پرهزینه‌ای است.^{۱۸} مشکلات تولید سازه مناسب جهت غیرفعال کردن ژن به علاوه مسایل مربوط به تولید جنین و حیوان زنده، این کار (تولید حیوان Knockout) را در زمرة سخت‌ترین مطالعات آزمایشگاهی قرار داده است. زمانی که قرار است بررسی ژن‌های دخیل در فرایند اسپرماتوژن مورد بررسی قرار گیرند این فرایند کمی سخت‌تر می‌شود.

یک روش جایگزین برای بررسی نقش ژن‌های دخیل در مراحل اسپرماتوژن، استفاده از الگو تولید سلول‌های ژرمنیال در محیط

پس از اضافه کردن DAB، سلول‌های موردنظر به رنگ قهوه‌ای درآمدند که نشان‌دهنده حضور پروتئین TSGA10 در سلول‌ها بود (شکل ۴).

بحث

در مطالعه حاضر روند تمایز سلول‌های بنیادی جنینی به سمت سلول‌های ژرمنیال را بر اساس زمان‌بندی گذر از مراحل مختلف میوز بررسی و از ژن *Tsga10* به عنوان یک شاهد جهت بررسی سلول‌های ژرمنیال تولیدی از نظر بیان ژن‌های عملکردی و نیز مقایسه‌ی تمایز بین محیط In vitro و In vivo استفاده کردیم.

مطالعات پیشین نشان‌دهنده ارتباط قوی بین بیان ژن *Tsga10* و انجام اسپرماتوژن هستند.^{۱۰} پروتئین کامل TSGA10 قبل از شکسته شدن ۶۵ کیلوالتون است و پس از شکسته شدن، تکه ۲۷ کیلوالتونی قسمت N-terminal آن در ساختار دم اسپرم شرکت می‌کند. در پژوهش‌های پیشین نشان داده شده که پروتئین TSGA10 یک دامین تفکیک کروموزومی دارد و در سلول‌های با میزان رشد بالا مانند بافت‌های جنینی و تعداد زیادی از سرطان‌های اولیه بیان بالای دارد.^{۱۱}

در نتیجه این ژن به عنوان یک ژن Cancer testis antigen معرفی شده است.^{۱۲}^{۱۳} همچنین در پژوهش‌های اخیر بیان این ژن در برخی از بیماری‌های اتو ایمیون نشان داده شده است.^{۱۴}^{۱۵} مشاهده گردید که در طی گذر سلول‌های ژرمنیال تولید شده در محیط آزمایشگاهی از مرحله Meiotic به Post-meiotic میزان بیان *Tsga10* افزایش می‌یابد که این افزایش مطابق با تغییرات In vivo است. مراحل تکامل سیر اسپرماتوژن در بیضه موش پس از تولد به سه فاز می‌تواند تقسیم شود: از دیاد سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونیال (Spermatogonial stem cells, SSCs) در روزهای یک تا هفت پس از تولد، شروع میوز و تمایز SSCs به اسپرماتوسایت و در نهایت تولید اسپرماتیدهای گرد هاپلوبید در طی روزهای هشت تا ۲۰ پس از تولد و در نهایت اسپرمیوزن و تولید اسپرماتوزوآی بالغ در طی روزهای ۲۱ تا ۳۶ پس از تولد موش.^{۱۶}

نتایج این مطالعه نشان داد، میزان بیان ژن *Tsga10* در بیضه موش بالغ نسبت به موش ۱۵ روزه حدود ۹/۷ برابر است، که در طی گذر

غیرفعال کردن یک ژن در فرایند اسپرماتوژن استفاده کرد. افزون بر این با بررسی های بیشتر و بهبود روش های تمایزی در آینده می توان از این سلول ها برای حل مشکل ناباروری در تعدادی از بیماران نابارور استفاده کرد.

سپاسگزاری: این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه دانشجویی با عنوان "بررسی بیان ژن *Tsga10* در فرایند تمایز سلول های بنیادی (In vitro)" جنینی موشی به سلول های ژرمینال در محیط آزمایشگاهی است که در مقطع دکتری تخصصی، در سال ۱۳۹۰-۹۱ با کد ۱۱۸۶۸-۳۰-۹۰-۰۱-۳۰ با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا شده است.

آزمایشگاهی (In vitro derived germ cells) از سلول های بنیادی جنینی به جای تولید حیوان Knockout است. به طوری که اگر در سلول های بنیادی جنینی یک ژن اختصاصی بیضه را Knockout کرده (در یک زنجیره یا هر دو زنجیره DNA) و سپس این سلول ها را در فرایند تمایز به سمت سلول های ژرمینال قرار دهیم، اثرات غیرفعال شدن آن ژن در سلول های حاصل قابل بررسی است.

بنابراین به نظر می رسد با توجه به شباهت الگوی بیان ژنی در فرایند تولید آزمایشگاهی سلول های ژرمینال از سلول های بنیادی جنینی، از این سلول ها می توان به عنوان الگویی برای بررسی اثرات

References

- Massart A, Lissens W, Tournaye H, Stouffs K. Genetic causes of spermatogenic failure. *Asian J Androl* 2012;14(1):40-8.
- Matzuk MM, Lamb DJ. Genetic dissection of mammalian fertility pathways. *Nat Cell Biol* 2002;4 Suppl:s41-9.
- Turner RM, Musse MP, Mandal A, Klotz K, Jayes FC, Herr JC, et al. Molecular genetic analysis of two human sperm fibrous sheath proteins, AKAP4 and AKAP3, in men with dysplasia of the fibrous sheath. *J Androl* 2001;22(2):302-15.
- Gadella BM, Van Gestel RA. Bicarbonate and its role in mammalian sperm function. *Anim Reprod Sci* 2004;82-83:307-19.
- Mobasher MB, Modarressi MH, Shabani M, Asgarian H, Sharifian RA, Vossough P, et al. Expression of the testis-specific gene, TSGA10, in Iranian patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL). *Leuk Res* 2006;30(7):883-9.
- Kerr CL, Cheng L. The dazzling in germ cell differentiation. *J Mol Cell Biol* 2010;2(1):26-9.
- Toyooka Y, Tsunekawa N, Akasu R, Noce T. Embryonic stem cells can form germ cells in vitro. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2003;100(20):11457-62.
- Lacham-Kaplan O, Chy H, Trounson A. Testicular cell conditioned medium supports differentiation of embryonic stem cells into ovarian structures containing oocytes. *Stem Cells* 2006;24(2):266-73.
- Bucay N, Yebra M, Cirulli V, Afrikanova I, Kaido T, Hayek A, et al. A novel approach for the derivation of putative primordial germ cells and sertoli cells from human embryonic stem cells. *Stem Cells* 2009;27(1):68-77.
- Modarressi MH, Cameron J, Taylor KE, Wolfe J. Identification and characterisation of a novel gene, TSGA10, expressed in testis. *Gene* 2001;262(1-2):249-55.
- Behnam B, Modarressi MH, Conti V, Taylor KE, Puliti A, Wolfe J. Expression of *Tsga10* sperm tail protein in embryogenesis and neural development: from cilium to cell division. *Biochem Biophys Res Commun* 2006;344(4):1102-10.
- Peschon JJ, Behringer RR, Brinster RL, Palmiter RD. Spermatid-specific expression of protamine 1 in transgenic mice. *Proc Natl Acad Sci USA* 1987;84(15):5316-9.
- Ghafoori-Fard S, Modarressi MH. Cancer-testis antigens: potential targets for cancer immunotherapy. *Arch Iran Med* 2009;12(4):395-404.
- Smith CJ, Oscarson M, Ronnlblom L, Alimohammadi M, Perheentupa J, Husebye ES, et al. TSGA10 - A target for autoantibodies in autoimmune polyendocrine syndrome type 1 and systemic lupus erythematosus. *Scand J Immunol* 2011;73(2):147-53.
- Roghanian A, Jones DC, Pattison JV, Wolfe J, Young NT, Behnam B. Filament-associated TSGA10 protein is expressed in professional antigen presenting cells and interacts with vimentin. *Cell Immunol* 2010;265(2):120-6.
- Reimand K, Perheentupa J, Link M, Krohn K, Peterson P, Uibo R. Testis-expressed protein TSGA10 an auto-antigen in autoimmune polyendocrine syndrome type I. *Int Immunol* 2008;20(1):39-44.
- Malkov M, Fisher Y, Don J. Developmental schedule of the postnatal rat testis determined by flow cytometry. *Biol Reprod* 1998;59(1):84-92.
- Childs AJ, Saunders PT, Anderson RA. Modelling germ cell development in vitro. *Mol Hum Reprod* 2008;14(9):501-11.

Expression analysis of *Tsga10* during *in vitro* differentiation of germ cells from mouse embryonic stem cell

Mohammad Miryounesi M.D., Ph.D.¹
 Zeinab Jamali M.Sc.²
 Masoumeh Razipour M.Sc.²
 Elahe Alavinejad M.Sc.²
 Mohammad Hossein Modarresi M.D., Ph.D.^{2*}

1- Genomic Research Center,
 Shahid Beheshti University of
 Medical Sciences, Tehran, Iran.
 2- Department of Medical Genetics,
 School of Medicine, Tehran University
 of Medical Sciences, Tehran,
 Iran.

Abstract

Received: 09 Aug. 2014 Accepted: 14 Jan. 2015 Available online: 09 Feb. 2015

Background: About 15% of couples have fertility problems and male factor in fertility accounts for half of the cases. In vitro generation of germ cells introduces a novel approach to male infertility and provides an effective system in gene tracking studies, however many aspects of this process have remained unclear. We aimed to promote mouse embryonic stem cells (mESCs) differentiation into germ cells and evaluate its effectiveness with tracking the expression of the Testis specific 10 (*Tsga10*) during this process.

Methods: This is an *in vitro* study that was performed in department of Medical Genetics in Tehran University of Medical Sciences from February 2012 to March 2013. Mouse embryonic stem cells were cultured on mouse embryonic fibroblast as feeder layer. Then mESCs were differentiated into germ cells in the presence of Retinoic Acid. Based on developmental schedule of the postnatal testis, samples were taken on the 7th, 12th and 25th days of the culture and were subjected to expression analysis of a panel of germ cell specific genes (*Stra8* as pre-meiotic, *Dazl* and *Sycp3* as meiotic and *Protamin1* and *Spata19* as Post-meiotic). Expression of Testis Specific Gene 10 (*Tsga10*) at RNA and protein levels was then analyzed.

Results: It was shown that transition of embryonic stem cells from mitosis to meiosis occurred between 7th and 12th days of mESC culture and post-meiotic gene expression did not occur until 25th day of the culture. Results showed low level of *Tsga10* expression in undifferentiated stem cells. During transition from meiotic to post-meiotic phase, *Tsga10* expression increased in 6.6 folds. This finding is in concordance with *in vivo* changes during transition from pre-pubertal to pubertal stage. Localization of processed and unprocessed form of the related protein was similar to those *in vivo* as well.

Conclusion: Expression pattern of *Tsga10*, as a gene with critical function in spermatogenesis, is similar during *in vitro* and *in vivo* germ cell generation. The results suggest that *in vitro* derived germ cells could be a trusted model to study genes behavior during spermatogenesis.

Keywords: Cell differentiation, embryonic stem cells, gene expression, male infertility, mice, *Tsga10*.

* Corresponding author: Department of Medical Genetics, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Pour Sina St., Qods St., Keshavarz Blvd., Tehran, Iran.
 Tel: +98-21-88953005
 E-mail: modaresi@tums.ac.ir