

مقایسه تشخیص فنوتیپی آنژیم‌های بتالاکتاماز وسیع طیف با استفاده از E-test ESBL و Combined disk method در کلپسیلا پنومونیه: گزارش کوتاه

آنلاین: ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

پذیرش: ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

دریافت: ۱۳۹۳/۰۸/۰۴

چکیده

زمینه و هدف: تولید پنی‌سیلینازها و دیگر آنژیم‌های بتالاکتاماز اصلی‌ترین مکانیسم مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام در بین خانواده انتروباکتریا سه است. هدف مطالعه مقایسه تشخیص آنژیم‌های بتالاکتاماز وسیع طیف با استفاده از دو روش فنوتیپی در ایزوله‌های کلپسیلا پنومونیه بود.

روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی ۱۴۴ ایزوله کلپسیلا پنومونیه از نمونه‌های بالینی در یک دوره شش ماهه از آذر سال ۱۳۹۱ در شیراز ایزوله و شناسایی شدند. تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی و بررسی تولید آنژیم‌های بتالاکتاماز به روش E-test ESBL و Combined disk method مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: مجموعاً ۳۸ ایزوله تولیدکننده ESBL به کمک روش E-test ESBL سفتازیدیم شناسایی شدند. به کمک دیسک‌های ترکیبی سفتازیدیم/کلاوولاتیک اسید، سفوتاکسیم/کلاوولاتیک اسید و سفپودکسیم/کلاوولاتیک اسید به ترتیب ۳۴، ۳۵ و ۳۱ ایزوله مولد بتالاکتاماز شناسایی شدند.

نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای باکتری‌های مولد ESBL غربالگری این باکتری‌ها از نظر تولید ESBL می‌تواند در درمان و انتخاب داروهای موثر مهم باشد.

کلمات کلیدی: مطالعه مقطعی، بتالاکتاماز، کلپسیلا پنومونیه، عفونت.

داخلی و غشای خارجی دیواره سلولی واقع شده‌اند.^۱ شناسایی سویه‌های مولد این آنژیم‌ها با روش معمول آزمایش حساسیت در برابر عوامل ضدمیکروبی به سختی امکان‌پذیر می‌باشد و از طرف دیگر، این آنژیم‌ها توسط ژن‌های پلاسمیدی در میان باکتری‌ها به سرعت انتقال می‌یابند.^۲ هدف از این مطالعه مقایسه تشخیص فنوتیپی آنژیم‌های بتالاکتاماز وسیع طیف (ESBL) با استفاده از E-test ESBL و Combined disk method در ایزوله‌های بالینی کلپسیلا پنومونیه می‌باشد.

روش بررسی

در این مطالعه مقطعی در مدت شش ماه از آذر ماه ۱۳۹۱ تا

محمد معتمدی فر^۱، داود منصوری^{۲*}، هادی صدیق

ابراهیم سراجی^۱، جمال سوروی^۱

۱- گروه باکتری و ویروس‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

۲- مرکز تحقیقات ایاز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

۳- گروه باکتری و ویروس‌شناسی، دانشکده پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

۴- گروه علم آزمایشگاهی، مرکز آموزش

عالی علوم پزشکی وارستانگان، مشهد، ایران.

* نویسنده مسئول: مشهد، گروه باکتری و ویروس‌شناسی، بیمارستان قائم، دانشگاه علم پزشکی مشهد.

تلفن: ۰۵۱-۳۸۰۲۶۵۲

E-mail: mansury154@yahoo.com

مقدمه

طیف بیماری‌زایی کلپسیلا پنومونیه معمولاً وسیع بوده شامل باکتریمی، پنومونی، عفونت مجاری ادراری می‌باشد. در بیمارستان همه‌گیری شدید بین نوزادان و عفونت‌های آندامیک در بخش بیماران کلیوی رخ می‌دهد. پنومونی کلپسیلایی بخش کوچک از موارد پنومونی را تشکیل می‌دهد ولی میزان مرگ و میر ناشی از آن بالا و حدود ۹۰٪ است.

این باکتری بیش از پنوموکک تمایل به ایجاد نکروز دارد.^۱ تولید پنی‌سیلینازها و دیگر آنژیم‌های بتالاکتاماز اصلی‌ترین مکانیسم مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام در بین خانواده انتروباکتریا سه است. آنژیم‌های بتالاکتاماز در فضای پری‌پلاسمیک در بین غشای

یافته‌ها

الگوی حساسیت به ۱۴ آنتی‌بیوتیک برای ۱۴۴ ایزوله کلبسیلا پنومونیه در جدول ۱ نشان داده شد. تمامی ایزوله‌ها به آنتی‌بیوتیک آموکسی‌سیلین و تعداد ۱۷ ایزوله به همه آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم بودند. بیشتری میزان مقاومت مربوط به سفوتاکسیم (50%) و کمترین مقاومت مربوط به مروپن ($11/8\%$) بود.

پس از انجام آنتی‌بیوگرام برای دیسک‌های انتخابی، ۷۲ ایزوله که حداقل به یکی از آنتی‌بیوتیک‌های بتالاكتام نیمه حساس یا مقاوم بودند جهت تایید ایزوله‌های مولد بتالاكتاماز وسیع‌الطیف با استفاده از دیسک‌های ترکیبی سفوتاکسیم+کلاوولانیک اسید، سفوتاکسیم+کلاوولانیک اسید و E-test سفوتاکسیم+کلاوولانیک اسید، سفتازیدیم+کلاوولانیک اسید و ESBL سفتازیدیم مورد آزمایش قرار گرفتند.

ESBL (۳۸٪/۲۶٪) ایزوله به کمک این روش تولیدکننده شناسایی شد. همه ایزوله‌های تولید کننده ESBL به ایمی‌پن و مروپن حساس و به آنتی‌بیوتیک آزترونام مقاوم بودند. با استفاده از دیسک‌های ترکیبی سفوتاکسیدیم/کلاوولانیک اسید، سفوتاکسیم/کلاوولانیک اسید و سفپودکسیم/کلاوولانیک اسید به ترتیب (۱٪/۹٪/۹٪)، (۳۵٪/۴٪/۴٪) و (۳۱٪/۸٪/۵٪) ایزوله به عنوان ایزوله‌های مولد بتالاكتاماز شناسایی شدند. در جدول ۲ توزیع ایزوله‌های مولد ESBL در نمونه‌های مختلف آورده شد.

بحث

افزایش مصرف داروهای بتالاكتام وسیع‌الطیف و بستره شدن طولانی مدت بیماران سبب افزایش مقاومت باکتری‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها می‌شود که این مقاومت از راه‌های مختلفی حاصل می‌شود که از مهمترین آنها، وجود پمپ‌های افلاکس، کاهش نفوذ پذیری غشاء و تولید بتالاكتامازهای وسیع‌الطیف ESBL می‌باشد.^۶ ارگانیسم‌هایی که این زن‌ها را در خود حمل می‌کنند باعث افزایش بیماری‌زایی و مرگ و میر در بین افراد می‌شوند و ادامه روند رو به رشد در ایجاد مقاومت‌هایی از این دسته جامعه را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.^۷ ۱۷ ایزوله در مطالعه حاضر به همه آنتی‌بیوتیک‌های به کار برده شده مقاوم بودند که یک خطر جدی برای درمان افرادی که با این ایزوله‌ها

اردیبهشت ۱۳۹۲ تعداد ۱۴۴ ایزوله کلبسیلا پنومونیه از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های آموزشی شیراز جمع‌آوری شد. این ایزوله‌های کلینیکی از بخش‌های مختلف بیمارستان و از نمونه‌های مختلف مانند ادرار، خون، خلط، عفونت زخم، مایعات بدن جمع‌آوری شده بودند. نمونه‌های تکراری در مطالعه محاسبه نگردید. به منظور تشخیص باکتری کلبسیلا پنومونیه برای تمامی ایزوله‌ها تست‌های تشخیصی مانند بررسی مورفولوژی کلینی در محیط ائوزین متیلن بلو آگار (EMB)، واکنش‌های محیط TSI، سیمون سیترات آگار، MR/VP و تست اوره آز انجام گرفت.

بررسی الگوی حساسیت در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها (Mast Group, Merseyside, UK) به روش دیسک دیفیوژن در سطح محیط Himedia Mueller Hinton Agar (MHA) انجام گردید.^۴

پس از بررسی هاله عدم رشد، سویه‌های مقاوم به حداقل یکی از انواع آنتی‌بیوتیک‌های بتالاكتام به عنوان ESBL محسوب شده و در مرحله بعد تحت آزمون فوتیپی تاییدی قرار گرفتند.

جهت انجام تست تاییدی از دیسک‌های ترکیبی (μg) سفالوسپورین با دیسک $10\ \mu\text{g}$ کلاوولانیک اسید) استفاده شد که این دیسک‌ها در محیط مولر هیتون آگار بر اساس روش دیسک دیفیوژن مانند آزمون غربالگری قرار داده شد.

اگر قطر هاله عدم رشد باکتری اطراف دیسک ترکیبی حداقل $5\ \mu\text{m}$ بیشتر از قطر هاله عدم رشد دیسک منفرد همان آنتی‌بیوتیک باشد، به عنوان سویه مولد بتالاكتاماز وسیع‌الطیف محسوب می‌گردد. از سویه‌های استاندارد کلبسیلا پنومونیه ATCC 7881 جهت کنترل مثبت و از اشرشیاکلی ATCC 25922 جهت کنترل منفی استفاده گردید.^۵

تعیین فوتیپی ESBL به روش ESBL (سفوتاکسیدیم) همانند دیسک ترکیبی می‌باشد با این تفاوت که آنتی‌بیوتیک منفرد و ترکیبی هر کدام در یک سمت نوار قرار دارد. روش کار نیز همانند روش دیسک دیفیوژن می‌باشد.

نحوه تعیین ایزوله‌های مولد ESBL به این طریق بود که نخست باید MIC سفتازیدیم آنها بیشتر یا مساوی $1\ \mu\text{g}$ باشد و سپس Minimal inhibitory concentration (MIC) به سفتازیدیم+کلاوولانیک اسید باید بیشتر یا مساوی $8\ \mu\text{g}$ شود (نوارهای Liofilchem srl., Italy E-test از Liofilchem srl., Italy تهیه شده بود).

جدول ۱: میزان فراوانی سویه‌های مقاوم، حساسیت متوسط و حساس نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مورد بررسی

مقاوم No. (%)	نیمه حساس No. (%)	حساس No. (%)	الگوی مقاومت آنتی بیوتیک
۵۹(۴۱)	۱۳(۹)	۷۲(۵۰)	سفوتاکسیم
۵۲(۳۶/۱)	۱۱(۷/۶)	۸۱(۵۶/۳)	سفتازیدیم
۶۱(۴۲/۴)	۰(۰)	۸۳(۵۷/۶)	سفتریاکسون
۵۶(۳۹)	۲(۱/۳)	۸۶(۵۹/۷)	سفنیزروکسیم
۵۱(۳۵/۴)	۱(۰/۷)	۹۲(۶۳/۹)	سفیپیم
۵۸(۴۰/۳)	۸(۵/۶)	۷۸(۵۴/۱)	سپیودوکسیم
۲۸(۱۹/۵)	۳(۲/۱)	۱۱۳(۷۸/۴)	لووفلوكاسین
۱۴(۹/۷)	۳(۲/۱)	۱۲۷(۸۸/۲)	مروپین
۱۶(۱۱/۱)	۷(۴/۹)	۱۲۱(۸۴)	ایمی‌پنم
۱۵(۱۰/۴)	۸(۵/۶)	۱۲۱(۸۴)	آمیکاسین
۲۴(۱۶/۷)	۴(۲/۸)	۱۱۶(۸۰/۵)	جنتاماپسین
۵۰(۳۴/۷)	۴(۲/۸)	۹۰(۶۲/۵)	آرترونام
۶۱(۴۲/۳)	۲(۱/۴)	۸۱(۵۶/۳)	کوتريموکسازول
۱۴۲(۹۸/۶)	۲(۱/۴)	۰(۰)	آموکسیسیلین

ایمی‌پنم برای درمان ایزوله‌هایی که به اکثر آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکدام از جمله سفالوسپورین‌های نسل سوم و چهارم مقاوم بودند، استفاده می‌شود. اما با توجه به نتایج مطالعات دیگر انجام شده در سایر نقاط دنیا و نیز مطالعه حاضر که بیانگر مقاومت ۱۶ درصدی نسبت به ایمی‌پنم است، افزایش مقاومت به این آنتی‌بیوتیک نشان‌دهنده کاهش کارایی این دارو در درمان عفونت‌های ناشی از این باکتری می‌باشد.^۳ در این مطالعه میزان مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های خانواده آمینوگلیکوزید (آمیکاسین و جنتاماپسین) به ترتیب ۱۶ و ۱۹/۴٪ بود که نزدیک به آنتی‌بیوتیک ایمی‌پنم می‌باشد و در مطالعاتی که صورت گرفته می‌توان از درمان ترکیبی (ایمی‌پنم+آمیکاسین) برای درمان عفونت‌های ناشی از باکتری‌های مولد ESBL استفاده کرد. علت این امر این است که فعالیت باکتریسیدالی ایمی‌پنم در ترکیب با آمیکاسین بیشتر از ایمی‌پنم تنهاست.^۴

در این مطالعه برای تشخیص فنوتیپی ESBL از دیسک‌های ترکیبی سفتازیدیم/کلاوولانیک اسید، سفوتابکسیم/کلاوولانیک اسید

جدول ۲: توزیع ایزوله‌های مولد ESBL در نمونه‌های مختلف

نوع نمونه	کل نمونه No.	ESBL ^a (+) No. (%)
ادرار	۱۰۸	۲۹(۲۶/۸)
خلط	۹	۱(۱/۱)
زخم	۷	۲(۲۸/۵)
خون	۵	۲(۴۰)
گلو	۵	۱(۲۰)
مایعات بدن	۶	۲(۳۳/۳)
دیگر نمونه‌ها	۴	۱(۲۵)

^a Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) enzymes

آلوده می‌شوند به حساب می‌آید. همچنین در این مطالعه نشان داده شد که ۶۱ ایزوله (۱۴۴٪) از ایزوله نسبت به سه یا بیشتر از سه آنتی‌بیوتیک مقاوم بودند (Multi-drug resistance). در حال حاضر از

تعداد ۳۵ ایزوله‌ای که به روش دیسک ترکیبی شناسایی شده بودند را نیز تایید کرد. این نتیجه با آنچه که توسط Mohanty و همکارانش انجام گرفت همخوانی دارد.^{۱۰} شیوع ۲۶/۳ درصدی ESBL در مطالعه حاضر با شیوعی که از مناطق دیگر ایران گزارش شده است همخوانی دارد.^{۱۱} البته باید این نکته را یادآور شد که این طیف وسیعی از شیوع به علت متفاوت بودن نوع مطالعات در مناطق مختلف، نمونه‌های مختلف و همچنین بخش‌های مختلف بیمارستان می‌باشد.

با توجه به نتایج مطالعات اخیر، مقاومت به سفالوسپورین‌های وسیع‌الطیف و دیگر آنتی‌بیوتیک‌ها از آمار بالایی برخوردار است که این معرض می‌تواند باعث طولانی‌شدن دوره درمان، مدت بسته و افزایش هزینه‌های درمانی گردد. بنابراین برای درمان عفونت‌های مشکوک به ارگانیسم‌های تولیدکننده بتالاکتاماز باید آنتی‌بیوتیک مناسب به دقت انتخاب شود.

همچنین سوش‌هایی که حساسیت آن‌ها در برابر سفتازیدیم و سفوتاکسیم کاهش پیدا کرده است باید از نظر داشتن توانایی تولید آنزیم‌های ESBL (با یکی از روش‌های Combined E-test ESBL یا Disk Method) مورد بررسی قرار بگیرند.

سپاسگزاری: این مقاله بخشنامه تحت عنوان "تعیین الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی و شناسایی بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف در ایزوله‌های CTX-M، TEM، PER، SHV و CTX-M-TEM در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه بیمارستان‌های آموزشی شیراز- ایران در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۱ و کد ۹۱-۶۵۸۹ می‌باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس اجرا شده است.

و سفپودکسیم/کلاوولانیک اسید استفاده شد که میزان حساسیت و اختصاصیت دیسک ترکیبی سفتازیدیم بیشتر از دو آنتی‌بیوتیک دیگر بود این در حالی است که در پژوهش Jain و همکاران صورت گرفت حساسیت و اختصاصیت سه آنتی‌بیوتیک سفپودکسیم، سفوتاکسیم و سفتازیدیم در غربال کردن ایزوله‌های ESBL مثبت مقایسه شده بود که در این بین آنتی‌بیوتیک سفپودکسیم بیشترین حساسیت و اختصاصیت را از خود نشان داده بود.^۹

همچنین در بین ۳۸ ایزوله ESBL مثبت مقاوم بودند که نشان‌دهنده حساسیت بالای این آنتی‌بیوتیک در جداسازی ایزوله‌های ESBL می‌باشد، به طوری که همه‌ی ایزوله‌های ESBL مثبت حداقل به یک یا دو سفالوسپورین مقاوم بودند این در حالی است که اکثر این ایزوله‌ها به آنتی‌بیوتیک آزترونام مقاومت داشتند، پس در حالت کلی می‌توان این نتیجه را گرفت که در تشخیص فنوتیپی ESBL می‌توان به مقاومت حداقل یک آنتی‌بیوتیک سفالوسپورین و آنتی‌بیوتیک آزترونام بسته کرده و در تجویز آنتی‌بیوتیک مناسب برای درمان این عفونتها اقدام کرد، زیرا تشخیص ESBL به روش مولکولی نیاز به هزینه زیاد و زمان دارد و همچنین بیشتر آزمایشگاهها این امکانات را در اختیار ندارند.

در مطالعه حاضر برای مقایسه حساسیت و اختصاصیت تست تاییدی فنوتیپی از نوارهای E-test ESBL سفتازیدیم نیز استفاده شد که تعداد سه ایزوله به جمع ESBL مثبت‌ها اضافه شد (در تست تاییدی فنوتیپی به روش دیسک ترکیبی تعداد ۳۵ ایزوله ESBL مثبت شدند که در انجام این تست با استفاده از نوارهای ESBL این E-test ESBL تعداد به ۳۸ ایزوله افزایش پیدا کرد) این در حالی بود که نوارهای E-

References

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidance for control of infections with carbapenem-resistant or carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in acute care facilities. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2009;58(10):256-60.
- Bush K. New beta-lactamases in gram-negative bacteria: diversity and impact on the selection of antimicrobial therapy. *Clin Infect Dis* 2001;32(7):1085-9.
- Dhillon RH-P, Clark J. ESBLs: A clear and present danger? *Crit Care Res Prac* 2011;2012:1-11.
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. Seventeenth Informational Supplement. CLSI Document M100-S17. Wayne, USA: Clinical and Laboratory Standards Institute, 2012.
- Nasehi L, Shahcheraghi F, Nikbin VS, Nematzadeh S. PER, CTX-M, TEM and SHV beta-lactamases in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae isolated from Tehran, Iran. *Iran J Basic Med Sci* 2010;13(3):111-8.
- Agnihotri N, Gupta V, Joshi RM. Aerobic bacterial isolates from burn wound infections and their antibiograms: a five-year study. *Burns* 2004;30(3):241-3.
- Turner PJ. Extended-spectrum β-lactamases. *Clin Infect Dis* 2005;41 Suppl 4:S273-5.

8. Rudresh SM, Nagarathnamma T. Extended spectrum β -lactamase producing Enterobacteriaceae and antibiotic co-resistance. *Indian J Med Res* 2011;133(1):116-8.
9. Jain A, Mondal R. Detection of extended spectrum beta-lactamase production in clinical isolates of *Klebsiella* spp. *Indian J Med Res* 2008;127(4):344-6.
10. Mohanty S, Gaind R, Ranjan R, Deb M. Use of the cefepime-clavulanate ESBL Etest for detection of extended-spectrum beta-lactamases in AmpC co-producing bacteria. *J Infect Dev Ctries* 2009;4(1):24-9.
11. Reinert RR, Low DE, Rossi F, Zhang X, Wattal C, Dowzicky MJ. Antimicrobial susceptibility among organisms from the Asia/Pacific Rim, Europe and Latin and North America collected as part of TEST and the in vitro activity of tigecycline. *J Antimicrob Chemother* 2007;60(5):1018-29.

Archive of SID

Comparison of phenotypic detection of extended spectrum beta-lactamases using the E-test ESBL and combined disk method clinical isolates of *Klebsiella pneumoniae*: brief report

Mohammad Motamedifar
Ph.D.^{1,2}
Davood Mansury Ph.D.
student^{3,4*}
Hadi Sedigh Ebrahim-Saraie
Ph.D. student¹
Jamal Sarvari Ph.D.¹

1- Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

2- HIV/AIDS Research Center, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran.

3- Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

4- Department of Laboratory Medicine, Varastegan Medical Higher Education Center, Mashhad, Iran.

Abstract

Received: 26 Oct. 2014 Accepted: 28 Feb. 2015 Available online: 10 Jun. 2015

Background: Antimicrobial resistance is a growing problem in many bacterial pathogens and is of particular concern for hospital-acquired nosocomial infections. *Klebsiella pneumoniae* is an important cause of nosocomial infections has rapidly become the most common extended spectrum beta-lactamases (ESBLs) producing organism. ESBL are defined as the enzymes capable of hydrolyzing oxyimino-cephalosporins. The aim of this study was to compare phenotypic detection of ESBL using two phenotypically method among the clinical isolates of *Klebsiella pneumoniae*.

Methods: In this cross-sectional study a total of 144 isolates from clinical samples Urine, sputum, wound, blood, throat and body fluids isolated and identified as *K. pneumoniae* in a teaching hospitals in Shiraz within a six months period from December 2012 to May 2013. Antibacterial susceptibility test performed to 14 antibiotics by the disk diffusion method according to CLSI guideline and then isolates that were resistant to at least one of the beta-lactam antibiotics evaluated for the production of beta-lactamase enzymes by using E-test ESBL and combined disk method.

Results: Totally 38 (26.3%) isolates produced ESBLs. All ESBL producing isolates were susceptible to imipenem and meropenem and resistant to aztreonam. The highest antibiotic resistance was observed for amoxicillin (100%) and the lowest antibiotic resistance was observed for meropenem (9.7%). The number of 38 (100%) isolates were identified as ESBL producer by using E-test ESBL ceftazidime. It was while using the combined disks; ceftazidime/clavulanic acid, cefotaxime/clavulanic acid and cefpodoxime/clavulanic acid, respectively 35 (92.1%), 34 (89.4%) and 31 (81.5%) of isolates identified as beta-lactamase producing isolates.

Conclusion: Considering the high prevalence of bacteria producing ESBL, screening for infections caused by ESBL-producing isolates may be lead to the most effective antibiotics therapies.

Keywords: beta-lactamases, cross-sectional studies, infections, klebsiella pneumoniae.

* Corresponding author: Department of Bacteriology and Virology, Ghaem Hospital, Shariati Sq., Mashhad, Iran.
Tel: +98- 51- 38022562
E-mail: mansury154@yahoo.com