

## حاملگی پرخطر به علت طوفان تیروپید: گزارش موردی

### چکیده

دریافت: ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ویرایش: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ آنلاین: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

**زمینه و هدف:** شایعترین علت تیروتوکسیکوز در زنان سینین باروری بیماری گریوز می‌باشد که بسیاری از عالیم آن با وضعیت هایپرمتاپولیک ایجاد شده در حاملگی مشابه است. در این گزارش بیماری معرفی می‌گردد که با تشخیص اولیه آمبولی ریه بستری شده و با تشخیص نهایی طوفان تیروپید درمان و مرخص شد.

**معرفی بیمار:** بیمار زن ۲۹ ساله حاملگی اول و سن بارداری ۳۱ هفته، مورد شناخته شده گریوز که با عالیم تاکی کاردی و تاکی پنه و افزایش فشارخون و ام اندام تحتانی در فروردین ماه ۱۳۹۴ به اورژانس بیمارستان قائم (عج) مشهد مراجعه کرده بود با توجه به وضعیت نامناسب بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر قرار گرفته و پس از رد آمبولی ریه با تشخیص طوفان تیروپیدی به علت مصرف اشتباه دارو تحت نظر قرار گرفت و با وجود مرگ جنین بیمار بهبود یافت.

**نتیجه‌گیری:** با وجود نادر بودن طوفان تیروپیدی در حاملگی، در صورت بروز اختلال عملکرد قلبی-ریوی در بارداری، رد کردن اختلالات تیروپیدی باید مدنظر باشد.

**کلمات کلیدی:** حاملگی، آمبولی ریه، طوفان تیروپیدی، تیروتوکسیکوز.

ملیحه حسن‌زاده<sup>۱\*</sup>، مینا برادران  
خلخالی<sup>۲</sup>، اکرم بهروز نیا<sup>۲</sup>  
لیلا موسوی<sup>۱</sup>

۱- گروه اکنولوژی زنان، گروه زنان و زایمان،  
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.  
۲- گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی  
مشهد، مشهد، ایران.

\*نویسنده مسئول: مشهد، خیابان احمد آباد، بیمارستان  
قائم، گروه زنان.  
تلفن: ۰۵۱-۲۸۰۱۲۷۷  
E-mail: hasanzademo@adm@mums.ac.ir

### مقدمه

وضعیت هایپرمتاپولیک ایجاد شده در حاملگی مشابه است. برخی عالیم مانند کاهش وزن، تهوع و استفراغ بارداری، اسهال، ضربان قلب بیش از ۱۰۰ ضربه در دقیقه که با مانور والسالوا کاهش پیدا نمی‌کند و لفادنونپاتی می‌تواند مطرح کننده اختلالات تیروپیدی باشد. طوفان تیروپیدی ممکن است حین جراحی‌های تیروپیدی یا غیرتیروپیدی، ترومما، عفونت و افزایش میزان ید ایجاد شود و می‌تواند یکی از تظاهرات مهم حاملگی مولار باشد.<sup>۱</sup> درمان شامل تجویز داروهای ضد تیروپید، اقدامات حمایتی و مراقبت در بخش مراقبت‌های ویژه و شناخت و درمان فاکتورهای ایجاد کننده و رد کردن تشخیص‌های افتراقی مهم از جمله آمبولی ریه و تمامی وضعیت‌های هایپرمتاپولیک است.<sup>۲-۵</sup> موارد گزارش شده در مقالات بیشتر شامل بیمارانی بودند که طوفان تیروپیدی در آن‌ها به ذنبال

شایعترین علت تیروتوکسیکوز در زنان سینین باروری بیماری گریوز می‌باشد (۸۵٪ تمام موارد). علت این بیماری اتوآنی‌بادی‌هایی می‌باشد که بر روی رسپتور هورمون تحریک کننده تیروپید اثر تحریکی دارد. هایپرتیروپیدی در حاملگی ناشایع است که شیوع آن ۰/۰-۰/۱٪ می‌باشد.<sup>۶-۷</sup> تشخیص‌های افتراقی هایپرتیروپیدی شامل گریوز، تیروپیدیت گرانولوماتوز تحت حاد، ندول‌های تیروپید، گواتر مولتی‌ندولر، هایپرتیروپیدی وابسته به ید، تیروتوکسیکوز به دنبال ترومای گردن و رادیاسیون، آدنوم هیپوفیزی آزادکننده هورمون تحریک کننده تیروپید، مقاومت به هورمون‌های تیروپیدی و تیروتوکسیکوز ساختگی می‌باشد.<sup>۸</sup> بسیاری از عالیم هایپرتیروپیدی با

متوسط سمت راست و کدورت قله ریه چپ داشت که آن‌تی‌بیوتیک گسترده طیف آغاز شد و آسپیراسیون مایع پلور انجام شد که با توجه به ترانسودا بودن مایع پلور، چست تیوب تعییه نشد. در سونوگرافی حاملگی ۳۰ هفته با وزن تقریبی gr ۱۶۸۰ و کاهش مایع آمنیوتیک بود و ریه‌های جنین کوچک و هیپوپلاستیک بود. بدلیل عدم بهبود تاکی‌کاردی و تاکی‌پنه، بیمار بار دیگر اکوکاردیوگرافی شد که در آن نارسایی متوسط تریکوسپید و فشار شریان ریوی mmHg ۴۰-۴۵ بود. در طی مدت بستری به علت فوت جنین ختم حاملگی انجام شد. پس از دفع جنین، درمان هیپرتیروییدی با پروپیل تیوراسیس ادامه پیدا کرد بیمار هفت روز انتوپه بود و بتدریج بیمار هوشیار و لوله تراشه خارج شد و با بهبود عالیم بالینی و آزمایشگاهی بیمار با دستور دارویی پروپیل تیواوراسیل mg ۵۰ سه بار در روز پس از ۲۰ روز با حال عمومی خوب ترخیص شد. آزمایشات هنگام ترخیص به قرار زیر می‌باشد.

(TSH=0.1 mcIU/mL, T4=12.2 µg/dL, T3=368 ng/ml)

## بحث

گریوز یک بیماری شایع است که اغلب در اواسط حاملگی و پس از زایمان عود می‌کند که اگر درمان نشود منجر به مرگ‌ومیر قابل توجه برای مادر و جنین می‌شود که در بیمار معرفی شده عدم دریافت درمان صحیح منجر به فوت جنین و اختلالات قلبی-عروقی برای مادر شد.<sup>۱</sup> بسیاری از تظاهرات حاملگی با هیپرتیروییدی مشترک است از جمله تاکی‌کاردی، عدم تحمل گرماء، افزایش تعریق، اضطراب، تومور دست، افزایش اشتها. ظاهراتی مانند افتالموپاتی و گواتر برای گریوز در حاملگی اختصاصی می‌باشد. عوارض حاملگی در گریوز شامل: سقط خردبهخودی، زایمان رودرس، کاهش وزن جنین، مردهزایی و پره‌اکلامپسی و اختلال قلبی-عروقی است.<sup>۱,۲,۳</sup> بیمار معرفی شده نیز مبتلا به تاکی‌کاردی، پره‌اکلامپسی، اختلال قلبی-عروقی و در نهایت مردهزایی شد. وضعیت بیمار بسیار وخیم بود که با توجه به مراقبت و درمان به موقع بیماری زمینه‌ای (تیرو توکسیکوز) با وجود مرگ جنین، مادر نجات یافت.

در بیماران حامله درمان نشده یا تشخیص داده نشده مبتلا به اختلال تیروییدی، طوفان تیروییدی یک وضعیت تهدید کننده حیات

حاملگی مولار یا سن حاملگی کمتر از ۲۰ هفته و یا پس از زایمان تشخیص داده شده بود.<sup>۴,۵</sup> در مطالعه حاضر بیماری معرفی می‌گردد که با تاکی‌کاردی و فشارخون بالا و با تشخیص احتمالی آمبولی ریه بستری شده بود که با اقدامات تشخیصی، آمبولی ریه رد شد و درمان با تشخیص طوفان تیروییدی که به علت هایپرتیروییدی درمان نشده در حاملگی ایجاد شده بود، انجام شد.

## معرفی بیمار

بیمار زن ۲۹ ساله حاملگی اول در هفته ۳۱ بارداری، اهل شهر مشهد، در فروردین ماه ۱۳۹۴ به اورژانس بیمارستان قائم (عج) مشهد با شکایت ادم اندام تحتانی، تاکی‌کاردی و تاکی‌پنه و افزایش فشارخون سیستمیک مراجعه کرده بود. بیمار مورد شناخته شده گریوز از یک سال پیش بود که تحت درمان با متی‌مازول پیش از حاملگی و پروپیل تیواوراسیل (Propylthiouracil) حین حاملگی بود. بیمار در طی حاملگی در اثر اشتباه داروخانه به جای مصرف پروپیل تیواوراسیل، پروپانتیلن مصرف کرده بود. در بدلو مراجعة عالیم حتی بیمار: نبض ۱۲۰ ضربان در دقیقه، تنفس ۳۰ تا در دقیقه، فشارخون mmHg ۱۴۰/۸۰، درجه حرارت °C ۳۸/۸ بود. بیمار با تشخیص اولیه آمبولی ریه بستری شد. در معاینه فیزیکی دیسترس تنفسی، تاکی‌کاردی، تاکی‌پنه، ادم، تیرومگالی و پروپاتوز داشت. ارتفاع رحم ۳۰ هفته، ضربان قلب جنین تاکی‌کارد و ۱۸۰ ضربه در دقیقه بود و خونریزی و آبریزش واژینال و انقباض رحمی نداشت. جنین و مادر تحت مانیتورینگ قرار گرفتند که با توجه به تاکی‌کاردی و تاکی‌پنه شدید بیمار منتقل بخش مراقبت‌های ویژه شد. جهت رد کردن آمبولی ریه، سونوگرافی کالر داپلر اندام تحتانی دو طرفه و سی‌تی آنژیوگرافی انجام شد که نرمال بود. در اکوکاردیوگرافی اولیه انجام شده Ejection fraction (EF)=70% و نارسایی خفیف تریکوسپید و فشار شریان ریوی mmHg ۴۰-۴۵ بود.

پروپانتیلين قطع و پروپیل تیواوراسیل mg ۵۰۰ روزانه و متورال mg ۵۰ هر شش ساعت شروع شد و با توجه به تب کشت ادرار و خون ارسال شد. بدلو بستری آزمون‌های کبدی و فرمول شمارش خون طبیعی بود، TSH=0.0032 mcIU/mL, T4>24 µg/dL و T3>596 ng/ml بود. در رادیوگرافی قفسه سینه، پلورال افیوزن

جدول مطالعات مشابه

نویسندها	سال انتشار	مجله	عنوان و نتیجه
Valentin BH, et al <sup>۱۶</sup>	۱۹۸۰	Postgrad Med J	بیمار با هیپرامزیس گراویداروم در سن ۹ هفته بارداری مراجعت می کند که با تشخیص و درمان تیروتوکسیکوز برای بیمار حال عمومی بهتر شده، اما جنین دچار محدودیت رشد در طول بارداری می شود.
Menon V, et al <sup>۱۷</sup>	۱۹۸۲	Postgrad Med J	بیمار با تیروتوکسیکوز کنترل نشده در سن بارداری ۲۵ هفته با تشخیص اکلامپسی، ختم حاملگی داده می شود (همچنین بیمار بی دردی اپی دورال دریافت می نماید) و همزان با متی مازول و هیدرالازین تحت درمان قرار می گیرد. ولی پس از ختم بارداری دچار تاکی کاردی و تاکی پنه به علت نارسای قلبی ناشی از طوفان تیرویید می گردد که با شروع درمان دیگوکسین و پروپر انولول در عرض دو روز بهبود می یابد.
Pugh S, et al <sup>۱۸</sup>	۱۹۹۴	Anaesthesia journal	بیماری به دنبال سزارین اورژانس (تحت بیهوشی عمومی) در ریکاوری دچار کاهش سطح هوشیاری می گردد و در بررسی انجام شده طوفان تیروییدی به دنبال هیپرتیروییدی تشخیص داده نشده علت افت هوشیاری بیمار اعلام می گردد و با درمان مناسب بیمار با حال عمومی خوب مرخص می شود.
Shibata SC, et al <sup>۱۹</sup>	۲۰۰۹	Anesth Analag	بیمار باردار به دنبال پارگی آنوریسم شریان کلیوی دچار اختلال سطح هوشیاری و تاکیکاردی می گردد. در ابتدا تشخیص شوک هایپولیمی داده شده و در انتهای تشخیص طوفان تیروییدی داده شده، به دنبال درمان دارویی با حال عمومی خوب ترخیص می گردد.
Yildizhan R, et al <sup>۲۰</sup>	۲۰۰۹	J Med Case Rep	خانم ۴۱ ساله با بارداری ۲۷ هفته و سابقه گریوز بدون مصرف دارو از سه ماهه اول بارداری، با ارست تنفسی و کاهش سطح هوشیاری به دنبال نفس تنگی چندروزه مراجعت کرده است که به علت تاخیر در تشخیص و عدم درمان مناسب، مرگ داخل رحمی جنین اتفاق افتاده و پس از ختم حاملگی و درمان صحیح با حال عمومی خوب مرخص می شود.
Nannaka, et al <sup>۲۱</sup>	۲۰۱۶	Endocrinol Diabetes Metab Case Rep.	خانم ۲۷ ساله با بارداری ۹ هفته و سابقه هیپرامزیس گراویداروم، با انفارکتوس حاد قلبی مراجعت می نماید در بررسی انجام شده تشخیص طوفان تیروییدی داده شده و با درمان مناسب با حال عمومی خوب ترخیص می شود.
Kofinas JD <sup>۲۲</sup>	۲۰۱۵	J Emerg Med	بیمار ۴۵ ساله با حاملگی مولار و خونریزی شدید واژنال و تاکیکاردی و فشارخون بالا و افت ساقحوریشن تحت کورتاژ اورژانس قرار می گیرد. پس از جراحی برون دهی قلب بیمار ۱۵٪ می گردد، پس از ۳-۶ روز بیمار انوریک شده و آزمایشات کبدی مختلف و به تدریج دچار کاهش سطح هوشیاری می گردد که با تشخیص طوفان تیروییدی و نارسایی چند ارگان تحت اقدامات حمایتی قرار گرفته و حال عمومی بیمار بهبود می یابد.

مراقبت از این بیماران در بیمارستان های سطح ۳ می تواند نجات پخش جان بیمار باشد. کنترل هیپرتیروییدی در طی حاملگی شرایط مادر و جنین را بهبود می بخشد و عوارض را کمتر می کند که این کنترل با آزمایشات سریال به فاصله چهار هفته امکان پذیر می شود.<sup>۱۷ و ۲۰</sup>

طوفان تیروییدی کمایش در بیمارانی دیده می شود که به مدت طولانی درمان نشدهند یا مصرف ناظم و یا اشتباه دارو داشتهند. مقالات نشان می دهد که افزایش سطح هورمون های تیرویید در طوفان تیروییدی باعث افزایش کاتکول آمین ها و افزایش پاسخ دهنی سلول ها

به شمار می رود که در ۲۰-۳۰٪ موارد می تواند منجر به مرگ مادر و جنین می گردد. مرگ مادر در اثر اختلالات قلبی عروقی و مرگ جنین در اثر سقط، وزن کم هنگام تولد، زایمان زودرس، پره اکلامپسی و ناهنجاری های مادرزادی اتفاق می افتد.<sup>۹-۱۱</sup> عوارض مادری و جنینی ایجاد شده در بیمار معرفی شده شامل: کاهش مایع آمنیوتیک، هیپوپلاستیک شدن ریه های جنین، فوت جنین، پره اکلامپسی در مادر بود که منجر به بستری در بخش مراقبت های ویژه و بیمارستان به مدت ۲۰ روز و ایجاد موربیدیتی برای بیمار شد که با انجام مراقبت های ویژه از بروز مورتالیته جلوگیری شد. بنابراین ارجاع و

و همکاران گزارش شد.<sup>۱۴</sup> در بیشتر موارد گزارش شده، طوفان تیروپیدی مربوط به حاملگی مولار می‌باشد، فقط یک مورد بیمار Okuda مشابه بیمار معرفی شده در سه ماهه سوم بارداری توسط گزارش شد که بیمار ۴۱ ساله با بارداری ۲۲ هفته با نارسایی قلبی و فشارخون بالا و پرتوپیستوری، ختم بارداری داده شد و در بررسی‌های بیشتر علل فشارخون بیمار پس از پایان بارداری تشخیص هیپرتیروپیدی بود.<sup>۱۵</sup>

نکته جالب در بیمار معرفی شده بروز طوفان تیروپیدی در تریمیستر سوم بارداری و بهدبال مصرف داروی اشتباہ و عدم درمان درست بیماری زمینه‌ای بود و نکته جالب توجه دیگر، تظاهر اولیه به صورت عالیم مشابه آمبولی ریه بود که پس از اقدامات تشخیصی و رد آمبولی ریه در نهایت با تشخیص هیپرتیروپیدی بیمار تحت درمان قرار گرفت، ولی در سیر انجام اقدامات تشخیصی و درمانی مرگ جنین به وقوع پیوست که شاید در صورت تشخیص سریعتر امکان نجات جنین وجود داشت. اکثر موارد گزارش شده بهدبال حاملگی مولار می‌باشد و مورد مشابه بیمار معرفی شده در این سن بارداری گزارش نشده است.<sup>۶</sup>

به آن‌ها می‌شود و نکته جالب اینکه سطح توتال T4 و T3 در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به طوفان تیروپیدی یکسان است اما سطح آزاد آن‌ها در طوفان تیروپیدی افزایش می‌یابد.<sup>۱۶</sup><sup>۱۷</sup> تیونامیدها درمان اولیه در طوفان تیروپیدی طی حاملگی می‌باشد. افزونبراین می‌توان جهت کتل تاکی‌کاردنی و تومور بیمار از بتاپلوكرها (پروپرانول و متورال) استفاده کرد. از درمان‌های دیگر می‌توان به ترکیبات ید و گلوکورتیکوپیدها نیز اشاره کرد.<sup>۱۸</sup><sup>۱۹</sup> بیمار معرفی شده به اشتباہ داروی آنتی‌کولینرژیک را به جای پروپیل تیواوراسیل مصرف کرده بود که افرون بر تظاهرات هیپرتیروپیدی درمان نشده، عوارض آنتی‌کولینرژیک‌ها مانند تاکی‌کاردنی، تپش قلب، سردرد و اضطراب، سرگیجه و تهوع و استفراغ و تاری دید نیز به بیمار اضافه شده بود. Daly و همکاران، بیمار ۳۹ ساله با سابقه تیروتوکسیکوز در حاملگی‌های پیشین را معرفی کرد که با تنگی نفس در هنگام استراحت ۱۱ هفتنه پس از زایمان مراجعه کرده بود که در نهایت با تشخیص طوفان تیروپیدی تحت درمان قرار گرفته بود.<sup>۲۰</sup> مورد مشابه دیگر زن ۲۷ ساله و ۱۶ هفتنه با حاملگی مولار بود که او نیز با تشخیص تیروتوکسیکوز پیگیری و درمان شد و توسط Hwang

## References

- Stagnaro-Green A, Abalovich M, Alexander E, Azizi F, Mestman J, Negro R, et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and postpartum. *Thyroid* 2011;21(10):1081-125.
- Bahn Chair RS, Burch HB, Cooper DS, Garber JR, Greenlee MC, Klein I, et al; American Thyroid Association; American Association of Clinical Endocrinologists. Hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis: management guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists. *Thyroid* 2011;21(6):593-646.
- Abalovich M, Amino N, Barbour LA, Cobin RH, De Groot LJ, Glinoer D, et al. Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2007;92(8 Suppl):S1-47.
- Sherif IH, Oyan WT, Bosairi S, Carrascal SM. Treatment of hyperthyroidism in pregnancy. *Acta Obstet Gynecol Scand* 1991;70(6):461-3.
- Wie JH, Kwon JY, Ko HS, Lee Y, Shin JC, Park IY. Thyroid storm and early-onset proteinuric hypertension caused by a partial molar pregnancy. *J Obstet Gynaecol* 2016;36(3):351-2.
- Singh S, Biswas M, Jose T, Dey M, Saraswat M. A rare case of thyroid storm following caesarean section. *Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol* 2016;5(3):933-6.
- Phoojaroenchanachai M, Sriussadaporn S, Peerapatdit T, Vannasaeng S, Nitityanant W, Boonnamsiri V, et al. Effect of maternal hyperthyroidism during late pregnancy on the risk of neonatal low birth weight. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2001;54(3):365-70.
- Millar LK, Wing DA, Leung AS, Koonings PP, Montoro MN, Mestman JH. Low birth weight and preeclampsia in pregnancies complicated by hyperthyroidism. *Obstet Gynecol* 1994;84(6):946-9.
- Stoffer SS, Hamburger JL. Inadvertent 131I therapy for hyperthyroidism in the first trimester of pregnancy. *J Nucl Med* 1976;17(02):146-9.
- Hyer S, Pratt B, Newbold K, Hamer C. Outcome of pregnancy after exposure to radioiodine in utero. *Endocr Pract* 2011;1:1-10.
- Azezli A, Bayraktaroglu T, Topuz S, Kalayoglu-Besik S. Hyperthyroidism in molar pregnancy: rapid preoperative preparation by plasmapheresis and complete improvement after evacuation. *Transfus Apher Sci* 2007;36(1):87-9.
- Sheffield JS, Cunningham FG. Thyrotoxicosis and heart failure that complicate pregnancy. *Am J Obstet Gynecol* 2004;190(1):211-7.
- Daly MJ, Wilson CM, Dolan SJ, Kennedy A, McCance DR. Reversible dilated cardiomyopathy associated with post-partum thyrotoxic storm. *QJM* 2009;102(3):217-9.
- Hwang W, Im D, Kim E. Persistent perioperative tachycardia and hypertension diagnosed as thyroid storm induced by a hydatidiform mole: a case report. *Korean J Anesthesiol* 2014;67(3):205-8.
- Okuda N, Onodera M, Tsunano Y, Nakataki E, Oto J, Imanaka H, et al. Acute cardiac failure in a pregnant woman due to thyrotoxic crisis. *Case Rep Cardiol* 2012;2012:393580.

16. Valentine BH, Jones C, Tyack AJ. Hyperemesis gravidarum due to thyrotoxicosis. *Postgrad Med J* 1980;56(660):746-7.
17. Menon V, McDougall WW, Leatherdale BA. Thyrotoxic crisis following eclampsia and induction of labour. *Postgrad Med J* 1982;58(679):286-7.
18. Pugh S, Lalwani K, Awal A. Thyroid storm as a cause of loss of consciousness following anaesthesia for emergency caesarean section. *Anaesthesia* 1994;49(1):35-7.
19. Shibata SC, Mizobuchi A, Shibuta S, Mashimo T. Undiagnosed thyrotoxicosis in a pregnant woman with spontaneous renal artery aneurysm rupture. *Anesth Analg* 2009;108(6):1886-8.
20. Yildizhan R, Kurdoglu M, Adali E, Kolusari A. Fetal death due to upper airway compromise complicated by thyroid storm in a mother with uncontrolled Graves' disease: a case report. *J Med Case Reports* 2009;3:7297.
21. Nannaka VB, Lvovsky D. A rare case of gestational thyrotoxicosis as a cause of acute myocardial infarction. *Endocrinol Diabetes Metab Case Rep* 2016;2016:1-5.
22. Kofinas JD, Kruczek A, Sample J, Eglinton GS. Thyroid storm-induced multi-organ failure in the setting of gestational trophoblastic disease. *J Emerg Med* 2015;48(1):35-8.

## High-risk pregnancy due to thyroid storm: case report

Malihe Hasanzadeh M.D.<sup>1\*</sup>  
Mina Baradaran Khalkhale M.D.<sup>2</sup>  
Akram Behrozea M.D.<sup>2</sup>  
Leila Musavi M.D.<sup>1</sup>

1- Department of Gynecology  
Oncology, Department of Obstetrics  
and Gynecology, Mashhad  
University of Medical Sciences,  
Mashhad, Iran.

2- Department of Obstetrics and  
Gynecology, Mashhad University of  
Medical Sciences, Mashhad, Iran.

### Abstract

Received: 12 Oct. 2017 Revised: 19 Oct. 2017 Accepted: 04 Feb. 2018 Available online: 14 Feb. 2018

**Background:** Graves' disease is the most common cause (85% of all cases) of thyrotoxicosis in women in childbearing age. Many of the symptoms are similar to hyper-metabolic status during pregnancy. The cause of the disease is autoantibodies that stimulate the thyroid-stimulating hormone (TSH) receptor. Hyperthyroidism is uncommon in pregnancy and its prevalence is 0.1%-0.4. In this paper we introduce a patient who was admitted with a primary diagnosis of pulmonary embolism and treatment with final diagnosis of thyroid storm and was discharged with good condition.

**Case presentation:** In the first pregnancy of a 29-year-old woman with gestation age of 31 weeks was referred to obstetric emergency unit Ghaem Hospital, Mashhad, Iran in March 2015. She had Grave's disease in her past medical history which was treated with methimazole before pregnancy and propylthiouracil (PTU) during pregnancy. In admission, she presented with tachycardia and tachypnea and hypertension and lower extremity edema. During pregnancy, she used propantheline instead of propylthiouracil due to pharmacy mistake. She admitted in Intensive care unit. After rule out of pulmonary embolism, ultrasonography showed a fetus with 30 week of gestational age with an approximate weight of 1680 grams. The amniotic fluid was reduced. She was treated with thyroid storm diagnosis due to a medication error. In serial obstetric visits fetal heart rate was not detected. Due to the fetal death, the pregnancy was terminated. Hyperthyroid therapy continued with PTU after delivery. She was discharged with a good general condition.

**Conclusion:** Despite the rarity of thyroid storm during pregnancy, in the event of unstable hemodynamic condition and cardiac dysfunction in pregnant women, rule out of thyroid disorders should be considered. Clinician should be paid attention to past drug history and underline disease of patient.

**Keywords:** pregnancy, pulmonary embolism, thyroid crisis, thyrotoxicosis.

\* Corresponding author: Department of  
Obstetrics and Gynecology, Ghaem  
Hospital, Ahmadabad St., Mashhad, Iran.  
Tel: +98- 51- 3801277  
E-mail: hasanzademofradm@mums.ac.ir