

پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

سال ۲۶، شماره ۲، صفحات ۱۰۱-۱۳۸۱ (تابستان ۱۴۰۱)

Original Article

تغییرات فصلی سطح سرمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D در شهر تهران

دکتر فربد رفیسزاده، دکتر علی اصغر میرسعید قاضی، دکتر پرham پژوهش، دکتر فریدون عزیزی

* مرکز تحقیقات غند درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خلاصه

سابقه و هدف: ویتامین D یکی از مواد اساسی برای سلامت استخوان است. در جوامع مختلف مشاهده شده است که سطح سرمی ویتامین D دارای تغییرات فصلی می‌باشد. اما این مسئله تاکنون در ایران بررسی نشده است.

مواد و روشها: در این مطالعه در قالب طرح قند و لیپید تهران، تعداد ۱۱۷۲ فرد (۶۹۰ زن و ۴۹۰ مرد) ۳ تا ۶۹ ساله که در ماههای مختلف سال بررسی شده بودند از نظر سطح سرمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D (25-OH-D) وارد شدند. در دی ماه بدایل مصادف بودن با ماه مبارک رمضان، نمونه‌گیری و بررسی بیماران انجام نشد. اندازه‌گیری ۲۵-OH-D با روش سنجش انتصال به پروتئین به روش RIA صورت گرفت و مقادیر سرمی کمتر از ۲۰ ng/ml به عنوان کمبود ویتامین D در نظر گرفته شدند.

یافته‌ها: سطح سرمی ویتامین D در جمعیت مطالعه دارای تغییرات ماهیانه مشخصی بوده و شدت و دامنه تغییرات آن در مردان بارزتر از زنان است. حداقل سطح سرمی 25-OH-D در هر دو جنس در ماههای آذر و بهمن (به ترتیب 12 ± 13 و 14 ± 16 نانوگرم در میلی‌لیتر در زنان و 24 ± 18 و 28 ± 16 نانوگرم در مردان) و حداکثر آن در ماه آبان (29 ± 29 ng/ml) در زنان و 55 ± 27 ng/ml در مردان) دیده شد. در تمام ماههای مورد بررسی، بالاترین سطح سرمی افراد مؤنث معادل یا کمتر از سایین ترین سطح سرمی افراد مذکور بود. سطح سرمی 25-OH-D مردان در تابستان و زمستان (31 ± 17 و 22 ± 22 نانوگرم در میلی‌لیتر) به نحو معنی‌داری پایین‌تر از بهار و پاییز (31 ± 27 و 43 ± 29 نانوگرم در میلی‌لیتر) است، اما در زنان اختلاف معنی‌داری بین سطح سرمی 25-OH-D در سه فصل اول سال دیده نمی‌شود و فقط میزان 25-OH-D در زمستان به نحو معنی‌داری کمتر از پاییز است.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: کمبود بودن شدت تغییرات فصلی در زنان و پایین بودن بسیار باز سطح ویتامین D در آنان قابل انتساب به الگوی زندگی و پوشش یکنواختی است که در تمام سال توسط آنان استفاده می‌شود. یافته‌های مانشانده ضرورت طرحهای تحقیقاتی و اقدامات پیشگیری در ارتباط با کمبود ویتامین D به ویژه در فصل زمستان می‌باشد.

وازگان کلیدی: نور آفتاب، ویتامین D، تغییرات فصلی.

مقدمه

نقش اصلی در تأمین ویتامین D مورد نیاز بدن را داراست و در صورت کفايت آن، نیاز به ویتامین D رژیم غذایی مرتفع خواهد شد (۱، ۲). عوامل گوناگونی در میزان سنتر پوستی ویتامین D توسط نورآفتاب نقش دارند. فاصله خورشید تا زمین در فصول گوناگون، زاویه تابش، میزان آلدگی هوا، نوع آب و هوای منطقه، مدت قرارگیری در معرض نور آفتاب و نوع پوشش از عواملی هستند که بر میزان سنتر پوستی ویتامین D اثر می‌گذارند (۳، ۴).

ویتامین D هورمونی است استرتوئیدی که نقش اساسی در متابولیسم مواد معدنی (بخصوص کلسیم و فسفر) و بافت استخوانی ایفا می‌کند. کمبود این ویتامین سبب اختلال در متابولیسم کلسیم و فسفر و عوارضی از قبیل ریکتر در کودکان، استئومالاسی در بزرگسالان و اختلال رشد (۵) شود. ویتامین D مورد نیاز بدن از دو منبع تأمین می‌شود: (۱) رژیم غذایی و (۲) سنتر پوستی توسط تابش نور آفتاب که

مداخله گر با متاپولیسم کلسیم و ویتامین D (کورتیکوستروئید، استروژن، داروهای ضدتشنج، مکمل‌های کلسیم و ویتامین D)، بارداری و شیردهی، مطالعه قند و لیپید تهران با هدف بررسی عوامل خطرساز بیماریهای قلبی - عروقی انجام و نمونه‌گیری این طرح از اردیبهشت ۱۳۷۸ تا مهر ۱۳۷۹ انجام شد. نمونه‌گیری در تمام ماههای سال به غیر از ماه مبارک رمضان و ۱۵ روز پس از آن انجام گرفت. به این دلیل هیچ نمونه‌ای در دی ماه بررسی نشده است.

کلیه افراد مورد بررسی به دنبال انتخاب، برای ورود در طرح قند و لیپید تهران به واحد بررسی قند و لیپید دعوت شدند و در آن واحد توسط پزشکان آموزش دیده مورد مصاحبه و معاينه قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک، شرح حال، داده‌های بالینی و اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک از افراد اخذ و در پرسشنامه‌های مدون و کلینیکی شده بثت شد. سپس در حالت ناشتا یک نمونه خون از بیماران گرفته شد. این نمونه خون در آزمایشگاه واحد قند و لیپید سانتیفیک و پس از انجماد در دمای ۸۰-۸۰ درجه سانتیگراد نگهداری شد.

بررسیهای آزمایشگاهی در این مطالعه در آزمایشگاه پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متاپولیسم انجام گرفت. اندازه‌گیری متاپولیت ویتامین D در سرم (۲۵-۴۰ هیدروکسی ویتامین D) با استفاده از روش سنجش اتصال به برووثین (protein binding assay) با تکنیک رادیوایمونواسی (RIA) و با استفاده از کیت‌های شرکت DRG Instruments از کشور آلمان انجام شد. از روش‌های کنترل کیفی معمول برای تضمین صحت و دقیقت آزمایشها در تمام مدت انجام بررسیهای آزمایشگاهی استفاده گردید. به منظور تضمین دقیقت آزمایشها در دامنه‌های مختلف غلظت ویتامین D، ضریب تغییرات اندازه‌گیریها در سه غلظت استاندارد متاپولیت ویتامین D اندازه‌گیری شد. ضریب تغییرات (coefficient of variation=CV) در غلظت ۲ نانوگرم در میلی‌لیتر (پایین) معادل ۵/۶٪، در غلظت ۱۳/۵ نانوگرم در میلی‌لیتر (متوسط) معادل ۷/۴٪ و در غلظت ۱۴۰ نانوگرم در میلی‌لیتر (بالا) معادل ۹/۲۴٪ بود که در هر سه دامنه در محدوده قابل قبول می‌باشد.

اولین بار توجه به نقش آفتاب در جلوگیری از بیماریهای استخوانی در قرن ۱۷ بوجود آمد. در آن هنگام مشاهده شد کودکانی که در شهرهای صنعتی ساکن هستند نسبت به کودکان ساکن روستاهای بیشتر به اختلالات استخوانی و رشد مبتلا می‌شوند (۳). مطالعات بعدی این یافته را تأیید کرد و نشان داده شد که قرار دادن کودکان مبتلا به راشیتیسم در معرض نورخورشید سبب بهبود قابل ملاحظه بیماری آنها می‌شود و به تنهایی در درمان راشیتیسم مؤثر است (۵). بررسی‌های بعدی نشان داد که میزان بروز ریکتر در فصل بهار بیشتر بوده و در پاییز کاهش می‌یابد و از این‌رو تابش آفتاب در فصل تابستان منبع مهمی برای ویتامین D در نظر گرفته شد (۶).


روشهای آزمایشگاهی میان این بودند که سطح سرمی متاپولیت‌های ویتامین D در فصل پاییز و تابستان بیشتر از سایر فصول بوده و ارتباطی با ویتامین D رژیم غذایی ندارد. مطالعات گوناگون، حاکی از تغییرات فصلی سطح سرمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D است (۷،۸).

با توجه به شیوع کمبود ویتامین D در کشور ما بخصوص در جمعیت زنان (۹)، شناخت عوامل مؤثر بر این کمبود و یافتن راه کارهای مناسب برای رفع این مشکل با توجه به شرایط زمانی و مکانی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ما تاکنون بررسی منسجمی در این مورد انجام نشده و با توجه به این خلاصه اطلاعاتی نیاز به مطالعه دقیق در این مورد احساس می‌شود.

در این مقاله تغییرات سطح سرمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D بر حسب فصول گوناگون سال در نمونه‌ای از جمعیت ساکن تهران بررسی می‌گردد.

مواد و روشها

افراد مورد بررسی در این مطالعه کسانی بودند که در مطالعه آینده‌نگر قند و لیپید تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوش‌های (cluster random sampling) از ساکنین منطقه ۱۳ شهری انتخاب شده بودند. نمونه‌های مورد مطالعه شامل ۱۱۷۲ فرد (۶۸۲ زن و ۴۹۰ مرد) ۳ تا ۶۹ سال است که به صورت دائمی ساکن تهران هستند. معیارهای عدم پذیرش در این مطالعه عبارت بودند از: بیماریهای کبدی و کلیوی، مصرف داروهای



شکل ۱: میانگین و فاصله اطمینان ۹۵ درصد سطح سرمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D در مردان و زنان در ماههای مختلف سال؛ به دلیل تغییر ماه رمضان با ماه دهم (دی)، نسونه‌گیری در این ماه انجام نشد.

بانگاه کلی به شکل ۱ مشخص می‌شود که میزان فراز و نشیب‌های سطح سرمی ۲۵-OH-D در زنان از سدت کمتری نسبت به مردان برخوردار است. در تابستان، افت سطح سرمی ۲۵-OH-D در هر دو جنس دیده می‌شود که این افت در مردان بارزتر و معنی دار بوده و در زنان خفیف‌تر است. همچنین کمترین اختلاف سطح سرمی ۲۵-OH-D بین دو جنس در ماههای فصل تابستان (تیر و مرداد) دیده می‌شود (6 ± 4 ng/ml در تیر و 8 ± 8 ng/ml در مرداد). در همه ماههای مورد بررسی، بالاترین سطح سرمی ۲۵-OH-D در افراد مؤنث معادل با کمتر از پایین‌ترین سطح سرمی افراد مذکور است. از نظر بررسی شیوع کمبود ویتامین D بیشترین شیوع کمبود این ویتامین در مردان در ماههای فروردین (10%) و بهمن (51%) و در زنان در ماههای آذر (91%) و بهمن (83%) مشاهده شد که ماه بهمن در بین دو مورد مشترک است.

جدول ۳: میانگین سطح سرمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D در دو جنس در فصول مختلف سال

	زن		مرد		فصل
	25-OH-D (ng/ml)	تعداد	25-OH-D (ng/ml)	تعداد	
21 ± 22	۲۲۸	38 ± 27	۱۳۱	بهار	
21 ± 22	۲۲۰	$31\pm21^{**}$	۱۶۱	تابستان	
22 ± 22	۱۲۲	42 ± 29	۱۱۸	پاییز	
$17\pm16^{**}$	۱۱۰	$28\pm22^{**}$	۸۰	زمستان	

* $p<0.01$, ** $p<0.05$ نسبت به بهار
*** $p<0.01$, **** $p<0.001$ نسبت به پاییز

نتایج مربوط به بررسیهای آزمایشگاهی به همراه اطلاعات زمینه‌ای و ماههای مختلف سال شمسی (زمان نمونه گیری) و همچنین در فصول مختلف با استفاده از آزمون t و بوسیله نرم‌افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مطالعه میانگین، انحراف معیار و فاصله اطمینان ۹۵ درصد سطح سرمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D در افرادی که در ماهها و فصول مختلف سال بررسی شده‌اند در دو جنس و در گروههای مختلف ارائه می‌شود. سطح معنی داری آماری معادل $p<0.05$ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

در این بررسی ۱۱۷۲ نفر (۶۸۲ زن و ۴۹۰ مرد) در محدوده سنی ۳ تا ۶۹ سال، وارد مطالعه شدند. در هر دو جنس بیشترین افراد در رده سنی ۱۰-۱۹ سال قرار داشتند و تعداد افراد مورد بررسی در همه زیر گروهها بیشتر از ۳۵ نفر بود (جدول ۱).

جدول ۱: توزیع سنی و جنسی افراد مورد مطالعه در طرح جامع بررسی وضعیت کلسیم و ویتامین D، تهران، ۱۳۷۹.

سن	جنس		(سال)
	زن	مرد	
۲-۹	۶۰(۷۴)*	۴۰(۴۹)	۱۲۳
۱۰-۱۹	۲۴۳(۶۱)	۱۵۴(۳۹)	۳۹۷
۲۰-۲۹	۱۱۱(۶۷)	۳۵(۳۲)	۱۶۶
۳۰-۳۹	۱۰۵(۵۹)	۷۳(۴۱)	۱۷۸
۴۰-۴۹	۷۷(۴۶)	۹۰(۵۴)	۱۶۷
۵۰-	۷۲(۵۱)	۶۹(۴۹)	۱۴۱
۱۱۷۲	۶۸۲(۵۸)	۴۹۰(۴۲)	جمع

* اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند.

میانگین و فاصله اطمینان ۹۵٪ مربوط به سطح سرمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D در ماههای گوناگون سال، در دو جنس، در شکل ۱ نشان داده شده است. حداقل سطح سرمی ۲۵-OH-D در هر دو جنس در ماههای نهم (آذر) و یازدهم (بهمن) وجود داشته است (به ترتیب 28 ± 16 ng/ml و 12 ± 13 ng/ml در زنان و 14 ± 14 ng/ml و 24 ± 18 ng/ml در مردان). حداکثر میزان سطح سرمی ۲۵-OH-D در هر دو جنس، در ماه هشتم (آبان) مشاهده شد (55 ± 27 ng/ml در مردان و 29 ± 29 ng/ml در زنان).

جدول ۲: میانگین سطح سرمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D و میزان شیوع کمبود ویتامین D (20 ng/ml) در مردان و زنان در ماههای مختلف

پ	کمبود(%)	زنان		مردان		ماه
		۲۵-OH-D (ng/ml)	تعداد	کمبود(%)	۲۵-OH-D (ng/ml)	
NS	۷۱	۱۵±۱۱	۳۱	۶۰	۲۸±۲۶	۱۵
p<0.001	۷۳	۲۰±۲۲	۹۲	۳۱	۳۶±۳۷	۵۵
p<0.001	۶۸	۲۳±۲۶	۱۰۵	۲۸	۴۱±۲۴	۶۱
p<0.05	۶۴	۲۱±۲۲	۹۰	۴۱	۲۸±۲۰	۷۵
NS	۷۴	۲۰±۲۴	۷۸	۴۰	۲۸±۱۷	۴۷
p<0.001	۶۷	۲۲±۲۱	۵۲	۲۸	۴۲±۲۶	۳۹
p<0.001	۶۲	۲۲±۲۰	۷۴	۳۷	۳۹±۲۹	۷۱
p<0.001	۵۵	۲۹±۲۹	۳۸	۱۳	۵۵±۲۷	۳۷
NS	۹۱	۱۲±۱۳	۱۱	۳۰	۲۸±۱۶	۱۰
p<0.001	۸۳	۱۴±۱۴	۶۶	۵۱	۲۴±۱۸	۴۵
p<0.02	۵۹	۲۲±۱۸	۴۴	۳۷	۳۴±۲۵	۲۵
p<0.001	۶۹	۲۱±۲۲	۶۸۱	۳۵	۳۵±۲۶	۴۹۰
کل						

می شوند (۱۰). مطالعات بعدی نشان دادند که قرار گرفتن کودکان مبتلا به ریکتر در معرض آفتاب، سبب بهبود قابل ملاحظه در بیماری آنها می شود (۵).

Kassowitz دریافت بروز ریکتر در خلال ماههای زمستان پیشتر شده و در ماههای پاییز و تابستان کاهش می یابد (۱۱). پیشرفت روش‌های بیوشیمی منجر به تعیین سطح متabolیت‌های ویتامین D در فضول گوناگون شد و اهمیت نسبی نورآفتاب و رژیم غذایی را پیشتر مشخص کرد که در نهایت تغییرات فصلی در سطح سرمی ۲۵-OH-D مطرح شد. یکی از اولین مطالعات در این زمینه توسط Round و Stamp در سال ۱۹۷۴ انجام شد. آنها دریافتند که حداکثر سطوح ۲۵-OH-D در پاییز بوده و با ویتامین D رژیم غذایی ارتباطی ندارد. این نتیجه نمایانگر آن است که نور آفتاب در فصل تابستان یک عامل عمدی در تأمین ویتامین D مورد نیاز بدن است (۸). مطالعات بعدی تغییرات فصلی ۲۵-OH-D و عوامل مؤثر بر آن را مشخص کرد (۳).

در مطالعه مشابهی که توسط Sedrani و همکاران بر روی نمونه‌ای از جمعیت عربستان انجام گرفت، سطح سرمی ۲۵-OH-D در ۴۰۷۸ نفر در ماههای گوناگون سال، به همراه میانگین دما و میزان اشعه ماورای بنتش در سطح زمین به مدت ۳ سال اندازه گیری شد. حداکثر سطح سرمی ۲۵-OH-D در ماه آوریل (فروردين و اوایل اردیبهشت) و حداقل آن در ماه سپتامبر (مهر و اوایل آبان) بود و اختلاف معنی داری بین این دو میزان وجود نداشت. ارتباط مشخصی بین سطح سرمی ۲۵-OH-D با UV در ماههای گوناگون یافت نشد. نویسنده مقاله، کاهش سطح سرمی ۲۵-OH-D

همچنین در بررسی میزان ۲۵-OH-D در فضول مختلف مشاهده می شود که سطح سرمی ۲۵-OH-D مردان در تابستان و زمستان (21 ± 21 و 28 ± 22 نانو گرم در میلی لیتر) به نحو معنی داری پایین تر از بهار و پاییز (43 ± 29 و 38 ± 27 نانو گرم در میلی لیتر) است ($p<0.05$ و $p<0.01$). اما در زنان اختلاف معنی داری بین سطح سرمی ۲۵-OH-D در سه فصل اول سال دیده نمی شود و فقط میزان ۲۵-OH-D در زمستان به نحو معنی داری کمتر از پاییز است (17 ± 16 ng/ml در مقایل 17 ± 23 ng/ml) ($p<0.05$).

بحث

سطح سرمی ۲۵-OH-D در ماهها و فضول گوناگون سال متغیر است و شدت این تغییرات در زنان کمتر از مردان است. حداکثر سطح سرمی این متابولیت در هر دو جنس در اواسط پاییز (آبان) و حداقل آن در اواخر پاییز و زمستان (آذر و بهمن) مشاهده می شود.

برای اولین بار Gilsson در سال ۱۶۰ نشان داد که میزان ناهنجاریهای استخوانی از قبیل بزرگی مفاصل استخوانهای بلند، بزرگی سر و قد کوتاه در کودکانی که ساکن شهرهای صنعتی انگلستان هستند، نسبت به کودکان ساکن در مناطق روستایی بیشتر است (۳). اولین بار نقش آفتاب در جلوگیری و درمان ریکتر به سال ۱۸۲۲ باز می گردد. در این سال سنیاد کی دریافت کودکانی که در شهر زندگی می کنند به علت عدم قرارگیری در معرض نور آفتاب نسبت به کودکان مناطق روستایی بیشتر به ریکتر مبتلا

اینکه زنها از پوشش نسبتاً ثابتی استفاده می‌کنند و نیز به علت اینکه اکثریت آنها خانه‌دار بوده و کمتر به فعالیتهای خارج از خانه می‌پردازند، می‌توان این ثبوت نسبی تغییرات سطح 25-OH-D نسبت به مردان را به عوامل فوق نسبت داد. در مطالعه‌ای که توسط Alagol و همکاران در ترکیه انجام شد، تأثیر سه نوع پوشش مورد استفاده زنان (غربی، اسلامی، و حد وسط) بر سطح سرمی 25-OH-D بررسی شد. یافته این مطالعه نشان داد که میزان سطح سرمی 25-OH-D در گروه با پوشش اسلامی، بطور معنی‌داری از ۲ گروه دیگر کمتر بوده و همه افراد این گروه به کمبود ویتامین D دچار بودند (۴). در افراد مورد مطالعه‌ما، در تمام ماههای مورد بررسی، بالاترین سطح سرمی افراد مؤنث، معادل یا کمتر از پایین ترین سطح سرمی افراد مذکور بود که این مطلب نمایانگر کمبود ویتامین D در زنان مورد مطالعه می‌باشد.

مطالعه حاضر اولین مطالعه‌ای است که به بررسی تغییرات فصلی سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D در یک جمعیت ایرانی می‌پردازد. یکی از محدودیت‌های مطالعه ما یکسان نبودن افراد مورد مطالعه در ماههای مختلف است، هر چند که از نظر سنی و جنسی اختلاف معنی‌داری بین افراد بررسی شده در ماههای مختلف دیده نمی‌شود. علاوه بر این عدم نمونه‌گیری در ماه رمضان (مصادف با دی‌ماه و فصل زمستان) امکان نتیجه گیری قطعی درباره وضعیت ویتامین D در فصل زمستان را از بین برده است.

به طور خلاصه، با توجه به یافته‌های ما اولاً پایین تر بودن سطح سرمی 25-OH-D در زنان نسبت به مردان در تمامی فصول و نیز شیوع بالاتر کمبود ویتامین D در زنان، نشاندهنده ضرورت یافتن یک راهکار مناسب برای رفع این مشکل است. ثانیاً پایین بودن سطح سرمی 25-OH-D در هر دو جنس در اواخر پاییز و زمستان نیاز به بررسیهای بیشتر و انجام مداخله در هر دو جنس را نشان می‌دهد.

در فصل تابستان را به افزایش دمای هوا و متعاقب آن کاهش در معرض نورآفتاب بودن جمعیت عربستان مرتبط می‌داند (۱۲). در مطالعه‌ما نیز در مردان، کاهش معنی‌دار ویتامین D در تابستان نسبت به بهار و پاییز دیده شد. مطالعه مشابه دیگری توسط Hine و همکاران در انگلستان انجام شد. در این مطالعه تغییرات سرمی 25-OH-D در فصول گوناگون سال و ارتباط آن با ساعت تابش آفتاب در روز، بر روی ۲۷ فرد سالم، به طور ماهیانه بررسی گردید. در این مطالعه مشاهده شد که سطح سرمی 25-OH-D به فاصله ۲ ماه پس از فصل تابستان به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد و میزان آن با تعداد ساعت‌های قرارگیری در معرض نورآفتاب نسبت مستقیم دارد (۱۳).

در مطالعه دیگری که توسط Sedrani و همکاران انجام گرفت سطح سرمی 25-OH-D در ۵۹ دانشجو و ۲۴ فرد مسن اندازه گیری شد. افراد مسن به مدت ۷ روز و روزی ۵ دقیقه در معرض نورآفتاب قرار گرفتند. در تمامی این افراد سطح سرمی 25-OH-D به طور معنی‌داری پس از تابش نورآفتاب افزایش یافت. (تقریباً ۲/۵ برابر)

در مطالعه‌ما حداکثر سطوح سرمی 25-OH-D در هر دو جنس در اواسط پاییز (آبان) دیده شد. این یافته با مطالعات پیشین مطابقت دارد (۷، ۸، ۱۳). به نظر می‌رسد این افزایش متعاقب فصل تابستان و پس از یک تأخیر ۱-۲ ماهه روی می‌دهد. شاید بتوان این یافته را به افزایش فعالیت در محیط‌های سریاز و در معرض قرارگیری نورآفتاب به علت خنک‌تر شدن هوای پاییز نسبت به تابستان نسبت داد. از طرفی وجود حداقل سطح سرمی 25-OH-D در ماههای آذر (اوخر پاییز) و بهمن (زمستان) نشاندهنده کاهش سنتر این ویتامین به علت فصل زمستان و عوامل مؤثر در کاهش تابش آفتاب (زاویه کمتر تابش، نوع پوشش افراد، وضعیت جوی) می‌باشد. سیر ثابت‌تر و با تغییرات کمتر سطوح 25-OH-D در زنان در فصول مختلف (blunting of seasonal variation) دیگر در تنظیم سطح 25-OH-D در زنان است. با توجه به

REFERENCES

- 1- Sedrani SH, Elidrissy AW, El Arabi KM. Sunlight and vitamin D status in normal Saudi subjects. *Am J Clin Nutr* 1983; 38: 129-32.
- 2- Haddad JG, Hahn TJ. Natural and synthetic sources of circulating 25-hydroxyvitamin D in man. *Nature* 1973; 244: 515-7.
- 3- Holick MF, Adams JS. Vitamin D metabolism and biological function. In: Avioli LV, Krane SM, editors. *Metabolic Bone Disease and Clinically Related Disorders*. 3rd ed. 1993; San Diego, Academic Press. p: 123-64.
- 4- Alagol F, Shihadeh Y, Boztepe H, Tanakol R, Yarman S, Azizlerli H, et al. Sunlight exposure and vitamin D deficiency in Turkish women. *J Endocrinol Invest* 2000; 23: 173-7.
- 5- Hess AF, Unger LF. Cure of infantile rickets by sunlight. *J Am Med Assoc* 1921; 77: 39.
- 6- Maxwell JD. Seasonal variations in vitamin D. *Proc Nutr Soc* 1994; 53: 533-43.
- 7- McLaughlin M, Raggatt PR, Fairney A, Brown DJ, Lester E, Wills MR. Seasonal variation in serum 25-hydroxycholecalciferol in healthy people. *Lancet* 1974; 1: 536-8.
- 8- Stamp TC, Round JM. Seasonal changes in human plasma levels of 25-hydroxyvitamin D. *Nature* 1974 22: 247: 563-5.
- 9- عزیزی ف، رئیس زاده ف، میر سید قاضی ع. کمبود ویتامین D در گروهی از ساکنین شهر تهران. مجله پژوهش در پزشکی ۱۳۷۹، سال ۲۴، شماره ۴، صفحات ۲۹۱ تا ۳۰۴
- 10- Sniadecki J. Cited by W Mozolowski, Jerdrzej Sniadecki (1763-1883) on the cure of rickets. *Nature* 1939; 143: 121.
- 11- Kassowitz M (editor). *Tetany and autointoxication in infants (Tetanie and autointoxification in Kindersalter)*. Wien Med Presse, 1897; 97: 139 (in Dutch).
- 12- Sedrani SH, Al-Arabi K, Abanmy A, Elidrissy A. Vitamin D status of Saudi: IV. Seasonal variations. *Saudi Med J* 1992; 13: 423-9.
- 13- Hine TJ, Roberts NB. Seasonal variation in serum 25-hydroxy D₃ does not affect 1, 25-dihydroxy vitamin D. *Ann Clin Biochem* 1994; 31: 31-4.