

The effectiveness of hypnotherapy on sleep quality improvement of students

Ali Mohammadzadeh Ebrahimi^{*1}, Tayebe Rahimi Pordanjani¹, Ali Taghvaeinia²

1. Department of Psychology, University of Bojnord, Bojnord, Iran.

2. Department of Psychology, Yasouj University, Yasouj, Iran

(Received: 2016/11/7 Accept: 2017/02/28)

Abstract

Background: Sleep quality has a fundamental and important role in determining the physical and psychological health of humans. Sleep disorders are widespread and have very damaging effects on the individual and social aspects of human life. This research was aimed to evaluate the effectiveness of hypnotherapy on sleep quality improvement.

Materials and methods: The method research was a Quasi-experimental, and pretest-posttest design with the control group. The population was all students of Applied Science Center of Khorasan Razavi in 2014. The sample consisted of 30 volunteers who were randomly assigned to two experimental and control groups, each group 15 subjects. Pittsburgh Sleep Quality Index was used to assess the sleep quality, and Wilkinson (1981) protocol was used for hypnotherapy sessions. Research data were analyzed by using the analysis of covariance.

Results: The results show the effectiveness of hypnotherapy to improve the overall quality of sleep, subjective sleep quality, sleep latency, sleep disturbances, and daytime dysfunction.

Conclusion: hypnotherapy improves sleep quality through mechanisms such as reduced physiological arousal, stimulation of relaxation, release stress and cognitive changes. It is suggested the use of this treatment in the sleep problems and more research in this area due to the lack of studies.

Keywords: Hypnotherapy, Sleep quality, Students

*Corresponding author: Ali Mohammadzadeh Ebrahimi
Email: alimohamadzade98@yahoo.com

اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر بهبود کیفیت خواب دانشجویان

علی محمدزاده ابراهیمی^{۱*}، طبیبه رحیمی پردنجانی^۱، علی تقوایی نیا^۲

۱- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

۲- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۸/۱۷ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

چکیده:

سابقه و هدف: کیفیت خواب نقش اساسی و تعیین کننده در سلامت جسمانی و روان‌شناختی انسان دارد. شیوع اختلال‌های خواب گسترده بوده و آثار آن بر ابعاد فردی و اجتماعی زندگی افراد بسیار محرب است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر بهبود کیفیت خواب انجام شد.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری تمام دانشجویان مرکز علمی کاربردی خراسان رضوی در سال ۱۳۹۳ بودند. نمونه شامل ۳۰ نفر از افراد داوطلب بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل، هر گروه ۱۵ نفر، جایگزین شدند. برای سنجش کیفیت خواب از پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ و برای انجام جلسه‌های هیپنوتیزم درمانی از روش ویدکسون (۱۹۸۱) استفاده شد. در مرحله پیش آزمون، هر دو گروه به پرسشنامه کیفیت خواب پاسخ دادند. سپس، گروه آزمایش در ۶ جلسه هیپنوتیزم درمانی شرکت کرد و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. در انتهای جلسه‌های درمانی، از هر گروه پس آزمون به عمل آمد. داده‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد هیپنوتیزم درمانی بر بهبود کیفیت کلی خواب و ابعاد کیفیت ذهنی خواب، تأخیر در به خواب رفتن، اختلال‌های خواب و اختلال‌های عملکرد روزانه موثر است.

نتیجه‌گیری: هیپنوتیزم درمانی از طریق مکانیسم‌هایی نظیر کاهش برانگیختگی فیزیولوژیکی، تحریک آرمیدگی، رهاسازی تنفس و تغییرهای شناختی کیفیت خواب افراد را بهبود می‌بخشد. بکارگیری این روش درمانی در درمان مشکلات خواب و انجام پژوهش‌های بیشتر در این زمینه با توجه به خلاء مطالعه‌ای، پیشنهاد می‌شود.

وازگان کلیدی: هیپنوتیزم درمانی، کیفیت خواب، دانشجویان

مقدمه:

کیفیت خواب پدیده‌ای پیچیده است که تعریف آن مشکل و ذهنی است. به این معنا که در محیط آزمایشگاهی قابل اندازه‌گیری نیست(۱). کیفیت خواب طبق تعریف از شاخص‌های ذهنی مربوط به چگونگی تجربه خواب تشکیل می‌شود؛ مانند میزان رضایتمندی از خواب و احساسی که پس از برخاستن از خواب ایجاد می‌شود(۲). حدود یک سوم بزرگسالان در دنیا دچار اختلال خواب داشته و می‌تواند کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. به علاوه، خواب سبب کاهش استرس، اضطراب و فشارهای عصبی می‌شود و به شخص در بازیافت انرژی دوباره برای تمرکز بهتر حواس، سازگاری و لذت بردن از فعالیت‌های روزانه کمک می‌کند(۳).

یکی از نیازهای اساسی انسان خواب است و در واقع هر فرد در حدود یک سوم از عمر خود را در خواب بسر می‌برد(۴). کمیت و کیفیت خواب (sleep quality) نقش مهمی در سلامت انسان(۵)، فرآیند یادگیری، تمرکز و حافظه (۳ و ۴) داشته و می‌تواند کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. به علاوه، خواب سبب کاهش استرس، اضطراب و فشارهای عصبی می‌شود و به شخص در بازیافت انرژی دوباره برای تمرکز بهتر حواس، سازگاری و لذت بردن از فعالیت‌های روزانه کمک می‌کند(۶).

نویسنده مسئول: علی محمدزاده ابراهیمی
پست الکترونیک: Alimohamadzade98@yahoo.com

خواب در زنان جوان مستعد هیپنوتیزم همراه است(۲۸). در پژوهشی دیگر Hodevici اختلال‌های افسردگی، اضطراب و بیخوابی موثر است(۳۱). Brayet و همکاران در پژوهشی به بررسی اثر هیپنوتیزم درمانی در درمان راه رفتن در خواب و افزایش کنترل بر رفتار آشفته روی ۸ آزمودنی که در خواب راه می‌رفتند و به کلینیک اختلال‌های خواب مراجعه کرده بودند، پرداختند. نتایج نشان داد هیپنوتیزم درمانی به افزایش قدرت موج دلتا و فرکانس سیگما و بتا بخصوص در چرخه دوم خواب منجر می‌شود(۳۲). Schlarb و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که این درمان بر بهبود عالیم کودکان مبتلا به اختلال‌های خواب موثر است(۳۳). در جامعه ایران پژوهش‌های انجام شده در مورد تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر اختلال‌های یا کیفیت خواب سیار اندک است. در تنها مطالعه انجام شده، میرزمانی و همکاران نشان دادند هیپنوتیزم درمانی بر اضطراب، افسردگی و بیخوابی بیماران مبتلا به وزوز گوش موثر است(۳۴). بنابراین، با توجه به گستردگی و آثار مغرب اختلال در کیفیت خواب به ویژه در بین دانشجویان، لزوم کاربرد بیشتر درمان‌های روان‌شناختی با توجه به عوارض دارد درمانی و همچنین خلاء مطالعه‌ای در زمینه بررسی تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر کیفیت خواب در جامعه ایران، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر بهبود کیفیت خواب دانشجویان است.

مواد و روش‌ها:

روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی (quasi-experimental) است که در آن از طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری تمام دانشجویان زن مرکز علمی کاربردی خراسان رضوی در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۹۴ تشکیل می‌دهند (۱۰۲۲ نفر). نمونه پژوهش از بین افراد داوطلب انتخاب شدن؛ به این ترتیب که ابتدا یک فراخوان برای شرکت در پژوهش ترتیب داده شد. ۱۲۳ نفر آمادگی خود را برای شرکت در پژوهش اعلام کردند. از این تعداد، ۸۵ نفر که ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند، در جلسه‌ای حضور یافته و طی آن به پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ پاسخ دادند. از این افراد ۳۲ نفر که نمره کلی بالاتر از ۵ (که مطابق با دستورالعمل نمره‌گذاری پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ نشان‌دهنده نامناسب بودن کیفیت خواب است) کسب کردند و همچنین ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۱۶ نفر) جایگزین شدند که در نهایت به دلیل ریزش، تعداد آزمودنی‌های هر یک از گروه‌ها به ۱۵ نفر رسید. سپس، طی جلسه جدآگاهانه‌ای برای آزمودنی‌های گروه آزمایش، در مورد منطق درمان و هدف پژوهشی درمان توضیحاتی داده شد و فرم رضایت‌نامه توسط آن‌ها تکمیل شد. همچنین به آن‌ها اطمینان داده شد که تمام اطلاعات آنان محترمانه خواهد ماند. لازم به ذکر است که ملاک‌های ورود به پژوهش حاضر عبارت بودند از: تکمیل فرم رضایت آگاه شرکت در برنامه درمانی، کسب نمره کلی بالاتر از ۵ در پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ، قرار داشتن در دامنه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، عدم مصرف داروهای روان‌پزشکی، عدم سوءصرف مواد مخدر و الکل، نداشتن اختلال باز روان‌شناختی بر اساس مصاحبه بالینی از سوی روان‌شناص و عدم ابتلا به بیماری جسمانی حاد. همچنین ملاک خروج، اصراف یا عدم توانایی تکمیل جلسه‌های درمان بود.

شانخ این کیفیت خواب پیتزبورگ (Pittsburgh Sleep Quality Index) این پرسشنامه توسط بایسه و همکاران (۶) ساخته شده است و نگرش افراد را پیرامون کیفیت خواب در یک ماه گذشته بررسی می‌کند. این ابزار دارای ۷ خرده مقیاس است که هفت نمره برای مقیاس‌های توصیف کلی فرد از کیفیت خواب، تاخیر در به خواب رفتن، طول مدت خواب مفید، کفایت خواب (بر اساس نسبت طول مدت خواب مفید از کل زمان سپری شده در رختخواب محاسبه می‌شود)، اختلال‌های خواب (به صورت بیدار شدن شبانه فرد تعریف می‌شود)، میزان داروی خواب‌آور مصرفی و عملکرد روزانه (به صورت مشکلات در رختخواب می‌شود) فرد در طول روز ناشی از بدخوابی تعریف می‌شود) است. نمره‌دهی هر یک از مقیاس‌های پرسشنامه بین صفر تا ۳ صورت می‌گیرد. به این ترتیب

شکایت دارند و این اختلال و بی‌نظمی در الگوی خواب می‌تواند سبب اختلال در فعالیت و پریشانی در قوای ذهنی شود(۹). در پژوهش‌ها اختلالات خواب چه به عنوان یک عالمت اولیه یا ثانویه، همواره با اختلالات دیگری نظر افسردگی، اختلال‌های اضطرابی، اختلال دو قطبی، حملات هراس، سوءصرف مواد و یا دیگر آسیب‌های روان‌شناختی گزارش شده است(۱۰). از نظر پژوهشی نیز، مشکلات مربوط به خواب عوارض مختلفی نظری چاقی، شکایت‌های قلبی و عروقی و سایر پیامدهای آسیب‌زا را به همراه دارد(۱۱). طوری که پژوهش‌ها نشان می‌دهد در افراد مبتلا به بیخوابی میانگین تعداد موارد بستری در ماه، به طور تقریبی دو برابر افراد بدون سابقه اختلال خواب بوده است(۱۲). همچنین میزان مرگ در افرادی که بیش از ۸/۵ ساعت و کمتر از ۳/۵ در شب می‌خوابند(۱۳). از لحاظ اجتماعی و شغلی نیز مشکلات خواب با کیفیت زندگی پایین‌تر، نزد بالاتر غیبیت و پایین‌تر بهره‌وری، تصادف رانندگی، حوادث شغلی و مشکلات بین فردی همراه است(۱۴). در بین دانشجویان نیز اختلال در خواب و محرومیت از خواب یکی از مشکلات شایع است. شیوع اختلال خواب در بین دانشجویان در مطالعه‌های غیر ایرانی ۱۹ تا ۵۷ درصد و در برخی مطالعه‌های ایرانی ۱۳/۵ تا ۸/۶ درصد آمده است. علاوه بر پیامدهای روانی، اجتماعی و جسمانی ذکر شده در بالا، نامطلوب بودن کیفیت خواب در دانشجویان با عملکرد و پیشرفت تحصیلی پایین و نارضایتی آن‌ها در این زمینه همراه است(۱۵).

با توجه به اهمیت بالای خواب، درمان‌های متعددی برای بهبود کیفیت خواب و یا پیشگیری و درمان اختلال‌های خواب به وجود آمداند. از متدالوگی درمان‌های مورد استفاده در این زمینه می‌توان به رفتاردرمانی (behavior therapy)، درمان شناختی-رفتاری (cognitive behavioral therapy)، دارو درمانی (pharmacotherapy)، موسیقی‌درمانی (music therapy)، آرام‌سازی (relaxation)، یا ترکیبی از آن‌ها اشاره کرد(۱۶). در این میان، دارودرمانی به عنوان رایج‌ترین روش مورد استفاده در اختلال‌های روان‌شناختی خواب است که با عوارضی نظیر کسلی روزانه، مقاومت نسبت به دارو و وابستگی همراه است(۱۷). از این رو امروزه به کاربرد مداخله‌های روان‌شناختی در درمان مشکلات خواب بیش از پیش تأکید می‌شود. از سوی دیگر، پژوهش‌ها در مورد مداخله‌های روان‌شناختی که ممکن است اثر مثبتی روی کیفیت خواب داشته باشند به نسبت اندک است. یک دلیل این مساله، این است که تلاش هوشیارانه برای بهبود کیفیت خواب می‌تواند به برانگیختگی بیشتر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی نظیر تنفس، ضربان قلب و ... منجر شود. بنابراین تمايل به بهبود کیفیت خواب از لحاظ شناختی نوعاً شکست می‌خورد یا حتی می‌تواند نتیجه عکس دهد(۱۸). بنابراین تأثیر ناخودآگاه و زیر سطح هوشیاری ممکن است در این زمینه اثربخش تر باشد، که می‌تواند تحت حالت هیپنوتیزم (hypnotic) اعمال شود. هیپنوتیزم به عنوان «یک حالت از هوشیاری که شامل توجه متتمرکز و کاهش آگاهی محیطی که با افزایش ظرفیت پاسخ به تلقین همراه است» تعریف شده است(۱۹). این تلقین‌ها اظهارات داده شده در طول القا یا پس از آن هستند که هدف آن‌ها تغییر یا اثر گذاشتن بر رفتار است که می‌تواند شامل مواردی نظیر کاهش درد، فلچ حرکتی یا یادگاری پس هیپنوتیزمی و ... باشد(۲۰ و ۲۱). هیپنوتیزم درمانی (hypnotherapy) به عنوان یک روش اثربخش در کاهش درد، اضطراب و استرس مربوط به انواع اختلال‌هایی از جمله: میگرن (۲۲)، سندروم روده تحریک‌پذیر(۲۳)، وزوز گوش (۲۴) و عزت نفس(۲۵) ثابت شده است. چندین مطالعه که همگی در جامعه غیر ایرانی انجام شده‌اند، شواهدی را در مورد آثار مفید هیپنوتیزم روی اختلال‌های خواب و بی‌خوابی (disturbances and insomnias) به دست آورده‌اند(۲۶-۲۹). از جمله، در یک مطالعه، بهبود قابل توجهی در کیفیت خواب گزارش شده زنان در دوره پس از یائسکی پس از مداخله هیپنوتیزم بالینی به دست آمد(۳۰). همچنین، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که گوش کردن به تلقین‌های هیپنوتیزمی قبل از خواب قویاً با افزایش کیفیت گزارش شده

جلسه اول: به شرکت کنندگان در مورد هیپنوتیزم و خلسه و چگونگی انجام آن و اینکه آنها در این چند جلسه آموزشی باید منتظر چه تغییراتی باشند توضیحاتی داده شد. سپس، به عنوان شروع کار یک آرامش‌آموزی کلی به آنها داده شد.

جلسه دوم: پس از ورود به خلسه، تلقیناتی در زمینه آرامش بیشتر، رفع استرس و اضطراب و عمیقتر شدن خلسه به افراد داده شد. در این جلسه سعی شد شرطی سازی افراد برای ورود به خلسه با شمارش تا عدد ۱۰ و فرمان به خواب صورت گیرد تا در جلسه‌های بعدی برای ورود به خلسه، زمان کمتری صرف شود.

جلسه سوم: در این جلسه، ابتدا به وسیله تلقین‌های بیشتر سعی شد خلسه افراد را عمیقتر کرده سپس به مدت ۱۰ دقیقه به تصویرسازی در افراد پرداخته شد که در ابتدای تصویرسازی در زمینه‌های خوشایند و آرامش بخش بود و در انتهای تصویرسازی ذهنی لحظه خواب انجام شد و تلقین‌های مربوط به شرطی کردن افراد تکرار شد.

جلسه چهارم: پس از دادن علامت شرطی و ورود به هیپنوتیزم، افراد به وسیله تصویرسازی ذهنی، به زمان قبل از خواب، بیدار شدن هنگام خواب و ... بوده شدند و در حین انجام این عمل به آن‌ها تلقین‌های مربوط به آرامش بیشتر، تمرکز فکر بیشتر و ... داده شد. این تلقینها با تصویرهای ذهنی مربوط به تلقین‌ها همراه شد تا اثر بخشی آن‌ها بیشتر شود.

جلسه پنجم: در این جلسه تلقین‌های هیپنوتیزمی با تصویرهای ذهنی مربوط به تلقین‌ها همراه شد تا اثر بخشی آن‌ها بیشتر شود.

جلسه ششم: در این جلسه، افراد نسبت به علامت شمارش تا عدد ۱۰ و انجام ۳ تنفس عمیق و آرام، شرطی شدند که در زمان قبل از خواب و یا بیداری زودهنگام یا بیداری در طول خواب، برای کسب آرامش، رفع استرس و اضطراب از این علامت شرطی استفاده کنند. برای تحلیل توصیفی داده‌های پژوهش، از شاخص‌های آماری میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل استنباطی، از

که مورد اصلاح تجربه نکرده‌ام معادل صفر، کمتر از یک بار در هفته معادل ۱، یک یا دو بار در هفته معادل ۲ و در نهایت سه بار یا بیشتر در هفته تجربه کرده‌ام معادل ۳، نمره می‌گیرد. حاصل جمع نمره‌های مقیاس‌های هفتگانه، نمره کلی را تشکیل می‌دهد که بین صفر تا ۵ است. نمره کلی بالاتر از ۵ به معنی کیفیت خواب نامطلوب است(۶). بایس و همکاران (۱۹۸۹) پایایی و روایی پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ را به ترتیب ۸۹/۶ و ۸۶/۵ گزارش کرده‌اند و در ایران نیز زرگر و همکاران (۳۵) اعتبار این پرسشنامه از طریق همبسته کردن نمره کل پرسشنامه با یک سوال کلی که در برگیرنده محتوای این پرسشنامه بود ۰/۶۸ (P<0.0001) محاسبه شد. همچنین آن‌ها پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۷۴/۰ محاسبه کردند. در پژوهش حاضر برای سنجش پایایی شاخص کیفیت خواب از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این میزان ۷۳/۰ برای کل پرسشنامه به دست آمد.

روش اجرا:

پس از آنکه افراد گروه آزمایش و گواه انتخاب شدند، طی جلسه‌ای (یک هفته پیش از شروع جلسات درمانی) از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد. به این ترتیب که شاخص کیفیت خواب پیترزبورگ از سوی افراد هر دو گروه تکمیل شد. قبل از شروع جلسه‌های درمانی برای اعضای گروه آزمایش جلسه‌ای توجیهی ترتیب داده شد که طی آن در مورد پژوهش حاضر، اهداف و مدت زمان آن به صورت کلی توضیحاتی داده شد. همچنین به آن‌ها اطلاعاتی در مورد محramانه بودن، حق خروج از پژوهش در هر زمان که می‌خواهند و زمان و مکان تشکیل جلسه‌ها داده شد. سپس، جلسه‌های گروهی هیپنوتیزم درمانی مبتنی بر روش درمانی Wilkinson (۳۶) برای گروه آزمایش به مدت ۶ جلسه هفتگی ۲ ساعته برگزار شد و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. یک هفته پس از پایان جلسه‌های درمانی از هر دو گروه آزمایش و گواه پس‌آزمون به عمل آمد. در زیر شرح جلسه‌های هیپنوتیزم روان درمانی بر اساس روش Wilkinson (۳۶) به اختصار ارائه شده است.

جدول ۱. میانگین و انحراف معیار نمره آزمودنی‌های گروه آزمایش و گواه در متغیرهای پژوهش

پس آزمون		پیش آزمون		گروه	متغیر
انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین		
۲/۹۴	۷/۸۶	۲/۲۶	۱۳/۲۰	آزمایش	کیفیت کلی خواب
۰/۹۴۱	۱۳/۲۰	۰/۶۷۶	۱۴/۲۰	گواه	
۰/۵۱۶	۰/۸۶۶	۰/۵۱۶	۲/۳۳	آزمایش	کیفیت ذهنی خواب
۰/۴۸۷	۲/۶۶	۰/۴۵۷	۲/۷۳	گواه	
۰/۸۳۳	۱/۸۶	۰/۵۶۰	۲/۸۰	آزمایش	تأثیر در به خواب رفتن
۰/۲۵۶	۲/۹۳	۰/۰۰۱	۳/۰۰	گواه	
۰/۹۱۰	۲/۰۰	۰/۷۹۸	۲/۲۶	آزمایش	مدت زمان خواب
۰/۶۵۴	۱/۴۰	۰/۴۱۴	۲/۸۰	گواه	
۰/۶۱۷	۰/۶۶۶	۰/۷۴۳	۱/۱۳	آزمایش	میزان بازدهی خواب
۰/۶۲۳	۰/۶۰۰	۰/۶۱۷	۰/۶۶۶	گواه	
۰/۵۶۰	۱/۲۰	۰/۴۵۷	۱/۹۳	آزمایش	اختلالات خواب
۰/۰۰۱	۲/۰۰	۰/۰۰۱	۲/۰۰	گواه	
۰/۵۶۰	۰/۲۰۰	۰/۷۹۸	۰/۲۶۶	آزمایش	داروهای خواب آور
۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	گواه	
۰/۷۲۲	۱/۶۶	۰/۴۸۶	۲/۶۶	آزمایش	اختلال در عملکرد روزانه
۰/۰۰۱	۳/۰۰	۰/۰۰۱	۳/۰۰	گواه	

معناداری وجود ندارد. برای بررسی مفروضه همگنی واریانس متغیرها در پس آزمون، از آزمون همگنی واریانس‌های لوین استفاده شد و نتایج نشان داد سطح معناداری به دست آمده از آزمون لوین در کیفیت خواب و خرد مقیاس‌های آن در گروه‌های بزرگتر از ۵ درصد بوده و معنادار نیست و فرض همگنی واریانس‌ها محقق شده است. سرانجام، مفروضه همگنی شیب‌های رگرسیون با محاسبه مقدار آزمون F حاصل از تعامل بین متغیر همپراش و متغیر مستقل محاسبه شد که نتایج نشان داد سطح معناداری به دست آمده از همه آثار تعاملی متغیرها در سطح ۵ درصد معنادار نیست و بنابراین مفروضه همگنی شیب‌های رگرسیون نیز رعایت شده است.

پس از اطمینان از برقراری مفروضه‌های تحلیل کواریانس به تجزیه و تحلیل سوال پژوهش پرداخته شد که نتایج مربوط به آن در جدول شماره ۲ آرائه شده است.

همان‌طور که در جدول ۲ ملاحظه می‌شود، با کنترل پیش آزمون بین گروه آزمایش و گواه از لحاظ کیفیت کلی خواب ($F = ۴۳/۹۷$ و $p < .001$)، کیفیت ذهنی خواب ($F = ۵۸/۵۷$ و $p < .001$)، اختلال‌های خواب ($F = ۳۲/۰۵$ و $p < .001$) و اختلال‌های عملکرد روزانه ($F = ۴۴/۱۲$ و $p < .001$) تفاوت معنادار مشاهده می‌شود. اما از لحاظ مدت زمان خواب ($F = ۲/۷۹$ و $p < .016$)، میزان بازدهی خواب ($F = ۰/۰۱۶$ و $p > .904$) و استفاده از داروهای خواب آور ($F = ۲/۲۱$ و $p < .148$) بین گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری مشاهده نشد. این یافته‌ها نشان می‌دهد هیپنوتیزم درمانی گروهی بر افرایش کیفیت کلی خواب و مولفه‌های کیفیت ذهنی خواب، تأثیر در به خواب رفت، اختلال‌های خواب و

شاخص آماری تحلیل کواریانس تک متغیری (ANCOVA) استفاده شد. تمام تحلیل‌ها با استفاده از نسخه ۲۴ نرم افزار SPSS انجام شد.

یافته‌ها:

گروه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، ۳۰ آزمودنی زن بودند که از این تعداد ۱۸ نفر (۶۰٪) مجرد و ۱۲ نفر (۴۰٪) متاهل هستند. میانگین سن در گروه آزمایش ۲۶/۸ سال، با انحراف معیار ۳/۱۴، گروه گواه ۲۷/۱۸ سال، با انحراف معیار ۳/۶۶ بود. در جدول ۱ میانگین و انحراف معیار نمره کسب شده آزمودنی‌های گروه آزمایش و گواه در متغیرهای کیفیت خواب و مولفه‌های آن، در مراحل پیش آزمون و پس آزمون، ارائه شده است.

قبل از انجام تحلیل اصلی، مفروضه‌های تحلیل کواریانس شامل نرمال بودن، خطی بودن، همگنی واریانس، همگنی شیب‌های رگرسیون و مستقل بودن متغیر همپراش بررسی شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آماره Z کلموگروف اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov Z) استفاده شد که نتایج نشان داد سطح معناداری به دست آمده در این آزمون در گروه آزمایش و گواه در مرحله پیشآزمون و پسازمون همه متغیرها، بیشتر از ۵ درصد است، بنابراین مفروضه نرمال بودن محقق شده است. برای بررسی خطی بودن رابطه بین متغیرهای واپسخواست، نمودار پراکنده‌گی متغیرهای واپسخواست ترسیم شد که در هیچ یک از متغیرها موردي از غیرخطی بودن مشاهده نشد. مفروضه مستقل بودن متغیرهای همپراش (پیش آزمون) با استفاده از آزمون t برای برابری میانگین آزمون لوین (Levene) برای برابری واریانس‌ها مورد سنجش واقع شد که سطوح معناداری به دست آمده نشان داد بین نمره‌های پیش آزمون متغیر کیفیت خواب و خرد مقیاس‌های آن در گروه آزمایش و گواه تفاوت آماری

جدول ۲. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری (ANCOVA) روی پس آزمون میانگین نمرات متغیرهای پژوهش در گروه‌های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون

متغیر	منبع تغییرات	مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	F	نسبت	سطح معنی داری (p)	میزان تاثیر (مجذور اتا)
کیفیت کلی خواب	پیش آزمون	۳/۹۰۶	۱	۳/۹۰۶			.۰/۰۲۹	.۰/۳۷۶
	عضویت گروهی	۲۱۲/۰۹۱	۱	۲۱۲/۰۹۱			.۰/۶۲۰	.۰/۰۰۱
کیفیت ذهنی خواب	پیش آزمون	.۰/۵۶۱	۱	.۰/۵۶۱			.۰/۰۷۹	.۰/۰۴۳
	عضویت گروهی	۱۴/۱۱۳	۱	۱۴/۱۱۳			.۰/۶۸۴	.۰/۰۰۱
تاخیر در به خواب رفت	پیش آزمون	۱/۳۰۹	۱	۱/۳۰۹			.۰/۱۲۳	.۰/۰۶
	عضویت گروهی	.۹/۷۰۹	۱	.۹/۷۰۹			.۰/۵۰۹	.۰/۰۰۱
مدت زمان خواب	پیش آزمون	.۰/۱۷۳	۱	.۰/۱۷۳			.۰/۰۱۰	.۰/۶۰۹
	عضویت گروهی	۱/۸۰۱	۱	۱/۸۰۱			.۰/۰۹۴	.۰/۱۰۶
میزان بازدهی	پیش آزمون	.۰/۵۴۴	۱	.۰/۵۴۴			.۰/۰۵۰	.۰/۴۵
	خواب	۴/۹۶	۱	۴/۹۶			.۰/۰۰۱	.۰/۹۰۴
اختلالات	پیش آزمون	.۰/۲۱۸	۱	.۰/۲۱۸			.۰/۰۵۰	.۰/۲۴۶
	عضویت گروهی	.۴/۹۶	۱	.۴/۹۶			.۰/۵۴۳	.۰/۰۰۱
خواب	پیش آزمون	.۰/۰۷۲	۱	.۰/۰۷۲			.۰/۰۱۶	.۰/۵۰۹
	عضویت گروهی	.۰/۳۵۵	۱	.۰/۳۵۵			.۰/۰۷۸	.۰/۱۴۸
داروهای	پیش آزمون	.۰/۱۳۳	۱	.۰/۱۳۳			.۰/۰۱۸	.۰/۴۸۶
	خواب آور	.۱۱/۷۶۰	۱	.۱۱/۷۶۰			.۰/۶۲۰	.۰/۰۰۱
اختلال	پیش آزمون	.۰/۱۳۳	۱	.۰/۱۳۳				
	عضویت گروهی	.۱۱/۷۶۰	۱	.۱۱/۷۶۰				

بالای بهبود در شکایت‌های جسمانی افراد در نتیجه استفاده از هیپنوتیزم، به کاهش مشکلات خواب و بهبود کیفیت خواب می‌انجامد. همچنین، هیپنوتیزم درمانی با ترغیب افراد برای جست‌وجو کردن ارتباط بین ذهن و جسم به بهبود نشانه‌های اضطراب در آن‌ها منجر می‌شود (۳۱) و این امر نیز به نوبه خود می‌تواند بهبود کیفیت خواب را به همراه داشته باشد.

نتیجه‌گیری:

در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد هیپنوتیزم درمانی بر بهبود کیفیت خواب موثر است. بر این اساس و همچنین نظر به شیوع گسترده مشکلات مربوط به کیفیت خواب و آثار مخرب آن بر ابعاد مختلف زندگی افراد، توصیه می‌شود این روش درمانی از سوی متخصصان در درمان اختلال‌های خواب استفاده شود. از محدودیت‌های پژوهش حاضر عدم تفکیک آزمودنی‌ها قبل از شروع درمان، از لحاظ نوع مشکلات خواب احتمالی است. این احتمال وجود دارد که افراد جامعه آماری مشکلات خواب با مبنای جسمانی کمتر مستعد همسان نباشند. افراد دارای مشکلات خواب با مبنای جسمانی ممکن است مدت‌آمد مداخله‌های هیپنوتیزم درمانی هستند (۴۹). بالعکس، مشکلات خواب دارای مبنای روان‌شناسی، بسیار مستعد هیپنوتیزم درمانی هستند. همچنین، نبود مرحله پیگیری مداخله درمانی، برای اطمینان از پایداری آثار و نتایج نیز از دیگر محدودیت‌های پژوهش حاضر است. مطالعه‌های انجام شده در زمینه تاثیر هیپنوتیزم بر کیفیت خواب و همچنین اختلال‌های خواب بسیار اندک است؛ از این رو پیشنهاد می‌شود مداخله‌ها و مطالعه‌های بیشتری برای ثبت و تأیید تجربی تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر کیفیت خواب انجام شود. همچنین پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آتی پیش از شروع مداخله درمانی، افراد مورد مداخله را از لحاظ نوع مشکلات خواب احتمالی همسان‌سازی کنند. در نهایت، برای اطمینان از پایداری آثار هیپنوتیزم درمانی بر کیفیت خواب، پیشنهاد می‌شود چنین پژوهشی را با لحاظ کردن مرحله پیگیری انجام دهن. همچنین به کارگیری این روش درمانی از سوی متخصصان در درمان اختلال‌های خواب توصیه می‌شود.

تشکر و قدردانی:

نویسنده‌گان این مقاله بر خود لازم می‌دانند از همه کسانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در انجام این پژوهش همکاری کرده‌اند، تشکر و قدردانی کنند.

منابع:

- Harnington JJ, Avidan AY. Treatment of sleep disorders in elderly patients. Curr Treat Options Neurol 2005; 7(5): 339-352.
- Blanc ML, Bonneau SB, Merette C, Savard J, Ivers H, Mortin CM. Psychological and health related quality of life factors associated with insomnia in a population-based sample. Journal of Psychosomatic Research 2007; 63: 157-166.
- Curcio G, Ferrara M, De Gennaro L. Sleep loss, learning capacity and academic performance. Sleep Med Rev 2006; 10: 323-337.
- Silva JAC. Sleep disorders in psychiatry. Metabolism 2006; 55: 40-44.
- Benington JH. Sleep homeostasis and the function of sleep. Sleep 2000; 23(7): 959-966.
- Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh sleep quality index: A new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res 1989; 28: 193-213.
- Dewald JF, Meijer AM, Oort FJ, Kerkhof GA, Bogels SM. The influence of sleep quality, sleep duration and sleepiness on school performance in children and adolescents: A meta-analytic review. Sleep Med Rev 2010; 14: 179-89.

اختلال‌های عملکرد روزانه تاثیر دارد. این یافته‌ها به این معناست که هیپنوتیزم درمانی کیفیت خواب و ابعاد نامبرده بالا را در دانشجویان افزایش می‌دهد.

بحث:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر بهبود کیفیت خواب دانشجویان بود. نتایج نشان داد هیپنوتیزم درمانی بر بهبود کیفیت کلی خواب و مولفه‌های کیفیت ذهنی خواب، تأخیر در به خواب رفت، اختلال‌های خواب و اختلال‌های عملکرد روزانه افراد را موثر است. این نتیجه همسان با یافته‌های پژوهش‌های گذشته، از جمله Morin و همکاران (۳۷)، Holdevici (۳۸)، Anbar Slothower (۳۹)، Kryger (۴۰)، Serban و همکاران (۴۱) و Robertson (۴۱) بوده و از این واقعیت حمایت می‌کند که هیپنوتیزم درمانی به افراد کمک می‌کند کنترل بیشتری بر نشانه‌های مختلط‌کننده خواب داشته و کیفیت خواب مطلوب‌تری داشته باشد.

به نظر می‌رسد مشکلات خواب با افزایش حالت برانگیختگی، تهییج عصبی و فعالیت ذهنی همراه است و این مسئله نیز با افزایش فعالیت دستگاه عصبی سمتاً تیک ارتباط دارد (۴۲). علاوه بر این، پی برده شده که بی‌خوابی اولیه ممکن است تحت حالتی از فعالسازی در سیستم عصبی سمتاً تیک، در نتیجه اختلال در ترشح کورتیزول، ایجاد شود (۴۳). پژوهش‌ها تاثیر هیپنوتیزم درمانی در فعالسازی عملکرد سیستم عصبی خودمختار، ایمنی و مرکزی را نشان داده‌اند (۴۴). همچنین، پی برده شده که هیپنوتیزم کاهش سطح تحریک‌پذیری فشار عصبی ایجاد می‌کند (۴۵). بنابراین، مبالغه‌آمیز تراوید بود فرض کنیم یک مکانیسم که از طریق آن هیپنوتیزم شروع خواب را بهبود می‌دهد، کاهش استرس ذهنی، تحریک‌آرمیدگی و رهاسازی تنفس و فشار است. مطالعه‌های پیشین نشان داده‌اند که استرس نقش مهمی در وقوع مشکلات خواب دارد (۴۶). در واقع مشکلات خواب مربوط به حالت تنفس و فشار عصبی، بهترین وضعیت برای درمان با هیپنوتیزم در نظر گرفته شده است (۴۵). تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر بهبود کیفیت خواب می‌تواند به آثار آن در کاهش برانگیختگی فیزیولوژیکی مربوط باشد (۴۷). علاوه بر این، افزایش کیفیت خواب افراد می‌تواند به دلیل تعییر در افکار و شناخت‌های پیش خواب آن‌ها به واسطه به کارگیری تصویرسازی هیپنوتیزمی و بیش‌های جدید آموخته شده، باشد. بینش‌ها و الگوهای فکری جدید افراد را از افکار برانگیزانده و اضطراب‌زا تغییر جهت داده و بنابراین به آرامش بیشتر آن‌ها منجر می‌شود (۴۸). بنابراین، نرخ

- Taibi DM, Landis CA, Petry H, Vitiello MV. A systematic review of valerian as a sleep aid: safe but not effective. Sleep Medicine Reviews 2007; 11(3): 209-30.
- Vela-Bueno A, De Iceta M, Fernandez C. Prevalence of sleep disorders in Madrid, Spain. Gac Sanit 1999; 13: 441-448.
- Bent S, Padula A, Moore D, Patterson M, Mehling W. Valerian for sleep: a systematic review and meta-analysis. The American journal of medicine 2006; 119(12):1005-1012.
- Graci GM, Hardie JC. Evidenced-based hypnotherapy for the management of sleep disorders. Int J Clin Exp Hypn 2007; 55(3): 288-302.
- Thase ME. Correlates and Consequences of Chronic Insomnia. General Hospital Psychiatry 2005; 27: 100-12.
- Redeker NS, Ruggiero JS, Hedges C. Sleep is related to physical function and emotional well-being after cardiac surgery. Nurs Res 2004; 53(3): 154-62.
- Novak M. Sleep disorders, mental health and the quality of life memory. Eur Psychiatr 2010; 25 (1): 94
- Moudi S, Saleh Ahangar M, Hosseini SH, Khafri S. Prevalence of sleep disorders among medical students of Babol University of Medical Sciences,

- Iran, 2013. J Babol Univ Med Sci 2014; 16(8): 69-74. (Full Text in Persian).
16. Gooneratne NS. Complementary and alternative medicine for sleep disturbances in older adults. Clin Geriatr Med 2008; 24(1): 121
 17. Wang, MY, Wang SY, Tsai, PS. Cognitive behavioural therapy for primary insomnia: a systematic review. Journal of Advanced Nursing 2005; 50: 553-564.
 18. Ansfield ME, Wegner DM, Bowser R. Ironic effects of sleep urgency. Behav Res Ther 1996; 34(7): 523-531.
 19. Elkins GR, Barabasz AF, Council JR, Spiegel D. Advancing research and practice: the revised APA division 30 definition of hypnosis. Int J Clin Exp Hypn 2015; 63(1): 1-9.
 20. Kihlstrom JF. Neuro-hypnotism: prospects for hypnosis and neuroscience. Cortex 2013; 49(2): 365-374.
 21. Cojan Y, Archimi A, Cheseaux N, Waber L, Vuilleumier P. Time-course of motor inhibition during hypnotic paralysis: EEG topographical and source analysis. Cortex 2013; 49(2): 423-436.
 22. Aghamohammadian HR, Shanbadi AK. Effect of muscle relaxation and cognitive restructuring under hypnosis in women with migraine: single-case study. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2007; 13(2): 182-186. (Full Text in Persian).
 23. Lindfors P, Unge P, Nyhlin H, Ljotsson B, Björnsson ES, Abrahamsson H. Long – term effects of hypnotherapy in patients with refractory irritable bowel syndrome. Scand J Gastroenterol 2012; 47(4): 414-421.
 24. Cope TE. Clinical hypnosis for the alleviation of tinnitus. Int Tinnitus J 2008; 14(2): 135-138.
 25. Badele M, Fathi M, Aghamohammadian HR, Badele MT, Ostadi N. Compare the effect of group cognitive behavioral hypnotherapy and group cognitive behavioral therapy on increasing the self-esteem of adolescents. Journal of Fundamentals of Mental Health 2013; 15(3): 412- 422. (Full Text in Persian).
 26. Kennedy GA. A review of hypnosis in the treatment of parasomnias: Nightmare, sleepwalking, and sleep terror disorders. Australian Journal of Hypnotherapy and Hypnosis 2002; 30(2): 99-155.
 27. Papadakis D. Exploring the subconscious with hypnosis to alleviate insomnia. The Australian Journal Of Clinical Hypnotherapy & Hypnosis 2013; 35(2): 4-19
 28. Cordi MJ, Schlarb AA, Rasch B. Deepening sleep by hypnotic suggestion. Sleep 2014; 37(6): 1143-1152.
 29. Cordi MJ, Hirsiger S, Merillat S, Rasch B. Improving sleep and cognition by hypnotic suggestion in the elderly. Neuropsychologia 2015; 69: 176-182
 30. Elkins, GR, Fisher WI, Johnson AK, Carpenter JS, Keith TZ. Clinical hypnosis in the treatment of postmenopausal hot flashes: a randomized controlled trial. Menopause (N.Y.,N.Y.) 2013; 20(3): 291-298.
 31. Hodevici I. Relaxation and hypnosis in reducing anxious-depressive symptoms and insomnia among adults. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2014; 127: 586-590.
 32. Brayet P, Denesle R, Rompre S, Petit D, Montplaisir J. The effect of hypnotherapy on spectral power in sleepwalkers. Abstracts of 4th International Congress of WASM & 5th Conference of CSS / Sleep Medicine 12, Suppl. 1 2011.
 33. Schlarb A, Schurian KV, Poets CF, Hautzinger M. First effects of a multicomponent treatment for sleep disorders in children. Nature and Science of Sleep 2011; 3: 1-11.
 34. Mirzamani SM, Bahrami H, Moghtaderi S, Namagh M. The effectiveness of hypnotherapy in treating depression, anxiety and sleep disturbance caused by subjective tinnitus. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2012; 14(9): 76-79. (Full Text in Persian).
 35. Rahimi Pordenjani T, Zargar Y, Noruzi Z, Mohamadzade Ebrahimi A. A Study of Simple and multiple relationships between morningness and sleep quality among students of Shahid Chamran University with addiction potential with. Jundishapur Sci Med J 2013; 12(4): 375-383. (Full Text in Persian).
 36. Wilkinson JB. Hypnotherapy in the psychosomatic approach to illness. Journal of Royal Society of Medicine 1981; 74: 525-530.
 37. Morin CM, Mimeaule V, Gagne A. Nonpharmacological treatment of late-life insomnia. Journal of Psychosomatic Research 1999, 46,103-116.
 38. Kryger M. A woman's guide to sleep disorders. New York: McGraw-Hill. 2004
 39. Anbar RD, Slothower MP. Hypnosis for treatment of insomnia in school-age children: a retrospective chart review. BMC Pediatrics 2006; 16: 6-23.
 40. Serban IL, Padurariu M, Alin Ciobica A, Cojocaru D, Lefter R. The role of hypnosis and related techniques in insomnia. Arch. Biol. Sci 2013; 65 (2): 507-510.
 41. Robertson D. The Practice of Cognitive-behavioral Hypnotherapy: A Manual for Evidence-Based Clinical Hypnosis, Karnac Books. 2012.
 42. Ng BY, Lee TS. Hypnotherapy for sleep disorders. Ann Acad Med Singapore 2008; 37: 683-688.
 43. Swanson LM, Pickett SM, Flynn H, Armitage R. Relationships among depression, anxiety, and insomnia symptoms in prenatal women seeking mental health treatment. Journal of Women's Health 2011; 20: 553-558.
 44. Nofzinger EA, Buysse DJ, Germain A, Price JC, Miewald JM, David BA, Kupfer J. Insomnia: functional neuroimaging evidence for hyper arousal. Am J Psychiatry 2004; 161: 2126-2131.
 45. Assen A. Hypnotherapy Explained. Radcliffe Publishing, Oxon UK. 2007
 46. Roth T, Drake C. Evolution of insomnia: current status and future direction. Sleep Med 2004; 1(1): 23-30.
 47. Ohness K, Kohen DP. Hypnosis and Hypnotherapy with Children. 3rd edition. New York: The Guilford Press; 1996.
 48. Harvey AG, Payne S. The management of unwanted pre-sleep thoughts in insomnia: distraction with imagery versus general distraction. Behav Res Therapy 2002; 40: 267-277.
 49. Weitzenhoffer A. The practice of hypnotism. New York: John Wiley & Sons. 2000.