

## تهیه ۳، ۴- دی فنیل - ۴- متوكسی - ۲- سیکلوپنتن - ۱- ال و مشتقات آن

كتايون مرجانى، محمود شريفى مقدم كاخكى و محسن موسوى:  
دانشگاه تربیت معلم

### چكیده

احيَا متوكسى کتون ۱ به وسیله  $\text{NaBH}_4$  متوكسى کتون ۲ می‌دهد. استرهای استات و توزیلات این الک جدا نشند ولی استربنزوات آن تهیه شد، احیا کتون ۲ بوسیله  $\text{LiAlH}_4$  الک ۳ تولید می‌کند. گرچه کتون ۹ تحت تأثیر متیل منیزیم یدید قرار نمی‌گیرد، ولی متوكسی کتون ۱ با متیل منیزیم یدید و فنیل منیزیم یدید واکنش داده هیدروکربن‌های مربوطه تشکیل می‌شوند. کتون ۱۳ در مجاورت فنیل منیزیم یدید به هیدروکربن ۱۴ تبدیل می‌شود. اجسام ۱۲ و ۱۴ به نور حساس هستند و به محلوتی از مواد تبدیل می‌شوند.

### مقدمه

تعدادی از مشتقات سیکلوپنتن ال خاصیت حشر مکشی نشان داده‌اند [۱]، برخی باکتریکش هستند [۲] و بعضی در تهیه داروهای ضد تومور، ضد دیابت و ضد ویروس به کار می‌روند [۸]-[۳]. مشتقات متعددی از سیکلوپنتن ال تهیه شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند که از آن جمله می‌توان ۴، ۳- دی فنیل - ۳- سیکلوپنتن - ۱ - ال [۹]، ۳، ۵- دی متیل - ۳، ۴- دی فنیل - ۲- سیکلوپنتن - ۱ - ال [۱۰]، الکینیل سیکلوپنتن الها [۱۱]، N- ترسیوبوتیل - ۴، ۴- دی فنیل - ۲- سیکلوپنتیل آمین [۱۲]، ۲، ۳ و ۴، ۴- دی فنیل سیکلوپنتیل آمین‌ها [۱۳] را نام برد ولی ۳، ۴- دی فنیل - ۴- متوكسی - ۲- سیکلوپنتن - ۱- ال و مشتقات آن مطالعه نشده بودند که مورد توجه ما قرار گرفت.

### بخش تجربی

نقاط ذوب به وسیله دستگاه گالنکامپ<sup>۱</sup> بر حسب درجه سانتیگراد انداز مکیری و تصحیح نشده هستند. طیف‌های HNMR<sup>۲</sup> و IR<sup>۳</sup> به ترتیب با دستگاه‌های «Perkin-Elmer» ۶۰ MHz (ppm) بر حسب  $\delta$  ثبت شده‌اند. Fingin TFQ 70 eV<sup>۴</sup> (cm<sup>-۱</sup>) بر حسب  $v$  ثبت شده‌اند.

### ۴- متوكسی - ۳، ۴- دی فنیل - ۲- سیکلوپنتن - ۱- ال ۲ $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_2$

۵ گرم  $\text{NaBH}_4$  حل شده در چند قطره آب به محلولی از ۱/۰ گرم(۳٪ مول) متوكسی کتون ۱ [۱۴]

<sup>۱</sup>-Gallenkamp

در ۵۰ میلی لیتر مтанول اضافه شد. پس از یک ساعت مخلوط واکنش را در ۱۰۰ میلی لیتر آب ریخته مтанول در حمام آب تبخیر و ماده آلی با اتر استخراج شد. تبخیر اثر ۷۰ میلی گرم ( $R=69\%$ ) الکل ۲ تولید می کند، تبلور مجدد در اتانول  $mp=143-145^{\circ}\text{C}$

IR(KBr): ۳۲۰۰(OH), ۱۱۰۰ (C-O)

$^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$ :  $\delta 1/8-3, m ({}^3\text{H})$ ;  $\delta 3/3, s ({}^3\text{H})$ ;  $\delta 5/2, m ({}^1\text{H})$ ;  $\delta 6/8, d ({}^1\text{H})$ ;  $\delta 7/5, m ({}^{10}\text{H})$ .

MS: ۲۶۶ ( $M^+$ ), ۲۳۵ ( $M^+ - \text{OMe}$ ).

#### ۴- متوكسی - ۳، ۴- دی فنیل -۲- سیکلوپنتن -۱- بنزووات ۳

به محلولی از ۰/۰۰۷ گرم (۰/۰۰۰۷ مول) الکل ۲، ۵ میلی لیتر بنزن بی آب و ۵ میلی لیتر پیریدین، دردمای صفر درجه به تدریج ۱ میلی لیتر بنزوئیل کلرید اضافه شد. پس از ۱۵۰ دقیقه مخلوط واکنش را در یک اrlen حاوی یخ ریخته با HCl رقیق، سپس سدیم بی کربنات رقیق و آب شسته با تبخیر حلal ماده ای متابولر نشد. کروماتوگرافی (اتیل استات ۱۰٪ هپتان ۹۰٪ گرم ( $R=58\%$ ) استر می دهد. تبلور مجدد در اتانول  $mp=116-118^{\circ}\text{C}$

IR(KBr): ۱۷۳۰(C=O)

$^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$ :  $\delta 2-3/3, m ({}^2\text{H})$ ;  $\delta 3/5, s ({}^3\text{H})$ ;  $\delta, 6/4, m ({}^1\text{H})$ ;  $\delta 6/9, d ({}^1\text{H})$ ;  $\delta 7/2-3/8, m ({}^{10}\text{H})$ .

MS: ۳۷۰ ( $M^+$ ), ۳۳۰ ( $M^+ - \text{OMe}$ ), ۱۰۵ ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}^+$ ), ۷۷ ( $\text{C}_6\text{H}_5^+$ ).

#### ۳، ۴- دی فنیل -۳- سیکلوپنتن -۱- ال ۴

۰/۰۲ گرم LiAlH<sub>4</sub> به محلولی از ۰/۰۰۱۸ گرم (۰/۰۰۰۱۸ مول) الکل ۲، در ۵ میلی لیتر اتر خشک اضافه شد. پس از ۲۴ ساعت مخلوط واکنش را در یخ ریخته، استخراج با اتر خشک، از تبخیر اثر ۰/۰۲۶ گرم ( $R=60\%$ ) الکل ۴ تولید می شود. تبلور مجدد در اتانول  $mp=102-104^{\circ}\text{C}$  [15] (102-104°C).

IR(KBr): ۳۵۹۰(OH)

#### احیا ۴- متوكسی ۳، ۴- دی فنیل -۲- سیکلوپنتن -۱- ان ۱

به محلولی از ۰/۰۰۸ گرم (۰/۰۰۰۳ مول) متوكسی کتون ۱ در ۱۵ میلی لیتر اتر خشک ۲ گرم پودر روی و ۰/۰ میلی لیتر استیک اسید اضافه شد پس از ۲۴ ساعت هم زدن، پودر روی با صافی جدا و محلول با آب تا خنثی شسته شد. از تبخیر اثر ماده روغنی شکلی به دست آمد که متابولر نشد. TLC ماده روغنی چند لکه نشان می داد که  $R_F$  یکی از آن ها با کتون ۱ [16] یکسان بود.

**۵- متوكسی - ۱ ، ۳ ، ۵- تری فنیل سیکلوپنتادین ۱۲ O C<sub>۲۴</sub>H<sub>۲۰</sub>**

به محلولی از ۶/۰ گرم (۰/۰۰۲ مول) کتون ۱ در ۵۰ میلی لیتر اتر خشک در صفر درجه واکنش‌گر گرینیارد تهیه شده از ۵/۰ گرم نوار منیزیم و ۲/۵ میلی لیتر برومید فنیل در ۱۰ میلی لیتر اتر خشک به تدریج اضافه کرده پس از یک ساعت واکنش کامل می‌شود مخلوط واکنش را در بشر حاوی یخ و آمونیوم کلرید ریخته، استخراج با اتر، خشک، از تبخیر حلal ۴/۰ گرم (R=۵۵%) دین ۱۲ تولید شد، تبلور مجدد در سیکلوهگزان C° ۱۵۲

mp = ۱۵۰

IR(KBr): ۱۶۰۰(C=C), ۱۱۰۰(C-O)

¹H NMR(CDCl<sub>۳</sub>): δ ۳/۵, s (۳H); δ ۶/۷, s (۱H), δ ۷/۱-۸, m (۱۱H).MS: ۳۲۴(M<sup>+</sup>), ۳۰۹ (M<sup>+</sup>-CH<sub>۳</sub>), ۷۷ (C<sub>۶</sub>H<sub>۵</sub><sup>+</sup>).**۱ ، ۴ ، ۲- تری فنیل سیکلوپنتادین ۱۴ C<sub>۲۲</sub>H<sub>۱۸</sub>**

به محلولی از ۶/۰ گرم (۰/۰۰۲ مول) کتون ۱۳ [۱۰] در ۵۰ میلی لیتر اتر خشک در صفر درجه واکنش‌گر گرینیارد حاصل از ۵/۰ گرم نوار منیزیم ۲/۵ میلی لیتر برومید فنیل در ۱۰ میلی لیتر اتر خشک به تدریج اضافه شد بعد از ۴ دقیقه مخلوط واکنش را در یک بشر حاوی یخ و آمونیوم کلرید ریخته، استخراج با اتر، تبخیر حلal ۴/۰ گرم (R=۶۰%) هیدروکربن ۱۴ تولید کرد تبلور مجدد در سیکلوهگزان C° ۱۵۰ mp=۱۴۸°C (۱۷)

[mp=۱۴۸°C (۱۷)]

IR(KBr): ۳۰۵۰ (C-H), ۱۶۰۰ (C=C) (آروماتیک)

¹H NMR(CDCl<sub>۳</sub>): δ ۳/۹, s (۴H); δ ۱/۷, s (۱H); δ ۸/۷-۷/۵, m (۱۵H) (آروماتیک)**فتواکسیداسیون ۱ ، ۲ ، ۴- تری فنیل سیکلوپنتادین ۱۴**


محلولی از ۱/۰ گرم (۰/۰۰۰۳ مول) دین ۱۴ در ۵۰ میلی لیتر کلروفرم و ۱ میلی لیتر محلول ۱/۰% متیلن بلو در کلروفرم را در ظرفی از جنس شیشه معمولی ریخته ظرف واکنش را در یک مخزن شیشه‌ای پر از آب ۲۰ درجه بین دو لامپ قرار داده و به وسیله یک پت اکسیژن به محلول دمیده شد پس از ۳ دقیقه واکنش کامل می‌شود. تبخیر حلal در خلا، استخراج با اتر، تبخیر حلal ماده متبلوری تولید نکرد TLC تبدیل ماده اولیه به یک مخلوط را نشان می‌داد. همین آزمایش در مجاورت نور خورشید منجر به همین مخلوط شد.

**فتواکسیداسیون ۵- متوكسی - ۱ ، ۳ ، ۵- تری فنیل سیکلوپنتادین ۱۲**

واکنش در شرایط مشابه آزمایش فوق روی دین ۱۲ انجام شد و مشابه آن مخلوط غیرمتبلوری به دست آمد.


### بحث و نتیجه گیری

احیا متوكسی کتون ۱ به وسیله  $\text{LiAlH}_4$  مخلوطی تولید می‌کند که یکی از مواد تشکیل دهنده مخلوط متوكسی الکل ۲ می‌باشد. این متوكسی کتون توسط  $\text{NaBH}_4$  در متانول با راندمان مناسبی به متوكسی الکل ۲ احیا می‌شود. ساختمان جسم ۲ به وسیله طیف سنجی و تهیه مشتقات آن تعیین شده است. اگرچه از اثر کلرید بنزوئیل در مجاورت پیریدین بر متوكسی الکل ۲ استر بنزووات به دست آمد که با استفاده از کروماتوگرافی (اتیل استات ۱۰٪ هیتان ۹۰٪) از مخلوط حاصل جدا شد ولی جدا کردن توزیلات به وسیله کروماتوگرافی موفق نبود زیرا که این ترکیب روی صفحه کروماتوگرافی ناپایدار و به یک مخلوط تبدیل می‌شد. استرات استرات متوكسی الکل ۲ نیز به وسیله کروماتوگرافی از مخلوط جدا ولی متبادر نشد.




احیا متوكسی الکل ۲ به وسیله  $\text{LiAlH}_4$  در محلول اتری انیدر با جایه جایی پیوند دوگانه و حذف گروه متوكسی، الکل شناخته شده ۴ [۱۵] تولید می‌کند، ساختمان این الکل به وسیله طیف سنجی و عدم نزول نقطه انجماد مخلوط با الکل شناخته شده تعیین شد. می‌توان برای این واکنش احیا، مکانیسمی به صورت زیر پیشنهاد کرد.


از اثر  $\text{LiAlH}_4$  بر متوكسی الکل ۲، ابتدا کمپلکس ۵ ایجاد می‌شود که با انتقال داخل مولکولی یک یون هیدرید از کمپلکس آلومینیومدار عامل الکلی به کربن اتیلنی موقعیت  $\alpha$  و حذف کمپلکس آلومینیومدار گروه متوكسی همراه با جایه جایی پیوند دوگانه الکل ۴ تولید می‌شود.




کلروکتون<sup>۷</sup> به وسیله پودر روی در اتر با راندمان ۹۷٪ به کتون<sup>۶</sup> تبدیل شده است [۱۶]. به منظور تهیه این کتون، ۴- متوكسی -۳، ۴- دی فنیل -۲- سیکلوپینتن -۱- ان تحت تأثیر پودر روی در اتر قرار گرفت. این واکنش مخلوطی تولید کرد که متبادر نشد. TLC نشان داد که یکی از مواد موجود در مخلوط، کتون اتیلنی غیر مزدوج<sup>۶</sup> می‌باشد. علت ایجاد این مخلوط مربوط به کمتر بودن الکترون کشندگی گروه متوكسی نسبت به اتم کلر می‌باشد که باعث پایداری بیشتر رادیکال آنیون<sup>۸a</sup> نسبت به<sup>۸b</sup> شده و در نتیجه<sup>۸a</sup> می‌تواند با رادیکال‌های محیط ترکیب شده اجسام مختلفی تولید کند.



RiO و همکارانش [۱۷] اعلام کرده بودند که یدید متیل منیزیم در حلول‌های مختلف (اتر، THF، بنزن و زایلن) حتی در حرارت بر کتول<sup>۹</sup> بی‌اثر بوده است. ما متوجه شدیم که علت عدم فعالیت این کتول در مقابل یدید متیل منیزیم باید مربوط به هیدروژن اسیدی عامل الکلی و تبدیل جسم<sup>۹</sup> به الکلات<sup>۱۰</sup> غیر محلول در محیط باشد که بدین ترتیب از دسترس CH<sub>2</sub>MgI خارج می‌شود.




به منظور اثبات این فرضیه و همچنین تهیه متوكسی الکل‌های با عامل الکلی نوع سوم اثر  $\text{CH}_2\text{MgI}$  و  $\text{MgI}$  بر متوكسی کتون ۱ بررسی شد در هر دو مورد واکنش‌ها انجام ولی در واکنش  $\text{CH}_2\text{MgI}$  ماده‌ای به دست آمد که متبادر نشد و در مجاورت هوا و نور به تدریج به مخلوط پیچیده‌ای تبدیل گردید. در واکنش برومید فنیل منیزیم با متوكسی کتون ۱ الکل ۱۱ تولید که در محیط واکنش با حذف یک مولکول آب به دین ۱۲ تبدیل می‌شود. ساختمان این دین به وسیله طیف سنجی تعیین شده است.




بالاخره فتواکسیداسیون حساس شده سیکلوبنتادین‌های متعددی، اندوپراکسیدهایی از نوع ۱۵ و ۱۶ تولید کرده‌اند [۱۸] و [۱۹]، ولی فتواکسیداسیون حساس شده دین ۱۲ و همچنین دین ۱۴ در مجاورت نور لامپ و نور خورشید به منظور تهیه فتوکسیدهای ۱۵ و ۱۶ مخلوط‌های متبادر نشده‌ای تولید کرد که موفق به جداسازی آن‌ها نشدیم.

دین ۱۴ از اثر برومید فنیل منیزیم بر کتون ۱۳ تهیه شد. الکل واسط ۱۷، مانند الکل ۱۱ با حذف یک مولکول آب در محیط واکنش به دین ۱۴ تبدیل می‌شود. سرعت تشکیل این دین بیشتر از دین ۱۲ است.



آبگیری از الکل 11 فقط می‌تواند دین 12 را تولید کند ولی برای واکنش آبگیری از الکل 17 همان‌طور که در زیر نشان داده است امکان حذف 1، 2 که دین 18 و حذف 1، 4 که دین 14 را تولید می‌کند وجود دارد ولی فقط دین 14 که به واسطه رزونانس بیشتر و استخلاف زیانتر از دین 17 پایدارتر است تشکیل می‌شود. حضور گروه متیلن در طیف <sup>1</sup>H NMR محصول واکنش، ساختمان 14 را تأیید می‌کند و به علاوه این هیدروکربن شناخته شده است [۱۸] و نقطه ذوب مخلوط این جسم با هیدروکربن شناخته شده نزولی نشان نمی‌دهد.



### منابع

1. C.A. 48:P10990d: Sankichi, Takei et al. Japan 4949(5)3 (1954).
2. C.A. 121: P108364C: Tanaka, Kyoshi, Sutani, Mineichi; Komatsu, Miwako; Tsuchide, Keiichi; Saito, Akito; Hayashi, Kazuya; Kanna, Hiroshi; Goto, Aya; Minami, Shinzaburo; Watanabe, Yasuo. Jpn.kokai Tokkyo Koho Jpo 641149 (1994).
3. Akella, Lakshmi B; Vince, Robert, Tetrahedron, 52(25) (1996) 8407.
4. Borcherding, David R; Butler, Brent T; Linnik, Matthew D; Mehdi, Shujaath; Dudley, Mark W; Edwards, Carl K; Nucleosides Nucleotides, 15(5) (1996) 967.
5. Takahashi, Takashi; Tanaka, Hiroshi; Yamada, Haruo; Matsumoto, Takuyuki; Sugiura, Yukio, Angew. Chem, Int. Ed. Engl, 35(16) (1996) 1835.
6. Seley, Katherine L; Schneller, Stewart W; Rattendi, Donna; Bacchi, Cyrus J.J.Med. Chem., 40(4) (1997) 622.
7. Date, Takashi; Oota, kumiko; Yoshioka, Hidetoshi; Murakami, Kunimutsu Jpn. Kokai Tokkyo Koho Jp 06, 145, 172 (1994).

8. Shiosaki, Massao; Kobayashi, Keiko; Myazaki, Hideki, Jpn. Kokai Tokkyo Koho Jp 05, 271, 174 (1993).
9. G.Rio and J.Mion-Coatleven, Bull. Soc. Chim, (1966) 3774.
10. Bladon, S. Mcvey and P. L. Pauson. J. Chem. Soc (c), (1966) 306.
11. Sander, Birgit; Andresen, Sven; Reichow, Stefan; Dubois, Katia; Agosta, William C; Magaretha, Paul. Helv. Chim. Acta, (5) (1996) 1428.
12. Taniguchi, Kiyosh; Miyao, Yasuhiro; Yamano, Katsuhiro; Yamamoto, Tokao; Terai, Takao; Kusunoki, Takahiro; Tsubaki, Kazunori; Shiokawa, Youichi. Chem.. Pharm. Bull, 44(6) (1996) 1188.
13. Taniguchi, Kiyoshi; Tsubaki, Kazunori; Take, Kazuhiko; Okumura, Kazuo; Terai, Takao; Shiokawa, Youichi. Chem.. Pharm. Bull, 42(4) (1994) 896.
14. H.Burton and C.W.Spanagel. J.Amer. Chem. Soc. 54(1932) 4338.
15. G, Rio; M, Charifi, Bull. Soc. Chim, 10 (1970) 3593.
16. E. J. Corey and H. Uda, J. Amer. Chem.. Soc, 85 (1963) 1788.
17. G.Rio and M.Charifi, Bull. Soc. Chim, 10(1970) 3585.
18. Ch. Du Fraisse, G. Rio, C. R. Acad. Sci; 246(1958), 1640
19. J. J. Basselier et J. P. Lieroux, C. R. Acad, Sci; 268(1958), 970
20. F.R. Newmann, Liebigs. Anh. 302 (1898) 236.