

بررسی کمپلکس‌های $dTDP^3-$ با فلزات دو ظرفیتی و تعیین ثابت‌های اسیدی و پایداری آن‌ها

سیدعلی اکبر سجادی: دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

ثابت‌های پایداری کمپلکس‌های ۱: ۱ ایجاد شده میان Cu^{2+} , Mn^{2+} , Zn^{2+} , Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+} , Mg^{2+} : M^{2+} با TiO_2 و Ni^{2+} , Cd^{2+} , Co^{2+} , $I=0/1M$ با تیمیدین-۵-دیفسفات ($dTDP^3-$) با تیتر اسیون pH پتانسیومتری در محلول آبی ($25^\circ C$) تعیین شد. همین ثابت‌ها با دیگر مشتقات دیفسفات ($R-DP^3-$) مقایسه شد. ثابت‌های اسیدی $NaNO_3$ و $K_{H(dTDP)}^H$ با تیتر اسیون pH پتانسیومتری اندازه‌گیری شد و با $K_{H_2(dTDP)}^H$ یعنی $dTDP^3-$ ثابت‌های مربوط مقایسه‌هایی انجام شد. نمودار نتایج $pK_{M(R-DP)}$ برای ترکیبات دیفسفات رسم شد و خط همبستگی^۱ از این نقاط محاسبه شدند، این نتایج نشان می‌دهند که کمپلکس‌های $M(dTDP)$ دقیقاً روی خط قرار گرفته‌اند؛ یعنی فلزات دو ظرفیتی فقط به گروه فسفات متصل شده‌اند و هیچ‌گونه برهمکنشی میان یون فلزی و قند یا باز نوکلئوزید وجود ندارد. معادله خط همبستگی بدست آمده از رابطه مطرح شده به ما اجازه می‌دهد که با مقدار pK_a هر لیگند دیفسفات منواستر تک پروتونه، ثابت‌های پایداری را محاسبه کنیم.

مقدمه

نوکلئوتیدها در بسیاری از واکنش‌های بیولوژیکی شرکت می‌کنند [۱، ۲]. که عمدۀ این واکنش‌ها با همکاری فلزات یونی صورت می‌گیرد [۳]. بدین جهت ثابت‌های اسیدی و پایداری زیادی و همچنین ثابت‌های ترمودینامیکی برای این نوع کمپلکس‌ها اندازه‌گیری و یا محاسبه شده‌اند [۴] و این اطلاعات در بررسی ساختار حالات جامد کمک زیادی می‌کنند [۵، ۶]. در نوکلئوزید-۵-تری فسفات، گروه فسفات در فاصله دورتری نسبت به نوکلئوباز قرار دارند. این قابل فهم است که در اکثر کمپلکس‌های نوکلئوزید-۵-تری فسفات بررسی شده ثابت اسیدی در محدوده $0/0.5 \pm 6/50$ قرار دارند.

بر این اساس، ثابت‌های پایداری این کمپلکس‌ها قابل فهم است؛ بهطوری که چنانچه فلزات علاوه بر پیوند با گروه فسفات بتوانند با گروه نوکلئوباز نیز پیوند حاصل و یک ماکروکیلیت ایجاد نمایند. یعنی یون فلزی از طرفی با


کلمات کلیدی: نوکلئوتیدها، دیفسفات منو استرها، ثابت‌های اسیدی، ثابت‌های پایداری.

۱. Correlation line

پذیرش ۸۶/۹/۱۱

دریافت ۸۵/۰۷/۱۰

گروه فسفات و از طرف دیگر با یک نیتروژن (عموماً N7) از حلقه باز پورین پیوند حاصل می‌کند. برای دسته نوکلئوزید-۵-منوفسفات‌ها خط همبستگی به دست آمده و معادلات خطی جهت مقایسه وجود دارد. برای تعدادی از ترکیبات دیفسفات نیز این خط تهیه شده و معادله خطی آن برای فلزات مختلف به دست آمده است [۷]. یک گروه فسفات که به ناحیه انتهای β به یک نوکلئوزید متصل است در بسیاری موارد نیز مانند مشتقات ساده دیفسفات عمل می‌کند [۸]. مهم این است که در صورتی که نوکلئوباز با یون فلزی برهمکنش نشان ندهد، ثابت‌های پایداری به دست آمده در محدوده دیفسفات‌های ساده قرار می‌گیرد. تیمیدین-۵-دیفسفات dTDP³⁻ در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۱. ساختار شیمیایی تیمیدین-۵-دیفسفات در حالت غالب

آزمایش‌ها

مواد و تجهیزات مورد نیاز

۱. نمک سدیم dTDP از شرکت St.Louis, Mo, USA، Sigma Chemical Co. تهیه شد. میزان فسفات معدنی موجود این ترکیب اندازه‌گیری و معادل ۱/۷٪ تعیین شد.

۲. Darmstadt, Merck AG، از شرکت Na₂H₂EDTA N,N,N',N'-tetra acetic 1,2-diaminoethane آلمان.

۳. C₈H₅O₄K پتاسیم هیدروژن فتالات، از شرکت Darmstadt, Merck AG آلمان. HNO₃. ۴

۵. NaOH (تیترازول)، از شرکت Darmstadt, Merck AG آلمان.

۶. نمک‌های نیترات Cd²⁺, Zn²⁺, Cu²⁺, Ni²⁺, Ca²⁺, Mn²⁺, Ba²⁺, Sr²⁺, Co²⁺, Mg²⁺, Na⁺ (همگی برای آنالیز) از شرکت Darmstadt, Merck AC آلمان که البته غلظت یون فلزی با EDTA دقیقاً تعیین شده است.

همه محلول‌ها با آب دیونیزه شده CO₂ و بدون Millipore, Ultrapure France ساخته شدند.

غلظت محلول‌های NaOH مصرفی آزمایش‌ها با پتانسیم هیدروژن فتالات به طور دقیق اندازه‌گیری شد. تیتراسیون‌های pH پتانسیومتری : این آزمایش‌ها با دستگاه Potentiograph Metrohm E53، dosimat و الکترود (NB) 6.0203.100 و 6.0202.100 همراه با محلول‌های بافر pH ۴، ۷، ۹ NBS E655 انجام شد. اعداد pH‌های خوانده شده از دستگاه مستقیماً برای محاسبات مورد استفاده قرار گرفتند این ثابت‌ها همان ثابت‌های عملی یا Bronsted هستند.

تعیین ثابت‌های اسیدی

ثابت‌های اسیدی $H_2(dTDP)$ یعنی $K_{H(dTDP)}^H$ و $K_{H_2(dTDP)}^H$ با تیتراسیون ۵۰ ml محلول آبی $I=0.1M$ $NaNO_3$ و $NaNO_3$ در حضور و عدم لیگند ($0/3mM$) تحت گاز N_2 با محلول $H(dTDP)^{2-}$ برای pH محدوده $4.7-10.4$ انتخاب شد که معادل 2% خنثی‌سازی معادله $dTDP^{3-}/(dTDP-H)^{4-}$ است. به دلیل پایین بودن میزان فسفات معدنی، در محاسبات وارد نشد. نتایج نهایی براساس اعداد به دست آمده از تیتراسیون حداقل ۲۰ جفت منحنی pH مستقل بود.

تعیین ثابت پایداری

ثابت‌های پایداری Zn^{2+} , Mn^{2+} , Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+} , Mg^{2+} : M^{2+} به طوری که $K_{M(dTDP)}^M$ بود تعیین شد. شرایط همانند پیش بود یعنی $50 ml$ محلول آبی $0.54 mM HNO_3$ در حضور و عدم حضور لیگند ($0/3mM NaOH$) و تحت N_2 با امیلی‌لیتر $0.3M NaNO_3$ نیترشد. اما $NaNO_3$ حدی با $M(NO_3)_2$ جایگزین شد و $I=0.1 M$ $NaNO_3$ و $NaNO_3$ در $25^\circ C$ نسبت L/M^{2+} به صورت‌های $1:1$ و $1:2$ برای تمام سیستم‌ها اعمال شد. در مورد Sr^{2+} و Ba^{2+} ثابت‌های پایداری کوچک بودند و نسبت‌های L/M^{2+} به $1:1$ و $1:15$ نیز اعمال شد که نتایج یکسانی را مانند $1:1$ به دست دادند. این نشان‌گر این مطلب بود که نسبت M^{2+}/L نقش مهمی در تشکیل کمپلکس ایفا نمی‌کند.

برای محاسبه ثابت‌های پایداری از جفت منحنی‌های تیتراسیون، یعنی منحنی بدون لیگند و با لیگند استفاده شد و با برنامه‌ای کامپیوتری Curve-fitting با استفاده از ثابت‌های H^+ و $H(dTDP)^{2-}$, $H_2(dTDP)^{-}$, $dTDP^{3-}$, $M(dTDP)$ و $M(H;dTDP)$ محاسبات صورت گرفت. اعداد به فاصله هر $1/0$ واحد pH از پائین‌ترین pH تا بالاترین pH جمع‌آوری شد و در جمع‌آوری این اعداد بسیار دقت شد که به محض مشاهده هیدرولیز $M(aq)^+$ اعداد حذف شوند که در این زمینه واکنش مذکور در منحنی فلز بدون لیگند (یعنی با شروع تشکیل

کمپلکس‌های $M(dTDP-H)^2^-$ قابل تشخیص بود. درجه تشکیل برای $M(H;dTDP)$ عموماً ۵% ≤ براساس میزان کل لیگند و محدوده خطای محاسبه شده برای $\log K_{M(H;dTDP)}^M \pm 0.03$ واحد \log بود.

نتایج و بحث

تمامی تیتر اسیون‌های pH پتانسیومتری ($25^\circ C$, $NaNO_3$, $I = 0.1M$) که در ادامه نتایج جمع‌آوری شدند با غلظت $mM = 0/3 [L]$ بود، به طوری که پدیده خودتجمعی^۱ حذف شد؛ یعنی لیگندها به صورت منomer در محلول قرار داشتند.

ثابت‌های اسیدی لیگند پروتونه شده

لیگند $H_2(dTDP)^-$ که حاوی دو پروتون بر روی گروه فسفات است قادر است که مطابق واکنش‌های زیر این پروتون‌ها را از دست بدهد.



$$K_{H_2(dTDP)}^H = [H(dTDP)^{2-}][H^+]/[H_2(dTDP)^-] \quad (1b)$$



$$K_{H(dTDP)}^H = [dTDP^{3-}][H^+]/[H(dTDP)^{2-}] \quad (2b)$$

همان‌طوری که گفته شد این دو پروتون بر روی گروه فسفات قرار گرفته‌اند: یکی بر روی گروه α و دیگری بر روی گروه β فسفات.

علاوه بر این لیگند $dTDP^{3-}$ قادر است که در یک واکنش بعدی که در محدوده بالای pH قرار دارد یک پروتون دیگر را از گروه حلقه بازی خود جدا کند. این پروتون از نیتروژن (N) جدا می‌شود که می‌توان این واکنش را به صورت زیر خلاصه کرد.



$$K_{dTDP}^H = [(dTDP-H)^{4-}][H^+]/[dTDP^{3-}] \quad (3b)$$

ثابت‌های اسیدی انداز مکری شده در جدول ۱ آورده شده است.

مقایسه ویژگی‌های اسید- بازی چند لیگند

اثر دپروتونه شدن (H) در باز تیمیدین در ترکیبات مشابه شناخته شده است.

$$\rho K_{dThd}^H = 9.69[9] < \rho K_{dTDP}^H = 9.90 \pm 0.03$$

$$\rho K_{dTDP}^H = 9.93 \pm 0.02 (table.1) \simeq \rho K_{dTTP}^H = 9.89 \pm 0.03 [10]$$

بار روی گروه فسفات در ۰، ۲، ۳- تا ۴- متغیر است.

جدول ۱. منفی لگاریتم ثابت‌های اسیدی قسمت‌های مختلف $dTDP^{3-}$ و تعداد دیگری از نوکلئوتیدها و ترکیبات دی‌فسفات منواست، اندازه گیری شده با تیتراسیون‌های pH پتانسیومتری ($NaNO_3$ در محلول‌های آبی $I=0.1\text{ M}$)

pK _a				اسید
(N3)H	-P(O) ₂ ⁻ -O-P(O) ₂ (OH) ⁻	(N3)H ⁺	-P ₂ (O) ₄ (OH) ₂ ⁻	
	6.32±0.02		1.32±0.18	H ₂ (PhDP) ⁻
	6.37±0.09		1.62±0.09	H ₂ (MeDP) ⁻
9.47±0.02	6.38±0.02		1.26±0.20	H ₂ (UDP) ⁻
	6.39±0.02	4.45±0.02	1.0±0.2	H ₃ (CDP) [±]
9.93±0.02	6.44±0.01		1.3	H ₂ (dTDP) ⁻
	6.65±0.16		1.34±0.16	H ₂ (BuDP) ⁻

ثابت‌های پایداری M^{2+} در کمپلکس‌های $dTDP$

اعداد تجربی تیتراسیون‌های pH پتانسیومتری دو سیستم $M^{2+}/dTDP$ بهطوری که Mn^{2+} , Mg^{2+} : M^{2+} بهطوری که Cd^{2+} , Cu^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , Zn^{2+} , Ba^{2+} , Sr^{2+} , Ca^{2+} است. با واکنش‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ تعریف می‌شود.



$$K_{M(H;dTDP)}^M = [M(H;dTDP)] / ([M^{2+}][H(dTDP)^{2-}]) \quad (4b)$$



$$K_{M(dTDP)}^M = [M(dTDP)^{-}] / ([M^{2+}][dTDP^{3-}]) \quad (5b)$$

ثبت اسیدی نهایی مطابق این واکنش‌ها تعریف می‌شود.




$$K_{M(H;dTDP)}^H = [M(dTDP)^{-}][H^{+}] / [M(H;dTDP)] \quad (6b)$$

$$\rho K_{M(H;dTDP)}^H = \rho K_{H(dTDP)}^H + \log K_{M(H;dTDP)}^M - \log K_{M(dTDP)}^M \quad (7)$$

نتایج واکنش‌های ۴، ۵ و ۶ برای کمپلکس‌های $dTDP$ و M^{2+} در جدول ۲ آورده شده است.

ثبت‌های پایداری در جدول ۲ روند عمومی را نشان می‌دهد. پایداری کمپلکس‌ها با یون‌های فلزی خاکی با افزایش شعاع یونی کاهش می‌یابد. برای یون‌های فلزی دو ظرفیتی 3d پایداری کمپلکس‌های یون فلزی - فسفات اغلب سری Irving-wiliams را دنبال نمی‌کند. روند ثابت‌های پایداری همه لیگندهای دی‌فسفات در جدول ۲ نشان داده شده است که به این صورت خلاصه می‌شود:




سوال این است که رابطه ثابت پایداری و ثابت اسیدی گروه دیفسفات به چه شکل است؟ به عبارت دیگر آیا رابطه خطی میان $\log K_{M(R-DP)}^M$ و $\rho K_{H(R-DP)}^H$ وجود دارد. جواب مثبت است و این مطلب در شکل ۲ نشان داده شده است.


جدول ۲: لگاریتم ثابت‌های پایداری کمپلکس‌های M(dTDP³⁻) معادله (۵) برای dTDP³⁻ اندازه گیری شده با تیتراسیون‌های pH پتانسیومتری $I=0.1\text{ M}$ و NaNO_3 (۲۵°C) در محلول‌های آبی.

	$\log K_{M(dTDP)}^M$		
M^{2+}	dTDP ³⁻	M^{2+}	dTDP ³⁻
Mg^{2+}	3.34 ± 0.06	Co^{2+}	3.77 ± 0.04
Ca^{2+}	2.94 ± 0.04	Ni^{2+}	3.57 ± 0.05
Sr^{2+}	2.40 ± 0.05	Cu^{2+}	5.34 ± 0.05
Ba^{2+}	2.33 ± 0.03	Zn^{2+}	4.15 ± 0.04
Mn^{2+}	4.18 ± 0.03	Cd^{2+}	4.30 ± 0.03


همان‌طوری که مشاهده می‌شود ثابت پایداری به دست آمده برای کمپلکس‌های M(dTDP) بر روی خط قرار دارد. این بدین معنی است که یون فلزی فقط از طریق گروه فسفات متصل است و هیچ‌گونه برهمکنش جانبی دیگری ندارد؛ زیرا هرگونه برهمکنش اضافی منجر به افزایش ثابت پایداری شده و به دنبال آن باید نقاط مربوط به کمپلکس‌های M(dTDP) بالای خط قرار بگیرند که این مطلب مشاهده نمی‌شود.

همان‌طوری که می‌بینیم نوکلئوتید dTDP³⁻ همانند ترکیبات دیفسفات منواسترهاي ساده عمل می‌کند و قسمت نوکلئوباز آن‌ها هیچ تأثیری بر روی ساخت کمپلکس با فلزات دو ظرفیتی مطرح شده ندارد. معادلات خطی روابط pK, logK ترکیب dTDP و کمپلکس‌های آن‌ها در شکل ۲ دیده می‌شود. بنا بر این می‌توان با داشتن ثابت اسیدی $R = \frac{\log K}{pK}$ ترکیب منو- و تری فسفات می‌توان از شکل ۳ استفاده نمود. در محور افقی یون فلزات دو ظرفیتی و محور عمودی ثابت‌های پایداری آن‌ها آورده شد. همان‌طور که مشاهده می‌شود روند افزایش به شکل آتنی است و در مورد هر سه ترکیب منو-، دی- و تری یکسان است.





شکل ۲. رابطه خطی $\rho K_{H(R-DP)}^H$ و $\log K_{M(R-DP)}^M$ برای چند فلز دو ظرفی برای کمیکس‌های ۱:۱ تعدادی از ترکیبات دی‌فسفات و ترکیب $dTDP^{3-}$. تمام اعداد نشان داده شده توسط تیتراسیون‌های pH پتانسیومتری در محیط آبی بدست آمده است (25°C و $\text{NaNO}_3 = 0.1 \text{ M}$).



شکل ۳. سری Irving-williams نشان داده شده برای کمیکس‌های ساخته شده با فلزات دو ظرفی و ترکیبات منو- $(R-TP)^{2-}$ ، دی- $(R-DP)^{-3}$ ، و تری فسفات $(R-MP)^{2-}$. این اعداد نشانگر ثابت‌های پایداری این کمیکس‌ها می‌باشند.

منابع

1. H. Sigel; Met. Ions in Biol. Syst. **32**, (1996) 1-814.
2. S. Lippard, J. Berg, J. Lewis; Principle of Bioinorganic Chemistry, Mill Valley, (1994).
3. A.S. mildvan; Magnesium. **6**, (1987) 28-33.
4. R.M. Smith, A.E. Martell; Pure Appl. Chem. **63**, (1991) 1015-1080.
5. K. Aoki; J. Am. Chem. Soc., (1989) 171-246.
6. K. Aoki; Met. Ions in Biol. Syst. **32**, (1996) 91-134.
7. Abstract JCBIC-7: S.A.A. Sajadi, M. Bastian, H. Sigel, J. Inorg. Biochemistry **59** (1995) 139.
8. S. A.A. Sajadi, B. Song, H. Sigel; in press.
9. H. Sigel; Chem. Soc. Rev. **22**, (1993) 255-267.
10. H. Sigel; Met. J. Am. Chem. Soc. **97**, (1995) 3209-3214.