

## بررسی گونه‌های مشاهده شده جنس آفتابپرست از تیره گاوزبانیان در محیط‌های رودرال و زکتال شهر همدان (غرب ایران)

عباس شاهسواری، شکوفه معبدی: دانشگاه بولی سینا همدان

### چکیده

طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۰ برخی از مناطق رودرال و زکتال درون شهر همدان و حومه آن (تا ساعت ۲۰ کیلومتری) شامل تعدادی از مزارع، باغها، فضاهای سبز، زمین‌های بایر و نیز حاشیه مسیرهای رفت و آمد (خیابان‌ها و اتوباران‌ها)، از نظر حضور و پراکندگی جنس آفتابپرست<sup>۱</sup> مقایسه فلوریستیکی-اکولوژیکی شدند. این جنس با ۷۴ گونه به عنوان یکی از پرگونه‌ترین جنس‌های تیره گاوزبانیان<sup>۲</sup> برای ایران معرفی می‌شود. دو گونه هلیوتروپیوم اوروپیوم<sup>۳</sup> و هلیوتروپیوم نوئانوم<sup>۴</sup> تاکنون در محدوده درون و حومه شهر همدان مشاهده شده‌اند. پراکندگی وسیع گونه هلیوتروپیوم اوروپیوم با درجه‌های همروبی ۴، ۵، ۶ H به عنوان عنصری ثوفیت رودرال- زکتال، در محیط‌های مرطوب (باغها، زمین‌های زراعی رها شده، حاشیه راه‌ها) و نیز در محیط‌های خشک (میان شکاف سنگ فرش‌ها و آسفالت‌ها، کنار دیوارها و غیره) معرف تطابق بالای این گونه با بسیاری از محیط‌های رودرال درون و حومه شهر همدان است. گونه هلیوتروپیوم نوئانوم با درجه همروبی ۴ H، بسیار محدود و تنها در یک مکان درون شهری و نیز به تعداد ناچیزی در حومه آن مشاهده شد.

### مقدمه

تیره گاوزبانیان با گونه‌های یاکساله علفی تا چندساله درختی و درختچه‌ای، و برگ‌های متناوب متسلسل از ۴ زیرتیره و ۴۱ جنس و ۲۱۸ گونه، دارای پراکندگی وسیعی در بسیاری از بیوتاپ‌های مختلف ایران است [۲۲]. حضور و تنوع فراوان بسیاری از گونه‌های این تیره را می‌توان در آمریکای مرکزی و جنوب آمریکای شمالی، در مناطق معتدل شمالی، در نواحی مدیترانه مشاهده کرد [۸، ۱۰].

جنس آفتابپرست از زیرتیره هلیوتروپیواید<sup>۴</sup>، عنصری جهان‌وطنی است و با ۳۰۰ گونه دارای پراکندگی وسیعی در قلمرو هول آرکتیک، و قلمرو نئوتروپیک (مرکز و جنوب آمریکا)، بهویژه، در نواحی شرق و جنوب ۳۴ درجه و ۳۵ دقیقه، تا ۳۵ درجه عرض شمالی واقع شده است [۵]. این شهر دارای زمستان‌هایی طولانی و آفریقا و جنوب شبه جزیره عربستان، واقع در قلمرو پالنتروپیک، و نیز در قلمرو استرالیک است [۲۰، ۱۳]،

واژه‌های کلیدی: بیوتاپ، رودرال، زکتال، همروبی، همدان، آفتابپرست

دریافت ۹۰/۹/۱۳ پذیرش ۹۱/۸/۲۸

\*نویسنده مسئول shah\_hend@yahoo.de

۱. *Heliotropium noënum* Boiss.

۲. Boraginaceae

۳. *Heliotropium europaeum* L.

۴. *Heliotropium*

۸. Heliotropioideae

[۱۶]، [۱۹]. گونه‌های این جنس بیشتر در مناطقی با آب و هوای خشک و نیمه خشک، عمدتاً در خاک‌های خشک، تپه‌های گچی، بیابان‌های شنی، خاک‌های بهم ریخته، شبیه‌های فرسایش یافته، و نیز در زمین‌های زراعی و بایر، در حاشیه رودخانه‌ها و بهمندرت در حوالی نهرهای گرم رشد می‌کنند [۷].

از این جنس و طی پژوهش‌های صحرایی تاکنون دو گونه از مناطق برونشهر همدان و محیط‌های اطراف آن جمع‌آوری و شناسایی شدند. گونه علفی و یکساله هلیوتروپیوم اوروپئوم با دوره گل‌دهی تابستانه، و گونه هلیوتروپیوم نوئانوم با دوره گل‌دهی بهاره که دارای پراکندگی وسیعی در ناحیه فلوریستیکی ایران و تورانی است [۳].

پراکندگی گونه اول بیشتر در آسیای میانه، شرق آسیا و حوالی دریای مدیترانه است [۹]، [۱۵]، [۲۱]، [۲۴]، [۲۶]. این گونه بهدلیل داشتن ماده الکالوئیدی پیرولیزیدین، به عنوان یکی از آفت‌های زراعی، باعث تخریب و کاهش شدید محصولات کشاورزی می‌شود [۱۸]. از سوی دیگر، مخلوط بذرهای آن با دیگر بذرها، باعث خطراتی در فرآورده‌های غذایی انسان‌ها نیز می‌شود [۱۲].

## مواد و روش‌ها

طی جمع‌آوری‌هایی که به طور تصادفی از ۳۸۵ زیستگاه رویشی در شهر همدان و حومه آن که شامل مزارع، باغ‌ها، زمین‌های بایر، حاشیه خیابان‌ها، پاکرد درختان و غیره صورت گرفتند، نمونه‌های فراوانی از جنس آفتابپرست جمع‌آوری و شناسایی شدند. برای شناسایی از سری کتب فلورا ایرانیکا [۲۲] و فلور ایران [۳] استفاده شد.

برای ارزیابی کیفی و کمی میزان تأثیر و دخالت‌های انسانی بر زیستگاه‌های بررسی شده، از شاخص‌های همروبی استفاده شد [۲۵]. درجه همروبی محیط‌های بررسی شده که دامنه آن از  $H^4$  (محیط‌های متاثر از دخالت‌های انسانی) تا  $H^6$  (بیوسینوز‌هایی شدیداً تخریب شده) متغیر بود، تعیین و نهایتاً نقشه پراکندگی گونه‌های مشاهده شده نیز تهیه گردید. نمونه‌های جمع‌آوری شده در هرباریوم شخصی مؤلف واقع در دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا همدان، نگهداری می‌شوند.


## جغرافیای منطقه بررسی شده

همدان با وسعتی معادل ۴۰۸۴ کیلومتر مربع، و جمعیتی در حدود ۶۳۷۳۰۴ نفر [۶]، در دامنه‌های جنوب شرق رشته کوه الوند (۳۵۸۴ متر ارتفاع) در غرب ایران واقع شده است. شرقی‌ترین نقطه این شهرستان ۴۹ درجه و ۲۷ دقیقه و غربی‌ترین آن ۴۸ درجه و ۲۰ دقیقه از نصف‌النهار گرینویچ فاصله دارد و در حد فاصل سرد، با متوسط ۲۰ - درجه سانتی‌گراد زیر صفر، در ماه‌های دی و تابستان‌هایی نسبتاً ملایم، با متوسط ۳۸ درجه

سانتی‌گراد، در ماه مرداد است. متوسط بارندگی سالانه آن ۳۱۶ میلی‌متر و رطوبت نسبی آن حدود ۵۲ است [۵].

## نتایج

بررسی‌های انجام شده که برای اولین بار در مناطق پژوهش صورت گرفته‌اند، نشان دادند که اکثر یافتگاه‌های این دوگونه شامل بیوتپ‌هایی با دخالت‌ها و تخریب‌های شدید انسانی (با درجات همروبی بین H<sub>4</sub> و H<sub>5</sub>) هستند. این امر بهدلیل تخریب زمین‌های نزدیک به طبیعی درون شهری، برای اهداف ساختمان‌سازی، جاده‌سازی، ایجاد مناطق تجاری و غیره است که نهایتاً باعث کاهش شدید و چشمگیری از مناطق سبز و طبیعت شهری شده است، چنان‌که محیط‌هایی با درجات همروبی H<sub>1</sub> (آهمروب، محیط‌های کاملاً بکر طبیعی)، H<sub>2</sub> (اولیگوهمروب، محیط‌هایی با تخریب ناچیز) و H<sub>3</sub> (مزوهمروب، محیط‌هایی که در آن‌ها حدوداً ۵۰٪ عناصر بومی مشاهده می‌شوند) بهدلیل فعالیت‌های آنتروپوژنی در هیچ یک از محدوده‌های بررسی شده مشاهده نشدند. از مجموع ۳۸۵ زیستگاه بررسی شده، ۶۰٪ آن متعلق به مکان‌هایی با تخریب محیطی زیاد (با همروبی H<sub>4</sub>، شامل زمین‌های باир، خرابه‌های میان مناطق مسکونی، زمین‌های زراعی رها شده و غیره)، ۳۰٪ آن با دخالت‌های انسانی نسبتاً زیاد (همروبی H<sub>5</sub>، زمین‌های زگزال) و ۱۰٪ آن با تخریب بسیار زیاد انسانی (همروبی H<sub>6</sub>، مانند شکاف آسفالت‌ها و سنگ فرش‌ها) معرفی می‌شوند (شکل ۱).



شکل ۱. درصد تعداد قطعات نمونه بررسی شده (n = 385) بر اساس شاخص همروبی در درجات H4 (بتن-یوهمروب)<sup>۱</sup>، H5 (آلفایوهمروب)<sup>۲</sup> و H6 (پلی‌همروب)<sup>۳</sup> در بیوتپ‌های بررسی شده درون شهر همدان

## تعیین ارزش همروبی گونه‌های بررسی شده

گونه هلیوتربیوم اوروبیوم بهدلیل حضور در محیط‌های شدیداً آنتروپوژنی، مثل: محیط‌های سنگفرش و آسفالت شده و نیز محدوده‌های رها شده زراعی، زمین‌های بایر و حتی محیط‌های مرطوب و یا آرید، حیاط منازل، حاشیه و یا روی دیوارها و غیره، دارای پراکندگی چشمگیری در شهر همدان است (شکل ۲ و ۳).

<sup>۱</sup>. β-euhemerob


<sup>۲</sup>. α-euhemerob

<sup>۳</sup>. Polyhemerob

این گونه در ۱۸۵ قطعه از ۳۸۵ قطعه نمونه انتخاب شده، با پراکندگی وسیع، در سه درجه همروبی (H<sub>4, 5, 6</sub>) مشاهده گردید. چنان‌که، ۱۰۲ قطعه نمونه آن (۵۵٪) دارای درجه همروبی H4 (بنا- یوهمروب)، ۵۹ قطعه نمونه (۳۲٪) دارای درجه همروبی H5 (آفایو- یوهمروب) و ۲۴ قطعه نمونه (۱۳٪) دارای درجه همروبی H6 (پلی- یوهمروب) بودند (شکل ۴).




شکل ۲. گونه هلیوتربیوم اوروپیوم در بسیاری از بیوتوب‌های درون شهر همدان فراوان مشاهده گردید. عکس فوق بیان‌گر رشد این گونه در یک محیط سنگ فرش و سیمان کاری شده در ضلع شرقی دانشگاه بوعلی سینا همدان است (عکس از شاهسواری، تیرماه ۱۳۸۹)



شکل ۳. پراکندگی گونه‌های هلیوتربیوم اوروپیوم (۰) و هلیوتربیوم نوئانوم (\*) در بیوتوب‌های بررسی شده شهر همدان

گونه هلیوتربیوم نوئانوم با درجه همروبی H4 (بنایو- یوهمروب) نیز در محیط‌های تخریب شده و تنها در یک محدوده درون شهری (۱٪)، واقع در شرق همدان (تپه مصلی) مشاهده شد (شکل ۳). بررسی‌های صورت گرفته از اطراف شهر نیز معرف پراکندگی ناچیز این گونه در محیط‌های برون شهری بودند، به عنوان مثال: در اطراف سد اکباتان، واقع در شرق همدان؛ و یا در ۱۰ کیلومتری جاده همدان به رزن که عموماً شامل حاشیه

جاده‌ها می‌گردد (شکل ۴).



شکل ۴. چگونگی حضور و پراکندگی دو گونه مشاهده شده از جنس آفتتابپرست L. بر اساس شاخص همروبی در محیط‌های بررسی شده شهر همدان

گونه هلیوتربیوم اوروپیوم علاوه بر حضور در محیط‌های درون شهری، در برخی از بیوتوب‌های برون شهری نیز مشاهده شد. بررسی‌های صورت گرفته نشان دادند که بیشترین حضور و پراکندگی این عنصر (%۶۲) مربوط به مناطقی نظیر زمین‌های بایر و زمین‌های زراعی رها شده حاشیه راه‌ها و جاده‌ها است و به

میزان کمتری (۳۸%) از آن در باغها و زمین‌های کشاورزی مشاهده می‌شوند. همچنین مقایسه دو منطقه درون و حومه شهر همدان نشان دادند که این گونه در هر دو محیط حضور تقریباً یکسان و مشابهی دارد و در حال حاضر، بهطور موقت، به عنوان یک عنصر شهر خنثی<sup>۱</sup> معرفی می‌گردد.

تا کنون گزارش‌هایی نیز در رابطه مهاجم و مزاحم بودن گونه آفتابپرست از برخی مناطق کشاورزی جهان منتشر شده‌اند، مانند استرالیا [۱۴]. اما در این رابطه هیچ مطلبی که دال بر مخرب بودن این گونه در محیط‌های کشاورزی همدان و یا دیگر مناطق زراعی ایران باشد، مشاهده نشد.

قابل ذکر است که در نتایج حاصل از پژوهش‌های مرفومتری که بر روی ۱۷۸ نمونه گیاهی، با انتخاب ۱۰۰ صفت نیز صورت گرفتند (۱۶۴ نمونه از گونه هلیوتروپیوم اوروپیوم، ۱۴ نمونه از گونه هلیوتروپیوم نوئانوم تغییرات ریختی-زیستی چشمگیری که بتوانند گونه‌های درون و حومه شهر همدان را از یکدیگر تفکیک کنند، مشاهده نشد).

## بحث

بیوتوب‌های مختلف شهری امروزه به همان اندازه مهم هستند که محیط‌های برون شهری دارای ارزش تحقیقاتی‌اند. چنان‌که ویلیام شاو<sup>۲</sup> [۲۳] از دانشگاه آریزونا می‌گوید: دیگر زمان آن فرا رسیده که پژوهش‌های منابع طبیعی از درون بوته‌زارها و مراتع، به محیط‌های زیست شهری انتقال داده شوند. ایجاد یک شهر اکولوژیکی<sup>۳</sup>، یعنی شهری سالم و بدون آلودگی‌های شدید زیست‌محیطی [۱۷] و نیز حفظ مزارع کشاورزی، به عنوان یکی از مهمترین آشیانه‌های اکولوژیکی محیط‌های درون شهری، می‌توانند کمک‌های ارزنده‌ای به حفظ و بقای بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری یک شهر کنند. شهرها بدون مناطق زراعی ارزش واقعی خود را بهتریج از دست می‌دهند. به گفته دانتون<sup>۴</sup> [۱۷] یک شهر نمی‌تواند بدون زمین‌های کشاورزی به حیات سالم خود ادامه دهد و مناطق کشاورزی نیز بدون شهرها دیگر مفهومی ندارند.

جنس آفتابپرست نیز از جنس‌های احتمالاً نووفیت زمین‌های زراعی و محیط‌های رودرال شهر همدان به شمار می‌آید که عموماً در محیط‌های زراعی و تخریب شده به‌وسیله انسان‌ها و نیز در فضای‌های سبز (باغچه‌های منازل و یا باغات) رشد می‌کند (شکل ۵). گونه‌های این جنس به عنوان عناصر غیربومی زگتاب معرفی می‌شوند، زیرا بسیاری از محیط‌هایی که در آن دو گونه هلیوتروپیوم اوروپیوم و هلیوتروپیوم نوئانوم مشاهده شدند، درون و حاشیه محیط‌های زراعی و یا زمین‌های بازی هستند که در گشتنهای نه‌چندان دور در آن‌ها زراعت می‌شده است. از سوی دیگر، بسیاری از عناصر زگتاب متعلق به گونه‌های بومی حقیقی<sup>۵</sup> نیستند، بلکه بیشتر در ردیف عناصر بومی قدیمی (کهن) یا همان گونه‌های آرکنووفیت<sup>۶</sup> و یا بومی جدید (نووفیت<sup>۷</sup>) قرار دارند. بسیاری از این گونه‌های بیولوژیکی، طی دوره‌های مختلف کشاورزی و یا دوره‌های تبادل کالا از محیط‌های

۱. Urbanoneutrum

۲. William Shaw

۳. ecocity

۴. Downton

۵. Indigenous

۶. archaeophyte

۷. neophyte

اولیه خود به محیط‌های دیگری منتقل شده‌اند. برای شناخت و معرفی موقعیت گونه‌های مشاهده شده در فوق، نیاز به بررسی‌های عمیق‌تری در رابطه با دیرینه این گیاهان است. از سوی دیگر، چون اطلاعات موجود در رابطه با گذشته گونه‌های مختلف تیره گاوزبانیان در ایران به اندازه‌ای نیست که بتوان بهمکم آن‌ها جوابی علمی برای بسیاری از سوالات کسب کرد و در رابطه با رشته‌های مختلف علمی چون: دیرینه‌شناسی گیاهی، دانه‌گردشناصی و یا باستان‌شناسی این گونه‌ها، اطلاعاتی در دست نیست و در کتب مطالعه شده‌ای چون: فلور شرق [۱۱]، کتاب قانون در طب بوعلی سینا [۱]، تحفه حکیم مؤمن [۲]، گیاهان دارویی زرگری [۴] و غیره نیز مطلبی در خصوص شناخت هر چه بهتر جنس آفتابپرست به دست نیامد، نمی‌توان به راحتی جای‌گاه این جنس و گونه‌های آن را به عنوان عنصری بومی و یا همروکر مشخص کرد. پیشنهاد می‌گردد، تا کسب اطلاعات جامع، بهطور موقت، از واژه "بومی/ جدید" برای این جنس در محیط‌های زگتال و رو درال شهر همدان استفاده شود. جای‌گاه اکولوژیکی گونه‌های آفتابپرست، همانند دیگر گونه‌های مناطق رو درال اهمیت فراوانی دارند، زیرا اگر این جنس از نظر پرورشی دارای ارزش اقتصادی هم نباشد، ولی دارای ارزش حفاظتی و افزایش تنوع زیستی در اکوسیستم‌های شهری است. حفظ مناطق زیست گونه‌های این جنس در آشیانه‌های اکولوژیکی آن‌ها معرف بخشی از تنوع گونه‌ای در یک محیط شهری بهشمار می‌آید که باید در حفظ و نگهداری آن‌ها کوشید. در غیراین صورت، واژه‌هایی چون حفظ تنوع زیستی، تنوع گونه‌ای و نیز مواردی چون حفظ بانک گونه و یا بانک ژن دیگر مفهوم علمی و حقیقی خود را از دست می‌دهند.

حافظت از بیوتاپ‌های زیست‌شهری، با مدیریت صحیح، می‌تواند تنوع زیستی محیط‌های درون شهری را تا میزان زیادی افزایش دهد. تعداد و وسعت شهرها در تمام نقاط جهان همه روزه در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود، تا سال ۲۰۲۵، بیش از ۶۰٪ جمعیت جهان در محیط‌های شهری زندگی کنند [۲۷]. بنا بر این شهرها به عنوان اکوسیستم‌های ناپایدار، اما بسیار حیاتی و مهم، زیست محیط‌های مناسبی برای گروهی از گیاهان شده‌اند.



شکل ۵. گونه هلیوتروپیوم اوروبیوم به عنوان گونه‌ای رو درال و زگتال بسیاری از بیوتاپ‌های مختلف شهری را تسخیر کرده است. در عکس فوق (سمت راست) نمونه‌ای مشاهده می‌گردد که در حاشیه یکی از خیابان‌های شهر همدان و کنار یک ستون چوبی رشد کرده است. عکس سمت راست از معبدی، تیر ۱۳۸۹ و عکس سمت چپ از شاهسواری، تیر ۱۳۸۹

متأسفانه دانش اکولوژی شهری و بررسی روابط درون و برون گونه‌های گونه‌های بیولوژیکی شهری در بسیاری از شهرهای جهان هنوز مراحل اولیه خود را سپری می‌کند. بنا بر این، کمبود اطلاعات و ابزارهایی برای حفاظت مؤثر از تنوع زیستی و عملکردهای اکولوژیکی در شهرهای بزرگ و کوچک، مانع از پژوهش‌های دقیق علمی می‌گردد. هر اندازه که تعداد انسان‌ها در محیط‌های شهری افزایش یابد، به همان میزان نیز تغییر و تحولات فراوانی در موقعیت خاک، کیفیت هوا و تنوع موجودات آبزی و خاکزی شهرها پدید می‌آید [۲۸]. با این تفاصیل، دیگر نمی‌توان شهرها را تنها به عنوان محیط‌های زیست انسانی در نظر گرفت، بلکه امروزه شهرها یکی از مهمترین و حساس‌ترین اکوسیستم‌هایی شده‌اند که اکوسیستم‌های آن نیاز به مراقبت و پژوهش‌های زیست محیطی فراوانی دارند تا انسان‌ها بتوانند در کنار گیاهان و جانوران دارای زندگی سالم و مطلوبی گردند.

## منابع

- ابن سینا، بوعلی، قانون در طب، کتاب دوم، چاپ چهارم، ترجمه عبدالرحمن شرفکندي (هه ژار) انتشارات سروش، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸).
- حسینی طبیب، م. م، تحفه حکیم مؤمن، چاپ اول (۱۳۳۸).
- خاتمساز، محبوبه، تیره گاوزبانیان، فلور ایران، جلد ۳۹، ۳۹، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع (۱۳۸۱).
- زرگری، علی، گیاهان دارویی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران (۱۳۶۱).
- سعیدیان، عبدالحسین، سرزمین و مردم ایران. مردم شناسی و آداب و رسوم اقوام ایرانی، انتشارات علم و زندگی، چاپ چهارم (۱۳۶۹).
- سالنامه آماری استان همدان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان، معاونت آمار و انفورماتیک (۱۳۸۷).
- H. Akhani, "Diversity, biogeography, and photosynthetic pathways of *Argusia* and *Heliotropium* (Boraginaceae) in South-West Asia with an analysis of phytogeographical units", Botanical journal of the linnean society 155, ( 2007) 401-425.
- I. A. Al-Shehbaz, "The Genera of Boraginaceae in The Southern United States", Journal of The Arnold Arboretum, 1(1991) 1-169.
- G. Bentham, "Flora Australiensis" (1869) L. Reeve & Co.: London.
- R. Binzet, N. Orcan, "Anatomical and palynological investigations on endemic *Onosma mersinana* Riedl, pak", J. Bot. 41(2) (2009) 503-510.
- E. Boissier, "Flora Orientalis", Vo l. IV (1879).
- S. M. Colegate, J. A. Edgar, B. L. Stegelmeier, "Plant-associated toxins in the human food supply", In Environmental Toxicology: Current Developments (J Rose, ed) (1998) 317-344. Gordon and Breach Science Publishers.
- L. A. Craven, "A taxonomic revision of *Heliotropium* (Boraginaceae) in Australia", Australian Systematic Botany 9 (1996) 521-657.

14. J. M. Cullen, "E. S. Delfosse Progress and prospects in biological control of weeds", In Proceeding of the Ninth Australian Weeds Conference, (Ed. JW Heap) (1990) 452-476. (university of Adelaide: Adelaide).
15. G. M. Cunningham, W. E. Mulham, P. L. Milthorpe, J. H. Leigh, "Plants of Western New South Wales", NSW Government Printing Ofice: Sydney (1981).
16. N. Diane, H. Förther, H. Hilger, "A systematic analysis of *Heliotropium*, *Tournefortia*, and allied taxa of the Heliotropiaceae (Boraginales) based on ITS1 sequences and morphoogical data", American Journal of Botany 89 (2002) 287-295.
17. P. F. Downton, "Cities for a Greenhouse World", Urban Ecology Australia-Cities for a Greenhouse World (2006).
18. S. L. Everest, "Poisonous Plants of Australia", Angus and Roberton: Sydney (1981).
19. H. Förther, "Die infragenerische Gliederung der Gattung *Heliotropium* L. und ihre Stellung innerhalb der subfam", Heliotropioideae (Schard.) Arn. (Boraginaceae). Sentnera 5 (1998) 35-241.
20. I. M. Johnston, "Studies in the Boraginaceae VII: the south American species of *Heliotropium*", Contributions of Gray Herbarium, 81(1928) 1-83.
21. W. T. Parsons, E. G. Cuthbertson, "Noxious Weeds of Australia", CSIRO Publishing: Melborne (2001).
22. H. Riedl, "In Rechinger, Flora- Iranica", No. 48 (1967).
23. W. Shaw, "Urban Ecology", Nature in an Urban Setting.internet (2005).
24. A.W. Sheppard, L. A. Brun, R. C. Lewis, "A demographic comparision of common heliotrope, *Heliotropium europaeum* L.: Southern Australia and Southern France", In 'Proceedings of the 11<sup>th</sup> Australian Weeds Conference. (Ed. RCH Shepherd) (1996) 286-290. (Weed Science Society of Victoria: Melbourne)
25. H. Sukopp, W. (eds) Trautmann, "Veranderungender flora und Fauna in der Bundesrepublik Deutschland", Bonn-Bad Godesberg (1976).
26. N. G. Walsh, T. J. Entwistle, "Flora of Victoria", Inkata Press: Melborne (1999).
27. World Resources Institute, World resources, "A guide to the global environment: the urban environment", Oxford, Oxford university Press (1996).
28. A. Young, "Environmental change in Australia since 1788", Victoria, Australia, Oxford University Press (2000).