



اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط وجود خشکی بر توانایی رقابتی علف های هرز با ذرت

حمید رضا میری^۱

تاریخ دریافت: ۹۲/۲/۱۱ تاریخ پذیرش: ۹۲/۷/۲۴

چکیده

به منظور بررسی اثرات افزایش غلظت CO₂ به همراه تغییر میزان رطوبت خاک بر رشد و توانایی رقابتی ذرت در برابر گیاهان زراعی و علف های هرز سه کربنه و چهارکربنه، آزمایش گلخانه ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان در سال ۱۳۹۱ انجام شد. آزمایش شامل بررسی اثر دو تیمار غلظت معمولی (۴۰۰ ppm) و افزایش یافته (۸۰۰ ppm) CO₂ و دو تیمار آبیاری معمولی و تنش خشکی بر گیاهان ذرت، گندم، آفتابگردان، ارزن و علف های هرز تاج خروس، سلمه تره، قیاق و یولاف وحشی بصورت کشت تکی و کشت مخلوط با ذرت بود. صفات سطح برگ، وزن خشک ساقه، برگ، ریشه و شاخص توانایی رقابتی (PRY) برای هر گیاه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت CO₂ رشد اندام های هوایی، سطح برگ و ریشه در گیاهان گندم، آفتابگردان، سلمه تره و یولاف وحشی افزایش یافت، در حالیکه در ذرت، ارزن، تاج خروس و قیاق تغییر معنی داری نشان نداد. تنش خشکی وزن خشک، گندم، آفتابگردان، ذرت و ارزن را به ترتیب ۲/۲۵، ۳/۳۰، ۳۰ و ۳۲ درصد کاهش داد، اما در شرایط CO₂ بالا این مقادیر به ترتیب ۰، ۳/۱۰، ۰ و ۱۹/۷ درصد بود. در واقع در شرایط افزایش CO₂ اثرات تنش خشکی بر گیاهان سه کربنه و چهارکربنه کاهش یافته و بخشی از اثرات تنش خشکی با افزایش CO₂ از بین رفت. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش CO₂ توانایی رقابتی علف های هرز سه کربنه در برابر ذرت افزایش می یابد. این امر سبب تغییر برهمکنش رقابتی گیاهان سه کربنه و چهارکربنه با علف های هرز در شرایط تنش خشکی و افزایش CO₂ تغییر می - شود. بطوریکه رقابت علف های هرز سه کربنه در برابر گیاهان زراعی چهارکربنه افزایش یافته و خسارت ناشی از این گیاهان بیشتر شود.

کلمات کلیدی: تغییر اقلیم، رقابت، مسیر فتوسنتزی، سه کربنه، چهار کربنه

مقدمه

آب و هوا مهمترین دلیل تغییرات سالانه عملکرد و تولید گیاهان زراعی است. این تغییرات حتی در محیط‌های با عملکرد بالا و تکنولوژی مدرن نیز مشاهده می‌شود. مقدار و الگوی فصلی تابش خورشیدی، درجه حرارت و بارندگی تعیین‌کننده‌های اصلی رشد گیاهان از طریق تعدادی از مکانیسم‌های مستقیم و غیرمستقیم هستند. دیگر فاکتورهای اقلیمی مانند، سرعت باد و فراوانی وقوع طوفان، نیز تأثیر قابل توجهی بر رشد گیاهان دارند. در سال‌های اخیر توجه زیادی به این اثرات تغییر اقلیم بر رشد و تولید گیاهان معطوف شده است و منابع زیادی در این زمینه به بررسی اثرات تغییر اقلیم فعلی بر اکوسیستم‌ها پرداخته‌اند (والتر و همکاران، ۲۰۰۲).

یکی از اثرات تغییرات اقلیمی افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای است. تغییرات غلظت گازهای اصلی جذب‌کننده تابش اتمسفری (CH_4 ، CO_2 ، N_2O و هالوکربن‌های مختلف) بوسیله بشر باعث ایجاد یک فشار تابشی بر سیستم اقلیمی شده است. این گازها در درجه اول در اثر فعالیت‌های صنعتی، حمل و نقل و فعالیت‌های خانگی و به میزان کمتر از فعالیت‌های کشاورزی و تغییر استفاده از زمین، آزاد می‌شوند (IPCC, 2001). اندازه‌گیری‌های مستقیم و غیرمستقیم CO_2 ، CH_4 و N_2O در اتمسفر در طی ۱۰۰۰ سال گذشته افزایش قابل توجه و بی‌سابقه این گازها را در زمان حاضر نشان می‌دهد. اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد که غلظت CO_2 اتمسفر از دهه ۱۹۵۰ تا کنون از حدود ۳۱۱ به ۳۸۰ ppm افزایش یافته است (با نرخ ۰/۵ ppm در سال در حال افزایش است (هوتون و همکاران، ۲۰۰۱)) و انتظار می‌رود تا اواخر قرن بیست و یکم به ۶۰۰-۱۰۰۰ ppm برسد (هوتون و همکاران، ۲۰۰۱).

مقادیر بالاتر دی‌اکسید کربن مستقیماً بر فیزیولوژی، روابط آبی، رشد و نمو گیاهان تأثیر می‌گذارد (اینسورد و لانگ، ۲۰۰۵؛ لانگ و همکاران، ۲۰۰۴) چراکه درجه حرارت افزایش یافته و در نتیجه تأمین و مصرف آب برای گیاه تغییر خواهد کرد. چنین تغییرات اقلیمی می‌تواند منجر به تغییر نوع و ترکیب پوشش گیاهی و میزان تولید در سیستم‌های طبیعی و کشاورزی در سطح جهان گردد (نیلسون و مارک، ۱۹۹۴). خشکی مهمترین فاکتور محیطی محدودکننده رشد و تولید گیاهان در سطح جهان است. در بیشتر نواحی گرمسیری و استوایی جهان عملکرد گیاهان زراعی بیشتر با میزان آب دریافت شده و ذخیره شده در خاک محدود می‌شود تا درجه حرارت هوا.

آزمایشات متعددی به بررسی واکنش گیاهان با مسیر فتوسنتز C_3 و C_4 به تغییرات غلظت دی‌اکسید کربن اتمسفری در گذشته (پولی و همکاران، ۱۹۹۴؛ تیشو و همکاران، ۱۹۹۸؛ سیج، ۲۰۰۲) و آینده (کولمن و بزاز، ۱۹۹۲؛ دیپری و همکاران، ۱۹۹۵) پرداخته‌اند. پاسخ متفاوت گیاهان C_3 (که کربن اتمسفری را ابتدا بصورت ترکیبات آلی سه کربنه تثبیت می‌کنند- مانند جو و یولاف وحشی) و C_4 (که کربن اتمسفری را بصورت ترکیب چهار کربنه تثبیت می‌کنند- مانند ذرت و تاج خروس) به افزایش غلظت CO_2 و درجه حرارت می‌تواند باعث تغییر پراکنش، رشد، تولید و برهمکنش رقابتی^۱ آنها گردد. یکی از مهمترین این برهمکنش‌های رقابتی در شرایط زراعی بین گیاهان زراعی و علف‌های هرز اتفاق می‌افتد و مطالعات زیادی به بررسی اثر افزایش CO_2 بر گیاهان زراعی و علف‌های هرز پرداخته‌اند. زیسکا (۲۰۰۱) مشاهده کرد که با افزایش غلظت CO_2

1- Competition interaction

سرعت جذب CO_2 و هدایت روزنه ای بالاتر که خروج آب را کاهش می‌دهد، ممکن است رقابت کننده‌تر از چهارکربنه‌ها باشند (هاتنشویلر و همکاران، ۱۹۹۷). وارد و همکاران (۱۹۹۹) نشان دادند که در شرایط افزایش CO_2 و وقوع خشکی گیاهان چهار کربنه برتری مشخصی نسبت به گیاهان سه کربنه دارند.

با توجه به اهمیت علف‌های هرز در سیستم‌های زراعی و وجود گونه‌های متعدد سه کربنه و چهار کربنه از علف‌های هرز، بررسی واکنش گونه‌های سه کربنه و چهارکربنه زراعی و نیز علف‌های هرز به افزایش غلظت CO_2 و خشکی به منظور آگاهی از وضعیت رشد و توانایی رقابتی گونه‌های مختلف ضروری به نظر می‌رسد. به این منظور آزمایش حاضر طراحی و اجرا شده است.

توانایی رقابتی سورگوم کاهش یافت در حالیکه در علف هرز سلمه تره افزایش یافت. همچنین زیسکا (۲۰۰۰) نشان داد که در شرایط افزایش CO_2 کاهش عملکرد سویا در برابر علف هرز سلمه تره از ۲۸ به ۳۹ درصد افزایش یافت. همچنین در سلمه تره با افزایش CO_2 وزن خشک ۶۵٪ افزایش یافت.

برهمکنش اثرات CO_2 و خشکی ممکن است رشد و عملکرد گیاهان سه کربنه و چهارکربنه را تغییر دهد. در غلظت فعلی CO_2 ، گونه‌های چهارکربنه (بوژه تک لپه‌ای‌ها) بدلیل سرعت جذب CO_2 بالاتر مقاومت روزنه‌ای بیشتر در برابر از دست دادن آب، بطور معمول آب کمتری در مقایسه با گونه‌های سه کربنه نیاز دارند (ونت وورد، ۱۹۸۳؛ الرینگر و همکاران، ۱۹۹۷). تحت شرایط افزایش CO_2 و خشکی ممکن است گونه‌های سه کربنه بدلیل افزایش

جدول ۱- تراکم در نظر گرفته شده برای گونه‌های گیاهی در آزمایش

| گونه گیاهی | تراکم (بوته در مترمربع) | تراکم در گلدان |
|------------|-------------------------|----------------|
| گندم | ۲۰۰ | ۲۰ |
| ذرت | ۱۰ | ۲ |
| آفتابگردان | ۱۰ | ۲ |
| ارزن | ۵۵ | ۷ |
| تاج خروس | ۲۰ | ۳ |
| سلمه تره | ۳۰ | ۴ |
| یولاف وحشی | ۱۵۰ | ۱۹ |
| قیاق | ۱۰ | ۲ |

مواد و روش‌ها

این آزمایش در سال ۱۳۹۱ در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان واقع در شهرستان ارسنجان در استان فارس با ارتفاع ۱۶۹۰ متر از سطح دریا و طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۱۹ دقیقه و عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۵۵ دقیقه در ۱۲۰ کیلومتری شمال شرق شیراز صورت گرفت. بافت خاک مزرعه

از نوع بافت شنی رسی با یک درصد ماده آلی، $7/9 = pH$ بود و قابلیت هدایت هیدرولیکی (EC) $0/59$ میلی موس بر سانتی متر بود.

آزمایش در شرایط گلخانه و کشت گیاهان در گلدان‌های ۱۵ کیلوگرمی انجام شد. هر گلدان با خاک با شرایط بالا پر شد و بذر گیاهان زراعی در درون گلدان با تراکم مناسب برای هر گیاه کشت شد.

بطور مداوم غلظت توسط دستگاه اندازه گیری CO_2^1 (مدل AZ77535- ساخت کشور تایلند) ثبت و تغییرات کنترل شد.

سایر عملیات کاشت و داشت از جمله تغذیه بطور معمول و بر اساس نیاز گیاه برای کلیه تیمارها بصورت یکنواخت اعمال شد. پس از رشد گیاه و رسیدن به مرحله گلدهی، ابتدا سطح برگ بوته‌ها توسط دستگاه اندازه گیری سطح برگ (مدل Δt ساخت کشور انگلستان) اندازه گیری شد، سپس گلدان‌ها تخلیه و گیاهان بطور کامل از گلدان خارج شد و برای هر گیاه صفات وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک اندام‌های هوایی و وزن خشک ریشه، اندازه گیری شد. برای اندازه گیری وزن خشک اندام‌های هوایی، پس از تفکیک شدن در آون در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد خشک شدند. برای اندازه گیری وزن خشک ریشه در زمان برداشت (انتهای دوره رشد رویشی) گلدان‌ها برش داده شد و ریشه پس از شستشو بوسیله آب در آون در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد (برای ارزن و گندم دمای ۵۰ درجه) خشک شده و وزن آنها اندازه گیری شد. نسبت ریشه به اندام‌های هوایی (R/S) بصورت نسبت وزن خشک ریشه به اندام‌های هوایی (ساقه+برگ) محاسبه شد. توانایی رقابتی گیاه با استفاده از شاخص عملکرد نسبی گیاه 2 (PRY) بر مبنای وزن خشک اندام‌های هوایی گیاه با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.

وزن خشک در کشت خالص / وزن خشک گونه در کشت

مخلوط = PRY

در پایان داده‌های بدست آمده در آزمایش با استفاده از نرم افزار Genstat 11 و بر اساس طرح آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی تجزیه

این تراکم و تعداد بذر در هر گلدان برای گیاهان مختلف در جدول ۱ نشان داده شده است. لازم به ذکر است در کشت‌های مخلوط تراکم هر گونه گیاهی ۵۰ درصد تراکم ذکر شده در جدول و با نسبت ۵۰:۵۰ در نظر گرفته شد. در طول دوره رشد علاوه بر کنترل غلظت CO_2 درون گلخانه، دمای هوا نیز با استفاده از دستگاه خنک کننده، ثابت نگه داشته شد.

طرح آزمایشی - آزمایش بصورت فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار با دو فاکتور غلظت CO_2 و تیمار آبیاری بود. غلظت CO_2 شامل ۳۸۰ و $700 \mu mol mol^{-1}$ و تیمارهای آبیاری شامل آبیاری معمول (شاهد) بر اساس نیاز گیاه و تیمار تنش (آبیاری معادل ۵۰ درصد آبیاری شاهد) در نظر گرفته شد. گونه‌های گیاهی مورد استفاده در آزمایش شامل گیاهان زراعی گندم (سه کربنه کشیده برگ)، ذرت و ارزن (چهارکربنه کشیده برگ)، آفتابگردان (سه کربنه پهن برگ) و علف‌های هرز تاج خروس (چهارکربنه پهن برگ) سلمه تره (سه کربنه پهن برگ)، قیاق (چهار کربنه کشیده برگ) و یولاف وحشی (سه کربنه کشیده برگ) بودند. ترکیب گونه‌های گیاهی بصورت زیر بود:

(۱) کشت خالص ذرت، (۲) مخلوط ذرت- گندم، (۳) مخلوط ذرت- ارزن، (۴) مخلوط ذرت- آفتابگردان، (۵) مخلوط ذرت- تاج خروس، (۶) مخلوط ذرت- سلمه تره، (۷) مخلوط ذرت- قیاق، که هر یک از این کشت‌ها در شرایط غلظت طبیعی و افزایش یافته و در شرایط معمول و خشکی کشت شدند. غلظت افزایش یافته CO_2 بوسیله تزریق گاز CO_2 با استفاده از سیلندر گاز CO_2 ایجاد شد. برای آگاهی از غلظت CO_2 موجود در شرایط گلخانه و ثابت نگه داشتن آن در حدود $700 \mu mol mol^{-1}$.

1- CO_2 Analyzer

2- Plant Relative Yield


باعث کاهش معنی داری وزن خشک در شرایط طبیعی غلظت CO_2 شد، بطوریکه در این شرایط وزن خشک ذرت ۳/۳۰٪ کاهش یافت، در عین حال غلظت بالای CO_2 باعث کاهش اثرات نامطلوب تنش خشکی بر ذرت شد، بطوریکه در شرایط افزایش غلظت CO_2 وزن خشک ذرت در اثر تنش خشکی تنها ۱۲/۲ درصد کاهش یافت.

شد و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون LSD استفاده شد.

نتایج و بحث

وزن خشک کل

افزایش غلظت CO_2 تأثیر معنی داری بر وزن خشک ذرت در شرایط کشت تکی نداشت و تنها ۲ درصد افزایش مشاهده شد (شکل ۱). تنش خشکی



شکل ۱- وزن خشک کل ذرت در حالت کشت تکی و در ترکیب گونه های مختلف در شرایط آبیاری و خشکی و تغییر غلظت CO_2

مجاورت گندم مشاهده شد که هیچ یک از این تغییرات معنی دار نبود. این امر نشان می دهد که تمایل به افزایش وزن خشک با افزایش غلظت CO_2 در ذرت در مجاورت گیاهان چهار کربنه بیش از گیاهان سه کربنه است، که حاکی از افزایش توانایی رقابتی گیاهان سه کربنه در مقابل گیاهان چهارکربنه با افزایش غلظت CO_2 است.

در حالت کشت مخلوط با افزایش غلظت CO_2 هیچ گونه افزایش معنی داری در وزن خشک ذرت در مجاورت گندم، آفتابگردان، ارزن، تاج خروس، یولاف وحشی، سورگوم و سلمه تره مشاهده نشد (شکل ۱). در واقع بیشترین افزایش وزن خشک ذرت با افزایش غلظت CO_2 در کشت مخلوط در مجاورت سورگوم (۱۰/۳ درصد) و کمترین افزایش (۰/۰۴ درصد) در

بالا معنی دار بود. بطوریکه در این حالت تنش خشکی باعث ۱۶/۴ درصد کاهش وزن ساقه شد (در مقایسه با ۲۴ درصد در حالت CO₂ معمولی).

وزن خشک برگ


اثر افزایش غلظت CO₂ و تنش خشکی بر وزن خشک برگ در شکل ۳ نشان داده شده است. با افزایش غلظت CO₂ وزن برگ ذرت تغییر معنی داری نشان نداد، تنها در رقابت با ارزن و قیاق وزن برگ ذرت بطور معنی داری افزایش نشان داد. در حالت کشت خالص ذرت با افزایش CO₂ وزن خشک برگ ۳/۷ درصد کاهش یافت. در مجاورت گیاهان چهار کربنه مانند ارزن، قیاق و تاج خروس، افزایش وزن برگ ذرت مشاهده شد. بطوریکه در مجاورت ارزن و قیاق به ترتیب ۲۰/۲ و ۱۵/۸ درصد افزایش روی داد. در حالیکه در مجاورت گیاهان سه کربنه تغییر معنی داری در وزن خشک برگ ذرت مشاهده نشد.

اثر تنش خشکی بر وزن خشک برگ معنی دار بود (شکل ۳). تنش خشکی باعث کاهش قابل توجه وزن برگ ذرت شد. این کاهش در حالت کشت خالص ۳۶/۸ درصد بود. در حالت کشت مخلوط نیز بیشترین کاهش وزن برگ در مجاورت سلمه تره (۴۵/۷٪ کاهش) و تاج خروس (۴۰/۵٪ کاهش) مشاهده شد. کمترین کاهش وزن خشک نیز در مجاورت قیاق و آفتابگردان مشاهده شد. به نظر می رسد که رابطه مشخصی بین کاهش وزن برگ ذرت در اثر تنش خشکی و نوع گیاه رقابت کننده از نظر مسیر فتوسنتزی وجود ندارد. ممکن است در این شرایط توانایی رقابتی گیاه مجاور از نظر بهره برداری از آب محدود خاک بر میزان کاهش وزن برگ ذرت تأثیر گذار باشد.


در شرایط تنش خشکی وزن خشک ذرت در مجاورت تمام گونه ها کاهش یافت. میزان این کاهش برای گونه های مختلف متفاوت بود، بطوریکه بیشترین کاهش وزن خشک ذرت در مجاورت یولاف و تاج خروس (به ترتیب ۱۸ و ۱۷/۲ درصد) و کمترین کاهش در مجاورت سورگوم (۳/۶ درصد) مشاهده شد (شکل ۱). همچنین در شرایط افزایش غلظت CO₂ میزان کاهش وزن خشک در اثر تنش خشکی کمتر از حالت طبیعی غلظت CO₂ بود، که این امر نشان می دهد با افزایش غلظت CO₂ اثرات نامطلوب تنش خشکی در ذرت کاهش می یابد.

وزن خشک ساقه

افزایش غلظت CO₂ در شرایط طبیعی تأثیر معنی داری بر وزن خشک ساقه ذرت نداشت (شکل ۲). اگر چه در برخی حالت ها تغییرات جزئی در وزن ساقه مشاهده شد. برای مثال در حالت کشت خالص با افزایش CO₂ وزن ساقه ۲ درصد افزایش یافت. همچنین در حالت کشت مخلوط در مجاورت قیاق و ارزن وزن ساقه به ترتیب ۲ و ۱ درصد کاهش یافت. تنش خشکی باعث کاهش معنی دار وزن خشک ساقه شد. در حالت کشت خالص تنش خشکی باعث کاهش وزن ساقه از ۴۹/۲ به ۳۷/۴ گرم در گلدان شد (۲۴٪ کاهش). در حالت کشت مخلوط وزن ساقه در اثر تنش خشکی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش مربوط به کشت مخلوط با تاج خروس و کمترین کاهش مربوط به کشت مخلوط قیاق و ارزن بود. در شرایط تنش خشکی با افزایش غلظت CO₂ وزن خشک ساقه ذرت در کشت مخلوط تا حدودی افزایش یافت اما این افزایش معنی دار نبود (شکل ۲). تنها در حالت کشت خالص افزایش وزن ساقه در شرایط وجود خشکی و CO₂



شکل ۲- وزن خشک ساقه ذرت در حالت کشت تکی و در ترکیب گونه های مختلف در شرایط آبیاری و خشکی و تغییر غلظت CO₂



شکل ۳- وزن خشک برگ ذرت در حالت کشت تکی و در ترکیب گونه های مختلف در شرایط آبیاری و خشکی و تغییر غلظت CO₂

خشکی بر وزن خشک برگ ذرت کمتر از حالت طبیعی CO₂ بود. برای مثال در برخی از حالت های کشت (در مجاورت گندم و قیاق) وزن برگ ذرت در

افزایش CO₂ در شرایط تنش خشکی باعث افزایش معنی دار وزن برگ ذرت شد (شکل ۳). در واقع در شرایط افزایش CO₂ تأثیر کاهشی تنش

برای مثال در کشت مخلوط با قیاق چنین اثری مشاهده شد. بطور کلی می توان گفت که اثرات تنش خشکی و نیز تغییرات CO_2 بر وزن ریشه ذرت کمتر از اثرات بر اندام های هوایی بود.

سطح برگ

افزایش غلظت CO_2 تأثیر معنی داری بر سطح برگ ذرت نداشت، اما در اثر تنش خشکی سطح برگ بطور معنی داری کاهش یافت (شکل ۵). میزان کاهش سطح برگ در اثر تنش خشکی بین ۲۵ تا ۳۲ درصد متفاوت بود. در شرایط CO_2 بالا کاهش ناشی از تنش خشکی کمتر از CO_2 طبیعی بود. بطوریکه میزان کاهش در شرایط CO_2 بالا بین ۲۲/۹ تا ۱۶/۸ درصد متفاوت بود.

بطورکلی با توجه به اینکه ذرت دارای مسیر فتوسنتزی C_4 واکنش اندکی به تغییرات غلظت CO_2 نشان داد. دراک و همکاران (۱۹۹۷) نشان دادند که با افزایش غلظت CO_2 در گیاهان سه کربنه فتوسنتز برگ در شرایط بدون محدودیت برای رشد ریشه تا ۵۸٪ افزایش می یابد، اما این غلظت CO_2 هیچ تأثیر مستقیم مثبتی بر گیاهان چهارکربنه ندارد. با این حال کمبود نیتروژن و تنش خشکی باعث نشت CO_2 از سلول های غلاف آوندی در برگ های گیاهان چهارکربنه شده و در این شرایط ممکن است فتوسنتز گیاهان چهارکربنه به افزایش CO_2 واکنش مثبت نشان دهد (لانگ، ۱۹۹۹). برخی مطالعات بلند مدت مزرعه ای افزایش فتوسنتز گیاهان چهارکربنه کشیده برگ از جمله سورگوم و ذرت را در شرایط افزایش غلظت CO_2 مشاهده کرده اند (ساماراکون و همکاران، ۱۹۹۶)، اما در کوتاه مدت چنین افزایش مشاهده نشده است. همچنین مسأله مبهم این است که افزایش غلظت CO_2 باعث کاهش هدایت روزنه ای


شرایط CO_2 بالا و وجود تنش خشکی برابر حالت بدون تنش و CO_2 طبیعی بود. علاوه بر این در مجاورت سلمه تره و آفتابگردان نیز با وجود CO_2 بالا تنش خشکی تأثیر معنی داری بر وزن برگ ذرت نداشت. این امر حاکی از آن است که در شرایط CO_2 بالا اثرات نامطلوب تنش خشکی بر برگ ذرت تقلیل می یابد.

نتایج مربوط به تغییرات وزن برگ ذرت نشان می دهد که در مقایسه با وزن ساقه و وزن کل گیاه، وزن برگ حساسیت بیشتری در مقابل تغییرات CO_2 و خشکی دارد. برای مثال تنش خشکی باعث ۳۶/۸ درصد کاهش وزن برگ ذرت در حالت کشت خالص شد، در حالیکه این میزان کاهش برای وزن ساقه ۲۴ درصد بود. همچنین با افزایش CO_2 وزن برگ ذرت در مقایسه با وزن ساقه واکنش بیشتری نشان داد (مقایسه شکل ۲ با ۳).

وزن خشک ریشه

افزایش غلظت CO_2 تأثیر معنی داری بر وزن ریشه ذرت نداشت (شکل ۴). بیشترین میزان تغییرات وزن ریشه در مجاورت قیاق مشاهده شد که ۹/۶ درصد افزایش نشان داد، هرچند این افزایش معنی دار نبود. تنش خشکی باعث کاهش معنی دار وزن ریشه ذرت شد. میزان کاهش در حالت کشت خالص ۱۴/۹ درصد بود. در حالت کشت مخلوط بیشترین کاهش در مجاورت گندم (۲۳/۲٪ کاهش) و کمترین کاهش در مجاورت یولاف وحشی (۱۱/۵٪ کاهش) مشاهده شد. در شرایط تنش خشکی با افزایش غلظت CO_2 تغییرات جزئی (و در مواردی افزایش) در وزن خشک ریشه ذرت مشاهده شد که این تغییرات معنی دار نبود، اما می توان گفت که با افزایش غلظت CO_2 اثرات تنش خشکی بر وزن ریشه ذرت کمتر شده است.

در گیاهان چهارکربنه همانند گیاهان سه کربنه می‌شود. بنابراین گیاهان چهارکربنه رشد یافته در شرایط افزایش CO₂ وضعیت آبی بهتری دارند و این می‌تواند سبب افزایش سرعت فتوسنتز و تولید حتی در شرایط بدون محدودیت آبی گردد.




شکل ۴- وزن خشک ریشه ذرت در حالت کشت تکی و در ترکیب گونه های مختلف در شرایط آبیاری و خشکی و تغییر غلظت CO₂

رشد و تولید گیاه گزارش شده است، اما در شرایط تنش خشکی بدلیل اثرات گفته شده، افزایش CO₂ می‌تواند باعث بهبود رشد و تولید ذرت شود. مشابه این حالت در آزمایش حاضر نیز مشاهده شد، بطوریکه در شرایط تأمین رطوبت، افزایش CO₂ تأثیر معنی داری بر وزن خشک ذرت نداشت اما در شرایط تنش خشکی، با افزایش CO₂ وزن خشک ذرت بطور معنی داری افزایش یافت. واناجا و همکاران (۲۰۰۸) نیز گزارش کردند که با افزایش غلظت CO₂ ارتفاع ساقه ذرت در حالت آبیاری کامل ۱۳٪ افزایش یافت اما در حالت تنش خشکی این میزان افزایش ۱۸٪ بود.

در شرایط تنش خشکی گیاهان چهارکربنه ممکن است واکنش متفاوتی به افزایش غلظت CO₂ نشان دهند. از نظر تئوری گیاهان چهارکربنه مانند ذرت فاقد تنفس نوری بوده و در شرایط تنش خشکی که روزنه ها بسته می‌شوند فتوسنتز آنها بیشتر در معرض بازدارندگی نوری^۱ فتوسنتز قرار دارند (لال و ادوارد، ۱۹۹۶) و عدم انجام تنفس نوری باعث جلوگیری از چرخش CO₂ داخلی می‌شود. در عمل چرخش داخلی CO₂ در برگ های در معرض خشکی ذرت توسط لال و ادوارد (۱۹۹۶) گزارش شده است. بنابراین با وجود اینکه در ذرت اثرات کوتاه مدت افزایش CO₂ بصورت بدون هیچ گونه تأثیر مثبت بر

1- Photoinhibition



شکل ۵- سطح برگ ذرت در حالت کشت تکی و در ترکیب گونه های مختلف در شرایط آبیاری و خشکی و تغییر غلظت CO₂

چنین واکنشی در آفتابگردان نیز مشاهده شد (واجانا و همکاران، ۲۰۱۱).

توانایی رقابتی

مقایسه عملکرد نسبی گیاه^۱ (PRY) به عنوان شاخصی از توانایی رقابتی گیاه نشان داد که در گیاهان مختلف با افزایش غلظت CO₂ و تنش خشکی توانایی رقابتی تغییر قابل توجهی نشان می دهد. در ذرت با افزایش CO₂ میزان PRY در برابر گندم، سلمه تره و یولاف وحشی کاهش یافت، در حالیکه در مجاورت سایر گیاهان تغییر اندکی نشان داد. در شرایط تنش خشکی نیز PRY ذرت در برابر ارزن و یولاف وحشی افزایش، در برابر قیاق کاهش و در برابر سایر گیاهان تغییر قابل توجهی نشان نداد (جدول ۲). بنابراین توانایی رقابتی ذرت در مجاورت

به عقیده وارد و همکاران (۱۹۹۹) در شرایط افزایش غلظت CO₂ برتری نسبی با گونه های سه کربنه است در حالیکه اگر در این شرایط تنش خشکی شدید وجود داشته باشد این برتری متعلق به گیاهان چهار کربنه است. البته به نظر می رسد چنین برداشتی از نحوه واکنش گیاهان به افزایش توام CO₂ و تنش خشکی بسته به گیاه و مکانیسم های سازگاری آن با تنش خشکی متفاوت باشد. همچنین صفات گیاهی واکنش فیزیولوژیک متفاوتی به این تغییرات نشان می دهند. برای مثال واجانا و همکاران (۲۰۰۸) نشان دادند که اثر افزایش CO₂ بر فتوسنتز، تعرق، هدایت روزن های، طول ریشه و اندام های هوایی معنی دار نبود، اما صفاتی مانند وزن ریشه، سطح برگ و وزن برگ بطور معنی داری تحت تأثیر افزایش CO₂ قرار گرفت. همچنین آنها نشان دادند که افزایش سطح برگ، وزن برگ و وزن ریشه با افزایش CO₂ در شرایط تنش خشکی بیشتر از شرایط بدون تنش بود.

1- Plant Relative Yield

گیاهان سه کربنه با افزایش CO₂ کاهش می یابد. بالایی دارند مانند قیاق توانایی رقابتی ذرت کاهش همچنین در مجاورت گیاهانی که تحمل خشکی می یابد.

جدول ۲- شاخص توانایی رقابتی نسبی (PRY) ذرت در رقابت با گیاهان مختلف در شرایط افزایش غلظت CO₂ و خشکی

| ترکیب کشت | آبیاری معمولی | | تنش خشکی | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 400 ppm CO ₂ | 800 ppm CO ₂ | 400 ppm CO ₂ | 800 ppm CO ₂ |
| ذرت- گندم | ۰/۹۵ | ۰/۹۳ | ۰/۹۷ | ۰/۹۲ |
| ذرت- آفتابگردان | ۰/۹۰ | ۰/۹۱ | ۰/۹۸ | ۰/۹۲ |
| ذرت- ارزن | ۱/۱۰ | ۱/۱۴ | ۱/۱۴ | ۱/۰۴ |
| ذرت- تاج خروس | ۱/۱۴ | ۱/۱۶ | ۱/۱۰ | ۱/۰۴ |
| ذرت- یولاف وحشی | ۱/۱۹ | ۱/۱۸ | ۱/۲۴ | ۱/۱۰ |
| ذرت- قیاق | ۰/۹۱ | ۰/۹۸ | ۱/۰۱ | ۰/۹۵ |
| ذرت- سلمه تره | ۱/۰۷ | ۱/۰۶ | ۱/۰۶ | ۱/۰۱ |

میان گیاهان چهار کربنه ارزن واکنش بیشتری به افزایش CO₂ نشان داد و در نتیجه توانایی رقابتی آن در برابر تاج خروس افزایش یافت.

نتایج مشابهی از برتری توانایی رقابتی گیاهان سه کربنه با افزایش غلظت CO₂ گزارش شده است. زیسکا (زیسکا، ۲۰۰۱) نشان داد که در شرایط غلظت طبیعی CO₂ توانایی رقابتی (PRY) سورگوم و توق مشابه بود. در حالیکه با افزایش غلظت CO₂، PYR، توق در برابر سورگوم افزایش و PRY سورگوم در برابر توق کاهش یافت. به عقیده زیسکا (۲۰۰۱) با افزایش با CO₂ تلفات عملکرد سورگوم ناشی از رقابت توق افزایش می یابد. بزاز و همکاران (۱۹۸۹) نیز نشان دادند که توانایی رقابتی گیاهان سه کربنه با افزایش CO₂، افزایش می یابد، در حالیکه در چهار کربنه ها کاهش می یابد. همچنین زیسکا (۲۰۰۰) نشان داد که با افزایش غلظت CO₂ توانایی رقابتی سویا در برابر تاج خروس افزایش یافته و در نتیجه تلفات ناشی رقابت تاج خروس بر سویا کاهش می یابد

نتایج حاکی از آن است که با افزایش غلظت CO₂ توانایی رقابتی گیاهان سه کربنه در برابر گیاهان چهارکربنه افزایش می یابد، در حالیکه در گیاهان چهارکربنه توانایی رقابتی در برابر گیاهان سه کربنه کاهش می یابد. نتایج مشابهی در دیگر پژوهش ها در این رابطه مشاهده شده است. برای مثال میری و همکاران (۲۰۱۲) نشان دادند که با افزایش غلظت CO₂ توانایی رقابتی سویا در مقابل ارزن و تاج خروس افزایش و در مقابل سلمه تره کاهش یافت. همچنین توانایی رقابتی ارزن در برابر سویا و سلمه تره کاهش و در برابر تاج خروس افزایش یافت. توانایی رقابتی تاج خروس نیز در برابر سویا، ارزن و سلمه تره کاهش یافت. توانایی رقابتی سلمه تره نیز در برابر ارزن و تاج خروس افزایش و در برابر سویا کاهش یافت. به عقیده آنها با افزایش غلظت CO₂، توانایی رقابتی گیاهان سه کربنه در برابر گیاهان چهارکربنه افزایش می یابد در حالیکه توانایی رقابتی گیاهان چهار کربنه در برابر سه کربنه ها کاهش می یابد. همچنین در

نتیجه گیری

علف‌های هرز چهار کربنه خواهند داشت (البته لازم تغییرات دمایی ناشی از افزایش CO₂ نیز در این رابطه مورد توجه قرار گیرد). در مقابل در گیاهان زراعی چهار کربنه توانایی رقابتی در برابر علف‌های هرز سه کربنه کاهش می‌یابد.

در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که با تغییرات اقلیمی آینده (افزایش غلظت CO₂ و کاهش فراهمی رطوبت) رشد، تولید و برهمکنش رقابتی گیاهان زراعی و علف‌های هرز تغییر قابل توجهی خواهد یافت، که لازم به منظور مدیریت علف‌های هرز در گیاهان زراعی کارایی روش‌های مدیریتی (از جمله کارایی علف‌کش‌های شیمیایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این با توجه به تغییر برهمکنش علف‌هرز- گیاه زراعی در این شرایط لازم است مطالعات بیشتری در رابطه با اثر افزایش غلظت CO₂ بر بانک بذر علف‌های هرز در خاک، کارایی علف‌کش‌ها و دیگر روابط علف‌هرز- گیاه زراعی صورت گیرد.

نتایج این پژوهش نشان داد که در شرایط افزایش CO₂ اثرات تنش خشکی بر گیاهان سه کربنه و چهارکربنه کاهش یافته و بخشی از اثرات تنش خشکی با افزایش CO₂ از بین می‌رود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که تحمل تنش خشکی در شرایط CO₂ بالا افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند سبب کاهش برتری نسبی گیاهان سه کربنه در شرایط تنش خشکی و CO₂ بالا شود. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش CO₂ توانایی رقابتی گیاهان سه کربنه در برابر گیاهان چهارکربنه افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند سبب تغییر برهمکنش رقابتی گیاهان سه کربنه و چهارکربنه با علف‌های هرز در شرایط تنش خشکی گردد. بطوریکه رقابت علف‌های هرز سه کربنه در برابر گیاهان زراعی چهارکربنه افزایش یافته و خسارت ناشی از این گیاهان بیشتر شود. در مقابل به نظر می‌رسد که در آینده با افزایش غلظت CO₂ گیاهان سه کربنه توانایی رقابتی بیشتری در برابر

منابع

- Ainsworth E.A. and S.P. Long. 2005. What have we learned from 15 years of free-air CO₂ enrichment (FACE)? A meta-analytic review of the responses of photosynthesis, canopy properties and plant production to rising CO₂. *New Phytologist*, 351-372.
- Bazzaz, F.A., K. Garbutt, E.G. Reekie and W.E. Williams. 1989. Using growth analysis to interpret competition between a C₃ and a C₄ annual under ambient and elevated CO₂. *Oecologia* 79: 223-235.
- Colman J.S. and F.A. Bazzaz. 1992. Effects of CO₂ and temperature on growth and resource use of co-occurring C₃ and C₄ annuals. *Ecology*, 73: 1244-1259.
- Dipperry J.K., D.T. Tissue, R.B. Thomas and B.R. Strain. 1995. Effects of low and elevated CO₂ on C₃ and C₄ annuals. *Oecologia*, 101: 13-20.
- Drake, B.G., M. Gonzalez-Meler, and S.P. Long. 1997. More efficient plants: a consequence of rising CO₂? *Ann. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol.*, 48: 609-639.
- Ehleringer, J.R., T.E. Cerling, and B.R. Helliker. 1997. C₄ photosynthesis, atmospheric CO₂ and climate. *Oecologia*, 112: 285-299.

- Hattenschwiler, S., F. Miglietta, A. Raschi and Ch. Korner. 1997. Thirty years of *in situ* tree growth under elevated CO₂: a model for future forest responses? *Global Change Biology*, 3: 463-471.
- Houghton, J.T., Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. Van der Linden, and D. Xiaosu. (eds). 2001. *Climate Change 2001: The Scientific Basis*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- IPCC. 2001. *Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability* (eds J.J. McCarthy, O.F. Canziani, N.A. Leary, D.J. Dokken & K.S. White), 1032 pp. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Lal, A. and G.E. Edwards. 1996. Analysis of inhibition of photosynthesis under water stress in the C₄ species *Amaranthus cruentus* and *Zea mays*: electron transport, CO₂ fixation and carboxylation capacity. *Aust. J. Plant Physiol.* 23: 403-412.
- Long S.P. 1999. Environmental responses. In: Sage, R.F. and Monson, R.K. (eds) *C₄ Plant Biology*. Academic Press, San Diego, pp. 215-250.
- Long, S.P., E.A. Ainsworth, A. Rogers and D.R. Ort. 2004. Rising atmospheric carbon dioxide: Plants FACE the future. *Annual Reviews in Plant Biology*, 55: 591-628.
- Miri, H.R., A. Rsategar and A. Bagheri. 2012. The impact of elevated CO₂ on growth and competitiveness of C₃ and C₄ crops and weeds. *Eur. J. Expl. Biopl.* 2(4): 1144-1150.
- Nilson, P.R. and D. Marks. 1994. A global perspective of regional vegetation and hydrologic sensitivities from climatic changes. *Journal of Vegetation Science* 5: 715-730.
- Polley, H.W., H.B. Johnson and H.S. Mayeux. 1994. Increasing CO₂: comparative responses of the C₄ grass *Schizachyrium* and grassland invader *Prosopis*. *Ecology*, 75: 976-988.
- Sage, R.F. 2002. How terrestrial organisms sense, signal and respond to carbon dioxide. *Integrative Computational Biology*, 42: 469-480.
- Samarakoon, A.B. and R.M. Gifford. 1996. Elevated CO₂ effects on water-use and growth of maize in wet and drying. *Australian Journal of Plant Physiology*, 23: 53-62.
- Tissue, D.T., J.P. Megonigal and R.B. Thomas. 1997. Nitrogenase activity and N₂ fixation are stimulated by elevated CO₂ in a tropical N₂-fixing tree. *Oecologia*, 109: 28-33.
- Vanaja, M., S.K. Yadav, G. Archana, N. Jyothi Lakshmi, P.R. Ram Reddy, P. Vagheera, S.K. Abdul Razak, M. Maheswari, B. Venkateswarlu. 2011. Response of C₄ (maize) and C₃ (sunflower) crop plants to drought stress and enhanced carbon dioxide concentration. *Plant Soil Environ.* 57: 207-215.
- Vanaja, M., M. Jyothi, P. Ratnakumar, P. Raghuram Reddy, N. Jyothi Lakshmi, S.K. Yadav, M. Maheswari and B. Venkateswarlu. 2008. Growth and yield response of castor bean (*Ricinus communis* L.) to two enhanced CO₂ levels. *Plant Soil and Environment* 54: 38-46.
- Walther, G.R., E. Post, P. Convey, A. Menzel, C. Parmesan, T.J.C. Beebee, J.M. Fromentin, O. Hoegh-Guldberg and F. Bairlein. 2002. Ecological responses to recent climate change. *Nature*, 416: (6879), 389-395.
- Ward, J.K., D.T. Tissue, R.B. Thomas and B.R. Straion. 1999. Comparative responses of model C₃ and C₄ plants to drought in low and elevated CO₂. *Glob. Chang. Biol.* 5: 857-867.

- Wentworth T.R. 1983. Distribution of C₄ plants along environmental and compositional gradients in southeastern Arizona. *Vegetation*, 52: 21-34.
- Ziska L.H. 2000. The impact of elevated carbon dioxide on yield loss from a C₃ and C₄ weed in field grown soybean. *Global Change Biology*, 6: 899-905.
- Ziska L.H. 2001 Change in competitive ability between a C₄ crop and a C₃ weed with elevated carbon dioxide. *Weed Sci.* 49: 622-627.
- Ziska, L.H., O. Ghannoum, J.T. Baker, J. Conroy, J.A. Bunce, K. Kobayashi and M. Okada. 2001. A global perspective of ground level, 'ambient' carbon dioxide for assessing the response of plants to atmospheric CO₂. *Global Change Biol.* 7: 789-796.

Archive of SID

Effect of CO₂ enrichment under drought stress condition on growth and weed competitiveness against corn

H.R. Miri¹

Received: 2013-5-1 Accepted: 2013-10-16

Abstract

In order to study the effects of CO₂ enrichment with changed water availability on growth and competitiveness of corn against C₃ and C₄ crop and weeds, a greenhouse experiment was conducted at Arsanjan Islamic Azad University in 2012. The experiment was the evaluation of the effect of two CO₂ concentrations (400 ppm and 700 ppm) and two irrigation treatments (control irrigation and drought) on corn, wheat, sunflower, millet and the weeds pigweed, lambsquarter, wild oat and johnson grass in monoculture and mixed culture with corn. Measured traits were leaf area, stem dry weight, leaf dry weight, shoot dry weight and plan relative yield. The results showed that CO₂ enrichment increased shoot growth, leaf area and root growth of wheat, sunflower, lambsquarter and wild oat while there was no significant change in corn, millet, pigweed and Johnson grass. Drought stress reduced wheat, sunflower, corn and millet by 25.2, 30.3, 30 and 32% respectively but, in elevated CO₂ concentration these values were 0, 10.3, 0 and 19.7%. In fact, CO₂ enrichment reduced detrimental effects of drought on C₃ and C₄ plants. The results also showed that with increasing CO₂ concentration, competitiveness of C₃ weeds increased against corn. This means that the competition interaction of C₄ crop changed against weeds in drought and increased CO₂ concentration which increases C₃ weeds damages on crop plants.

Key words: climatic change, competition, photosynthetic pathway, C₃, C₄

1- Assistant Professor, Islamic Azad University, Arsanjan Branch