

ایجاد سازواره‌های ژنی جدید به منظور بیان ژن هورمون رشد شترمرغ در سیستم‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی

حسین فتح پور^۱، عباس دوستی^{*}، مریم قاسمی^۲، حمیدرضا کبیری^۳

^۱دانشیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، استادیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد،
^۲کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد،^۳کارشناس، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف: رشد مناسب شترمرغ به هورمون رشد آن و تغذیه بستگی دارد. هورمون رشد شترمرغ یک پلی پیتید است که موجب تحریک رشد و تکثیر سلول‌ها می‌شود. هدف از این مطالعه همسانه سازی و تولید دو سازواره ژنی به منظور بیان هورمون رشد شترمرغ در سیستم‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش، RNA از غده هیپوفیز شترمرغ تخلیص شد و cDNA آن به روش رونوشت برداری معکوس تهیه گردید. cDNA حاصل، به روش همسانه سازی T/A در پلاسمید TOPO کلون شد. سپس ساب کلونینگ cDNA هورمون رشد شترمرغ در وکتورهای pET32.1 و pcDNA3.1 انجام شد.

یافته‌ها: همسانه سازی cDNA هورمون رشد شترمرغ در پلاسمید TOPO با موفقیت انجام شد و روش‌های PCR و هضم اندونوکلئازی، صحت کلون سازی را تایید نمود. پس از ساب کلونینگ این cDNA، پلاسمید‌های نوترکیب، pcDNA3.1-gh و pET32-gh حاصل گردید و سازواره‌های حاصل توسط هضم آنزیمی تایید گردیدند.

نتیجه گیری: با استناد به نتایج به دست آمده در این مطالعه به نظر می‌رسد که سازه‌های ژنی تازه ساخته شده در این پژوهش می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب برای تولید صنعتی هورمون رشد شترمرغ مورد استفاده قرار گیرند.

واژگان کلیدی: شترمرغ، هورمون رشد، همسانه سازی.

دریافت مقاله: فروردین ماه ۹۳ پذیرش برای چاپ: تیر ماه ۹۳

مقدمه

بلند کروموزوم شماره ۱۷ و در ناحیه‌های ۲۴-۲۲ رشد دارند. این ژن‌ها طولی برابر ۲-۳ کیلوبایز داشته و دارای ۵ اگزون و چهار ایترون می‌باشند (۴). هورمون رشد توسط سلول‌های سوماتوتروپیک بخش قدامی غده هیپوفیز تولید، ذخیره و ترشح می‌شوند. ترشح این هورمون در غده هیپوفیز توسط پیتیدهای هورمونی آزاد کننده هورمون رشد (growth hormone-releasing hormone: GHRH) و بازدارنده هورمون رشد (growth hormone-inhibiting hormone: GHIH) تولید شده به وسیله هسته‌های ترشحی هیپotalamus تنظیم می‌شود. به طوری که فعالیت‌های

رشد اولیه شترمرغ به وسیله تغذیه و هورمون رشد آن کنترل می‌شود. هورمون رشد در شترمرغ موجب افزایش سوخت و ساز چربی، متابولیسم کربوهیدرات، جذب پروتئین و تحریک رشد می‌گردد. این هورمون یک پلی پیتید ۱۹۱ اسید آمینه‌ای، تک رشته‌ای با وزن مولکولی حدود ۲۲ کیلو دالتون می‌باشد (۱ و ۲). همچنین دارای ۴ رشته مارپیچ است که برای واکنش با گیرنده هورمون رشد ضروری می‌باشند (۳). ژن‌های کد کننده هورمون رشد gh1 و gh2 هستند که بر روی بازوی

* آدرس برای مکاتبه: شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی.
تلفن: ۰۹۱۳۸۳۸۸۳۰ پست الکترونیک: abbasdoosti@yahoo.com

مواد و روش‌ها

(الف) استخراج RNA از بافت هیپوفیز: در این مطالعه پس از شکستن ججمجه شتر مرغ تازه کشتار شده، غده هیپوفیز از آن خارج گردید و بلافاصله بر روی یخ قرار داده شد. به منظور استخراج RNA از محلول RNX-Plus محصول شرکت سیناژن cDNA ایران استفاده شد. با استفاده از کیت مخصوص تهیه RNA، ساخت شرکت فرماتاز آلمان از روی RNA فراهم شده، مطابق دستورالعمل کیت، cDNA هورمون رشد شتر مرغ ساخته شد.

(ب) طراحی پرایمرز به منظور تکثیر ژن هورمون رشد، طراحی پرایمر صورت گرفت. بدین صورت که ابتدا توالی هورمون رشد شترمرغ از بانک جهانی ژن (GenBank) گفته شد. شماره ثبت ژن مورد استفاده AB028191 می‌باشد. بر اساس آن توالی پرایمر مشخص گردید. به منظور سهولت همسانه سازی در انتهای^۵ پرایمرهای Forward و Reverse به ترتیب سایت برش آنزیم‌های BamHI و HindIII قرار داده شد. توالی پرایمرهای مورد استفاده در این بررسی به صورت زیر می‌باشد. در زیر سایت برش آنزیم‌های مربوطه خط کشیده شده است:

Ost-GH-F: 5'-TCCTCGAGACAGAAATGGCTCC-3'
Ost-GH-R: 5'-CCATCCATGGAGATGGTGCAGTTGCTT-3'

(ج) تکثیر cDNA هورمون رشد شترمرغ: واکنش PCR در حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر شامل ۲۰ نانوگرم DNA الگو، ۲ میلی مolar MgCl₂، ۲۰۰ میکرومolar مخلوط dNTP، ۲۵ پیکومول از هر پرایمر، یک واحد آنزیم DNA پلی مراز Taq و چند قطره روغن معدنی برای جلوگیری از تبخیر مواد و آلودگی (همه مواد ساخت شرکت سیناژن ایران) انجام شد.

در ادامه واکنش PCR با شرایط دمایی ۵ دقیقه و اسرشت شدن ابتدایی در دمای ۹۴ درجه سیلیسیوس و در ادامه ۳۰ چرخه شامل و اسرشت شدن در دمای ۹۴ درجه سیلیسیوس به مدت ۱ دقیقه، اتصال در دمای ۵۸ درجه سیلیسیوس به مدت ۱ دقیقه، طویل شدن در دمای ۷۲ درجه سیلیسیوس به مدت ۴۰

فیزیولوژیکی مانند فعالیت بدنی، تغذیه و خواب، ترشح این هورمون را تحریک و موادی مانند اسیدهای چرب آزاد از ترشح آن جلوگیری می‌نمایند^(۵). هورمون رشد به طور مستقیم سرعت انتقال بسیاری از اسیدهای آمینه به داخل سلول‌ها را از طریق غشا افزایش می‌دهد. این امر موجب افزایش غلظت اسیدهای آمینه در داخل سلول و احتمالاً افزایش ساخت پروتئین می‌شود.

این کنترل انتقال اسیدهای آمینه مشابه اثر انسولین در کنترل انتقال گلوكز از غشای سلول‌ها می‌باشد. حتی زمانی که غلظت اسیدهای آمینه داخل سلول هم زیاد نمی‌شود، هورمون رشد ترجمه RNA را افزایش می‌دهد و بدین وسیله ریبوزوم‌های داخل سیتوپلاسم را وادار به افزایش ساخت پروتئین می‌نماید^(۶ و ۷). تجویز هورمون رشد در مدت ۳۰ إلى ۶۰ دقیقه باعث افزایش اسیدهای چرب آزاد در خون (از منشاء بافت چربی) و افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب در کبد می‌گردد. به نظر می‌رسد که اثر هورمون رشد در متابولیسم کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها بدون دخالت IGF-I انجام می‌گیرد. تجویز هورمون رشد انسانی، که با تکنیک نوترکیبی تهیه شده است، باعث افزایش توده بدون چربی بدن و کاهش در چربی بدن همراه با افزایش در میزان متابولیک و افت کلسترول پلاسمایی شود^(۷-۹).

تا قبل از کشف سنتز مصنوعی هورمون رشد به روش DNA نوترکیب، این هورمون برای کاربردهای درمانی از غده هیپوفیز اجساد استخراج می‌شد. از سال ۲۰۰۵ هورمون رشد نوترکیب در ایالات متحده آمریکا در دسترس قرار گرفت و برای کاربردهای صنعتی و درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هورمون رشد دارای کاربردهای درمانی و صنعتی می‌باشد. در صنعت از این هورمون برای افزایش قابلیت حیوانات اهلی استفاده می‌شود و موجب افزایش شیر و محصولات شیری در گاوها شیرده می‌گردد^(۱۰).

هدف از این مطالعه ایجاد دو سازواره ژنی جدید برای بررسی بیان ژن هورمون رشد شترمرغ در باکتری اشريشیا کلی (E. coli) می‌باشد.

ایونیتوروژن (Invitrogen, USA) می‌باشند، ابتدا هر یک از این وکتورها با دو آنزیم *BamHI* و *HindIII* برش داده شد تا به صورت خطی در آیند. همچنین وکتور TOPO حاوی cDNA هورمون رشد شتر مرغ نیز با آنزیم‌های *BamHI* و *HindIII* برش داده شد تا cDNA هورمون رشد از وکتور TOPO جدا گردد. محصولات هضم آنزیمی بر روی ژل آکاروز ۲ درصد الکتروفورز گردید و قطعات مورد نظر شامل وکتور پروکاربیوتی cDNA، وکتور یوکاربیوتی pET32 و قطعه pcDNA3.1 هورمون رشد شتر مرغ با استفاده از کیت تخلیص DNA از ژل ساخت شرکت بیونیر کره جنوبی (Bioneer, Korea) بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده، انجام شد. محصول تخلیص شده از ژل، به روش همسانه سازی T/A در پلاسمید تجاری TOPO ساخت شرکت اینویتوروژن آمریکا (pCR8/GW/TOPO, Invitrogen) درج گردید.

در ادامه در دو واکنش جداگانه، اتصال cDNA هورمون رشد به هر یک از وکتورهای پروکاربیوتی و بیوکاربیوتی انجام گرفت. واکنش گرهای مورد استفاده در واکنش اتصال شامل ۲ میکروگرم وکتور، ۶ میکروگرم cDNA هورمون رشد، ۲ میکروولیتر بافر ۱۰X و ۲ واحد آنزیم T4 DNA Ligase در حجم نهایی ۲۰ میکروولیتر، مخلوط گردیدند. واکنش گرها در دمای ۱۴ درجه سیلیسیوس به مدت ۴ ساعت نگهداری شدند و ترانسفورماتیون شیمیابی محصولات اتصال، با استفاده از کلرید کلسیم یک دهم مولار سرد استریل، در باکتری اشريشیا کلی سویه Top10F انجام شد.

با توجه به اینکه نشانگر انتخابی وکتورهای pET32 و pcDNA3.1 ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی (آمپی سیلین) می‌باشد، باکتری‌های ترانسفورم شده بر روی محیط کشت حاوی آنتی بیوتیک اسپکتینومایسین به مدت ۱۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سیلیسیوس گرم‌گذاری شدند. ۳۷ درجه سیلیسیوس گرم‌گذاری شدند.

و) تایید ساب کلونینگ: تعدادی از کلنی‌های رشد یافته بر روی پلیت حاوی آنتی بیوتیک، به صورت تصادفی (حدود ۱۰ کلنی) انتخاب و در محیط LB-Broth (Bioneer, Korea) پلاسمیدهای سیلین کشت داده شدند و به مدت ۱۸ ساعت در ۳۷ درجه سیلیسیوس گرم‌گذاری گردیدند. با کمک سانتریفیوژ از باکتری‌های رشد یافته، رسوب گیری انجام شده و با استفاده از کیت تخلیص پلاسمید (pET32 و pcDNA3.1) نوترکیب شدند. صحت

ثانیه و در نهایت طویل شدن نهایی در دمای ۷۲ درجه سیلیسیوس به مدت ۵ دقیقه انجام شد. محصول نهایی PCR در ژل آگارز یک درصد مورد الکتروفورز قرار گرفت. پس از رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید با استفاده از اشعه UV مورد بررسی قرار گرفت.

د) همسانه سازی T/A: قطعه تکیه یافته مربوط به cDNA هورمون رشد شترمرغ، با کمک تیغ اسکالپل از روی ژل بریده شد. استخراج DNA از ژل با استفاده از کیت تخلیص DNA از ژل ساخت شرکت بیونیر کره جنوبی (Bioneer, Korea) بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده، انجام شد. محصول تخلیص شده از ژل، به روش همسانه سازی T/A در پلاسمید تجاری TOPO ساخت شرکت اینویتوروژن آمریکا (pCR8/GW/TOPO, Invitrogen) درج گردید.

ترانسفورماتیون شیمیابی محصولات اتصال (Ligation) با استفاده از کلرید کلسیم ۱/۰ مولار سرد استریل، در باکتری اشريشیا کلی سویه Top10F انجام شد. با توجه به اینکه نشانگر انتخابی پلاسمید TOPO، ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی (اسپکتینومایسین) می‌باشد، باکتری‌های ترانسفورم شده بر روی محیط کشت حاوی آنتی بیوتیک اسپکتینومایسین به مدت ۱۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سیلیسیوس گرم‌گذاری شدند. به منظور بررسی اولیه حضور cDNA هورمون رشد شتر مرغ در باکتری‌های دستکاری شده، از کلنی‌های رشد یافته به روش جوشاندن، تخلیص DNA صورت پذیرفت و با پرایمرهای هورمون رشد شتر مرغ، واکنش PCR انجام شد. برای تایید صحت همسانه سازی T/A ژن هورمون رشد در پلاسمید تجاری TOPO، هضم آنزیمی دوگانه با آنزیم‌های *BamHI* و *HindIII* انجام شد. کلنی‌های حاوی cDNA هورمون رشد برای آزمون‌های بعدی مورد استفاده قرار گرفتند.

ه) همسانه سازی cDNA هورمون رشد در وکتورهای بیانی: به منظور ساب کلونینگ cDNA هورمون رشد در وکتورهای بیانی یوکاربیوتی (pET32) و یوکاربیوتی (pcDNA3.1) که به ترتیب ساخت شرکت‌های نوازن (Novagen, USA) و

وکتورهای نوترکیب *gh* pET32-*gh* و pcDNA3.1-*gh* نشان دهنده حضور cDNA هورمون رشد شتر مرغ در این وکتورها و صحت کلونینگ می‌باشد. تایید نهایی با روش هضم آنزیمی با استفاده از آنزیم‌های *BamHI* و *HindIII* که به ترتیب در پایانه های ۵' و ۳' cDNA هورمون رشد، تعییه شده اند، انجام شد. هضم آنزیمی وکتور نوترکیب pET32-*gh*، قطعاتی با اندازه‌های برابر ۵۹۰۰ جفت باز (وکتور pET32) و ۶۷۲ جفت باز (cDNA) روی ژل آگاروز نشان داد. همچنین قطعات ۵۴۲۷ جفت باز (وکتور pcDNA3.1) و ۶۷۲ جفت باز (cDNA) حاصل هضم آنزیمی وکتور نوترکیب pcDNA3.1-*gh* بود.

بحث


در این مطالعه ابتدا RNA کامل از هیپوفیز شتر مرغ تخلیص گردید و cDNA هورمون رشد تهیه شد. cDNA هورمون رشد PCR شتر مرغ به روش همسانه سازی محصولات (تکنیک همسانه سازی T/A) در وکتور TOPO کلون گردید و پلاسمید نوترکیب TOPO-*gh* حاصل شد. به منظور دستیابی به اهداف این تحقیق، cDNA هورمون رشد شتر مرغ از پلاسمید نوترکیب TOPO-*gh* خارج و در دو وکتور بیانی یوکاربیوتی (pcDNA3.1) و پروکاربیوتی (pET32) ساب کلون شد و وکتورهای نوترکیب pET32-*gh* و pcDNA3.1-*gh* تولید شدند. با توجه به پیشرفت تکنیک‌های مولکولی، امروزه تولید بسیاری از پلی پیتیدها و پروتئین‌ها با روش‌های مهندسی ژنتیک انجام می‌شود. در کشور ما بسیاری از فرآورده‌های بیولوژیک نوترکیب از خارج کشور وارد می‌شوند و در زمینه تولید فرآورده‌های نوترکیب تحقیقات زیادی در کشور انجام نشده است. انجام تحقیقات در زمینه تولید پروتئین‌ها و داروها با روش‌های مهندسی ژنتیک سر آغازی برای تولید صنعتی و بی نیاز نمودن کشور از واردات این گونه محصولات و نیل به خود کفایی می‌باشد. شتر مرغ به دلیل قدرت متابولیسمی بالا و تبدیل غذا به انرژی، رشد سریع، عمر مفید و طولانی و تولید مثل بالا به عنوان یکی

همسانه سازی نهایی با روش‌های PCR و هضم آنزیمی بررسی گردید.

یافته‌ها

cDNA هورمون رشد شتر مرغ با موفقیت تهیه و تکثیر گردید. به منظور ایجاد همسانه ژن هورمون رشد، از روش همسانه سازی T/A محصول PCR در وکتور TOPO استفاده شد، که موجب تولید سازه TOPO-*gh* گردید. به منظور تایید صحت همسانه سازی ژن *gh* از آزمون‌های تاییدی PCR و هضم آنزیمی استفاده شد که واکنش PCR نمایان کرد که درصد زیادی از کلون‌های به دست آمده، دارای سازه TOPO-*gh* می‌باشند. هضم آنزیمی دوگانه با آنزیم‌های *BamHI* و *HindIII* بر روی پلاسمیدهای تخلیص شده، نیز وجود قطعه ۶۷۲ جفت بازی مربوط به cDNA هورمون رشد شتر مرغ در وکتور TOPO را مشخص نمود (شکل ۱).

مراحل ساب کلونینگ cDNA هورمون رشد شتر مرغ در وکتورهای بیانی پروکاربیوتی (pET32) و یوکاربیوتی (pcDNA3.1) با موفقیت انجام شد. انجام PCR بر روی



شکل ۱: هضم آنزیمی پلاسمید نوترکیب TOPO-*gh* با آنزیم‌های *BamHI* و *HindIII*. ستون ۱) مارکر یک کیلو بازی فرمتاژ، ستون‌های ۲ و ۳) کلونهای صحیح TOPO-*gh* بریده شده با آنزیم‌های *BamHI* و *HindIII* و که وکتور TOPO با اندازه ۲۸۱۷ جفت باز و cDNA هورمون رشد شترمرغ با اندازه ۶۷۲ جفت باز مشخص است. ستون ۴) وکتور TOPO فاقد قطعه کلون شده. ستون ۵) کلون صحیح TOPO-*gh* بریده نشده.

هیپوفیز شترمرغ و سپس با استفاده از روش PCR با پرایمرهای اختصاصی، cDNA کد کننده هورمون رشد تهیه شد و نیز با استفاده از روش همسانه سازی T/A، قطعه cDNA هورمون رشد همسانه سازی شد و در نهایت ساختار ژنی به دست آمده به باکتری اشريشيا کلسي منتقل گردید.

نتیجه گیری

در پژوهش حاضر، cDNA هورمون رشد شتر مرغ با کاربرد تکنیک‌های مهندسی ژنتیک، تهیه شد. این cDNA در پلاسمید TOPO همسانه سازی و ذخیره گردید. با تولید سازواره TOPO-gh، امکان ساخت کلونینگ هورمون رشد شتر مرغ در سایر سیستم‌های پروکاربیوتی (انواع باکتری‌ها) و یوکاربیوتی (مخمرها، گیاهان و جانوران) فراهم آمد. در ادامه همسانه سازی ژن هورمون رشد شتر مرغ در دو وکتور بیان شونده در سیستم‌های پروکاربیوتی و یوکاربیوتی با موفقیت انجام شد. سازواره‌های pET32-gh و pcDNA3.1-gh که در این تحقیق، تولید شده اند برای تحقیقات آینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

تشکر و قدردانی

نویسندها این مقاله از همکاران محترم مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و همچنین معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به دلیل همکاری صمیمانه در اجرای این پژوهش کمال امتنان را دارند.

از پرندگان مهم در صنعت دام در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود و می‌توان پوست و گوشت آن‌ها را صادر کرد (۱۱). این پرنده به دلیل دارا بودن توانایی تولید گوشت کم چرب، روغن باکیفیت حاوی میزان بالای اسیدهای چرب غیر اشباع و با کیفیت، چرم مرغوب و نیز پرهای زیبای زیستی موردن توجه پرورش دهنده‌گان شترمرغ قرار گرفته است (۱۲). با توجه به اهمیت تولید فراوردهای دامی، در دهه‌های اخیر راهکارها و تکنیک‌های متعددی مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است که میزان تولید فراورده‌های قابل عرضه به بازار فروش را در این دام‌ها افزایش دهد. یکی از این راهکارها تولید هورمون رشد نوترکیب و استفاده از آن به منظور تولید محصولات دامی در مزارع تولید دام در کشورهای پیشرفت‌های می‌باشد.

کومانو (Komano) و همکاران در تحقیقی که در سال ۱۹۹۹ بر روی ژن هورمون رشد شترمرغ انجام دادند توانستند این ژن را کلون و تعیین توالی نمایند. بررسی‌های بیشتر نشان داد که بین هورمون رشد شترمرغ و حیواناتی مانند مرغ، بوقلمون و اردک شباهتی در حدود ۹۰٪ وجود دارد. همچنین مشخص شد که این ژن در بین انسان، موش، بز و گاو دارای تشابهی در حدود ۷۱٪ می‌باشد (۱۳).

در کشور ایران در سال ۲۰۱۲، دوستی (Doosti) و همکاران برای اولین بار موفق به همسانه سازی و توالی یابی ژن هورمون رشد شترمرغ در باکتری اشريشيا کلسي شدند (۶). در این مطالعه با استفاده از روش Reverse RT-PCR (Transcriptase-PCR) از روی RNA تخلیص شده از غده

References

1. Crole MR, Soley JT. What prevents *Struthio camelus* and *Dromaius novaehollandiae* (Palaeognathae) from choking? A novel anatomical mechanism in ratites, the linguo-laryngeal apparatus. *Front Zool*. 2012; 9(1): 11.
2. Yi S, Bernat B, Pál G, Kossiakoff A, Li WH. Functional promiscuity of squirrel monkey growth hormone receptor toward both primate and non primate growth hormones. *Mol Biol Evol*. 2002; 19(7): 1083-1092.

3. Dayani Nia M, Karimipour M, Babapoor V, Shahgholian L, Doosti A. Cloning & sequencing sheep growth hormone gene of lori bakhtiari strain. J Vet Med Tabriz Branch Islamic Azad Uni. 2010; 1(13): 747-751. [In Persian]
4. Valinsky A, Shani M, Gootwine E. Restriction fragment length polymorphism in sheep at the growth hormone locus is the result of variation in gene number. Anim Biotechnol. 1990; 1: 135-144.
5. Bartholomew EF, Martini F, Nath JL. Fundamentals of anatomy & physiology. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc. 2009; pp: 616-617.
6. Doosti A, Ghasemi Dehkordi P, Khodabahsh H. cDNA cloning and sequencing of ostrich growth hormone. Arch Biol Sci Belgrade. 2012; 64 (2): 445-449.
7. Darendeliler F. Safety of growth hormone treatment. J Clin Res Ped Endo. 2009; 11: 36-43.
8. Hull KL, Harvey S. Growth hormone therapy and quality of life: possibilities, pitfalls and mechanisms. J Endocrinol. 2003; 179(3): 311-333.
9. Yuen KC, Chong LE, Riddle MC. Influence of glucocorticoids and growth hormone on insulin sensitivity in humans. Diabet Med. 2013; 30(6): 651-663.
10. Miller JM, Hallager S, Monfort SL, Newby J, Bishop K, Tidmus SA, Black P, Houston B, Matthee CA, Fleischer RC. Phylogeographic analysis of nuclear and mtDNA supports subspecies designations in the ostrich (*Struthio camelus*). Conserve Genet. 2011; 12: 423-431.
11. Aganga AA, Aganga AO, Omphile UJ. Ostrich feeding and nutrition. Pakistan J Nutr. 2003; 2(2): 60-67.
12. Dalle Zotte A, Brand TS, Hoffman LC, Schoon K, Cullere M, Swart R. Effect of cottonseed oilcake inclusion on ostrich growth performance and meat chemical composition. Meat Sci. 2013; 93(2): 194-200.
13. Komano T, Takebe S, Taguchi Y, Sakai H. Cloning and Sequencing of cDNA that encodes ostrich growth hormone. Mem School Bost Kinki Uni. 1999; 5: 74-81.

Generation of new gene constructs for expression of ostrich growth hormone gene in prokaryotic and eukaryotic systems

Hossein Fathpour¹, Abbas Doosti², Maryam Ghasemi³, Hamidreza Kabiri⁴

¹Associate Professor, Biotechnology Research Center, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.

²Assistant Professor, Biotechnology Research Center, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.

³MS.c., Biotechnology Research Center, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.

⁴BS.c., Biotechnology Research Center, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.

Abstract

Background & Objectives: Growth of ostrich depends to employment of growth hormone and proper nutrition. The ostrich growth hormone is a polypeptide that stimulates growth and cell reproduction. The aim of this study was to clone and generation of two new gene constructs for expression of ostrich growth hormone gene in prokaryotic and eukaryotic systems.

Materials & Methods: In this study, RNA was extracted from ostrich pituitary gland and cDNAs synthesized using RT-PCR method. These cDNAs were cloned into TOPO vector based on T/A method. Then, cDNA sub-clones of ostrich growth hormone were prepared on pcDNA3.1 and pET32 vectors.

Results: Cloning of ostrich growth hormone cDNA in TOPO vector was confirmed by PCR and endonuclease restriction digest. After sub-cloning of this cDNA, pcDNA3.1-gh and pET32-gh recombinant vectors were generated and the presence of genes were confirmed using restriction digestion.

Conclusion: According to the results, the new recombinant vectors generated in this study can serve as an effective approach for production of the ostrich growth hormone in commercial levels.

Keywords: Ostrich, Growth hormone (GH), Cloning.

Correspondence to: Abbas Doosti

Tel: +989133838830

E-mail: abbasdoosti@yahoo.com

Journal of Microbial World 2014, 7(3): 190-196.