

## موکورمایکوز رینوسبرال

### و گزارش ۳ مورد آن در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

\*\* احمد دانشی (M.D.) \* مرتضی جوادی (M.D.)  
\*\*\*\* شبا هنگ حمیدی (M.D.) \*\*\* سید بهزاد پوستی (M.D.)

#### چکیده

موکورمایکوز مهلک‌ترین بیماری قارچی سیستمیک است که در زمینه بیماری دیابت یا نقص ایمنی بروز می‌کند و در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع مرگ و میر بسیار بالای دارد. درمان این بیماری بر طرف کردن بیماری زمینه‌ای، درمان دارویی با آمفوتیریسین B، و دبریدمان جراحی است که هرچه مداخله جراحی سریعتر انجام شود بهبودی واضح در پیش‌آگهی خواهیم داشت.

**واژه‌های کلیدی :** موکورمایکوزیس، بیماری‌های قارچی عمقی، دیابت شیرین

#### مقدمه

در زیر میکروسکوپ موکورمایکوزیس به صورت هایفاهای مرتب و بدون دیواره که با شاخک‌های جانی خودزاویه ۹۰ درجه می‌سازد، دیده می‌شود [رنگ آمیزی اختصاصی قارچ (PAS ، پتانس) و رنگ آمیزی هماتوکسیلین اوزین] (۶،۱).

پاتوژن موکورمایکوزیس به صورت درگیری دیواره لامینای الاستیک عروق و به دنبال آن ترومبوزیس و نکروز بافتی می‌باشد (۷،۵). عوامل مساعد کننده ابتلاء این بیماری عبارتند از: ضعف سیستم ایمنی، دیابت ملیتوس کنترل نشده، بدخیمی‌های خونی، سوختگی‌های شدید، بیماری کلیوی، ایدز، ضعف سیستم ایمنی به دنبال پیوند اعضاء، نوترورپنی، مصرف کورتیکواستروییدها، شیمی درمانی، کم خونی و سوء تغذیه (۱۵).

موکورمایکوزیس یک عفونت حاد و فرصت طلب قارچی است که معمولاً توسط اعضاء خانواده ایجاد می‌شود که از زیر گروه‌های آن Mucoraceae Absidia و Rhizopus می‌توان نام برد (۱). بین زیر گروه‌های آن Rhizopus Oryzae شایع‌ترین گروهی است که ایجاد موکورمایکوزیس می‌کند (۲). عوامل بیماری در طبیعت بر روی مواد آلی در حال فساد، خاک و فضولات و مواد قندی رشد می‌کنند و اسپور آنها در هوا پراکنده‌اند، ولی با این وجود معمولاً بیماری زا نیستند و تنها در شرایط وجود بیماری زمینه‌ای تولید بیماری می‌کنند (۱،۳،۴). ارگانیسم بعد از استنشاق به حفره بینی، وارد سرو گردن می‌شود و در صورت وجود بیماری زمینه‌ای ایجاد بیماری می‌کند (۵،۲).

✉ دانشگاه علوم پزشکی ایران- بیمارستان حضرت رسول

\*\*\* استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

\* استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

\*\* دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

\*\*\*\* دستیار گوش و حلق و بینی- بیمارستان رسول اکرم (ص)

استفاده از دوز کم هارین از طریق انفوژیون داخل

وریدی احتمال فلیت حاصل از مصرف آمفوتربیسین را کاهش می‌دهد. اخیراً به استفاده از Hyperbaric oxygen therapy روش‌های درمانی سه گانه ذکر شده اضافه می‌شود، اشاره شده است<sup>(۵)</sup>.

آمفوتربیسین با دوز کم شروع می‌شود و در روزهای اول برای جلوگیری از عوارض ناخواسته می‌توان از کورتیکواستروئید استفاده کرد. بین ۷۰ تا ۸۰ درصد این بیماران دارای دیابت ملیتوس می‌باشند<sup>(۸)</sup>. پیش‌آگهی بیماری بدون علت زمینه‌ای یا با دیابت ۶ درصد و برای بیماران با علت زمینه‌ای جدی CNS ۱۰ درصد است. درگیری رینوسربرال و درگیری شایعترین سندروم بالینی است که توسط متخصصین ENT دیده می‌شود<sup>(۵)</sup>.

### معرفی بیمار

۱- بیمار مردی ۶۶ ساله و دیابتیک بود که از سه روز قبل از مراجعته دچار تورم ناحیه چپ صورت همراه با اریتم و درد شده بود. او به مدت سه روز با تشخیص سلولیت پرہسپتال تحت درمان قرار داشته ولی بهبود نیافته و هنگام مراجعته به این مرکز دچار فلج عصب VII، کموزیس، پروپتوزیس، محدودیت حرکات چشم و بی‌حسی نیمه صورت بود.

بیمار در بد و ورود دارای دید  $\frac{1}{10}$  بود ولی حرکات چشم محدود شده بود. در سی‌تی اسکن درگیری یک طرفه سینوس‌ها و علایمی دال برნفوذ موکور مایکوز از لامینا پیراسه به حفره اوریت دیده می‌شد (تصویر شماره ۱). این بیمار علی‌رغم این که دید  $\frac{1}{10}$  داشت ولی با موافقت همکاران چشم پزشک تصمیم به خارج کردن گرفته شد و ظرف کمتر از ۶ ساعت بیوپسی


اشکال مختلف کلینیکی موکور مایکوز یس عبارتند از: Gastrointestinal ، Pulmonary ، Rhinocerebral . CNS ، Osteitis ، Cutaneous ، Disseminated غیراختصاصی و شامل Engorgement توربینت‌ها و انسداد بینی است. برای رسیدن به تشخیص باید ظن بالینی قوی داشت. مثلاً در افراد پُرخطر، رینیت مقاوم ممکن است اولین علامت درگیری با موکور مایکوز یس باشد<sup>(۵)</sup>.

با پیشرفت بیماری ایجاد ایسکمی و ترومبوز، نکروز توربینت‌ها و ترشحات خونی از بینی را خواهیم داشت. در این مرحله توربینت‌ها سیاه رنگ می‌شوند. با پیشرفت بیماری به سمت مرحله تهاجمی، علایمی چون پتوزیس، پروپتوزیس، سلولیت اربیت، افتالمولپلزی، درگیری عصب سه قلو، و فلج عصب VII را خواهیم داشت. علایم دیگری که دیده می‌شود عبارتند از: کاهش قدرت بینایی و در صورت عدم درمان منتج شدن آن به کوری. تغییر در سطح وضعیت هوشیاری یک علامت شوم است<sup>(۱،۴،۵)</sup>.

تشخیص بر اساس علایم بالینی و وجود بیماری زمینه‌ای و تشخیص قطعی با بیوپسی می‌باشد و کشت علی‌رغم ماهیت تهاجمی بیماری ارزشی ندارد و اکثر اوقات منفی خواهد بود<sup>(۱،۵)</sup>.

درمان صحیح در موارد درگیری رینوسربرال شامل جراحی و اصلاح اختلال متابولیک و درمان طبی می‌باشد. درمان جراحی شامل دبیریدمان تمام مناطق درگیر از جمله سینوس‌ها و چشم است. درمان طبی شامل تجویز آمفوتربیسین B با دوز ۱mg/kg تا دوز کلی ۲ گرم است که با توجه به عوارض کلیوی، عملکرد کلیوی باید مرتب بررسی شود<sup>(۵)</sup> (درمان طبی دیگر کتوکونازول می‌باشد).

جهت خارج کردن چشم برای بیمار از طریق انسیزیون کالدول لوک مدیال ماگزیلکتومی انجام شد و از آن طریق اتموییدکتومی و اسفنوییدکتومی صورت گرفت. در ضمن عفونت قارچی از طریق سوراخ اینفرا اریتال به زیر گونه نفوذ کرده بود و آنجا پُر از نسوج نکروتیک و قارچی بود که دبریدمان آن ناحیه نیز انجام گرفت.




تصویر شماره ۲: سی تی اسکن کورونال سینوس ها

بیمار دو روز بعد فلج عصب زوج شش و افزایش محدودیت حرکت در چشمها و پارگی قرنیه پیدا کرد و دچار کوری شد. در سی تی اسکن اریت نکته پاتولوژیک واضحی وجود نداشت ولی با رضایت همکاران چشم پزشک خارج کردن اریت انجام شد. نسوج نکروتیک حاوی قارچ در رأس اریت دیده می شد. در ضمن مجدداً زیر گونه پُر از نسج قارچی بود که به پوست فیستولیزه شده بود. بیمار با توجه به نفوذ موکور به سیستم عصبی مرکزی دچار لتاژی و کاهش سطح هوشیاری شده و فوت کرد.

۳- بیمار سوم در مراجعه با شکایت درد یک طرفه صورت و ترشح چرکی خونابهای از طرف راست بینی که در هفته اول اسفند آغاز شده بود. همراه آن درد شدید در اریت راست و دوینی در نگاه به چپ داشته است. بیمار به چشم پزشک مراجعه کرده و به درمان با آنتی بیوتیک اکتفا شده بود. چند روز بعد بیمار دچار


برداشته و جواب بیوپسی موکور مایکوزیس بود. مشاوره های قلب و ریه انجام و بیمار آماده عمل شد ولی در طی این مدت دید بیمار به حد دید شمارش انگشت (Finger count) رسید و بیمار مختصری لتاژیک شده بود.



تصویر شماره ۱: سی تی اسکن کورونال سینوس ها

بیمار تحت عمل جراحی خارج کردن اریت و دبریدمان سینوس ها قرار گرفت که نفوذ موکور به خلف اریت مشهود بود. برای مدت دو ماه برای بیمار آمفوتیریسین استفاده شد و دیابت وی کنترل گردید و به طور مرتب تحت دبریدمان قرار گرفت. بیمار با حال عمومی خوب مخصوص شد.

۲- بیمار دختر ۲۰ ساله ای بود که ۸ سال قبل تحت پیوند کلیه قرار گرفته بود و اخیراً به علت شک و رد پیوند کلیه، برای او داروهای سریکوگرامینی شروع کرده بودند. بیمار مدتی بعد جهت رد کردن موکور مایکوز به این مرکز ارجاع داده شد که به سرعت برای بیمار بیوپسی انجام گرفت. جواب بیوپسی، موکور مایکوز بود. در سی تی اسکن نیز پان سینوزیت یک طرفه دیده می شد (تصویر شماره ۲). بیمار مختصری محدودیت حرکت چشم داشت ولی دید وی طبیعی بود، که به علت عدم اجازه همکاران چشم پزشک



تصویر شماره ۳: سی تی اسکن آکسیال بینی و سینوس ها



تصویر شماره ۴: سی تی اسکن آکسیال بینی و سینوس ها

با کنترل بیماری زمینه‌ای و آزمایشات کلیوی، بیمار تحت درمان‌های دبریدمان و دارویی قرار گرفت. در تاریخ ۷۸/۱۲/۲۴ بیوپسی مجدد موکور در قسمت کام مثبت گردید که مجدداً درمان طبی و دبریدمان ادامه داده شد و با بهبود نشت CSF و جواب منفی بیوپسی مجدد بیمار در تاریخ ۷۹/۱/۱۶ مخصوص گردید.

### بحث

افراد دیابتی و افراد دچار نقص ایمنی مستعد ابتلاء به موکور مایکوزیس رینوسربال می‌باشند. پیش‌آگهی این بیماری در افراد دیابتیک بهتر از افراد با نقص ایمنی می‌باشد و پاسخ به درمان بهتر دیده می‌شود. نکته قابل توجه در برخورد با این بیماران ظن قوی بالینی و انجام

تاری دید شد و بالاخره دید خود را به طور کامل از دست داد. او همچنین دارای گزگز گونه راست و فک پایین بود که تا قدم این تیر می‌کشید. او در تاریخ ۷۸/۱۱/۲۸ به بخش گوش و حلق و بینی این مرکز مراجعت نموده است. بیمار از سال ۱۳۷۱ با تشخیص آدیسون تحت درمان با ۷/۵ میلی گرم پردنیزولون و یک قرص فلودرو-کورتیزون بوده است. از سال ۱۳۷۱ با تشخیص دیابت تحت درمان با یک قرص گلی بنکلامید بوده است اما قند بیمار تحت کنترل بوده و از ۱۶۵ میلی گرم در ۷۸/۱۱/۷ دسی لیتر بالاتر نداشته است. بیمار در تاریخ ۷۸/۱۱/۷ تحت جراحی کاتاراکت قرار گرفته است.

در معاينه اوليه، چشم راست بینی بوده و ترشح موکوپورولانت داشت. سمت راست بینی بی‌حس و دچار نکروز مختصر کام سخت سمت راست در محاذات دندان آسیای کوچک بود. در انشعاب V1 هیپوستزی و V2 آستزی داشت. اعصاب جمجمه‌ای طبیعی بودند. سمت راست صورت نیز دچار تورم بود. در تاریخ ۷۸/۱۲/۷ سی تی اسکن انجام شد (تصویر شماره ۳ و ۴) و تحت عمل جراحی ماگریلکتومی کامل و خارج کردن چشم و سپس تحت درمان با آمفوتریسین قرار گرفت. مشاوره غدد انجام و پروتکل انسولین گذاشته شد. دوز آمفوتریسین به ۱۰۰ میلی گرم یک روز در میان رسانده شد و بر این اساس ادامه داشت. در تاریخ ۷۸/۱۲/۱۵ مشاوره جراحی اعصاب انجام شد. در تاریخ ۷۸/۱۱/۱۸ در اتاق عمل دبریدمان مجدد اریت با روش اندوسکوپی سینوس و بینی انجام گرفت که در این دبریدمان مختصر نشت CSF پیدا کرد.

یک راه دیگر گرفتاری سیستم عصبی مرکزی از طریق کرپریفورم می‌باشد که خود، تخلیه هرچه سریعتر سینوس‌ها را نیز می‌طلبد. پس به طور خلاصه، تخلیه هرچه سریعتر اریت سبب بهبود پیش‌آگهی می‌شود. کاهش حرکت اریت و علایمی دال بر درگیری اریت از طریق سینوس‌ها در سی‌تی اسکن کافی است تا این تخلیه شود و نباید منتظر شویم تا درگیری گلوب یا نکروز رأس اریت ایجاد و بیمار کور شود.

در مجموع، در منابع موجود طرز برخورد با بیماران موکورمایکوزیس رینوسبرال بر پایه درمان جراحی، درمان طبی و مداخله هرچه سریعتر است ولی در نوع مداخله جراحی اختلاف نظر وجود دارد. در بعضی منابع برخورد محتاطانه در خارج کردن اریت توصیه شده است ولی در تجربیات ما و در منابع دیگر به این نتیجه رسیدیم که در صورت خارج کردن هرچه سریعتر اریت، پیش‌آگهی بهتر خواهد شد.

ضمانت پیش‌آگهی بیماران ما به نسبت منابع خارجی پایین‌تر است که علت آن مراجعته دیرتر بیماران به مرکز ما و تأخیر در تشخیص در مراکز دیگر می‌باشد (سرویوال در منابع خارجی به طور متوسط ۵۰ درصد و در مطالعه ما حدود ۴۰ درصد بوده است).

در هر حال در بیماران دیابتی یا با نقص ایمنی با دیدن علایمی مثل سینوزیت باید به فکر موکورمایکوزیس باشیم و هرچه سریعتر اقدامات جراحی و درمانی را آغاز نماییم. علاوه بر دبریدمان و تخلیه سینوس‌ها، تخلیه چشم (در صورت درگیری اریت) از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید برای تخلیه اریت منتظر شویم تا بیمار عالیم واضح درگیری بینایی پیدا کند و بعد به فکر تخلیه بیفتد. این کار باید هرچه زودتر انجام پذیرد، زیرا پیش‌آگهی را بهبود می‌بخشد.

هرچه سریعتر جراحی شامل تخلیه چشم (در صورت وجود علایمی دال بر گرفتاری حفره اریت) و دبریدمان سینوس‌ها می‌باشد که باعث بهبود پیش‌آگهی می‌شود. ازین سه بیمار فوق، مورد اول که به سرعت تشخیص داده شد و فوراً اقدامات جراحی برای وی صورت گرفت، بهبود پیدا کرد. مورد دوم به علت تأخیر در ارجاع به بیمارستان حضرت رسول و تأخیر در اجازه سرویس چشم پزشکی جهت تخلیه چشم، فوت کرد. یکی از اقدامات مهم انجام هرچه سریعتر جراحی به منظور جلوگیری از انتشار موکورمایکوزیس به سیستم عصبی مرکزی می‌باشد. یکی از راه‌های انتشار، اریت می‌باشد. هدف از تخلیه اریت جلوگیری از انتشار موکورمایکوزیس از طریق اریت است که هرچه سریعتر باید انجام پذیرد. تخلیه اریت بدون توجه به دید چشم باید انجام گیرد و این در حالی است که اگر متظر شویم تا دید چشم کاهش یابد و بعداً تخلیه اریت صورت گیرد، زمان را از دست داده‌ایم. کاهش یافتن حرکات چشم یا وجود علایمی دال بر نفوذ موکورمایکوزیس از لامینا پاپیراسه به اریت در سی‌تی اسکن کافی است تا حتی در صورت طبیعی بودن بینایی، تخلیه اریت انجام پذیرد و تنها در این صورت است که سرویوال بهبود خواهد یافت. بیمار دوم که موافقت همکاران چشم پزشک جهت تخلیه اریت به علت بینایی طبیعی دیرتر داده شد و دیرتر از بیمار اول تخلیه صورت گرفت، فوت نمود. در بیمار دوم ناحیه بوکال پُر از نسوج نکروتیک و قارچی بود که بعد از رسیدن به این ناحیه با تکنیک کالدول مشاهده شد که عفونت از طریق سوراخ اینفرااریتال به آن رسیده است و شاید بتوان گفت انتشار موکورمایکوزیس به سیستم عصبی مرکزی از طریق سوراخ اینفرااریتال و کف اریت می‌باشد.

## فهرست منابع

1. Finn DG. Mucormycosis of the paranasal sinuses. *Ear Nose Throat J.* 1988; (11): 813-22.
2. Brown OE, Finn R. Mucormycosis of the mandible. *J Oral Maxillofac Surg.* 1986; 44(2): 132-6.
3. Galleta SL, Wule AE, Goldberg HI, Nichols CW, Glaser JS. Rhinocerebral mucormycosis: management and survival after carotid occlusion. *Ann Neurol.* 1990; 28(1): 103-7.
4. Ochi JW, Harris JP, Feldman JI, Press GA. Rhinocerebral mucormycosis: results of aggressive surgical debridement and amphotericin B. *Laryngoscope.* 1988; (12): 1339-42.
5. Cummings W. Otolaryngology head & neck surgery. 1998; 2 : 1114.
6. O'Hara M. Histopathologic diagnosis of fungal diseases. *Infection Control.* 1986; 7(2): 78-84.
7. Hauman CHJ, Raubehemier EJ. Orofacial mucormycosis. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol.* 1989; 68(5): 624-7. Van Johnson E, Kline LB, Julian BA, Garcia JH. Bilateral cavernous sinus thrombosis due to mucormycosis. *Arch Ophthalmol.* 1988; (8): 1089-92.