

بررسی میزان استفاده از انواع روش‌های پیشگیری از بارداری و نگرش زنان ازدواج کرده زیر ۲۵ سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی غرب استان مازندران نسبت به تنظیم خانواده در سال ۱۳۸۰

حسن عظیمی *

سهیلا نظرپور *

چکیده

سابقه و هدف : رعایت تنظیم خانواده به خصوص در گروه‌های سنی نوجوان و جوان از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این بررسی تعیین میزان استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری و نگرش زنان ازدواج کرده زیر ۲۵ سال نسبت به تنظیم خانواده در غرب استان مازندران است.

مواد و روش‌ها : پژوهش به صورت توصیفی انجام پذیرفته است. ۵۴۲ خانم ازدواج کرده زیر ۲۵ سال مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهری و روستایی به طریق نمونه‌گیری خوشای از چهار شهرستان در غرب استان مازندران انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند.

یافته‌ها : شایعترین روش پیشگیری مورد استفاده، IUD (۲۸/۶ درصد) می‌باشد و مهمترین علت ترک روش قبلی یا عدم کاربرد روش پیشگیری، عوارض استفاده مطرح شده است. تعداد ایده آل فرزندان به عقیده اکثریت افراد (۷۴/۸ درصد)، دو فرزند بوده و اکثریت افراد نسبت به تعداد ایده آل فرزندان (۵۹ درصد) و تنظیم خانواده (۶۰/۶ درصد) نگرش مثبتی داشتند. همچنین بین نوع روش پیشگیری مورد استفاده و یکسری از مشخصات دموگرافیکی شامل سن (P<۰/۰۲)، سن ازدواج (P<۰/۰۲)، تعداد کل حاملگی (P<۰/۰۱۶)، تعداد کل فرزندان (P<۰/۰۰۱)، سطح تحصیلات (P<۰/۰۰۰۶)، سطح تحصیلات همسر (P<۰/۰۰۹۹)، شغل همسر (P<۰/۰۰۰۱)، محل سکونت (P<۰/۰۰۰۱) و شرایط سکونت

(P<۰/۰۰۰۱) همبستگی معنی دار آماری وجود دارد.

استنتاج : در جامعه پژوهش، شایعترین روش پیشگیری، IUD بوده و نگرش مثبتی نسبت به تنظیم خانواده وجود دارد. آموزش افراد جهت انتخاب صحیح روش و کاهش عوارض توصیه می‌شود که بهتر است قبل از ازدواج آغاز گردد.

واژه‌های کلیدی : پیشگیری از آبستن، تنظیم خانواده، نگرش، نگرش به سلامت و بهداشت

✉ چالوس- خیابان ۱۷ شهریور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس،

* مریم، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس

** کارشناس ارشد آمار حیاتی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

مقدمه

با توجه به مشکلات و عوارض ناشی از حاملگی در سینین پایین، لزوم اجرای صحیح برنامه‌های تنظیم خانواده، به خصوص در زنان جوان و نوجوان کاملاً ملموس است و از آنجایی که درسال‌های دهه ۲۰ زندگی، قدرت باروری به اوج خود می‌رسد^(۷) و قابلیت باروری در سن ۲۵ سالگی بیشترین درصد را شامل می‌گردد^(۸)، لذا انتخاب روش پیشگیری مناسب در زنان زیر ۲۵ سال در جلوگیری از بروز مشکلات عدیده طبی، اجتماعی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر روش‌های پیشگیری متفاوتی عرضه می‌گردند. از جمله روش‌های پیشگیری که در کشور ما رواج بیشتری دارند، می‌توان به OCP^(۱)، IUD^(۲)، آمپول‌های تزریقی، کاندوم مردانه و لوله بستن اشاره نمود. از طرفی بعضی از روش‌ها نظیر روش‌های سدکننده به جز کاندوم کاربرد کمی داشته‌اند.

در زمینه شیوع استفاده از انواع روش‌های پیشگیری، در کشورهای مختلف از جمله ایران تحقیقات متعددی انجام پذیرفته است که نتایج متفاوتی داشته‌اند. به طور مثال ایکسائو و زائو^(۹) (Xiao & Zhao, 1997) در تحقیق خود در چین، کواکس (Kovacs, 1997) در کشورهای مرکزی و شرقی اروپا^(۱۰) و نیز اوزوomba و اییکو^(۱۱) (Ozumba & Ibekwe, 2001) در تحقیقی در نیجریا آورده‌اند. اما در بررسی دیگری که توسط Kosunen و همکاران⁽¹²⁾ (Kosunen, 1999) در یکی از کشورهای اروپایی انجام پذیرفت، شایعترین روش بود^(۱۳) (Harden & Ogden, 1999) در کاندوم و اوگدن⁽¹⁴⁾ (Harden & Ogden, 1999) در بررسی خود در تامس جنوبی پرمصرفترین روش را کاندوم به دست آورده‌اند. در این بررسی نیز پژوهشگر بر آن شد تا میزان استفاده از روش‌های

امروزه یکی از مشکلات بزرگ عصر ما رشد بی‌رویه و روزافرون جمعیت است. طبق برآورد، روزانه ۹۱۰/۰۰ تولد در دنیا اتفاق می‌افتد و ۵۰ درصد این زایمان‌ها بدون برنامه ریزی قبلی و ۲۵ درصد کاملاً ناخواسته می‌باشد. همچنین حاملگی‌های ناخواسته مرگ ناشی از سقط‌های عمدی را موجب می‌شود که روزانه ۵۰۰ زن جان خود را در این رابطه از دست می‌دهند^(۱۵). رشد جمعیت ایران نیز در دو دهه اخیر چنان افزایش یافته است که در مقاطعی به رشد افغانی رسیده، به طوری که در اوخر دهه ۶۰ به میزان غیر قابل تصور ۳/۵ درصد رسیده بود^(۲). طبق آخرین سرشماری رسمی در آبان ماه ۱۳۷۵، جمعیت ایران به حدود ۶۰/۱ میلیون نفر بالغ گردیده که در حال حاضر با نرخ رشدی حدود ۱/۳ درصد در سال مواجه هستیم که هنوز هم رشد سریعی می‌باشد^(۳). لذا استمرار تقویت سیاست‌های تعديل میزان رشد جمعیت در غالب برنامه توسعه در سال‌های آینده امری اجتناب ناپذیر است.

با توجه به جوان بودن جمعیت ما، توجه به حاملگی‌ها در سینین پایین یکی از نکات حائز اهمیت است. اکثر گزارشات مربوط به تولد فرزند در نوجوانان نشان می‌دهد که این گروه، بیشتر از سایرین در خطر ابتلاء به بعضی از عوارض به خصوص پره‌اکلامپسی، کم خونی فقر آهن و برخی از عوارض مربوط به نوزاد نظیر تولد نوزاد با وزن کم (Low birth weight) (کمتر از ۲۵۰۰ گرم) و با وزن بسیار کم (Very low birth weight) (کمتر از ۱۵۰۰ گرم) قرار دارند^{(۴)، (۵)}. همچنین حاملگی در دهه دوم زندگی احتمالاً موجب وقفه و شاید قطع دایم آموخت و تحصیل زنان جوان می‌شود و از سوی دیگر عدم آمادگی برای پذیرش مسؤولیت‌های مادری، موجب ناراحتی‌های روحی و روانی شدید در این گونه مادران می‌گردد^(۶).

1. Oral contraceptive pills
2. Intra utrine

دوم شامل اطلاعاتی در ارتباط با روش پیشگیری مورد استفاده فعلی و قبلی و نحوه آشنایی و تهیه آنها و بخش سوم که قسمت اعظم آن را عبارات نگرشی تشکیل می‌داد، در جهت تعیین نگرش افراد نسبت به تعداد ایده‌آل فرزندان و اهمیت تنظیم خانواده و کنترل جمعیت تهیه گردید. به منظور تعیین اعتبار علمی فرم مصاحبه، از روش اعتبار محتوا (Content validity) و به منظور تعیین اعتماد آن، از روش آزمون مجدد (Test and retest) استفاده شد. سپس نتایج به دست آمده از فرم‌های مصاحبه، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری با انجام آزمون کای دو $\alpha=0.50$ با استفاده از نرم‌افزار کامپیوترا SPSS قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی نگرش افراد از مقیاس لیکرت استفاده شد.

یافته‌ها

بررسی نشان می‌دهد میانگین سن نمونه‌ها 22.3 سال، میانگین سن ازدواج 17.5 سالگی، میانگین سن اولین حاملگی 18.45 سالگی، میانگین تعداد کل حاملگی 2.64 و میانگین تعداد کل فرزندان 1.18 می‌باشد و 2.6 درصد از نمونه‌ها در سابقه خود یک سقط عمدی را ذکر می‌نمایند. اکثریت نمونه‌ها 95 درصد خانه دار بوده و شغل همسر نیز با بیشترین فراوانی (42.3 درصد) شغل آزاد می‌باشد. در خصوص محل سکونت، بررسی نشان می‌دهد که 58 درصد از نمونه‌ها در روستا و 42 درصد در شهر زندگی می‌کنند و درآمد ماهانه خانواده در بررسی، با بیشترین فراوانی (53 درصد) مربوط به سطح درآمد ماهانه بین چهل تا هشتاد هزار تومان بود. طبق بررسی، 88.6 درصد از نمونه‌ها درآمد ماهانه کمتر از یک صد و بیست هزار تومان داشته‌اند.

نتایج نشان می‌دهد اکثریت نمونه‌ها (76.7 درصد) بعد از ازدواج با وسائل پیشگیری آشنا شده‌اند و در مورد نحوه آشنایی با روش‌ها، مشاوره ازدواج در مراکز

پیشگیری را در زنان ازدواج کرده زیر 25 سال تعیین نموده و نیز نگرش آنها را نسبت به تنظیم خانواده بستجد. چرا که شناخت این عوامل می‌تواند راهگشایی باشد تا سیاستگذاران بهداشتی در هرچه بهتر نمودن کیفیت خدمات ارایه شده، عرضه روش‌های پیشگیری مفیدتری که کمتر مورد توجه هستند و ایجاد نگرش مثبت و رفع منفی نگرانی‌ها، تلاش نمایند.

مواد و روش‌ها

این پژوهش بر حسب ماهیت موضوع و اهداف تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد که نوع روش پیشگیری از بارداری مورد استفاده و نیز نگرش افراد نسبت به تعداد ایده‌آل فرزندان و تنظیم خانواده را در جامعه پژوهش از طریق بررسی توصیفی و همبستگی بین مشخصات دموگرافیکی با نوع روش پیشگیری مورد استفاده را از طریق بررسی همبستگی گذشته نگر تعیین می‌نماید.

در این پژوهش، نمونه‌گیری به طریق خوشای انجام گرفت. بدین صورت که از شهرهای واقع در غرب استان مازندران، چهار شهرستان نوشهر، چالوس، محمودآباد و رامسر به طور تصادفی مشخص و به تناسب تعداد مراکز بهداشت شهری و خانه‌های بهداشت روستایی موجود در آنها و نیز با توجه به بافت کوهستانی و دشتی منطقه، 9 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 27 خانه بهداشت روستایی، مشخص گردیدند و در این مراکز، با توجه به حجم نمونه تعیین شده، کلیه مراجعینی که مشخصات واحدهای مورد پژوهش (شامل تأهل، زندگی با همسر و سن کمتر از 25 سال) را دارا بودند، از تاریخ $80/5/20$ لغایت $80/8/30$ مورد بررسی و مصاحبه قرار گرفته و 542 فرم جهت بررسی به دست آمد. فرم مصاحبه دارای 42 سؤال و مشتمل بر سه بخش بود که بخش اول درخصوص مشخصات دموگرافیک، بخش

درین بررسی اکثریت نمونه‌ها (۷۴/۸ درصد) تعداد دو فرزند را به عنوان تعداد ایده‌آل در نظر می‌گیرند (جدول شماره ۲) و اکثریت آنان (۵۷/۸ درصد) معتقدند که در جامعه توجه کافی به تنظیم خانواده وجود دارد.

جدول شماره ۲ : توزیع فراوانی زنان ازدواج کرده زیر ۲۵ سال مراجعة کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی غرب استان مازندران (۱۳۸۰) بر حسب نگرش در مورد عدم تأثیر جنسیت بر روی تعداد فرزندان

نگرش در مورد عدم تأثیر جنسیت روی تعداد فرزندان	درصد فراوانی (درصد)	فرابانی	درصد فراوانی	تجمعی
متبت	۳۰۴ (۵۹)	۵۹	۳۰۴ (۵۹)	۵۹
متوسط	۲۱۰ (۴۰/۸)	۹۹/۸	۲۱۰ (۴۰/۸)	۹۹/۸
منفی	۱ (۰/۲)	۱۰۰	۱ (۰/۲)	۱۰۰
جمع	۵۱۵ (۱۰۰)		۵۱۵ (۱۰۰)	

با بررسی نگرش افراد در خصوص تأثیر جنسیت در تعداد فرزندان که با استفاده از مقیاس لیکرت انجام پذیرفت، نتایج نشان می‌دهد که ۵۹ درصد از افراد تحت مطالعه نگرش مثبتی به این مسئله داشته و معتقدند که جنسیت روی تعداد فرزندان آنها تأثیری ندارد. در این رابطه ۴۰/۸ درصد نگرش متوسط و تنها ۰/۲ درصد نگرش منفی دارند (جدول شماره ۳).

جدول شماره ۳ : توزیع فراوانی زنان ازدواج کرده زیر ۲۵ سال مراجعة کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی غرب استان مازندران (۱۳۸۰) بر حسب نظرشان در مورد تعداد ایده‌آل فرزند

تجمعی	درصد فراوانی	فرابانی (درصد)	تعداد	ایده‌آل فرزند
۲۰/۹	۱۱۱ (۲۰/۹)	۱۱۱ (۲۰/۹)	۱	
۹۵/۷	۳۹۷ (۷۴/۸)	۳۹۷ (۷۴/۸)	۲	
۹۹/۵	۲۰ (۳/۸)	۲۰ (۳/۸)	۳	
۱۰۰	۳ (۰/۶)	۳ (۰/۶)	۴ و بیشتر	
	۵۳۱ (۱۰۰)		جمع	

بهداشت، بیشترین فراوانی (۴۸/۸ درصد) و رسانه‌های گروهی، کمترین فراوانی (۱/۵ درصد) را شامل می‌شوند. در زمینه نوع روش پیشگیری مورد استفاده، نتایج نشان می‌دهد که ۲۸/۶ درصد افراد از IUD استفاده می‌نمایند که بیشترین شیوع را شامل می‌شود و کمترین شیوع مربوط به آمپول‌های تزریقی با فراوانی ۰/۶ درصد بوده است و ۷/۷ درصد از افراد هیچ روشی برای پیشگیری ندارند (جدول شماره ۱). لازم به ذکر است روش‌های جراحی با توجه به سن افراد کاربردی نداشته است.

جدول شماره ۱ : توزیع فراوانی زنان ازدواج کرده زیر ۲۵ سال مراجعة کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی غرب استان مازندران (۱۳۸۰) بر حسب نوع روش پیشگیری از بازداری مورد استفاده

مجموع	درصد فراوانی (درصد)	فرابانی (درصد)	نوع روش
۵۴۲ (۱۰۰)	۱۱/۶	۶۳ (۱۱/۶)	ریتمیک
	۳۴/۱	۱۲۲ (۲۲/۵)	فرض ترکیبی
	۳۹/۸	۳۱ (۵/۷)	فرض شیردهی
	۵۲/۲	۶۷ (۱۲/۴)	کاندوم
	۵۲/۸	۳ (۰/۶)	آمپول تزریقی
	۶۳/۷	۵۹ (۱۰/۹)	مقارب منقطع
	۹۲/۳	۱۵۵ (۲۸/۶)	IUD
	۱۰۰	۴۲ (۷/۷)	هیچ کدام
		۵۴۲ (۱۰۰)	جمع

در میان نمونه‌هایی که قبلاً روش پیشگیری دیگری داشته و اکنون آن را ترک نموده‌اند و نیز در گروهی که از هیچ روشی برای پیشگیری استفاده نمی‌کنند، با بیشترین فراوانی (۳۶/۹ درصد و ۵۶/۷ درصد)، عوارض استفاده از روش‌ها به عنوان علت اصلی ترک روش قبلی و یا عدم کاربرد روش‌ها مطرح شده است. در خصوص راه‌های دسترسی به وسایل پیشگیری، اکثریت نمونه‌ها (۷۲/۳ درصد) این وسایل را از طریق مراکز بهداشتی درمانی که ارایه کننده خدمات تنظیم خانواده هستند، به دست می‌آورند.

دموگرافیکی، با استفاده انجام آزمون کای دو و $\alpha = 0.05$ نتایج به دست آمده به شرح ذیل می‌باشد:

بین نوع روش پیشگیری و سن ازدواج همبستگی معنی‌دار آماری وجود دارد ($P < 0.02$). همچنین بین دو متغیر نوع روش پیشگیری و تعداد کل حاملگی رابطه معنی‌دار آماری به دست آمد ($P < 0.0016$). به طوری که با داشتن سابقه چهار حاملگی یا بیشتر، روش‌های ریتمیک یا منقطع بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می‌دهند، اما با داشتن سابقه کمتر از چهار حاملگی، روش‌های هورمونی و IUD بیشتر کاربرد دارند. بررسی ارتباط معنی‌داری را بین نوع روش پیشگیری و تعداد کل فرزندان نشان داد ($P < 0.001$). به طوری که در گروه بدون فرزند، روش‌های مورد استفاده دارای ضریب شکست بالاتر بوده (شامل روش‌های ریتمیک و منقطع)، اما در گروه‌های دارای فرزند، استفاده از روش‌های مطمئن‌تر (شامل روش‌های هورمونی و IUD) بیشتر کاربرد داشته است (جدول شماره ۵).

همچنین بین دو متغیر نوع روش پیشگیری و سطح تحصیلات فرد ($P < 0.0006$) و سطح تحصیلات همسر ($P < 0.0099$) رابطه معنی‌دار آماری به دست آمد.

همچنین با بررسی نگرش افراد در خصوص تنظیم خانواده و کنترل جمعیت که با استفاده از مقیاس لیکرت انجام پذیرفت، نتایج نشان می‌دهد که ۶۰/۶ درصد از افراد تحت مطالعه در مورد تنظیم خانواده و کنترل جمعیت نگرش مثبت و ۳۹/۴ درصد نگرش متوسط و هیچ‌یک از نمونه‌ها نگرش منفی نداشته‌اند (جدول شماره ۴).

جدول شماره ۴: توزیع فراوانی زنان ازدواج کرده زیر ۲۵ سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی غرب استان مازندران (۱۳۸۰) بر حسب نگرش نسبت به تنظیم خانواده

نگرش نسبت به تنظیم خانواده	فراآوانی (درصد) تجمعی	درصد فرااآوانی تنظیم خانواده	مثبت
منفی	۱۰۰	۲۰۷(۳۹/۴)	متوسط
مثبت	۳۱۹(۶۰/۶)	۶۰/۶	منفی
جمع	۵۲۶(۱۰۰)	۱۰۰	جمع

در خصوص بررسی همبستگی معنی‌دار بین نوع روش پیشگیری از بارداری مورد استفاده و عوامل

جدول شماره ۵: توزیع فراوانی زنان ازدواج کرده زیر ۲۵ سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی غرب استان مازندران (۱۳۸۰) بر حسب نوع پیشگیری و تعداد کل فرزندان

روش پیشگیری	تعداد فرزندان				
	یک یا دو	سه یا چهار	بیشتر از چهار	تعداد (درصد)	جمع
ریتمیک و منقطع	۸۱(۲۴)	۲۳(۲۱/۳)	۳(۱۵)	۱۲۵(۲۵)	۱۲۵(۲۵)
هورمونی	۱۰۹(۳۱/۳)	۳۴(۳۲/۵)	۵(۲۰)	۱۵۳(۳۰/۶)	۶۷(۱۳/۴)
کاندوم	۴۳(۱۲/۸)	۱۳(۱۲)	۲(۱۰)	۱۰۴(۳۰/۹)	۱۵۵(۳۱)
IUD	۹(۲۵/۷)	۴(۱۲)	۳۸(۳۵/۲)	۱۰(۵۰)	۵۰۰(۱۰۰)
جمع	۳۵(۷)	۱۰۸(۲۱/۶)	۲۰(۴)	۳۳۷(۶۷/۴)	۵۰۰(۱۰۰)

نتایج به دست آمده از بررسی‌ها نشان می‌دهد نگرش اکثریت افراد (۶۰/۶ درصد) نسبت به تنظیم خانواده و کنترل جمعیت مثبت می‌باشد. به طوری که هیچ‌یک نگرش منفی در این زمینه نداشته‌اند. این نتیجه‌گیری نشان دهنده آن است که مسأله تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در دید افراد جامعه جایگاه مناسبی داشته و می‌تواند در اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده از طریق مشارکت مردمی مؤثر واقع شود. چرا که آگاهی، نگرش و عملکرد هر سه به طور مکمل می‌توانند در موقوفیت هر برنامه‌ای تأثیرگذار باشند.

در این بررسی تعداد ایده‌آل فرزند به عقیده اکثریت نمونه‌ها (۷۴/۸ درصد)، دو فرزند است و خوب‌بختانه نگرش مثبتی در خصوص تعداد ایده‌آل فرزندان و عدم تأثیر جنسیت روی تعداد فرزندان در اکثریت نمونه‌ها (۵۹ درصد) موجود است که خود گویای موقوفیت نسبی برنامه‌های تنظیم خانواده در این زمینه می‌باشد.

افرادی که روش پیشگیری قبلی خود را ترک نموده و از روش دیگری استفاده می‌کنند و نیز افرادی که از هیچ روشی برای پیشگیری استفاده نمی‌کنند، علت ترک روش قبلی یا عدم به کارگیری روش پیشگیری در حال را با بیشترین فراوانی (۳۶/۹ درصد و ۵۶/۷ درصد) عوارض استفاده از روش‌ها بیان می‌کنند. بنابراین توجه به عوارض روش‌ها از مسائل مهم در تداوم استفاده از روش‌ها می‌باشد. دوناتی (2000، Donati، 2001) نیز در بررسی (Knowledge – Attitude – Practice) KAP ترس از عوارض جانبی را یکی از علل مهم عدم استفاده از روش‌های پیشگیری بیان می‌کند (Fox, 14). فاکس (Fox, 2001) در مطالعه‌ای که در جامائیکا بر روی ۴۶۳ زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی انجام داد، مشخص نمود ۴۸ درصد از آنها عوارض جانبی را تجربه نموده‌اند که این عوارض اساساً در کاربرد قرص و آمپول‌های تزریقی رخ داده است و وقوع عوارض

بین دو متغیر نوع روش پیشگیری و وضعیت شغلی فرد ارتباط معنی داری به دست نیامد. اما بین نوع روش پیشگیری و شغل همسر ارتباط معنی‌دار قوی آماری حاصل شد ($P < 0.0001$).

همچنین بررسی نشان می‌دهد بین دو متغیر نوع روش پیشگیری و محل سکونت رابطه معنی‌دار قوی آماری موجود است ($P < 0.0001$). به طوری که در گروه روستایی بیشتر از روش‌های هورمونی و IUD در گروه شهری از روش‌های ریتمیک و منقطع استفاده می‌شود.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین دو متغیر نوع روش پیشگیری و شرایط سکونت نیز رابطه معنی‌دار آماری وجود دارد ($P < 0.0001$).

بحث

بررسی مشخص نمود استفاده از IUD بیشترین فراوانی (۲۸/۶ درصد) را در جامعه پژوهش شامل می‌شود و کمترین فراوانی (۰/۶ درصد) مربوط به آمپول‌های تزریقی است. در مطالعات انجام شده در سایر مناطق کشور، نتایج متفاوتی به دست آمده است. اما به طور کلی روش‌هایی که در این پژوهش به طور شایعتر استفاده شده‌اند، در اکثر مطالعات نیز از جمله پرمصرف‌ترین روش‌ها بوده‌اند. در بررسی‌هایی که در کشورهایی نظیر چین، کشورهای مرکزی و شرقی اروپا و نیجریا نیز انجام شده، پر مصرف ترین روش IUD به دست آمده است (9, 10, 11). البته باید مذکور شد شیوع پایین و یا حتی عدم کاربرد بعضی از روش‌ها در این بررسی نظیر کاربرد نورپلاست، دیافراگم و غیره می‌تواند ناشی از عدم ارایه این وسائل در مراکز مذکور یا حتی در کشور باشد که در این زمینه باید فعالیت بیشتری انجام شود.

داده‌اند، یکی از علل مهم مؤقتی تنظیم خانواده در سوئد و هلند نسبت به ایالات متحده، ارتباط نزدیک خدمات تنظیم خانواده و مدارس مطرح گردید(۱۶). لذا توجه به این مسئله حائز اهمیت است. در خصوص نحوه آشنایی، بررسی نشان می‌دهد مشاوره ازدواج در مراکز آشنایی، مهمترین روش آشنایی (۴۸/۸ درصد) بوده بهداشت، مهمترین روش آشنایی (۱/۵ درصد) بوده است که خود گویای اهمیت و تأثیر مفید این مراکز در آگاهی مردم می‌باشد. اما متاسفانه رسانه‌های گروهی کمترین فراوانی (۱/۵ درصد) را شامل می‌شوند که بیانگر خوب عمل نکردن این سیستم اطلاع‌رسانی مهم در جامعه است. لذا پیشنهاد می‌گردد رسانه‌های گروهی در آموزش اصول تنظیم خانواده و آشنا نمودن جوانان با روش‌های پیشگیری فعالیت بیشتری نمایند.

بررسی نشان می‌دهد بین دو متغیر نوع روش پیشگیری و تعداد کل فرزندان، رابطه معنی‌دار آماری وجود دارد ($P<0.001$). به طوری که در گروه بدون فرزند، روش‌های مورد استفاده دارای ضرب شکست بالاتر بوده و در گروه دارای فرزند، استفاده از روش‌های مطمئن‌تر بیشتر کاربرد داشته است که می‌توان علت را ترس بیشتر گروه دوم از حاملگی دیگر و داشتن فرزند بیشتر دانست. در صورتی که در گروه بدون فرزند، مسئله حامله شدن شاید خیلی ناخوشایند نبوده و یا اهمیت پیشگیری برای فرد خیلی روشن نباشد. از طرفی استفاده از روش‌هایی نظیر IUD در خانم‌های نولی گراویدا، منع مصرف نسبی داشته و روش‌های هورمونی نیز در این گروه به خاطر عوارض، کمتر استقبال می‌گردد.

طبق بررسی بین دو متغیر نوع روش پیشگیری و تعداد کل حاملگی نیز رابطه معنی‌دار آماری به دست آمده است ($P<0.001$). به طوری که با داشتن چهار حاملگی یا بیشتر، کاربرد روش‌های ریتمیک یا منقطع بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می‌دهند. در توجیه این نتیجه می‌توان چنین گفت که افرادی که از روش‌های

جانبی برروی میزان تداوم مصرف روش پیشگیری اثر منفی داشته است. این محقق انجام مشاوره و آگاهی دادن به مددجو در خصوص عوارض جانبی را در انتخاب صحیح روش و در نتیجه تداوم مصرف مؤثر دانسته است(۱۵). همچنین آگاهی افراد در مورد نحوه صحیح استفاده از وسایل می‌تواند در کاهش عوارض نیز مؤثر باشد.

بررسی یافته‌های به دست آمده از خصوصیات دموگرافیکی افراد مشخص می‌نماید که میانگین سن ازدواج (۱۷/۵ سالگی) گویای سن ازدواج پایین در جامعه پژوهش است. از طرفی میانگین سن حاملگی ۱۸/۴۵ سالگی به دست آمده که خود مطرح کننده حاملگی در سنین پایین است.

بررسی نشان داد که ۲/۶ درصد از نمونه‌ها سابقه یک سقط عمده دارند که خود گویای عدم مؤقتی و شکست در کاربرد روش‌های پیشگیری یا عدم به کارگیری این روش‌ها است.

با توجه به این که ۵۸ درصد از نمونه‌ها در روستا و ۴۲ درصد در شهر زندگی می‌کنند، مشخص می‌گردد نمونه‌گیری مناسب بوده و از هر دو بافت شهری و روستایی نمونه کافی به دست آمده است. با دقت بر درآمد ماهانه خانواده مشخص می‌شود که ۸۸/۶ درصد از نمونه‌ها درآمد ماهانه کمتر از یک صد و پیست هزار تومان داشته‌اند که زیر خط فقر است و اگر خط فقر را ۹۵/۷ یک صد و شصت هزار تومان در نظر بگیریم، درصد از افراد زیر این خط قرار می‌گیرند. بررسی نشان می‌دهد که اکثریت نمونه‌ها (۷۶/۷ درصد) بعد از ازدواج با وسایل پیشگیری آشنا شده‌اند که خود ضرورت آشنا نمودن دختران با وسایل پیشگیری را در مدارس مشخص می‌کند. با نظر به مطالعه‌ای که کروم و مک کارتی (Cromer and McCarthy, 1999) در چهار کشور انگلیس، هلند، سوئد و ایالات متحده انجام

ریتمیک و منقطع قابل توجه می‌باشد. در روش‌های ریتمیک، محاسبه زمان تخمک‌گذاری، براساس اصول علمی لازم است که شاید آگاهی ساکنین شهر به این مسئله خود یکی از علل استفاده از این روش‌ها باشد. در نهایت ملاحظه می‌شود که بین نوع روش پیشگیری مورد استفاده با تعداد قابل توجهی از مشخصات دموگرافیکی فرد، همبستگی معنی دار وجود دارد و انتخاب روش پیشگیری با یکسری از مشخصات دموگرافیکی فرد متناسب است.

سپاسگزاری

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس که در جهت انجام این پژوهش همکاری همه جانبی داشته‌اند، قدردانی و تشکر به عمل می‌آید.

غیر مطمئن استفاده می‌کنند، تعداد حاملگی بیشتری داشته و موفقیت آنها در تنظیم خانواده کمتر می‌باشد. به طوری که علی‌رغم سن کم، تعداد حاملگی قابل توجهی دارند.

همچنین ارتباط معنی داری بین نوع روش پیشگیری و سطح تحصیلات فرد ($P < 0.006$) و همسرش ($P < 0.0099$) به دست آمده است. تهرانی و همکاران (۲۰۰۱) نیز در بررسی خود سطح تحصیلات فرد و همسرش را از مهمترین عوامل در کاربرد روش‌های پیشگیری به دست آورده‌اند (۱۸).

بررسی بین دو متغیر نوع روش پیشگیری و محل سکونت، رابطه معنی‌دار قوی آماری را نشان می‌دهد ($P < 0.0001$). به طوری که در گروه روستایی بیشتر از روش‌های هورمونی و IUD استفاده شده و در گروه شهری استفاده از روش‌های نامطمئنی نظیر روش‌های

فهرست منابع

۱. فتحی‌زاده ناهید و همکاران. عوارض زودرس نورپلنت و آمپول‌های تزریقی DMPA در مراجعین به مراکز بهداشتی - درمانی شهر اصفهان در سال ۱۳۷۷. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۷۷، شماره ۹: ۳۰ تا ۳۴.
۲. فروهری فریدون. کاهش رشد جمعیت ایران. هفته نامه پزشکی/امروز، ۱۳۷۶، سال هفتم، شماره ۱۹۲: ۳۱ تا ۳۴.
۳. حلم سرشت پریوش، دل‌پیشه اسماعیل. جمعیت و تنظیم خانواده. چاپ سوم. تهران: انتشارات چهر، ۱۳۷۹، صفحات ۵۵ تا ۶۲.
۴. Cunningham FG. *Williams Obstetrics*. 21th ed, U.S.A: Mc Grow-Hill Company, 2001. 1517-1562.
۵. فرنیا مرضیه. جمعیت و برنامه تنظیم خانواده. نشریه اصلاح و تربیت، سال ششم، شماره ۶۷: صفحات ۱۵ تا ۱۹.
۶. حلم سرشت پریوش، دل‌پیشه اسماعیل. بهداشت و تنظیم خانواده. چاپ سوم. تهران: انتشارات چهر، ۱۳۷۸، صفحات ۱۳ تا ۳۲.
۷. شجاعی تهرانی حسین، عبادی فرد آذرفرید. جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت باروری. چاپ اول. تهران: مؤسسه انتشاراتی جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۷، صفحات ۳۰ تا ۳۰.
۸. فلاحیان معصومه، سلیمان مهریار. روش‌های جلوگیری از حاملگی تزریقی و نقش آن در تنظیم خانواده. تهران: نشر معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۷۲.

9. Xiao BL, Zhao BG. Current practice of family planning in China. *IJGOAL*. 1997; 58(1): 59-67.
10. Kovacs L. Abortion and contraceptive practices in eastern Europe. *Int -J-Gynecol-Obstet*. 1997; 58(1): 69-75.
11. Ozumba BC, Ibekwe PC. Contraceptive use at the family planning clinic of the university of Nigeria Teaching hospitals, Enugu, Nigeria. *Public-Health*. 2001; 115(1): 51-3.
12. Kosunen E, et al. Do young women have specific problems in contraceptive use and counseling, *Eur-J-obstet-Gynecol-Reprod-Biol*, 1999; 83(1): 15-20.
13. Harden A, Ogden J. Sixteen to nineteen year old's use of, and beliefs about contraceptive services. *Br-J- Fam- plann*, 1999; 24(4): 141-4.
14. Donati S, Hamam R, Medda E. Family planning KAP survey in Gaza. *Soc -Sci -Med*. 2000; 50(6): 841-9.
15. Fox K. The impact of side effects on family planning use among female clients of the public health services in Jamaica. *West - Indian - Mad - J*. 2001; 50(3): 209-13.
16. Cromer BA, McCarthy M. Family planning services in adolescent pregnancy prevention. *Fam- Plann-Perspect*. 1999; 31(6): 287-93.
17. Chacko E. women's use of contraception in rural India: a village-level study, *Health-Place*, 2001; 7(3): 197-208.
18. Tehrani FP, Farahani FK, Hashemi M. Factors influencing contraceptive use in Tehran. *Fam-Pract*. 2001; 18(2): 204-8.