

تأثیر آموزش‌های تغذیه و بهداشت به زنان عشايری در سلامت ایل و نقش زنان عشايری در گسترش فرهنگ تغذیه و بهداشت

محمد شهبا زی (M.D.)

مسعود کیمیاگر (Ph.D.)

موسی صالحی (Ph.D.)

ید الله مرابی (M.D.)

علی اصغر کلاهی (M.D.)

چکیده

سابقه و هدف : در سال‌های اخیر، وضعیت تغذیه خوب به عنوان یک شاخص توسعه و زنان به عنوان پژوهش دهنده‌گان نسل بعد در جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار استند، از این‌رو در کشورهای در حال رشد، آموزش تغذیه در توسعه اقتصادی و ملی مورد توجه برنامه‌ریزان بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است.

مواد و روش‌ها : با همکاری دختران با سواد داوطلب و معلمین عشايری به مدت یک سال، برنامه آموزشی مدونی با محتوای مبانی بهداشت و تغذیه در خانواده‌های مورد مطالعه به اجرا در آمد. جامعه مورد مطالعه ۱۴۱ خانوار از طایفه‌های ایل قشقایی است که به طور تصادفی به نسبت جمعیت از این طایفه‌ها انتخاب شده‌اند. اطلاعات با استفاده از روش مشاهده مستقیم، ثبت و مطالعه گردید.

یافته‌ها : میانگین انرژی لازم برای انجام کارهایی که فقط زنان به عهده دارند ۱۲۷۰ کالری، و سهم زنان در کارهایی که زن و مرد با مشارکت هم انجام می‌دهند ۷۹۰ کالری، و میانگین انرژی لازم برای کارهایی که منحصرًا مردان انجام می‌دهند ۸۳۰ کالری بود. مصرف کالری سرانه خانوار با "پرسشنامه ۲۴ ساعت یاد آمد خوراک" ۳۰۵۴ کالری برآورد گردید.

سرانه مصرف مردان ۳۳۰۰ کالری، زنان ۱۵۰۰ کالری و سایر اعضاء، ۱۸۶۰ کالری تعیین شد و مقدار قابل توجهی از سبد غذایی آن‌ها، سهم مرغها و سگ‌های ایل می‌شد. درصد سوء تغذیه کودکان زیر ۶ سال عشاير مورد مطالعه، قبل و بعد از مداخله آموزشی، اختلاف معنی داری را نشان می‌دهد ($P < 0.05$). گرچه هنوز از درصد کودکان دچار سوء تغذیه استان فارس بیشتر است.

استنتاج : مردان به دلیل محدود شدن کار چوبانی، کارگری، مدیریت طایفه و تیره، کشیک شبانه، شکار و داد و ستد از طرفی و بالا بودن سهم مردان و مهمان‌ها از سهم غذای روزانه خانوار، افزایش وزن و زنان به دلیل کاهش درآمد و افزایش تلاش برای تأمین حداقل نیاز فرزندان، انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و کاهش وزن دارند. آموزش دادن زنان و دختران با سواد و داوطلب عشايری در موضوعات بهداشتی و فرهنگی برای جبران عقب ماندگی جامعه ایلی از توسعه فرهنگی و بهداشتی امری ضروری است که باید بیشتر از گذشته مورد توجه مسؤولان محترم کشور قرار بگیرد.

واژه‌های کلیدی : آموزش بهداشت، بهداشت، زنان-آموزش

✉ شیراز: کوی زهرا (س)-دانشکده بهداشت

* دانشجوی دکتری تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

** استادیار دانشگاه JSU می‌سی بی، آمریکا

** استاد دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

**** دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

***** تاریخ دریافت: ۱۵/۰۸/۸۲

**** تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۰۸/۰۸/۸۲

مقدمه

مروری بر مطالعات جامعه شناسی و آنתרופومتری غذا نشان می دهد که زن ها از غذا به عنوان یک عامل در زمینه شناسایی خود و هویت فرهنگی خویشن استفاده می کنند^(۶). به این دلیل چه در برابر اعضاء خانواده و چه در برابر مهمنان همیشه نقش میزبان را بازی نموده و با بهترین شیوه، مواد غذایی در دسترس را با محبت، سلیقه، دانش و مهارت عرضه می نمایند. شاید زنان به این دلیل، آخرین نفری هستند که به غذا دسترسی می یابند^(۲).

زنان ایل به خصوص در طبقات بالا در مسائل سیاسی و اجتماعی نقش دارند. زنان ایل، مادرانی با عاطفه کامل مادری هستند. فداکاری، ایثار و شکیبایی از خصایص بارز آنها است. تدبیر و کارداری زنان ایل به عنوان مادر گاهی از جنگ های خونین بین دو طایفه جلوگیری کرده است. زن در ایل، مری و معلم فرزندش می باشد. زیرا پدر کمتر در خانه است. آغوش مادر و تعلیم او مدرسه کودکان است^(۷).

فرهنگ سازی در همه جوامع، کار خانواده ها است. پایه فرهنگی کودکان در خانواده ریخته می شود و سپس در جامعه تکامل می یابد. و مادران در شالوده سازی فرهنگی کودکان نقش اساسی دارند. فرهنگ جنبه های گوناگونی دارد؛ مثل: زبان، دین، تکنولوژی و ابزار، آداب و رسوم غذا خوردن، شرکت در مجالس، ازدواج، لباس پوشیدن، سواری و تیر اندازی، شکار، بافتگی، پخت و پز و غیره.

با این تعریف در می یابیم که خانواده چه وظیفه سنگینی در قبال افراد جامعه دارد؛ زیرا اغلب اجزاء فرهنگ با آموزش های والدین به خصوص مادران در ذهن کودک نقش می بندد. گرچه با گسترش وسایل ارتباط جمعی، تاثیرپذیری افراد خانواده از جوامع دیگر رو به فزونی است، ولی در عشاير ایران هنوز خانواده

در سال های اخیر با توجه به این که وضعیت تغذیه خوب به عنوان یک شاخص توسعه مورد قبول برنامه ریزان بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال رشد قرار گرفته، زنان به عنوان کسانی که مسؤولیت مهم پرورش جامعه را به عهده دارند از اهمیت ویژه ای در توسعه اقتصادی و ملی مورد توجه قرار گرفته اند^(۱).

نگاه مختصری به روند جمعیت ایران در ۲۰ سال گذشته به خوبی نشان می دهد که از دیدگاه فیزیولوژی، تغذیه زنان آسیب پذیر از مردان می باشد. زیرا نه تنها دوران بارداری و شیردهی خاص زنان بوده بلکه به علت جنگ و سایر اثرات اجتماعی، در سال های بعد از انقلاب نسبت زنان میانسال به مردان بیشتر شده است. و در نتیجه احتمال بالا بودن زنان مسن در ده سال آینده در ایران بیشتر خواهد بود.

عدم تغذیه مناسب زنان در دوران آسیب پذیری، اثرات دراز مدتی در امنیت تغذیه کشور به جا خواهد نهاد. به عنوان مثال تغذیه ناکافی در دوران نوزادی، کودکی و جوانی منجر به کوتاه ماندن جثه و کوچک شدن لگن خاصره شده که نه تنها یکی از شاخص های تعیین کننده وزن و قد نوزادان در نسل آینده بوده بلکه یکی از عوامل مهم در ایجاد پیچیدگی های زایمان و مرگ و میر در این قبیل زنان خواهد بود^(۳).

کمبودها ی مواد مغذی که اغلب به علت نیازهای فیزیولوژیکی بالا و تخلیه مواد مغذی در اثر حاملگی های مکرر در کشورهای در حال توسعه در زنان دیده می شود، عبارتند از: کمبودهای ید، آهن، فولیک اسید و یا ویتامین A و B2^(۴). پوکی استخوان به خصوص در زنان بعد از دوران یائسگی یکی از مسائل خاص تغذیه ای در کشورهای مختلف دنیاست^(۵).

مراقبتی کودکان مورد توجه طراحان برنامه و مجری طرح بوده است:

۱- مراقبت‌های بهداشتی

۲- مراقبت‌های تغذیه‌ای، شامل آماده سازی غذا، تهیه غذاهای کامل و تامین کننده نیاز کودکان زیر پنج سال، خوراندن و خوراکیاری و موارد دیگر. در مورد مراقبت‌های بهداشتی، آموزش ما پیرامون استفاده از امکانات موجود برای دسترسی به آب آشامیدنی سالم، جوشاندن آب و یا استفاده از محلول کلر مادر برای ضدغوفنی آب و سبزیجات، فراهم آوردن امکانات دسترسی کودکان به آب کلریزه و صابون برای شست و شوی دست و صورت، جلب مشارکت عمومی در جمع آوری و دفن بهداشتی زباله‌ها، تلاش خانوار برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهیه امکانات اولیه برای احداث توالت صحرایی و مراجعته به موقع به خانه‌های بهداشتی و استفاده صحیح از کارت رشد و توجه ویژه به واکسیناسیون اطفال خلاصه شده بود.

و در مورد مراقبت‌های تغذیه‌ای به موارد متعددی در برنامه‌ریزی آموزشی توجه نمودیم که از آن جمله‌اند: رعایت بهداشت فردی و بهداشت مواد اولیه و نگهداری صحیح مواد غذایی که رعایت آن‌ها در تهیه یک غذای سالم ضروری است، کوتاه‌تر شدن فاصله تولد کودک تا آغاز تغذیه با شیرمادر، روش‌های صحیح در آغوش گرفتن کودک و شیر دادن او، طول مدت شیر دادن در هر وعده و تکرار آن، استفاده به موقع از تغذیه تکمیلی، روش تهیه غذای مکمل، استفاده صحیح از گروههای مواد غذایی در تهیه غذای کودک و خانواده، آموزش راههای ساده و ارزان در تهیه غذای مناسب و توجه به روش‌هایی که در تهیه غذا وقت کم‌تری را نیاز داشته باشد، توجه به کمیت و کیفیت غذای خورده شده توسط کودک، داشتن حوصله و

مهم‌ترین مرکز فراگیری و انتقال فرهنگ و سنت‌ها از نسلی به نسل دیگر است.^(۸)

مواد و روش‌ها

این مطالعه یک بررسی مداخله‌ای- تجربی (Interventional) با روش کارآزمایی میدانی (Field Trial) است که چهار طایفه از عشاير قشقایی فارس، شامل ۱۴۱ خانوار عشايري را در بر می‌گيرد. نمونه‌گيری به روش تصادفي طبقه‌بندی شده بود که در هر طبقه (در اينجا هر طایفه يك طبقه است). به نسبت جمعيت و به طور تصادفي، تيره‌ها (به عنوان خوشة) انتخاب شدند و كل خانوار هر خوشة در تيره‌های مذکور مورد مطالعه قرار گرفتند.

برای بررسی مصرف مواد غذایی در نمونه مورد مطالعه از "پرسش نامه‌های ۲۴ ساعت یاد آمد خوراک" استفاده شد و اندازه‌گیری غذای ذکر شده با ترازوی آشپزخانه انجام گرفت. سپس به کمک جدول ترکیبات موادغذایی، غذاهای ثبت شده، آنالیز گردید.^(۹،۱۰) وزن افراد با ترازوی عقربه ای آلمانی و قد افراد با متر ایستاده 208 secā اندازه گیری شد. تقسیم کار در جامعه ایلی را بر اساس نظر دکتر امان الله^(۸) قرار داده و کالری لازم برای انجام این کارها را محاسبه نمودیم. میزان انرژی مصرفی در طی فعالیت‌های مختلف با استفاده از جداول کتاب اصول تنظیم برنامه‌های غذایی به دست آمد.^(۱۱) مقایسه شاخص توده‌بدنی افراد و تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه قبل و بعد از مداخله آموزشی با روش آماری Mc Nemar انجام گرفت. برای آموزش به مادران عشايري، طرحی به کار گرفته شد که توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارائه و توسط مجری طرح تکمیل گردید.

محتوای آموزشی
در برنامه آموزشی حاضر دو بخش اصلی از رفتارهای

كتاب، جزوه آموزشی، مسیر دسترسی به خانوار عشايري و كيف كمك های اوليه به عنوان عوامل قادر كننده مورد توجه بود. حضور رابطين بهداشتی كه خود مفاهيم بهداشتی را ياد گرفته و باور كرده باشند در جمع خانوار عشايري به طور مستمر برآگاهي و نگرش اعضای خانوار اثر نهاده و منجر به جلب حمایت های مالي خانوار برای اجرای امور بهداشتی جاري مثل ايجاد يك مخزن آب محفوظ، ايجاد مسیر معين برای مازاد آب های مصرفي روزانه و دفن زباله های غذائي خواهد شد. پس از سپری شدن دوره يك ساله آموزش، مجری طرح، سه ماه خانواده های مورد آموزش را به حال خود گذاشت و سپس از مرآقین کودکان (مادران، مادر بزرگ ها و دختران بزرگ خانواده) با استفاده از پرسشنامه و به شکل چهره به چهره، آزمون دانش تغذیه ای و تست ليکرت را به عمل آورد. پرسشنامه ها نخست در مطالعه مقدماتی به کار رفته و پاسخ های ذکر شده در ذيل هر پرسشن با روش بحث گروهی (Focus Group Discussion) جست و جو و پس از ويراستاري ثبت شده است. روایي و پایايسی پرسشنامه های طرح که دانش و نگرش افراد را می سنجند در آغاز طرح با روش Split Half Correlation Coeficient گرفت (۱۲). ولی اثر آموزش را در نمرات دانش و نگرش جستجو نکرده ايم، بلکه تغييرات رشد در کودکان زير ۶ سال و تغييرات شاخص توده بدنی بزرگسالان را به عنوان تأثير آموزش در تغيير رفتار بهداشتی و تغذیه ای خانوار عشايري در نظر گرفته و گزارش کرده ايم.

شاخص توده بدنی بالاتر از ۲۶ را دليل افرايش وزن و نوعی اختلال تغذیه ای و کم تر از ۱۷ را ضعف و سوء تغذیه شدید در نظر گرفته ايم. وزن برای سن کم تر از ۸۰ درصد جدول NCHS را کمبود وزن و قد برای سن کم تر از ۹۰ درصد NCHS را کاهش رشد و جمع اين

وقت در هنگام خوراک دادن به کودکان زير پنج سال، توجه به اشتهاي آنها و دلail احتمالي کمي اشتها در آنها، توجه به زمان و مكان تغذیه کودکان فوق و فراهم کردن اين امكان که کودک در هنگام گرسنگي بتواند احساس خود را بيان کند، داشتن رابطه عاطفي و دوستانه با کودکان به خصوص هنگام غذا خوردن، صحبت کردن با زبان کودکانه و بازي کردن برای جلب توجه آنها به غذا، همه در برنامه ريزی آموزشی ما گنجانده شده بود. برای همه اعضاء خانواده نيز آموزش هايي در نظر گرفته شده بود. توجه به به وزن و قد و شاخص توده بدنی زنان موجود در خانه يا مراقب مستقيم کودک، توجه دادن اعضاء خانواده به ميزان نياز زنان و کودکان به انرژي و پروتئين، مشاغل و گرفتاري های زنان به خصوص زنان باردار و شير ده، اطلاق رفتار عمومي با زنان و کودکان برای پرهيز از خشونت های رايچ در زندگي ايلى و مواردي که در هنگام آموزش در هر تيره و گروه، ضرورتش احساس می شد هم در محتواي مطالب آموزشی ما گنجانيده شده بود. اين مطالب نخست در مدت ۱۰ روز به ۳۰ دختر عشايري با سعاد حدود ديلم و داوطلب عضويت در گروه رابطين بهداشت عشايري آموزش داده شدند. آنها موظف شدند اين آموزش ها را در مدت يك سال زير نظر مجری طرح و با همکاري معلمین عشايري به خانواده خود و چند خانواری که در نزديكي آنها چادر می زندند انتقال دهند. در اين آموزش چگونگي جمع آوري مشارکت مردمي برای انجام ضرورت های بهداشتی نيز مورد توجه قرار داشت. در انتخاب داوطلبين دقت شد که دختر عشايري دعوت شده به اردوی آموزشی واقعاً داوطلب باشد. و هيچگونه قول یا وعده استخدام یا حقوق و حتی کار مزد به آنها داده نشد. همه هنجراهای اجتماعی و عوامل صاحب نفوذ مثل معلمین عشايري، افراد با نفوذ محلی در نظر گرفته شد.

جدول شماره ۱: خلاصه اطلاعات مربوط به خانوارهای مورد بررسی
(عشایر قشقایی) (۱۳۸۰)

کودکان زیر ۶ سال	شیرده	کودکان	باردار	زن بالای ۶ سال	مرد بالای ۶ سال	افراد ≥۶	تعداد	خانوار							
								طایفه		خانوار		نفر		تعداد	
								تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	نفر	نفر	نفر	نفر
۳۴	۲	۱۱	۱۲۱	۹۳	۲۱۴	۴۰	۴۰								
۲۵	۱۳	۲	۱۰۳	۲۲۲	۴۲										
۳۷	۹	۸	۱۲۶	۹۱	۲۱۷	۳۲									
۴۰	۶	۱۲	۱۲۰	۹۴	۲۱۴	۲۷									
۱۴۶	۳۰	۳۳	۴۹۶	۳۸۱	۸۷۷	۱۴۱	کل								

۲۹۶ نفر از زن‌ها بالای ۱۵ سال سن داشتند، ۲۰۷ نفر آن‌ها متاهل، ۳۳ نفر باردار و ۳۰ نفر شیرده بودند. ۴۹۶ زن و دختر بالای ۶ سال داشتند که ۱۳۲ نفر در حد دبستان، ۵۶ نفر در حد راهنمایی و ۷ نفر در حد دبیرستان، سواد داشتند و ۶۱ درصد کل زنان و دختران بالای شش سال، بی‌سواد بودند (جدول شماره ۲). انرژی متوسط لازم برای انجام کارهایی که فقط زنان به عهده دارند ۱۲۷۰ کالری محاسبه گردید. سهم زنان در کارهایی که زن و مرد با مشارکت هم انجام می‌دهند ۷۹۰ کالری محاسبه شد و میانگین انرژی لازم برای کارهایی که منحصراً مردان انجام می‌دهند ۸۳۰ کالری بود. مصرف کالری سرانه خانوار با "پرسشنامه ۲۴ ساعت یاد آمد

دو کمبود را ملاک تشخیص سوء تغذیه شدید در کودکان زیر ۶ سال قرار داده‌ایم (۱۳).

عوامل مداخله گر مثل خشکسالی که بر تولید مواد غذایی اصلی عشاير یعنی شیر و گوشت اثر می‌گذارد، و فصل‌های بهار و تابستان که عشاير دسترسی بیشتری به لبیات و میوه دارند، در برابر پاییز و زمستان که دسترسی آن‌ها به لبیات و میوه کم‌تر است، در نظر گرفته شد. شرایط بارش باران قبل و بعد از مطالعه یکسال بود و دوره مطالعه یکسال در نظر گرفته شد و هر دو بار اندازه‌گیری آنتروپومتری در اواسط تابستان انجام گرفت، تا اثر فصول حذف شود.

یافته‌ها

از بین چهار طایفه از ایل قشقایی فارس به نسبت جمعیت، ۱۴۱ خانوار را به طور تصادفی انتخاب نمودیم. ۴۰ خانوار از طایفه عمله، ۴۲ خانوار شش بلوکی، ۳۲ خانوار کشکولی و ۲۷ خانوار از فارسیمان‌ها در نمونه ما قرار گرفتند. حجم نمونه ۸۷۷ نفر شامل ۴۹۶ زن و دختر و ۳۸۱ مرد و پسر گردید (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۲: توزیع میزان سواد در خانوارهای مورد بررسی (عشایر قشقایی) (۱۳۸۰)

جمع	دبيرستان و دپلم	راهنمایی	دبستان	بسواد	سواد		طوابیف
					تعداد(درصد)	تعداد(درصد)	
۹۳ (۲۴/۴)	۷	۱۵	۲۵	۴۶	مرد	مرد	عمله
۱۲۱ (۴۴/۴)	۳	۷	۴۰	۷۱	زن	زن	
۱۰۳ (۲۷/۱)	۵	۱۲	۳۲	۵۴	مرد	مرد	شش بلوکی
۱۲۹ (۲۶)	۲	۱۸	۳۶	۷۳	زن	زن	
۹۱ (۲۳/۹)	۸	۸	۲۳	۵۲	مرد	مرد	کشکولی
۱۲۶ (۲۵/۴)	-	۱۵	۳۲	۷۹	زن	زن	
۹۴ (۲۴/۶)	۵	۷	۱۲	۷۰	مرد	مرد	فارسیمان
۱۲۰ (۲۴/۲)	۲	۱۶	۲۴	۷۸	زن	زن	
۳۸۱ (۱۰۰)	۲۵ (۷)	۴۲ (۱۱)	۹۲ (۲۴)	۲۲۲ (۵۸)	مرد	مرد	کل
۴۹۶ (۱۰۰)	۷ (۱)	۵۶ (۱۱)	۱۳۲ (۲۷)	۳۰۱ (۶۱)	زن	زن	

از ۱۴۶ نفر کودک زیر ۶ سال، ۲۹ نفر (۲۰ درصد) سوء تغذیه شدید، ۲۱ نفر (۱۴ درصد) کاهش رشد، ۳۰ نفر (۲۱ درصد) لاغری و ۶۶ نفر (۴۵ درصد) وضعیت طبیعی داشتند. دختران به ترتیب با ۱۸ و ۱۵ و ۲۳ درصد، سوء تغذیه شدید، کاهش رشد و لاغری، وضعیت رشد بدتری از پسران داشتند. بعد از آموزش مادران به کمک رابطین بهداشتی، نتایج فوق بهبود یافته و همان گونه که در جدول شماره ۴ ملاحظه می شود تغییرات، معنی دار ($p < 0.05$) و قابل تأمل هستند.

بحث

مردان عشايری به دلیل محدود شدن کار چوپانی، کارگری، فعالیت در مدیریت طایفه و تیره، کشیک شبانه، شکار و داد و ستد خودرو برای رفت و آمد ها به اثری کمتری نسبت به گذشته احتیاج دارند و چون رسم قدیم عشاير و ایلات در احترام فوق العاده به مرد و مهمانها يش همچنان باقی است، مصرف مواد غذایی در بین مردان بیش از حد نیاز است و ۳۰ درصد شاخص توده بدنی بالاتر یا مساوی ۲۶، نتیجه همین تغییرات و تفاوت ها است. از طرفی فعالیت زنان به دلیل افزایش تنگناهای اقتصادی افزون گشته است. در نمونه مورد مطالعه، زنان روزانه حداقل به ۲۰۰۰ کالری نیاز دارند؛ در حالی که حدوداً ۱۵۰۰ کالری بیشتر دریافت نمی کنند. شاید به همین دلیل ۱۷ درصد زنان شاخص توده بدنی کمتر یا مساوی ۱۷

خواراک" ۳۰۵۴ کالری برآورد گردید. مردان ۳۳۰۰ کالری، زنان ۱۵۰۰ کالری و سرانه مصرف سایر اعضاء ۱۸۶۰ کالری تعیین شد و مقدار قابل توجهی از سبد غذایی آنها سهم مرغها و سگهای ایل می گردید. مردان به دلیل محدود شدن کار چوپانی، کارگری، مدیریت طایفه و تیره، کشیک شبانه، شکار و داد و ستد از طرفی و بالا بودن سهم مردان و مهمانها از سهم غذای روزانه خانوار، افزایش وزن دارند و زنان به دلیل کاهش در آمد و افزایش تلاش برای تامین حداقل نیاز فرزندان، اثری بیشتری مصرف می کنند و کاهش وزن دارند. در صد سوء تغذیه کودکان زیر ۶ سال عشاير مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله آموزشی، اختلاف معنی داری را نشان می دهد ($P < 0.05$)؛ گرچه هنوز از درصد کودکان چهار سوء تغذیه استان فارس بیشتر است. قبل از شروع برنامه آموزشی ۲۶ نفر (۳۰ درصد) از مردان و ۹ نفر (۶ درصد) از زنان شاخص توده بدنی (BMI) بالاتر یا مساوی ۲۶ داشتند و ۲۵ نفر (۱۷ درصد) از زنان کمتر یا مساوی ۱۷ داشتند (جدول شماره ۳).

جدول شماره ۳: مقایسه شاخص توده بدنی افراد بالای ۲۵ سال قبل و بعد از مطالعه

مرحله	شاخص					
	بالاتر یا مساوی با ۲۶		کمتر از ۲۶ و بیشتر از ۱۷		کمتر از ۱۷	
	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)
قبل از آموزش	۲۵ (۱۰)	۷۷ (۷۵)	۳۵ (۱۵)	۲۶ (۱۰)	۱۷ (۱۷)	۱۷ (۱۷)
بعد از آموزش	۱۷ (۷)	۲۰۱ (۸۵)	۹۱ (۱۸)	۲۰۱ (۱۰)	۱۷ (۷)	۲۰۱ (۱۰)
P.V.	—	۰/۰۰۵	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	—	—

جدول شماره ۴: مقایسه درصد سوء تغذیه کودکان زیر ۶ سال قبل و بعد از مطالعه

مرحله	وضعیت سوء تغذیه					
	سوء تغذیه شدید	سوء تغذیه متوسط	سوء تغذیه نماینده	کاهش رشد	کمبود وزن	تجذیه خوب
تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)
قبل از آموزش	۲۹ (۲۰)	۱۹ (۱۳)	۲۱ (۱۴)	۳۰ (۲۱)	۶۶ (۴۵)	۱۴۶ (۱۰۰)
بعد از آموزش	۱۹ (۱۳)	۲۱ (۱۱)	۱۶ (۱۱)	۹ (۱۳)	۹۲ (۶۳)	۱۴۶ (۱۰۰)
P.V.	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۲۶	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	—

زنان علاوه بر خانه‌داری و مراقبت از کودکان، کشاورزی بوده است (۱۷).

زنان جامعه مورد مطالعه ما از نظر سوء تغذیه و شاخص توده‌بدنی، وضعیتی تقریباً مشابه این جوامع داشته‌اند. با ادامه آموزش‌های تغذیه که توسط مجری طرح و رابطین بهداشتی تکرار می‌گردید، غذای مادران در این جامعه با وجود تداوم شرایط فقر از کیفیت بهتری برخوردار شد، زیرا تغییرات لازم در روش‌های آماده‌سازی، پخت و نگهداری مواد غذایی در عمل، مورد قبول آن‌ها واقع شده و به مورد اجرا گذاشته شده بود. یافته‌های ما نشان می‌دهد که آموزش بهداشت و تغذیه به مادران، بدون همراه نمودن هزینه اضافی منجر به بهبود شاخص‌های رشد کودکان می‌گردد. اما برای رساندن کودکان به رشد متناسب با سن آن‌ها باید در وضعیت اقتصادی آن‌ها تغییراتی حاصل شده و بیش از آنچه تا کنون در آموزش مادران و پدران این جامعه کارشده است، تلاش صورت پذیرد. اندازه و طبیعت رشد در جامعه مورد مطالعه پس از یک سال تلاش آموزشی تیم تحقیق، اندکی بهتر از یافته‌های دیگر کشورهایی است که آموزش تغذیه در آن‌ها بدون استفاده از دیگر تعاملات، تنظیم شده است (۱۸). یک سال بعد از انجام یک برنامه آموزشی دراندونزی متوجه شدند بچه‌های ۵ تا ۲۴ ماهه خانواده‌های تحت آموزش از رشد بهتری برخوردار بودند. کودکان مذکور $SD = 0.5$ معادل یک کیلوگرم از کودکانی که خانواده‌های آن‌ها تحت آموزش نبودند، سنگین‌تر شده بودند. با این وجود همبستگی مثبتی بین نمرات آموزشی و شاخص قد برای سن ملاحظه نشد (۱۹). به عنوان مثال در یک بررسی، مداخله‌های تغذیه‌ای در جمعیت دانش‌آموزی دارای قد طبیعی و بالاتر از میانگین، هیچ گونه تأثیری را بر روی وزن در ارتباط با قد و محیط بازو نشان نداد، در حالی

داشته‌اند. وجود ۲۰ درصد سوء تغذیه شدید در بین کودکان زیر ۶ سال جامعه مورد مطالعه، آموزش همه و به خصوص بالاتربودن نرخ سوء تغذیه در بین دختران نسبت به پسران، آموزش همه جانبه و گسترش فرهنگ تغذیه و بهداشت را شدیداً ضروری ساخته است. با توجه به نقش مهم زنان در ایل، ما اجرای همه جانبه طرح رابطین بهداشت عشايری را برای به کارگیری نیروی بالقوه زنان عشايری پیشنهاد می‌نماییم. رابطین بهداشت که در این طرح ما را همراهی می‌کردند در مدت کمی که از پایان آموزش گذشته بود، توانستند محیط زندگی و باورها و بیش‌های خانوار خود و اطراف خود را نسبت به موضوعات بهداشتی تغییر دهند. تفاوت عمده این طرح با سایر طرح‌های آموزشی در به کارگیری روش‌های آموزش بهداشت است. در این روش‌ها به شش مرحله آگاهی، باور، هنجارهای اجتماعی و عوامل قادر کننده، توجه شده و بر آگاهی و باور رابطین بهداشتی عشاير در مدت نسبتاً مناسب آموزشی، تاثیر عمیق نهاده شده است.

مطالعات متعددی در جوامع در حال توسعه نشان داده‌اند که کوتاه قدمی تغذیه‌ای (Stunting) و شاخص توده‌بدنی کمتر از $18/5$ که به عنوان سوء تغذیه مزمن و کمبود انرژی شناخته می‌شوند در ۴۰ درصد زنان جنوب و حنوب شرقی آسیا دیده می‌شود (۱۵، ۱۶). مطالعات دیگر نشان داده‌اند که زنان با $BMI < 18/5$ با توان کمتری موفق به حل مشکلات خود و خانواده بوده‌اند (۱۶). در اتیوپی ۲۷ درصد زنان شیرده $BMI < 18/5$ با توان کمتری میانگین BMI زنان مسلمان سری لانکا 21 ± 3 بوده که ۱۲ درصد آن‌ها شاخص توده‌بدنی زیر ۱۷ و حدود ۱۸ درصد بین ۱۸/۵ و ۱۷ داشته‌اند (۱۷). یک چهارم زنان مورد مطالعه در ویتنام سوء تغذیه داشته‌اند و ۲۹ درصد آن‌ها BMI کمتر از $18/5$ را نشان داده‌اند. کار عمده این

خانواده در اجرای طرح برخوردار گردید. این دختران آموزش دیده و داوطلب تا پایان دوره طرح با ما بودند و پس از آن نیز با ادامه دوره های مقدماتی و تکمیلی بر تعدادشان افزوده شد، تا در آینده همه خانوار عشايری از آموزش ها و خدمات آنان برخوردار شوند.

سپاسگزاری

در موفقیت این طرح، همراهی و همکاری معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کارشناسان جدی، با سواد و پی گیر مرکز بهداشت استان فارس و تلاش عالمانه و صادقانه اداره تغذیه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، را باید مد نظر داشت. بدین وسیله از همه این عزیزان و کسانی که نام برده نشده، صمیمانه سپاسگزاری می شود.

که در دانش آموزانی که دچار کوتاه قدمی تغذیه ای بودند، بسیار موثر بود (۲۰). با این وجود ما متوجه شدیم مادران به سختی تن به تغییر عادات غذایی خود می دهنند. از این رو ابتدا به دختران تحصیل کرده که داوطلبانه حاضر به همکاری با طرح بودند دریک دوره ۱۰ روزه مقدماتی و سپس در یک دوره ۵ روزه تکمیلی در خصوص ارزش گروه های غذایی، ضرورت کاربرد همه این گروه ها در غذای روزانه، ارزش تغذیه تکمیلی و روش تهیه سوپ با غلات، حبوبات، سبزیجات و آرد عدس و نگهداری مواد غذایی با توجه به نبودن یخچال در جامعه مورد مطالعه و اصول بهداشت فردی و محیط آموزش داده شد. این دختران در تعلیم مادران خود و خانواده های اطرافشان مارا یاری دادند. آن ها باعث شدند ما ارتباط بسیار خوبی با والدین داشته باشیم و از همکاری اعضاء

فهرست منابع

۷. کیانی منوچهر. سیه چادرها تحقیقی در زندگی مودم ایل قشقایی چاپ دوم. انتشارات کیان نشر ۱۳۷۶.
۸. امان اللهی بهاروند. کوچ نسینی در ایران، پژوهشی درباره عشاير و ایلات چاپ پنجم. بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۱۳۷۸.
۹. غفارپور معصومه، هوشیار راد آناهیتا، کیانفر هایده. راهنمای مقیاس های خاصی ضرایب تبدیل و درصد خوارکی مواد غذایی. نشر علوم کشاورزی ۱۳۷۸.
۱۰. موحدی آریو، روستا رویا. جامول ترکیبات مواد غذایی. چاپ دوم. تهران: انتیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور ۱۳۷۹.
۱۱. میرمیران پروین. اصول تنظیم برنامه های غذایی. چاپ دوم. تهران: بنیاد امور بیماری های خاص چاپ دوم ۱۳۷۹ صفحه ۸۵
۱۲. آ. ان. اپنهایم. طرح پرسشنامه و سنجش تکوش ها ترجمه کریم نیا، مرضیه. چاپ دوم. مشهد: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۵۷.

13. Greeting J. Scherbaum V. " Health and nutrition status on mothers and children under 5 years in the Wolkite, Ethiopia. *Institute of biological and nutrition*, Germany Feb 2001.
14. UN ACC/SCN (Administrative Committee on Coordination/ Subcommittee on Nutrition). 1989. Malnutrition and infection: A review. Nutrition Policy Discussion Paper No. 5. Geneva: *ACC-SCN/International Food Policy Research Institute*.
15. UN ACC/SCN (Administrative Committee on Coordination/ Subcommittee on Nutrition).1992. *Second report on the world nutrition situation*. Volume II, Global and regional results. Geneva: United Nations.
16. Shetty P.S, and W.P.T. James. 1994. Body mass index. A measure of chronic energy deficiency in adults. *FAO Food and Nutrition Paper* 56. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
17. Drink G. Schroeder, Helena Pachon, Kirk A. "An integrate child nutrition intervention improved growth of younger, more malnourished children in northern Viet Nam". *Food and nutrition bulletin*, 2002 Sep 23(4): .
18. Ardyth II, Gillespie, "Communication Theory as a Basis for Nutrition Education." *Supplement to journal of the American Dietetic Association*, 1987;87 B: s.44-s.52.
19. Zeitlin M, Griffithsm, Manoff R. "*House hold evaluation nutrition communication and behavior change component, Indonesian Nutrition Development program*" Vol4. New York: Monoff international Inc, 1984.
20. Zeitlin M, "Upper Volta case study of home based community level weaning food development "*study IV for Mulated foods*. Cambridge, MA: US Agency for international development, 1981.