

شیوع فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در دختران دانشآموز

مدارس راهنمایی شهر ساری در سال ۱۳۸۱

امید عما دیان *

فرشاد نقش وار (M.D.)*

ژیلا ترابی زاده (M.D.)
M.D.)

رضا جهان بخش (M.D.)***

مهرنوش کوثریان (M.D.)**

چکیده

سابقه و هدف : فقر آهن شایع‌ترین کمبود تغذیه‌ای جهان و کشور ایران می‌باشد؛ بخصوص این نگرانی وجود دارد که در نوجوانان دختر، این مشکل تغذیه‌ای باعث عوارضی مانند اختلال یادگیری و کم خونی شود. تحقیق حاضر به منظور تعیین شیوع فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در دختران دانشآموز مدارس راهنمایی شهر ساری انجام شد.

مواد و روش‌ها : تحقیق به روش توصیفی انجام شد. ۹۲۰ دانشآموز به روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پس از توضیح و کسب مجوز، اطلاعات دموگرافیک پرسیده و ثبت شد و از هر نمونه ۷ سی خون جهت بررسی شمارش کامل گلوبولی (CBC)، لام خون محیطی، آهن سرم، ظرفیت کلی آهن متصل شونده (TIBC) گرفته شد. آزمایش‌ها به روش‌ها استاندارد انجام شد. درصد اشباع ترانسферین (TS) محاسبه گردید.

دانشآموزان با هموگلوبین کمتر از ۱۱/۵ گرم در دسی‌لیتر یا همان‌توکریت کمتر از ۳۴ درصد، کم خون و افراد با TS کمتر از ۱۶ درصد یا فریتین کمتر از ۱۲ میکروگرم در دسی‌لیتر، مبتلا به فقر آهن در نظر گرفته شدند. دانشآموزانی که دارای معیارهای فقر آهن تومام با کم خونی بودند، مبتلا به کم خونی فقر آهن تشخیص داده شدند. حداقل و حداکثر شیوع به دست آمده با اطمینان ۹۵ درصد (CI 95) برای جوامع مشابه محاسبه گردید.

یافته‌ها : ۸۸۱ نفر همکاری نمودند. شیوع کم خونی (۹/۲۴-۵/۷۶) ۷/۵ درصد، فقر آهن (۳۷/۱-۳۱/۹) ۳۴ درصد و کم خونی فقر آهن (۳/۵۳-۱/۱۴) ۲/۵ درصد به دست آمد. شیوع فقر آهن و کم خونی در دانشآموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی مشابه بود.

استنتاج : با توجه به شیوع زیاد فقر آهن، مطالعاتی برای تاثیر و باصره‌بودن تجویز سولفات آهن به منظور پیش‌گیری از کم خونی توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی : فقر آهن، کم خونی فقر آهن، دختران نوجوان

* این تحقیق طی شماره ۲۹-۸۱ در شورای پژوهشی دانشگاه ثبت شده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است.

** متخصص پاتولوژی، عضو هیأت علمی (استادیار) دانشگاه علوم پزشکی مازندران

*** ساری: بلوار امیر مازندرانی - مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

**** فوق تخصص غدد اطفال، عضو هیأت علمی (دانشیار) دانشگاه علوم پزشکی مازندران

***** دستیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

† تاریخ دریافت: ۸۲/۱۰/۱ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۸۲/۱۲/۳ تاریخ تصویب: ۸۳/۳/۱۳

مقدمه

سال ۱۳۷۴ شیوع کم خونی فقر آهن در استان مازندران ۱۸ درصد اعلام شده، ولی به تفکیک شهرستانها و یا بر حسب سن و جنس گزارش نشده است^(۹). آخرین بررسی با عنوان بررسی ریزمغذی های آهن روی ویتامین A و D در استان های مختلف کشور در سال ۱۳۸۱ انجام شده است که نتایج آن هنوز منتشر نشده است. تحقیقات استانی دیگری هم انجام شده است^{(۹) تا ۱۴}. به منظور بررسی دقیق تر شیوع فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در شهر ساری، مطالعه اخیر در سال ۱۳۸۱ بر روی دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه شهر ساری انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه به روش توصیفی انجام شد. تعداد نمونه با احتمال ۳۰ درصد فراوانی فقر آهن با اطمینان ۹۵ درصد و خطای ۳ درصد محاسبه شد. ۹۲۰ دانش آموز به روش تصادفی چند مرحله ای از مدارس راهنمایی دولتی و غیرانتفاعی شهر ساری (به نسب جمعیت دانش آموزان) انتخاب شدند. پس از توضیح طرح و کسب رضایت از هر نمونه، اطلاعات دموگرافیک شامل سن، نوع اداره مدرسه و وضعیت قاعدگی پرسیده و ثبت شد. از هر نمونه ۷ سی سی خون به صورت غیر ناشتا در ساعت ۸ تا ۱۱ صبح جمع آوری شد.

CBC، آهن سرم، TIBC و فریتین سرم به روش های استاندارد اندازه گیری شد^(۱۵). آهن سرم و TIBC به روش کالریمتری و کیت پارس آزمون، توسط دستگاه کوباس میرا ساخت کشور سوئیس و فریتین سرم با روش الیزا با دستگاه الیزامولتی اسکن و توسط کیت ORG از کشور فنلاند مورد سنجش قرار گرفت. درصد اشباع ترانسفرین (TS) با فرمول $\frac{\text{Iron}^{100}}{\text{TIBC}}$ محاسبه شد. دانش آموزانی که دارای همو گلوبین کمتر از ۱۱/۵ یا هماتوکریت کمتر از ۳۴ درصد بودند، کم خون تشخیص داده شدند. افرادی که TS کمتر از ۱۶ درصد

کم خونی از مشکلات شایع کودکان و نوجوانان و کمبود آهن، شایع ترین کمبود تغذیه ای در دنیا می باشد^(۱). به دلیل این که آهن یکی از اجزاء اساسی همو گلوبین، میو گلوبین و بعضی از آنزیم های مهم بدن می باشد، کمبود آن باعث عوارض مختلفی مانند اختلال یادگیری، عالیم کم خونی به درجات مختلف و حتی مرگ زودرس می گردد^{(۱) تا ۵}. شیوع فقر آهن در دنیا بسیار بالا است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که بیشتر مردم جهان دچار فقر آهن هستند و حداقل یک سوم جمعیت جهان (حدود ۲ میلیارد نفر) به دلیل فقر آهن مبتلا به کم خونی می باشند^(۱). در حال حاضر در بعضی کشورها برنامه های غربالگری برای تشخیص زودرس فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در جمعیت های در معرض خطر مانند کودکان و زنان انجام می شود^(۱). اما در صورتی که برنامه غربالگری در این مرحله وجود نداشته باشد، فرد با بروز عالیم کم خونی مانند تپش قلب، تنگی نفس، احساس خستگی و رنگ پریدگی به پزشک مراجعه می کند و پس از انجام شمارش کامل گلبولی و آزمایش های لازم، تشخیص داده می شود و پس از تأیید تشخیص، اقدام به درمان می شود^(۶). در بعضی کشورها به دلیل شیوع زیاد این کمبود تغذیه ای، آهن تکمیلی به مواد غذایی پر مصرف مانند آرد اضافه می شود (آهن یاری)^(۷).

در کشور ایران به منظور پیشگیری از کم خونی فقر آهن، برای کلیه شیرخواران از ۶ تا ۲۴ ماهگی، آهن تکمیلی تجویز می گردد. همچنین خانم های باردار از ماه سوم تا ۳ ماه پس از زایمان، آهن تکمیلی دریافت می کنند^(۸). ولی برنامه غربالگری برای تشخیص فقر آهن و یا کم خونی ناشی از آن وجود ندارد. طرح های کشوری برای تعیین شیوع این اختلال تغذیه ای انجام شده است و نتایج به صورت استانی منتشر شده است؛ به طور مثال در

آهن سرم، TIBC، درصد اشباع ترانسферین و فریتین دانشآموزان در جدول شماره ۱ نشان داده شده است. میانگین آهن سرم، TIBC و فریتین در کل گروه به ترتیب $76/72$ ، $35/2$ ، و 25 میکروگرم در دسی لیتر بود و همچنین میانگین درصد اشباع ترانسفرین کل گروه 22 درصد بود.

شیوع کم خونی $7/5$ درصد و با (درجه اطمینان 95) درصد از $5/76$ تا $9/24$ درصد) برای جوامع مشابه محاسبه شد. 38 درصد دانشآموزان (از $31/9$ تا $37/1$ درصد) دچار فقر آهن بودند. شیوع کم خونی فقر آهن $2/5$ درصد (از $1/47$ تا $3/53$ درصد) محاسبه گردید. شیوع کم خونی و فقر آهن در مدارس دولتی و غیرانتفاعی مشابه بود. همچنین در دخترانی که قاعده می‌شدند ($p=0/34$ ، $t=0/95$) و نمی‌شدند ($p=0/21$ ، $t=1/24$) مشابه بود.

یا فریتین کمتر از 12 میکروگرم در لیتر داشتند، مبتلا به فقر آهن و افرادی که هر دو معیار را داشتند، مبتلا به کم خونی فقر آهن در نظر گرفته شدند. از آمار توصیفی برای نمایش داده‌ها استفاده شد. حداقل و حداکثر شیوع با درجه اطمینان 95 درصد برای جوامع مشابه (CI 95) محاسبه شد.

یافته‌ها

از مجموع 920 دانشآموز انتخاب شده، تعداد 39 نفر ($4/2$ درصد) به علل مختلف، مانند عدم رضایت والدین یا غیبت در روز خون‌گیری حذف شدند. 2 مورد، ابتلا به تالاسمی مژهور مشاهده شد. 801 نفر (87 درصد) در مدارس دولتی و 120 (13 درصد) در مدارس غیرانتفاعی مشغول تحصیل بودند. سن دانشآموزان بین 11 تا 15 سال با متوسط 13 سال بود. قاعده‌گی در 56 درصد دانشآموزان شروع شده بود.

جدول شماره ۱: میزان آهن سرم، TIBC، درصد اشباع ترانسفرین و فریتین در دانشآموزان مدارس راهنمایی دخترانه شهرساری سال تحصیلی $81-82$

سن	آن (میکروگرم در دسی لیتر)	(%) TS	آن (میکروگرم در دسی لیتر)	آن (میکروگرم در دسی لیتر)	فاقد فقر آهن (طبیعی)
$12/9 \pm 0/9$	$25/3 \pm 23/7$	$23/3 \pm 5/1$	$344/6 \pm 20/5$	$79/4 \pm 14$	
$12/9 \pm 0/9$	$22/4 \pm 23/4$	$14/2 \pm 1/6$	$410 \pm 21/9$	$57/7 \pm 2/7$	مبتلا به فقر آهن
NS	NS	$<0/0001$	$<0/0001$	$<0/0001$	P

بحث

به شیرخواران و مادران و کودکان بود⁽¹⁾. همچنین در مطالعه‌هایی که در هند در سال 1994 به عمل آمد، شیوع کم خونی فقر آهن (فریتین زیر 12 میلی‌گرم در دسی لیتر) در دختران و نوجوان زیر 12 سال، 60 درصد گزارش شده است⁽⁷⁾.

این بررسی نشان داد که 34 درصد دانشآموزان مبتلا به فقر آهن هستند. در سال‌های 1988 تا 1994 در سومین بررسی کشوری سلامت در ایالات متحده آمریکا 9 درصد دختران نوجوان 12 تا 15 ساله دچار فقر آهن و 2 درصد، کم خونی فقر آهن بودند. این آمار پس از توصیه‌های انجمن کودکان آمریکا برای اضافه کردن آهن به شیر خشک و تجویز آهن تكمیلی (از سال 1975)

هموگلوبین کمتر از ۱۱/۰ gm/dl ، هماتوکریت کمتر از ۳۴ درصد برای دختران کمتر از ۱۵ سال و هموگلوبین کمتر از ۱۲ gm/dl و یا هماتوکریت کمتر از ۳۶ درصد برای دختران بزرگتر از ۱۵ سال. همچنین براساس شاخص‌های MCH, MCV, MCHC به ترتیب مقادیر کمتر از ۸۰ fl و کمتر از ۲۶ pg/cells و ۳۲ ng dl معیار کم خونی بودند. فقر آهن با مقادیر T.S و فریتین به ترتیب کمتر از ۱۶ درصد و ۲۶ pg/dl و ۳۲ ng/dl تعریف گردید. این تفاوت شاید به دلیل سن بالاتر دانش‌آموزان بوده است زیرا قاعده‌گی دخترانی که عادت ماهیانه دارند، بیشتر بوده است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه‌هایی برای پیش‌گیری از کم خونی فقر آهن دارد که شامل تجویز آهن تکمیلی به کلیه شیرخواران ۶ تا ۲۴ ماهه می‌باشد. اما غربالگری برای تشخیص فقر آهن یا کم خونی ناشی از آن در کودکان و نوجوانان وجود ندارد. آکادمی آمریکا توصیه می‌کند که برای تمام جوانان ۱۶ تا ۲۱ ساله هر ساله بررسی آزمایشگاهی برای تشخیص فقر آهن انجام شود(۱۶).


همچنین CDC (مرکز کنترل بیماری‌ها) آمریکا توصیه می‌کند که دختران نوجوان در معرض خطر (کسانی که خون‌ریزی شدید ماهیانه دارند یا آهن رژیم غذایی شان کم است و یا تشخیص قبلی فقر آهن داشته‌اند) هر ساله بررسی شوند و چنانچه در گروه پرخطر نباشند، هر ۵ تا ۱۰ سال بررسی شوند(۱۶). به نظر می‌رسد که انجام برنامه توصیه شده توسط کمیته علمی - کشوری آهن مبنی بر تجویز آهن خوراکی به تمام دختران نوجوان به مدت ۴ ماه در سال نیز بتواند در تخفیف این مشکل نقش داشته باشد.

در یک بررسی که به منظور تعیین اثر بخشی مکمل آهن هفتگی در دو دوره ۱۶ و ۲۰ هفته‌ای در دختران

در کشور ما شیوع فقر آهن در برخی نواحی کشور مانند کرج، جلفا و ورامین ۴۰ تا ۴۴ درصد گزارش شده است که نزدیک به یافته مطالعه حاضر می‌باشد(۱۰). شیوع کم خونی به طور کلی در این بررسی ۷/۵ درصد دیده شد که کمتر از میزان پیش‌بینی شده می‌باشد. این میزان، نزدیک به شیوع کم خونی در کرج (۸/۲) درصد (۱۳) و لی شیوع آن از جلفا (۱۳/۶ درصد) و ورامین (۱۶/۳ درصد) کمتر است(۱۰، ۱۲). این تفاوت ممکن است در نوع تغذیه یا وضعیت اقتصادی- اجتماعی باشد.

کم خونی فقر آهن در این بررسی ۲/۵ درصد و بسیار کمتر از مقدار پیش‌بینی شده بود. علت این پدیده شاید سخت‌گیری در تشخیص کم خونی فقر آهن باشد، چون تمام شاخص‌های کم خونی و کمبود ذخایر آهن باید وجود می‌داشت. همان‌طور که می‌دانیم فریتین، پروتئین است که در شرایط التهاب و عنفونت بالا می‌رود. بنابراین بالاتر بودن آن از سطح تشخیصی، در تمام موارد به علت ذخایر آهن نمی‌باشد.

نتایج بررسی مشابه در کرج، ورامین و جلفا به ترتیب ۷/۲ و ۱۰/۵ و ۱۳/۶ درصد بوده که همگی بیشتر از مطالعه حاضر است(۱۴، ۱۳، ۹) (نمودار شماره ۱). تعریف آن‌ها از کم خونی فقر آهن، کاهش دوشاخص هموگلوبین و هماتوکریت به شرح ذیل بود:



نمودار شماره ۱: مقایسه بررسی شیوع کم خونی فقر آهن در شهرستان‌های جلفا، کرج، ورامین و ساری طی سال‌های ۷۶ تا ۸۱

در حال حاضر اسید فیتیک موجود در نان، مانع جذب آهن می‌شود و بنابراین هزینه‌های غنی‌سازی به هدر می‌رود. ضایعات بالای نان نیز از دیگر عواملی است که مشکل ایجاد می‌کند. با توجه به فقر آهن خفیفی که در دانش‌آموزان مورد بررسی وجود داشته است، لازم است به دیگر استراتژی‌های مبارزه با فقر آهن توجه شود. همانند:

- ۱) کمتر مصرف شدن غذاهای کم‌ارزش مانند نوشابه‌های گازدار
- ۲) خودداری از مصرف چای همراه غذا و یا بلا فاصله پس از آن
- ۳) آموزش مصرف غذاهای سرشار از آهن
- ۴) درمان مشکلات لثه
- ۵) درمان عفونت‌های انگلی با توجه به شیوع کرم‌های قلاب‌دار در منطقه

سپاسگزاری

در پایان از معاونت محترم پژوهشی و بهداشتی دانشگاه، از مسؤولین آموزش و پرورش ناحیه ۲۱ شهرستان ساری، مدیران و معاونین مدارس راهنمایی و دانش‌آموزان مدارس راهنمایی تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

دانش‌آموز دیبرستان منطقه ساوجبلاغ صورت گرفت، تجویز آهن سبب بهبود ذخایر آن در بدن و افزایش هموگلوبین شد و محققین دوره ۱۶ هفتاهی را توصیه نمودند (۱۰). همچنین بهدلیل تاثیر اسید فولیک بر پیش‌گیری از نقایص لوله عصبی، WHO توام شدن اسید فولیک با آهن را توصیه می‌کند (۱۰). البته برخی این مداخله را برای کل جمعیت مقرون به صرفه نمی‌دانند و فقط برای گروه‌های پرخطر شامل مادرانی که سابقه زایمان نوزاد چهار نقایص لوله عصبی دارند، توصیه می‌کنند (۱۰).

در پایش این طرح باید مسأله تمکین یا پذیرش (Compliance) را در نظر داشت. زیرا عوارض گوارشی آهن و تجربه‌ای که با خانم‌های باردار در مورد قرص‌های سولفات آهن وجود دارد، نشانگر همکاری ضعیف این گروه است (۱۰).

بنابراین باید به جنبه‌های دیگر برنامه توجه نمود؛ به طور مثال از استراتژی‌های دیگر، برنامه کشوری غنی‌سازی آرد می‌باشد که از سال ۱۹۷۰ در کشورهای مختلف بررسی شد. ارجحیت این برنامه نسبت به برنامه آهن یاری، همکاری جمعیت هدف می‌باشد. اما اضافه کردن آهن به آرد نیز مشکلات دیگری دارد که از آن جمله، اضافه کردن جوش‌شیرین برای تهیه خمیر می‌باشد. چنانچه خمیر با مایه خمیر آماده شود، آهن موجود در گندم و یا آهن اضافه شده، قابل جذب می‌گردد. ولی

فهرست منابع

1. Wu AC, Lesperance L, Bernstein H. "Screening for iron deficiency" *Pediatrics in Review*, 2002; 23(5): 171-177.
2. Lozoff B, Jimenez E, Hagen J. "Poor behaveral and development outcome more than 10 years after treatment for
- Iran defiemcy in infancy", *Pediatrics* 2000; 105: 1.
3. Bruner AB, Joffe A, Duggan AK. "Ranobmised study of cognitive effect of iron supplementation in non-anaemic iron-deficiemnt adolescent girls", *Lancet* 1996; 348: 992.

4. Weatherall DJ, Kwiatkowski D. "Hematologic disorders of children in development countries" *The Ped clin of north America* Dec 2002; 49(6): 1149-1164.
5. Lozzoff B, Wolf AW, Yimenez E. "Iron-deficiency anemia and infant development" Effects of extended oral iron therapy. *J pediatr* 1996; 129: 302.
6. Segel GB, Hirsh MC, Feig S.A. "Managing anemia in podiatric office practice: part I" *Pediatrics in Review*. 2002; 23(3): 75-84.
7. Vasanthi GGg, Pawashe AABB, Susie H, Sujatha T, Ramann L. Iron nutritional status of adolescent girls from rural area and slum. *Indian-pediatr.* feb 1994; 31(2): 127-32.
۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت بهداشتی. *مجموعه آموزش پیشگیری و کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن*. ۱۳۷۵-۱۳۷۶. صفحات ۱۵-۱.
۹. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت سلامت. دفتر بهبود تغذیه جامعه. *مجموعه آموزشی تغذیه*. چاپ دوم انتشارات آررویچ -۱۳۸۲. صفحات ۷۱-۷۸.
۱۰. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. کمیته علمی - کشوری آهن. *برنامه آهن یاری گروههای در معرض خطر کم خونی فقر آهن*. تیرماه ۱۳۸۲. صفحه ۳.
۱۱. نژاد امیر هوشنگ، عسکری محسن، ولایی ناصر، فولادی مقدم عاطفه، شمس عطاالله. «بررسی
- فقر آهن، کم خونی فقر آهن در دانشآموزان دیبرستانی منطقه ورامین ۷۸-۷۷» *پایان نامه* پژوهشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
۱۲. منتظری فر ف، کیمیاگر م. «بررسی اپیدمیولوژیک کم خونی و کمبود در دختران دانشآموز مدارس راهنمایی و دیبرستانهای شهر زاهدان» *پایان نامه* کارشناسی ارشد تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۷۵-۷۶.
۱۳. پورقاسم گرگری، کیمیاگر ب. «بررسی شیوع فقر آهن، کم خونی و کم خونی فقر آهن در دانشآموزان دیبرستان شهرستان جلفا در سال ۱۳۷۶ و تأثیر سولفات آهن بر شاخصهای خونی و روی سرم» *پایان نامه* کارشناسی ارشد علوم تغذیه و صنایع غذایی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۷۶-۷۷.
۱۴. خدادادی مقدم. «بررسی فقر آهن، کم خونی و کم خونی فقر آهن در دانشآموزان دیبرستان شهر کرج و تأثیر سولفات فر بر شاخصهای خونی و بیوشیمیایی و روی سرم» *پایان نامه* کارشناسی ارشد علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۷۸.
15. Henry I.B. "Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods". 12th edition, Philadelphia: W.B. Saunders company. 2001: 187-191.
16. CDC. Recommendations to prevent and control iron deficiency in the United States. MMWR Morbid Mortal wkly Rep. 1998; 47: 1-36.