

دقت سونوگرافی جهت تخمین وزن هنگام تولد

هادی مجیدی(M.D.)** رضا علی محمدپور تهمتن(Ph.D.)***
انسیه فولادی(M.Sc.)**** کبری زارع(M.Sc.)*****

صغیری خانی(M.Sc.)+
روح الله عبدي(M.D.)****

چکیده

سابقه و هدف: تخمین سونوگرافیک وزن جنین، به طور وسیعی در تصمیم‌گیری‌های بالینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرمول‌های ریاضی زیادی برای تخمین وزن مورد استفاده قرار می‌گیرد و از پارامترهای متعددی جهت این کار استفاده می‌کنند. یکی از رایج‌ترین فرمول‌هایی که استفاده می‌شود فرمول هدلک (Hadlock) است که گفته می‌شود اواخر سه ماهه سوم بارداری دارای دقیق‌تر است. ولی در پژوهش‌های مختلف دقیق آن بسیار متفاوت گزارش شده است. حتی گفته شده برای تخمین وزن غیرطبیعی جنین از دقیق‌تر کمی برخوردار است. این پژوهش به منظور تعیین دقیق سونوگرافی جهت تخمین وزن هنگام تولد جنین‌های کوچک و بزرگ برای سن بارداری انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش به روش تعیین قدرت تشخیصی آزمون از سال 1379 لغاًیت 1383 بر روی 174 زن باردار با حاملگی تک قلو و کیسه آب سالم که در بخش زایشگاه بیمارستان امام خمینی ساری بستره شده بودند، انجام شد. نمونه‌ها پس از بستره به بخش سونوگرافی اعزام و تخمین وزن جنین توسط یک سونولوژیست صورت می‌گرفت. سپس مادر به زایشگاه انتقال یافته و تا انجام زایمان مراقبت‌های لازم صورت می‌گرفت. بلافاصله پس از زایمان همه نوزادان به وسیله یک ترازوی دقیق وزن می‌شدند. سپس به وسیله تعیین شدت همبستگی و آزمون تی زوج (Paired t Test)، ضریب توافقی کنداول تاو (Kendal-Tau) و رگرسیون چندگانه دقیق سونوگرافی جهت تخمین وزن هنگام تولد تعیین گردید.

یافته‌ها: تغییرات وزن تخمینی به وسیله سونوگرافی با وزن واقعی هنگام تولد (درکل نمونه‌ها) توافق داشت ($P < 0.001$). آزمون تی زوج نیز نشان داد وزن تخمینی به وسیله سونوگرافی با وزن واقعی تفاوت معنیداری ندارد. ولی پس از مطابقت دادن وزن هنگام تولد برای سن حاملگی، مشخص گردید که در گروه SGA (Small for gestational age) و LGA (Large for gestational age) تفاوت معنیداری با وزن تخمینی به وسیله سونوگرافی، وزن واقعی هنگام تولد دارد ($P < 0.001$) در گروه AGA (appropriate for gestational age) سونوگرافی، وزن را بدون اختلاف معنیداری با وزن واقعی هنگام تولد تخمین زده بود.

استنتاج: یافته‌ها نشان داد که دقیق سونوگرافی برای تخمین نوزادان با وزن طبیعی زیاد است، ولی برای تخمین نوزادان با وزن غیرطبیعی، کمتر است. لذا بدین‌وسیله توجه سونولوژیست‌های محترم را جهت پیگیری وزن واقعی نوزاد و مقایسه تخمین خود با وزن واقعی و افزایش مهارت جلب نموده، ضمناً به متخصصین محترم نیز تاکید می‌شود که در تصمیم‌گیری‌های حساس‌هایی صرفاً بر اساس سونوگرافی اقدام ننمایند و انجام پژوهش‌های بیشتر در این راستا توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی : وزن هنگام تولد، اولتراسوند، تخمین

E این تحقیق طی شماره 7-79 در شورای پژوهشی دانشگاه ثبت شده و با همایت مالی دانشگاه علوم پژوهشی مازندران انجام شده است.

* کارشناس ارشد مامائی، عضو هیأت علمی (مرتبه) دانشگاه علوم پژوهشی مازندران + ساری-
بلوار خزر- دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه

** متخصص رادیو لوژی و سونوگرافی (استادیار) دانشگاه علوم پژوهشی مازندران *** متخصص آمار حیاتی، عضو هیأت علمی (استادیار) دانشگاه علوم پژوهشی مازندران

کارشناس مامایی بیمارستان امام خمینی ساری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تاریخ ارجاع جهت اصلاحات : 84/4/5
تاریخ دریافت : 83/12/25
تصویب: 84/4/29

مقدمه

تحمین وزن جنین به وسیله سونوگرافی، اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌های حساس و حیاتی مامایی را تشکیل میدهد از جمله: هنگامی که نیاز به تصمیم‌گیری در مورد قابلیت حیات، سلامت یا بقای جنین باشد، خاتمه حاملگی در موارد محدودیت رشد داخلی (Intra uterine Growth Restriction) (IUGR) و حاملگی‌های عارضه دار مثل پره اکلامپسی، دیابت و... به طور کلی تفاوت زیاد از وزن متوسط جنین برای سن حاملگی یک شاخص مهم برای بیمارگی، میزان مرگ و میر و پیشبینی رشد نوزادی است به عبارتی دیگر اهمیت تخمین وزن جنین از آنجا مشخص می‌شود که ارزیابی دقیق قبل از زایمان از وزن جنین، میتواند برای برقراری یک برنامه درمانی مناسب، جهت به حداقل رساندن میزان بیمارگی و مرگ و میر نوزادی مفید باشد (1-2).

شناصایی جنین‌های ماکروزوم (وزن بیش از 4000 گرم) مهم، است چون رشد بیش از حد جنین، با زایمان طولانی، زایمان همراه با ابزار و جراحی و نیز تروماتیک و همچنین آسیب عصبی جنینی همراه است و یکی از عوارض اصلی حاملگی همراه با دیابت می‌باشد (6-1). شناصایی جنین‌های دارای وزن کم هنگام تولد (LBW)¹ و نیز نوزاد با محدودیت رشد داخلی (IUGR) (وزن کمتر از صد 10 برای سن جنینی) نیز بسیار حائز اهمیت است. زیرا در صورت تشخیص IUGR به حض رسیده بودن جنین باید خاتمه حاملگی صورت گیرد. در صورت عدم رسیدگی جنین نیز کنترل وضعیت به وسیله سونوگرافی، آزمون بدون استرس

مواد و روش‌ها

این تحقیق از نوع تعیین قدرت تشخیصی آزمون است که به منظور سنجش قدرت تشخیصی سونوگرافی جهت تخمین وزن هنگام تولد نوزادان بر روی 174 زن باردار با حاملگی یک قلو که

2. Non Stress Test

3. Head circumference
4. Abdominal circumference
5. Biparietal. Diameter
6. Femur. Length

1. Low. Birth. Weight

سن جنیفی)، 135 نوزاد (6 درصد) طبیعی (وزن بین صدک 10 و صدک 90 برای سن جنیفی) و 27 نوزاد (15/5 درصد) SGA² (وزن زیر صدک 10 برای سن جنیفی) بودند.

تغییرات وزن تخمینی به وسیله سونوگرافی با وزن واقعی هنگام تولد (در کل نمونه ها) توافق داشت ($P < 0.001$) (Kendal Tau = 0/55). آزمون تی زوج نیز نشان داد وزن تخمینی به وسیله سونوگرافی با وزن واقعی تفاوت معنیداری ندارد. ولی پس از مطابقت دادن وزن هنگام تولد برای سن حاملگی، مشخص گردید که درگروه LGA و SGA، وزن تخمینی به وسیله سونوگرافی تفاوت معنیداری با وزن واقعی هنگام تولد دارد (به ترتیب $P < 0.001$ و $P < 0.01$). در گروه AGA و سونوگرافی، وزن را بدون اختلاف معنیداری با وزن واقعی هنگام تولد تخمین زده بود. حساسیت سونوگرافی برای گروه های دارای وزن کم هنگام تولد، وزن طبیعی و ماکروزوم به ترتیب برابر بود با 72/2، 72/9 و 91/9. سونوگرافی در این سه گروه به ترتیب برابر بود با 27/8، 8/1 و 75 درصد. پس از حذف پارامترهایی که با وزن واقعی هنگام تولد، همبستگی نداشتند (مثل سن مادر و تعداد حاملگی)، پارامترهای قطر بین دوپاریتال، دورسر، دورشکم و دور ران اندازه گیری شده به وسیله سونوگرافی و همچنین متغیرهای وزن مادر (MW)⁴ و سن حاملگی (GA)⁵

2. Small. Gestational. age

3. Appropriate for Gestational Age

4. Maternal weight

5. gestational age

از 1378 لغایت 1383 در زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) ساری بستره شده بودند، انجام شد. جهت انجام پژوهش کلیه زنان واجد شرایط که جهت زایمان در زایشگاه بستره بودند، پس از دادن رضایت آگاهانه و نیز بدون پرداخت هزینه اضافی از سوی بیمار به بخش سونوگرافی اعزام و

به وسیله سونولوژیست محترم پارامترهای مختلف از قبیل: قطر بین دو پاریتال، دور سر، دور شکم، طول ران، وزن تخمین زده شد. پس از بازگشت مادر به زایشگاه و سیر مراحل زایمان، بلافاصله پس از زایمان، نوزاد با ترازوی دقیق وزن شد. سپس به وسیله آزمون های آماری تی زوج، ضریب توافقی کن دالتا و Kendal Tau-b (Kendal Tau-b)، تحلیل رگرسیون چندگانه، سنجش حساسیت و ویژگی، میزان دقت سونوگرافی جهت تخمین وزن نوزادان بررسی شد. لازم به توضیح است که سونوگرافها توسط دستگاه GE-a Convex: 305 M.H.z با پروب 200 با استفاده از فرمول هدلاک (Hadlock) انجام شد.

یافته ها

میانگین سنی نمونه ها	24/95±40/59
72/07±11/4 کیلوگرم بوده است.	98/3 درصد نمونه ها خانه دار بودند.
36/8 درصد آنان، تحصیلاتی در حد راهنمایی داشتند.	87/4 درصد آنان اولین زایمان خود را تجربه می کردند و 51/7 درصد آنان 10-14 بار برای دریافت مراقبت قبل از تولد مراجعه کرده بودند.
تعداد 12 نوزاد (6/9 درصد LGA)	(وزن بالای صدک 90 با ری

1. Large. Gestational. age

عمل می‌کنند، انجام نتایج این مطالعات مقایسه شود. در مطالعه لین¹ (1999) نیز توصیه شده است هم روش‌های تشخیصی و هم رویکردهای درمانی به جنین‌های IUGR باید اصلاح شود (10).

یافته‌ها نشان داد سونوگرافی برای تخمین وزن نوزادان AGA، دقیق‌تر از نوزادان SGA و LGA است. درحقیقت هالکومب² و همکاران (2000) مشخص شدکه سونوگرافی در سه ماهه سوم بارداری و استفاده از دور شکم برای تخمین وزن نوزادان LGA دقیق است(16) در حقیقی دیگر سونوگرافی، وزن جنین‌های LGA را به طور معنیداری متفاوت از وزن واقعی تخمین زده بود(4) و محققی دیگر نیز میزان مثبت کاذب تشخیص IUGR را با سونوگرافی بسیار بالا گزارش کرد(8). دلیل این موضوع میتواند ناشی از این عادت باشد که اکثر افراد تمایل دارند معیار اندازه‌گیری شده، غیرطبیعی نباشد. پیشنهاد می‌شود سونولوژیست‌های محترم با برقراری تعامل بیشتر با زایشگاه و اطلاع از وزن واقعی نوزاد، در جهت افزایش دقت خود تلاش نمایند. ضمن این‌که توجیه تعدد درد ستگاه‌ها و فرمول‌ها و افراد در این مورد نیز صدق می‌کند.

یافته‌ها نشان داد حساسیت سونوگرافی جهت تخمین وزن نوزادان طبیعی (92 درصد) بیشتر از حساسیت آن در نوزادان LBW ماکروزوم (25 درصد) و (72/2) درصد بوده است. تعدادی از تحقیقات نیز دقت سونوگرافی جهت شناسایی نوزادان ماکروزوم را کم (17)، و تعدادی دقت آن را زیاد (3)، 5 و 19) گزارش نموده‌اند.

1. Lin
2. Holcomb

جهت پیشگویی وزن هنگام تولد به وسیله تحلیل رگرسیون چندگانه برای ورود در مدل انتخاب شدند، ضرایب رگرسیونی به صورت زیر در معادله رگرسیون حاسبه شد:

$$\text{Y} = -57/14 + 70\text{AC} + 80$$

$$\text{HC} + 9\text{Mw} + 39 \text{ GA} + 16\text{BPD} + 6/8\text{FL}$$

بحث

یافته‌ها نشان داد وزن تخمینی به وسیله سونوگرافی با وزن واقعی هنگام تولد تفاوت معنیداری ندارد. بعضی از حقیقین نشان داده‌اند که سونوگرافی متدهای دقیقی برای تخمین وزن هنگام تولد است(17,16,3).

درحالی که در برخی تحقیقات گزارش شده سونوگرافی روش دقیقی برای تخمین وزن نیست(20-17) به نظر می‌رسد علت تفاوت این یافته‌ها مربوط به تعدد دستگاه‌های سونوگرافی و فرمول‌هایی باشد که به وسیله آن تخمین وزن صورت می‌گیرد (فرمول‌های زیادی جهت تخمین وزن جنین توسط سونوگرافی استفاده می‌شود؛ مثل هدلاک (Hadlock) (با چهار فرمول، Campbell)، کمپبل(Aoki)، شپارد(Shepard) و ... که در بیمارستان امام خمینی ساری دستگاه سونوگرافی با یک فرمول هدلاک Hadlock تنظیم شده است). و حتی میتواند مربوط به اختلاف در مهارت سونولوژیست‌ها باشد؛ به طوری که حقیقین بسیاری بر روی متفاوت بودن دقت سونولوژیست‌ها جهت تخمین وزن هنگام تولد تاکید نموده‌اند و معتقدند مهارت و دقت سونولوژیست بر روی ارزش وزن تخمینی جنین تاثیر زیادی داشته، خطاهای تکنیکی بسیار زیادی توسط آنان ممکن است صورت گیرد (5، 6، 10 و 17-19).

بنابراین پیشنهاد می‌شود مطالعاتی مدون و چندمرکزی به طور جدأگانه با دستگاه‌های مشابه که با فرمول‌های یکسانی

این نتایج در مورد نوزادان IUGR نیز با تناقض زیادی به دست آمده است(20، 17، 8، 7). در حالی که شرمن³ و همکاران (1998) سونوگرافی را برای نوزادان LBW دقیقتر از معاینه بالینی، برای نوزادان طبیعی، دقت آن را کمتر از معاینه بالینی و برای نوزادان ماکروزوم، دقت هر دو روش را مشابه گزارش کردند(19). تفاوت در یافته‌ها میتواند به علت تفاوت در پارامترهای استفاده شده جهت تخمین وزن باشد. لذا پیشنهاد میشود هر واحد سونوگرافی به ویژه بخش سونوگرافی بیمارستان امام خمینی نسبت به ساختمان هنجار وزن هنگام تولد توسط دستگاه سونوگرافی موجود اقدام نماید. همچنین ضمن تمجید از دقت بالا، LBW، جهت نوزادان طبیعی و توصیه میشود در صورت لزوم با استفاده از فرمول به دست آمده در این تحقیق و یا حتی انجام پژوهش با نمونه بیشتر و فرمول دقیقتر، نسبت به افزایش دقت تخمین‌های انجام شده اقدام نمایند.

سپاسگزاری

ضمن تشکر از شواری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران جهت حمایت مالی از این طرح، از کلیه استادی و همکاران محترم بخش پرتوشناصی و سونوگرافی دانشگاه و نیز از کلیه کسانی که در انجام این طرح محققین را یاری رسانده‌اند، تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

3. Sherman

فهرست منابع

1. Smalian JC, Ranzini AC, Ananth CV, resenberg JC, and Vintzileos AM. Comparison of three sonographic circonference measurement techniques to predict Birth weight. *Obstet Gynecol* 1999; 93: 622-6.
2. Chang FM, Liang RT Ko HC, Yao BL, Chang CH and Yu CH. Three-Dimensional Ultrasound- Assessed Fetal Thigh Volumetry in predicting Birth weight. *Obstet Gynecol* 1997; 90:331-9.
3. Best G, pressman EK. Ultrasongraphic prediction of birth weight in Diabetic pregnancies. *Obstet Gynecol* 2002; 99: 340-4.
4. Chauhan SP, Scardo JA, Magann EF, Deveoe LD, Hendrix NW, Martin JNJ. Detection of Growth- Restricted Fetuses in preeclampsia: A case- control study. *Obstet Gynecol* 1999; 93: 687-91.
5. Hendrix NW, Chauhan Sp, Magann EF, martin yN, Morrison JC and Devoe LD. Inteapartum Amniotic fluid index: A poor predictor of Abnormal Fetal Size. *Obstet Gynecol* 1998; 92: 823-7.
6. Chauhan Sp, West DJ, Scardo JA, Boyd JM, Joiner J, and Hendrix NW. Antepartum Detection of macrosomic fetus. Clinical Versus sonographic, Inclding soft- Tissue measurements. *Obstet Gynecol*. 2000; 95: 639-42.
7. Gore D, Williams M, Brien W, Gilby J. ultrasound prediction of intreaterine Growth Restriction. *Obstet Gynecol* 2000; 97: 685.
8. Mongelli M, Sverker EK< Tambyrajia T. Screening for fetal Groiwtth restiction: A mathematical model of the effect of time interval and ultrasound error. *Obstet Gynecol* 1998; 92: 988-12.
9. Owen P, Maharaj S, Khalid SK, Howi R PW. Interval Between fetal measurements in predicting Growth Restriction. *Obstet Gynecol* 2001; 97: 499-504.
10. Lin CC, Forgas YS. Current concepts of fetal Growth Restriction: part II. Diagnodis and Management *obstet Gynecol* 1999; 93: 140-6.
11. Chauhan SP, Scardo JA, Magann EF, Deveoe LD, Hendrix NW, Martin JNJ. Detection of Growth- Restricted Fetuses in preeclampsia: A case- control study. *Obstet Gynecol* 1999; 93: 687-91.
12. Holcmb Wl yr, mostell Dy and Gray DL. Abdominal circumference VS. estimated weight to predict large for gestational age Birth weight in diabetic pregnancy. *J clinic Imaeg* 2000; 24:1-7.
13. Estimators of Birth weight in pregnant women Requiring Insulin A comparison of seven sonographic models. *Obstet Gynecol* 1995; 85: 565-9.

14. Hadlock FP, Harrist RB, sharman S, Deter RL, park Sk. Estimation or fetal weight with the use of head, body and femur measurement- A propective study. *Amy obstet Gynecol* 1985; 151: 337-7.
15. Chauhan SP, Lutton PM, Biley KJ, Morrison JC. Intra partum birth weight: clinical versus sonographic alone. *Obstet Gynecol* 1993; 81: 695-7.
16. Holcmb WI yr, mostell Dy and Gray DL. Abdominal circumference VS. Estimated weight to predict large for gestational age Birth weight in diabetic pregnancy. *J clinic Imaeg* 2000; 24: 1-7.
17. McLaren RA, Puckett YL, Chanhan SP. Estimtors of birth weight in pregnant women Requiring insulin: A Comparison of sonographic models. *Obstet Gynecol* 1995; 85: 565-9.
18. Chauhan SP, Lutton PM, Bailey KJ, Guerrieri JP, Morrison JC. Intra partum clinical, Sonograp hic, and parous patients E stimates of newborn Bith weight *obstet Gynecol* 1992; 79: 956-8.
19. Sherman DY,Arieli S,Tovbin J, Siegel G, Caspi E and Bukousky I. A Comparison of clinical and ultrasonic Estimation of Fetal weight. *Obstet Gynecol* 1998; 91: 212-7.
20. Pressman EK, Bienstock JL, Blakemore KJ, Martin Sand callan NA. Prediction of birth weight by ultrasound in the third trimester.*Obstet Gynecol* 2000; 95: 502-6.
21. Bogaret LJV. Customised gravidoram and fetal growth chart in a south African popalation. *Int J Gynecol obstet* 1999; 66: 129-136.
22. Honarvar M, Allahyari M, Dehbashi S. A simple estimated fetal weight equation for fetuses beween 24 and 34 weeks of gestation. *Int J Gynecol obstet* 1999; 67: 67-74.