

تعیین ارزش تشخیصی سطح خونی CA15-3، CEA در تومورهای پستان با متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغلی

فرشاد نقش وار (M.D.)⁺*، ژیلا ترابی زاده (M.D.)^{*}، مهران قهرمانی (M.D.)^{**}

چکیده

سابقه و هدف: سرطان پستان شایع ترین سرطان در جنس مونث می‌باشد. ۷ تا ۱۱ درصد زنان در طول عمر خود و سالیانه یک میلیون نفر در کل دنیا به آن مبتلا می‌شوند. علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در روش‌های تشخیص موارد متاستاتیک بدخیمی‌ها صورت گرفته است، هنوز محدودیت‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد. به همین علت امروزه توجه خاصی به استفاده از روش‌های حساس، سریع و ارزان شده است که یکی از آن‌ها استفاده از نشانگرهای تومور (Tumor Markers) می‌باشد. در این مطالعه حساسیت و ویژگی سطح خونی دو نشانگر تومور CEA و CA15-3 در تومورهای پستان با متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغلی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: مطالعه روی ۱۵۰ بیمار مبتلا به سرطان پستان بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) و شفای ساری در سال ۱۳۸۳-۸۴ انجام شده است. از هر بیمار قبل از نمونه برداری، خون گرفته شد و سرم آن جدا و با استفاده از کیت CANAg و روش ELISA، میزان CA15-3، میزان CEA اندازه‌گیری شد. سپس نمونه پستان برداشته شده به روش پیشرفت‌ههه تغییر شکل یافته (Modified Radical Mastectomy) و غدد لنفاوی زیر بغل مورد بررسی میکروسکوپیک قرار گرفت و اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و حساسیت، ویژگی و کارآبی متغیرها تعیین گردید.

یافته‌ها: مطالعه روی ۱۵۰ بیمار مونث با محدوده سنی ۳۲-۷۵ سال (متوسط سنی ۵۱/۶ سال) انجام شد. بیماران به ۲ گروه کلی تقسیم شدند. گروه یک (۸۹ نفر) مبتلا به بدخیمی پستان با درگیری غدد لنفاوی زیر بغل - گروه دو (۶۱ نفر) مبتلا به بدخیمی پستان بدون درگیری غدد لنفاوی زیر بغل.

میزان دو نشانگر تومور CEA, CA15-3 بین دو گروه یک و دو اختلاف آماری نشان داد. CA15-3 در آستانه تشخیصی ۳۵ U/ml بالاترین کارآبی (۸۲ درصد) را نشان داده و حساسیت ۷۸ و ویژگی ۸۸ درصد داشت. CEA در آستانه تشخیصی ۲/۵ ng/ml بالاترین کارآبی (۶۲/۶ درصد) را نشان داده و حساسیت ۴۸ و ویژگی ۸۳ درصد داشت.

استنتاج: نتایج مطالعه صورت گرفته حاکی از آن است که از نشانگر تومور CA15-3 می‌توان در شناسایی موارد وجود و یا عدم متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغلی در بدخیمی‌های پستان استفاده نمود ولی CEA حساسیت مناسبی در این زمینه ندارد.

واژه‌های کلیدی : تومور پستان- متاستاز- CA15-3- CEA

* این تحقیق طی شماره ۲۲-۸۲ در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است.

+ مولف مسئول: ساری-بلوار امیرمازندرانی- مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

** دستیار پاتولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تاریخ دریافت: ۸۵/۸/۱۶ تاریخ تصویب: ۸۵/۱۱/۲۰

مقدمه

CEA است (۹۶/۲ درصد در مقابل ۶۹/۸ درصد). بدین منظور دراین تحقیق حساسیت و ویژگی دو نشانگر تومور CA15-3، CEA برای شناسایی گسترش تومور پستان به خدد لنفاوی زیر بغلی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

مطالعه روی ۱۵۰ بیمار مشکوک به سرطان پستان که طی سال های ۸۴-۸۳ در بیمارستان های امام خمینی (ره) و شفای شهرستان ساری بستری شده بودند، انجام شد. بررسی آسیب شناسی نمونه ها به روش برش انجمادی، یکی از انواع بد خیمی های پستان را نشان داده و بیماران مذکور تحت عمل جراحی برداشت پستان به روش پیشرفته تغییر شکل یافته (Modified Racial Mastectomy) قرار گرفتند.

قبل از هر گونه اقدام جراحی، از بیماران نمونه خون گرفته شد. سپس سرم آن جدا گردیده و میزان ELISA سرم با کیت CAN-Ag CA15-3، CEA اندازه گیری شد. بعد از انجام نمونه برداری و تائید بد خیمی، نمونه پستان برداشته شده و خدد لنفاوی زیر بغل مورد بررسی قرار گرفت و در نمونه های منفی از نظر در گیری خدد لنفاوی زیر بغلی در جهت بررسی میکرو متاستاز، پس از برش های بیش تر و بررسی مجدد لام های هماتوکسیلین - اثوزین در صورت منفی بودن یک برش تهیه و به روش ایمنی - بافی - شیمیایی از نظر کراتین رنگ آمیزی و بررسی گردید.

سپس بیماران بدون در نظر گرفتن مرحله (stage) بر اساس بررسی بافت شناسی نمونه پستان برداشته شده و نمونه خدد لنفاوی زیر بغل به ۲ گروه تقسیم شدند. گروه یک: (۸۹ نفر) مبتلا به بد خیمی پستان با در گیری خدد لنفاوی زیر بغل.

سرطان پستان، شایع ترین سرطان در جنس مونث می باشد. ۷ تا ۱۱ درصد زنان در طول عمر خود و سالیانه یک میلیون نفر در کل دنیا به آن مبتلا می شوند(۱).

امروزه به علت استفاده گسترده از پرتو نگاری پستان، میزان تشخیص سرطان پستان بالا رفته و اکثر آنها در مراحل پایین تشخیص داده می شوند. ولی با این حال هیچ گونه کاهش مشخصی در مرگ و میر ناشی از سرطان پستان مشاهده نشده است(۲).

علی رغم پیشرفت هایی که در زمینه کشف زود درس موارد سرطان و در نتیجه درمان بیماران صورت گرفته، هنوز هم اکثر بیماران در سیر بیماری خود دچار گسترش بیماری و متاستاز به خدد لنفاوی زیر بغل می شوند؛ به طوری که میزان مرگ و میر سالیانه سرطان پستان فقط در آمریکا به ۴۴۰۰۰ مورد می رسد(۳). متاستاز به خدد لنفاوی زیر بغلی یکی از مهم ترین معیار های تعیین کننده پیش آگهی در بد خیمی های پستان می باشد (۴).

باتوجه به این که روش های شناسایی گسترش تومور به خدد لنفاوی زیر بغلی مانند اشعه X، سونو گرافی و برش نگاری رایانه ای با محدودیت های فراوانی همراه بوده، امروزه به روش های دیگری که از یک سو غیر تهاجمی، کم هزینه و سریع بوده و از سوی دیگر دارای حساسیت مناسبی باشد، توجه فراوانی گردیده است، یکی از این روش ها بررسی نشانگرهای تومور از جمله CA15-3، CEA یک گلیکو پروتئین با وزن ملکولی ۲۰۰ کیلو دالتون است که در مطالعات متعدد ارتباط سطوح بسیار بالای آن با متاستاز و پیش آگهی بد در تومور های متعدد اثبات گردیده است(۴). CA15-3 آنتی ژنی است که توان با سرطان پستان در جریان خون وجود دارد و در بیماران دچار سرطان پستان همراه با متاستاز، حساس و اختصاصی می باشد و در بیماران فوق، سطوح آن به طور چشمگیری بالاتر از

با افزایش آستانه تشخیصی به 60U/ml حساسیت به ۴۶ درصد کاهش یافته لیکن ویژگی به ۹۸ و کارآیی به ۶۷ درصد می‌رسد.

CEA بیشترین کارآیی (Efficiency) را در آستانه تشخیصی (Cut off) 2/5ng/ml نشان می‌دهد (۶۲/۶ درصد) و در این آستانه تشخیصی، حساسیت ۴۸ و ویژگی ۸۳ درصد می‌باشد. با افزایش آستانه تشخیصی به 3/5ng/ml حساسیت کاهش یافته به ۳۷ درصد می‌رسد و ویژگی به ۹۶ و کارآیی به ۶۱/۳ درصد می‌رسد. با کاهش آستانه تشخیصی به 1ng/ml حساسیت به ۹۱ درصد لیکن ویژگی به ۱۶ و کارآیی به ۶۰/۶ درصد می‌رسد. در جداول شماره ۲ و ۳ تغییرات کارآیی بر اساس آستانه تشخیصی آورده شده است:

در جدول شماره ۴ میزان حساسیت، ویژگی و کارآیی CA15-3 در آستانه تشخیصی 35U/ml و 2/5ng/ml آورده شده است:

جدول شماره ۲: تغییرات کارآیی CA15-3 براساس آستانه تشخیصی

| آستانه تشخیصی (U/ml) | کارآیی (%) |
|----------------------|------------|
| ۱۵ | ۷۰ |
| ۲۰ | ۷۲ |
| ۲۵ | ۷۳ |
| ۳۰ | ۷۳/۳ |
| ۳۵ | ۸۲/۶ |
| ۴۰ | ۸۲ |
| ۴۵ | ۷۹ |
| ۵۰ | ۷۶ |
| ۶۰ | ۶۷ |

جدول شماره ۳: تغییرات کارآیی CEA براساس آستانه تشخیصی

| آستانه تشخیصی (U/ml) | کارآیی (%) |
|----------------------|------------|
| ۱ | ۶۰/۶ |
| ۱/۵ | ۶۱/۳ |
| ۲ | ۶۱/۳ |
| ۲/۵ | ۶۲/۶ |
| ۳ | ۶۲ |
| ۳/۵ | ۶۱/۳ |

گروه دو: (۶۱ نفر) مبتلا به بدخيimi پستان بدون درگيري غدد لنفاوي زير بغل.

كليه نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون هاي آماري t-test و تعين حساسیت- ویژگی توسط نرم افزار SPSS11 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافته ها

در مطالعه صورت گرفته، محدوده سنی بيماران ۳۲-۷۵ سال با متوسط سنی ۵۱/۶۶ سال بود. محدوده سنی بيماران در گروه يك (۸۹ نفر) ۳۱-۷۵ سال (متوسط سنی ۵۲/۳۸ سال) و در گروه دو (۶۱ نفر) ۳۲-۷۵ سال (متوسط سنی ۵۱/۶ سال) بود. متوسط میزان CA15-3 در گروه يك و دو به ترتیب ۶۸/۸۵ و ۲۳/۷۵U/ml بوده و متوسط میزان CEA در گروه يك و دو به ترتیب ۳/۶۲ng/ml و ۱/۷۴ng/ml بود (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱: متوسط میزان CA15-3, CEA سرم بيماران

| گروه | ۱ | ۲ |
|---------------|-------|-------|
| CA15-3 (U/ml) | ۶۸/۸۵ | ۲۳/۷۵ |
| CEA (ng/ml) | ۳/۶۲ | ۱/۷۴ |

بين میزان CA15-3, CEA گروه ۱ و ۲ اختلاف آماري وجود داشت ($P < 0.05$). بعد از اندازه گيری مقادير اين نشانگرهای تومور، میزان آستانه تشخیصی (Cut off) آنها براساس مقاديری که بيشترین کارآيی (Efficiency) را نشان مي‌دهند، محاسبه گردید.

CA15-3 بيشترین کارآيی را در 35U/ml نشان داد (۸۲ درصد) و در اين آستانه تشخیصی، حساسیت و ویژگی آن به ترتیب ۷۸ و ۸۸ درصد بود. با کاهش آستانه تشخیصی به 15U/ml حساسیت تا ۹۵ درصد افزایش یافته لیکن ویژگی به ۳۲ و کارآيی به ۷۰ درصد می‌رسد.

خوش خیم پستان بوده اند، حساسیت CEA، CA15-3 در موارد متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغلی به ترتیب $41/3$ و $80/8$ درصد بوده و بیان شده است که اندازه گیری CA15-3 CA چندان موثر و مفید نمی باشد ولی میزان CA15-3 بسیار کمک کننده است(۱۰).

در مطالعه ای که روی ۱۳۶ بیمار مبتلا به تومور گسترش یافته پستان انجام شده است آستانه تشخیصی برای CA15-3 و CEA، به ترتیب $2/5\text{ng/ml}$ ، 28U/L ، برای CA15-3 و CEA بیان شده است و بالاترین حساسیت را برای CEA بیان نموده است(۱۱).

در مطالعه ای که توسط ماسایی و همکارانش صورت گرفت بررسی سطح نشانگرها توموری را در پی گیری پاسخ به درمان در بیماران با بیماری پیشرفته مبتلا به تومور پستان با متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغلی موثر دانستند(۱۲).

در مطالعه ای نیز از بین دو نشانگر فوق، CA15-3 عموماً بیشترین حساسیت و ویژگی را داشته، ضمن آن که طی Fulvestrant درمانی در بیماران با بهبودی نسیی افزایش ارزشمندی در سطح CA15-3 در خلال شش ماه اول درمان نداشتیم، اما CEA به طور ارزشمندی کاهش نشان داد(۱۳).

در مطالعه صورت گرفته، CA15-3 در ۷۸ درصد موارد بدخیمی پستان با درگیری غدد لنفاوی، افزایش نشان می دهد در حالی که فقط در ۱۱ درصد موارد بدون درگیری غدد لنفاوی افزایش می یابد.

در رابطه با CEA در ۴۸ درصد موارد با درگیری غدد لنفاوی و 61 درصد موارد بدون درگیری غدد لنفاوی افزایش می یابد. بنابراین CA15-3 بیشترین حساسیت و ویژگی را دارا بوده و می توان از آن در تشخیص موارد متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغلی در تومورهای پستان استفاده نمود.

جدول شماره ۴ : میزان حساسیت، ویژگی و کارآیی CEA در آستانه تشخیصی CA15-3

| کارآیی | ویژگی | حساسیت |
|--------|-------|--------|
| CA15-3 | ۷۸٪ | ۸۸٪ |
| CEA | ۴۸٪ | ۸۳٪ |

بحث

در یک مطالعه گسترده در سطح خونی 3ng/ml برای CEA به ترتیب حساسیت و ویژگی $96/42$ و درصد بیان شده است(۵).

در مطالعه دیگر، CEA بالاتر از 20ng/ml با حجم تومور و متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغلی مرتبط بوده است و در این تحقیق بیان شده است که افزایش 20 تا 50 درصد در سطح CEA با پیدایش متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغلی همراه است(۶).

در مطالعه ای که روی ۳۶۴ فرد مبتلا به سرطان پستان انجام شده است برای CEA سطح خونی 6ng/ml CA15-3 و برای 40U/ml CA15-3 بیان شده است و مشخص شده که بین سطح CA15-3 و درگیری غدد لنفاوی زیر بغل نسبت به CEA ارتباط بیشتری وجود دارد(۷).

در مطالعه برد(Beard) و هاسکل(Haskell) بیماران مبتلا به تومور پستان تحت پی گیری و اندازه گیری سریال CEA قرار گرفته و مشخص شد که CEA با 53 درصد مثبت کاذب قادر به پیش بینی عود تومور است(۶).

مطالعه ون در لیندن(Van Derlinden) و کلکاجیوس(Collagues) CA15-3، CEA نشان داد که سطح خونی در بررسی پیش آگهی بیماران مفید می باشد(۸).

در مطالعه کرامر(Kramer) و همکارانش افزایش سطح سرمی CA15-3، CEA در بیش از 80 درصد موارد با متاستاز به غدد لنفاوی زیر بغلی همراه است(۹). در مطالعه ای روی ۲۱۹۱ بیمار که 1453 نفر مبتلا به سرطان بدخیم پستان و 782 نفر مبتلا به بیماری



فهرست منابع

1. Cotran, Kumar, Collins. *Pathologic Basis of Disease.* 7th ed. Philadelphia: Saunders; 2005. P: 1104-6.
2. Rosai-Juan, Ackerman S. *Sur. Pathology.* 8 th ed. Newyork: lipincott; 2004; 2: 1590-91.
3. Barek M, Steiner M, Finkel B, Abramson J, Antal S. CA15-3 and tpa as markers for breast cancer. *Eur. J. Cancer.* 1990; 260: 577-80.
4. John Bernard henry. *Clinical diagnosis and management by laboratory methods.* 21th ed. Philadelphia: Saunders; 2005. 1036-39.
5. Steven A, Rosenberg. *Principles and pratice of the biologic thrapy of cancer.* third edition. Philadelphia: lippincott Williams and wilkins; 2000. P: 455-7.
6. Burtis, CA, Ashwood, E. *Tietz. text book of clinical chemistry.* Third edition. Philadelphia: Sauders; 1999. p: 723-6.
7. Jacques wallach. *Interpretation of diagnostic tets.* 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and wilkins; 2000. P: 906-8.
8. Silver, H. Ragaz, J. Coldman, A.J. *The breast comprehensive management of benign and malignant disease.* 5th edition. Philadelphia: saunders; 1998. P: 1467-9.
9. Archtti A,Buttitta F,Bertacca G, Zavaglia K, Bevilacqua G, Angelucci D, Viacava P. mRNA markers of breast cancer nodal metastases: Comparison between mammaghlobin and carcinoemberionic Antigen in 248 patient. *J. Pathol.* 2001 Sep; 195(2): 186-90.
10. Carneivo C, Costa L, Mole Quintela A, Miranda I, Jorge M. Serum tumor markers in metastatic breast cancer comparative study between CEA, CA15-3. *Eur. J. Cancer.* 1998; 34: 343-6.
11. Maraglio L, Pastorino G, Martini M, Addamo G.F, Sogno G. Abvanced breast cancer and CEA,MCA,CA15-3 Correlation with response to treatment. *Eur. J.Cancer.* 1995; 34: 263-4.
12. Massacesi C, Rocchi MB, Marcuci F, Pilone A, Galeazzi M, Bonsignori M. Serum tumor markers may precede instrumental response to chemotherapy in patients with metastatic cancer. *Int Biol. M.* 2003; 18: 295-300.
13. Rupert Bartsch, Catharina wenzel, Ursula pluscnig,Dagmar Hussian,Ursula sevelda, Gabriela Altoryai, et al. Prognostic value of monitoring tumor markers CA15-3 and CEA during fulvestrant treatment. *BMC cancer.* 2006; 6: 81.