

# بررسی اثر رعایت رژیم غذایی نشاسته ای سه ساعته بر سندروم پیش از قاعده‌گی در دانش آموزان دبیرستان‌های دولتی و غیر دولتی شهر ساری ۱۳۸۵

کبرا عابدیان کاسگری <sup>+</sup>(M.Sc) زهره شاه حسینی <sup>\*\*</sup>(M.Sc) ماه منیر دانش <sup>\*\*\*</sup>(M.Sc)

## چکیده

**سابقه و هدف:** سندروم پیش از قاعده‌گی (PMS) یکی از شایعترین اختلالات زنان قبل از دوران یائسگی است بنحوی که (۹۷-۸۵درصد) خانمها از علایم جسمی، خلقی و رفتاری PMS باشد و طبیعت متفاوت رنج می‌برند. این سندروم هم چنین دارای پیامدهای اقتصادی به دلیل غیبت کاری و کاهش کارایی نیز می‌باشد. در مورد درمان آن نیز راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است از جمله قرص‌های جلوگیری از بارداری، آگونیستهای GnRH، دانازوول، استفاده از مکملهای ویتامینی، کلسیم و تعدیل رژیم غذایی که نظرات در زمینه نوع تغذیه متناقض می‌باشد که در این تحقیق، به تأثیر رعایت رژیم غذایی نشاسته ای سه ساعته بر سندروم پیش از قاعده‌گی، در دانش آموزان سال دوم و سوم دبیرستان‌های دولتی و غیر دولتی شهر ساری پرداخته شده است.

**مواد و روش‌ها:** جامعه پژوهش این تحقیق نیمه تجربی مشکل از ۴۷۸ دانش آموز دبیرستانی دخترمدارس دولتی و غیردولتی شهرستان ساری بودند، که با استفاده از جداول اعداد تصادفی از مدارس دولتی و غیر دولتی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای دو قسمتی شامل مشخصات فردی، اطلاعات مربوط به سوابق سیکل قاعده‌گی، بیماریها و مصرف داروها و سوالاتی در زمینه علایم جسمی، رفتاری و خلقی مرتبط با سندروم پیش از قاعده‌گی بود. علایم سندروم پیش از قاعده‌گی در بد و ورود به مطالعه و در پایان ماه‌های اول تا سوم بعد از شروع درمان که مشتمل بر رژیم سرشار از نشاسته بوده است مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات به صورت خود گزارش دهی بود که با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی آنالیز گردید.

**یافته‌ها:** میانگین سنی شرکت کنندگان  $11/12 \pm 8/49$  با محدوده سنی ۱۴ تا ۱۹ سال بود. میانگین طول سیکل قاعده‌گی  $2/1 \pm 8/28$  روز و طول مدت خونریزی بطور متوسط  $1/8 \pm 3/6$  روز بیان شد. جمع نمره علایم جسمی PMS، قبل از رعایت رژیم غذایی و در بد و مطالعه  $1/0 \pm 8/85$  در پایان ماه‌های اول، دوم و سوم بعد از رعایت رژیم نشاسته ای سه ساعته به ترتیب  $5/7 \pm 5/7$ ،  $4/7 \pm 7/11$ ،  $4/7 \pm 7/11$ ،  $4/7 \pm 7/11$  بود که اختلاف معنی دار بود ( $P=0/000$ ). جمع نمره علایم خلقی و رفتاری سندروم پیش از قاعده‌گی، قبل از رعایت رژیم غذایی در بد و مطالعه  $1/0 \pm 8/15$  و در پایان ماه‌های اول، دوم و سوم بعد از رعایت رژیم نشاسته ای سه ساعته به ترتیب  $4/6 \pm 9/11$ ،  $4/6 \pm 9/13$ ،  $4/6 \pm 9/13$  بود که اختلاف معنی دار بود.

**استنتاج:** نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می‌دهد که مصرف مواد نشاسته ای پیچیده می‌تواند عاملی در بهبود علایم سندروم پیش از قاعده‌گی باشد. لذا یک برنامه آموزشی مدون از جانب سیاستگذاران بهداشتی در مدارس درخصوص تأثیر این گونه رژیم‌ها بر روی علایم سندروم پیش از قاعده‌گی از مصرف بی مورد داروها در این دوره زمانی جلوگیری به عمل آورد و با این عمل در بهداشت و سلامت دختران جوان به عنوان مادران آینده گامی مفید و موثر برداشت.

**واژه‌های کلیدی:** سندروم پیش از قاعده‌گی، رژیم غذایی نشاسته ای سه ساعته، دانش آموزان دبیرستانی

<sup>+</sup> مولف مسئول: کبرا عابدیان کاسگری-ساری، خیابان وصال، داشکده پرستاری و مامایی نسیبه

\* کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران \*\* کارشناس ارشد مامایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشجوی دوره دکتری بهداشت باروری

\*\*\* کارشناس ارشد مامایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

\*\*\*\* تاریخ دریافت: ۱۹/۱۱/۸۶ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۹/۱۱/۸۷ تاریخ تصویب: ۲۵/۴/۸۷

## مقدمه

و فرزندان به عنوان یکی از علل بسیار مهم مجادلات و ناراحتی های زوجین مطرح می باشد (۱۵). شیوع PMS به دلیل تنوع در علایم و شدت و تفاوت در روش های اندازه گیری در مطالعات مختلف بین ۲۰ تا ۹۰ درصد متفاوت بیان شده است (۴) هم چنین در مورد چگونگی درمان آن نیز راهکارهای مختلفی پیشنهاد شد از جمله ساپرس تخمک گذاری با تجویز داروهایی نظیر قرص های جلو گیری از بارداری و مصرف اگونوستیهای GnRH و دانازول (۵، ۹، ۱۰، ۱۱).

عده ای نیز روشهای غیر دارویی را موثر می دانند (۱۳) و گروهی نیز به درمانهای علامتی این سندروم با استفاده از دیورتیکها، داروهای ضدپروستاگلاندین و یا حتی استفاده از آرام بخش ها و ضد افسردگی ها اشاره کردن (۹، ۱۰) جمعی نیز استفاده از مکمل های ویتامینی و کلسیم را پیشنهاد کردن (۱۴) جمعی نیز مصرف دارونما را موثر دانستند (۱۶). عده ای نیز برای کاهش علایم این سندروم مصرف داروی گیاهی را پیشنهاد نمودند (۱۷) از آنجائی که یکی از توریهای درمان PMS تعدلیل رژیم غذایی است (۱۸، ۱۹). و نظرات در زمینه نوع تغذیه متناقض می باشد به طوری که عده ای بر روی مصرف کربوهیدرات (۲۰) و عده ای بر روی مصرف غذای پر پروتئین و کم چرب برای کاهش علایم سندروم پیش از قاعده گی اشاره می کنند (۲۱) در این تحقیق با استدلال جلو گیری از بروز ادم و تورم در PMS توصیه به کاهش مصرف نمک و کربوهیدرات های ساده شد. و با توجه به رابطه بین گراناتین و درد پستان ها و تاثیر کاهش مصرف کافئین در پیشگیری از تنش عصبی، اضطراب و بی خوابی و مصرف و عده های غذایی سبک با فواصل کوتاهتر

سندروم پیش از قاعده گی (PMS)<sup>۱</sup> یکی از شایعترین اختلالات زنان قبل از دوران یائسگی است (۲، ۱). اکثربیت خانمهای (۹۷-۹۵ درصد) از علایم جسمی و خلقوی و رفتاری PMS قبل از قاعده گی با شدت و طبیعت متفاوت رنج می برند (۳، ۴) . این سندروم از ظهور دوره ای یک یا چند علامت از مجموعه بزرگی از علایم، درست قبل از قاعده گی، به درجایی که سبب به هم خوردن روش کار یا زندگی فرد می شود پدید می آید و به دنبال آن دارای دوره ای فاقد هر گونه علامت است. علایمی که بیشتر از همه با آن رو به رو هستیم عبارتند از: نفخ شکم، اضطراب یا تنش، حساسیت پستان ها - دوره های گریه، افسردگی - خستگی - کمبود انرژی، عصبانیت یا تحریک پذیری بدون دلیل، اشکال در تمرکز، تغییرات اشتها و تشنجی، و درجاتی متغیر از ادم انتهای ها که معمولاً در ۷-۱۰ روز آخر سیکل قاعده گی ایجاد می شود (۵) در این سندروم، ۷-۱۰ روز قبل از قاعده گی زمان نامناسبی برای اکثر خانم هاست در این روزها بانوان بیشتر از دیگر مواقع از حضور در محل کار خود داری می کنند، نیازمند بستری شدن در بیمارستانها می گردند، مصدوم می شوند، ناراحتی های روانی پیدا می کنند و حتی خودکشی می کنند و بیان شده که تعدادی از آنها دچار حالات روحی شدید شده و خصوصاً اگر مجبور شوند در مصاحبه یا امتحان شرکت کنند به طور میانگین ۵ تا ۱۰ درصد نمره آنها کاهش می یابد (۶، ۷) این سندروم هم چنین دارای پیامدهای اقتصادی به دلیل غیبت کاری و کاهش کارایی و پیامدهای اجتماعی نظیر ارتکاب به قتل، جنایت و افزایش حوادث، پیامدهای تحصیلی نظیر تاثیر روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان و به دلیل پیامدهای خانوادگی نظیر کشمکش ها بین زن و همسر

۱- Pre Menstrual Syndrome

مطالعاتی که در داخل کشور مورد استفاده و تائید قرار گرفته است (۲۵، ۲۳، ۲۲) که جهت تعیین اعتبار علمی ابزار از اعتبار محتوا و برای تعیین اعتماد آن از روش آزمون مجدد استفاده شد (آلفا کرونباخ ۰/۹۰ درجه بندی نمرات شامل: علامت ندارم (نمره صفر) علامت وجود دارد ولی مشکل در انجام فعالیت روزانه از قبیل تحصیلی ایجاد نمی کند (خفیف ۱ نمره) عالیم وجود دارد و تا حدی بر فعالیت روزانه تاثیر می گذارد (متوجه ۲ نمره) عالیم به حدی است که مانع فعالیت روزانه و غیب از کلاس و مصرف مسکن می شود، (شدید ۳ نمره) در نظر گرفته شد. در پایان جمع نمرات قبل از مداخله جمع آوری و به عنوان نمره هر فرد ثبت شد. سپس رژیم غذایی مورد نظر به طور دستور العمل کتبی به این افراد ارائه شد. هر فرد در پایان ماه اول، دوم و سوم رعایت رژیم غذایی نیز پرسشنامه مورد نظر را پر کرد و نمره گذاری مجدد صورت گرفت. ضمناً برگه ثبت رعایت رژیم غذایی نیز به عنوان شاهد توسط افراد مورد نظر علامت گذاری می شد در پایان ماه سوم جمع بندی نمرات انجام شد. در پایان اگر مجموع امتیازات PMS در هر علامت یک نمره نسبت به قبل از درمان کاهش می یافتد به عنوان بهبود و در غیراینصورت به عنوان عدم بهبود تلقی می شد. با توجه به شیوع ۲۰ تا ۹۰ درصد این سندروم در این تحقیق با در نظر گرفتن ۵۰ P و ۵۰ q و ۰/۰۵ با استفاده از فرمول  $N = \frac{Z^2 Pq}{d^2}$  تعداد نمونه ها ۳۸۴ نفر برآورد شد.

در این تحقیق دانش آموزان سال اول به دلیل ورود به محیط جدید و دانش آموزان سال چهارم بدليل نگرانی شرکت در کنکور با احتمال تاثیر استرس و نگرانی بر نتیجه تحقیق از پژوهش حذف شدند هم چنین افرادی که کمتر از چهار علامت جسمی و یک علامت خلقی و رفتاری را داشتند و یا از داروهای خاص یا هورمونی یا ویتامین و مکمل استفاده می کردند به همراه افرادی که

برای کاهش نوسانات خلقی، بنابر شواهدی مبنی بر اختلال در جذب گلوکز توسط سلول ها طی مدت زمان قبل از قاعده‌ی، که اساس تئوریک این توصیه غذایی را مطرح می کنند (۱۸)، به تاثیر رعایت رژیم غذایی نشاسته ای سه ساعته بر سندروم پیش از قاعده‌ی، در دانش آموزان سال دوم و سوم دیبرستانهای دولتی و غیردولتی شهر ساری پرداختیم. از طرفی رعایت رژیم غذایی نسبت به روش های پیشنهادی نظری مصرف GnRH، OCP و روش بی خطر، مطمئن، کم عارضه و کم هزینه است و اینکه با آموزش تغذیه صحیح به حفظ و ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان، این نیروی موثر و مفید آینده کشور نیز کمک می شود.

## مواد و روش ها

این تحقیق به روش نیمه تجربی انجام شد و جامعه پژوهش آن متشكل از دانش آموزان دیبرستانی دختر مدارس دولتی و غیردولتی شهرستان ساری بودند، که با استفاده از جداول اعداد تصادفی از بین مدارس دولتی و غیر دولتی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر دو قسمت بود که سوالات قسمت اول پرسشنامه شامل مشخصات فردی و اطلاعات مربوط به سوابق سیکل قاعده‌ی، بیماریها و مصرف داروها بود. سوالات قسمت دوم پرسشنامه در زمینه عالیم جسمی و رفتاری و خلقی مرتبط با سندروم پیش از قاعده‌ی بود که با شماره گذاری از ۱ تا ۱۷ برای عالیم رفتاری و خلقی از قبیل اضطراب، عدم تمرکز، پرهیز از فعالیت های اجتماعی، افسردگی و گوش نشینی و بی حوصلگی و از شماره ۱۸ تا ۳۵ برای عالیم جسمی از قبیل درد و ناراحتی شکم، سردرد، درد مفاصل، نفخ شکم، ورم ساق پا، تهوع و استفراغ مشخص می شد. سوالات با مقیاس ۴ گزینه ای لیکرت تنظیم شد. هم چنین این پرسشنامه قبلاً طی

عادات ماهانه توسط افراد اجرا می شد. اطلاعات به صورت خود گزارش دهی بود. کلیه پرسشنامه ها طی چهار ماه جمع آوری شد و تجزیه و تحلیل آن به کمک نرم افزار SPSS در مراحل مختلف انجام شد از آنجا که هر فرد به عنوان شاهد خودش محسوب می شد با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی (تی و کای دو) تجزیه و تحلیل نهایی در زمینه تاثیر یا عدم تاثیر رژیم پیشنهادی بر روی علایم جسمی،  
خلقی و رفتاری PMS صورت گرفت.

### یافته ها

از ۷۰۰ نفری که پرسشنامه را دریافت کردند ۴۷۸ نفر واجد شرایط شرکت در مطالعه بودند که به آنها فرم رعایت رژیم غذایی نشاسته ای ۳ ساعته و برگه ثبت روزانه رعایت رژیم مربوطه، برای مدت سه سیکل داده شد.

از نظر مشخصات فردی میانگین سنی شرکت کنندگان  $16/89 \pm 1/12$  با محدوده سنی ۱۴ تا ۱۹ سال بودند.

میانگین طول سیکل قاعده‌گی  $2/1 \pm 28/87$  و طول مدت خونریزی بطور متوسط  $1/8 \pm 6/32$  بیان شد از ۴۷۸ نفر مورد مطالعه ۱۶۲ نفر میل به خانه ماندن را نداشتند ولی ۹۶ نفر (۲۰/۱درصد) بطور خفیف، ۱۳۰ نفر (۲۷/۲درصد) بطور متوسط و ۹۰ نفر (۱۸/۸درصد) بطور شدید این علامت را در مرحله سندروم پیش از قاعده‌گی گزارش کردند.

در مورد اضطراب ۹۰ نفر (۱۸/۸درصد) خفیف، ۱۰۰ نفر (۲۰/۹درصد) متوسط و ۶۴ نفر (۱۳/۴درصد) بطور شدید این علامت را گزارش کردند. عدم تمرکز نیز توسط ۹۳ نفر (۱۹/۵درصد) بطور خفیف، ۸۳ نفر (۱۷/۴درصد) بطور متوسط و ۲۱ نفر (۴/۴درصد) بطور شدید گزارش شد.

قاعده‌گی نامنظم یا کوتاهتر از ۲۱ روز یا بلندتر از ۳۵ روز داشتند و یا قبل از بیماری روحی مبتلا شدند و یا در سه ماه اخیر وجود استرسی چون فوت نزدیکان یا ازدواج یا عمل جراحی را ذکر کردند نیز از مطالعه حذف شدند. شرکت کنندگان به همراه توضیحات ضروری در زمینه هدف از انجام پژوهش، نحوه تکمیل پرسشنامه و برگه ثبت روزانه رعایت رژیم و اطمینان یافتن از محramانه ماندن اطلاعات کسب شده و جلب موافقت شرکت در پژوهش، پرسشنامه و رژیم غذایی مورد نظر را به صورت دستورالعمل مكتوب دریافت کردند. طریقه اجرای این رژیم به این صورت بود که، دانش آموzan دارای علایم سندروم پیش از قاعده‌گی تا حد امکان از مصرف کافئین (که در قهوه و چای موجود است) و قندهای ساده (مثل نوشابه‌ها و شیرینی جات و شکلات و ...) و نمک پرهیز می کردند و رژیم نشاسته، ۳ ساعت را به صورت زیر به مرحله اجرا می گذاشتند.

رژیم نشاسته ای شامل: (برنج، گندم، جو، سبز زمینی، ذرت و هم چنین محصولات غذایی که از این مواد تهیه شده اند مانند بیسکویت سبوس دار بود) می باشد در طول ساعات بیداری هر ۳ ساعت یک وعده غذایی مختصر و پر نشاسته خورده می شد. یعنی روزانه حدود شش وعده غذایی میل می شد ولی در وعده های مختصر و کم حجم. اولین وعده غذایی باید ظرف یک ساعت پس از بیدار شدن میل می شد و آخرین وعده هم باید با زمان خوابیدن شب بیش از یک ساعت فاصله می داشت. بنابراین از غذاهای متنوع و سالم که شامل مقادیر زیاد میوه و سبزیجات بود نیز استفاده می شد. به عبارتی مصرف سبزیجات و میوه جات را هرگز نباید فراموش می کردند (مثلاً دانش آموzan برای ساعت ۱۰ صبح از چند عدد هویج و یا سبز زمینی پخته استفاده می کردند). این برنامه می باشد در تمام روزها و نه فقط در روزهای پیش از

متوسط و در ۵۴ نفر (۱۱/۳ درصد) بطور شدید گزارش شد. درد عضلاتی نیز در ۸۱ نفر (۱۶/۹ درصد) خفیف و در ۸۱ نفر (۱۶/۹ درصد) بطور متوسط و در ۴۷ نفر (۹/۸ درصد) بطور شدید گزارش شد.

نخ شکم در ۸۰ نفر (۱۶/۷ درصد) بطور خفیف و در ۸۵ نفر (۱۷/۸ درصد) بطور متوسط و در ۴۳ نفر (۹ درصد) بطور شدید گزارش شد. ورم ساق پا در ۳۱ نفر (۶/۵ درصد) خفیف و در ۱۹ نفر (۴ درصد) متوسط و در ۵ نفر (۱ درصد) بطور شدید گزارش شد. تهوع در ۴۴ نفر (۹/۵ درصد) خفیف و در ۳۳ نفر (۶/۹ درصد) بطور متوسط و در ۱۸ نفر (۳/۸ درصد) شدید گزارش شد. اسهال در ۵۳ نفر (۱۱/۱ درصد) خفیف و در ۳۰ نفر (۶/۳ درصد) متوسط و در ۱۱ نفر (۲/۳ درصد) بطور شدید گزارش شد.

۸۶ نفر (۱۱ درصد) پرهیز از فعالیت اجتماعی را بطور خفیف، ۷۸ تفر (۱۶/۳ درصد) بطور متوسط و ۵۳ نفر (۱۱/۲ درصد) بطور شدید دارا بودند. افسردگی و گوشه نشینی نیز بطور خفیف توسط ۸۶ تفر (۱۸ درصد) و بطور متوسط توسط ۸۷ نفر (۱۸/۲ درصد) و بطور شدید توسط ۶۲ نفر (۱۳/۱ درصد) گزارش شد. ۸۳ نفر (۱۷/۴ درصد) بی حوصلگی را بطور خفیف و ۱۵۵ نفر (۳۲/۴ درصد) بطور متوسط و ۱۱۷ نفر (۲۴/۵ درصد) بطور شدید گزارش کردند. درد و ناراحتی شکم نیز در ۷۲ نفر (۱۵/۱ درصد) بطور خفیف و در ۱۵۴ نفر (۳۲/۲ درصد) بطور متوسط و در ۲۱۱ نفر (۴۴/۱ درصد) بطور شدید گزارش شد. سردرد نیز در ۹۱ نفر (۱۹ درصد) خفیف و در ۱۰۰ نفر (۲۰/۹ درصد) بطور متوسط و در ۴۹ نفر (۱۰/۳ درصد) بطور شدید گزارش شد. درد مفاصل در ۶۷ نفر (۱۴ درصد) بطور خفیف و در ۸۳ نفر (۱۷/۴ درصد) بطور

جدول شماره ۱: مقایسه میانگین نمرات علایم جسمی و خلقی و رفتاری در بدء مطالعه و در طی ماههای اول تا سوم رعایت رژیم غذایی نشاسته‌ای ۳ ساعته

P	بعد از رعایت رژیم			قبل از رعایت رژیم	زمان	نوع علامت
	پایان ماه سوم	پایان ماه دوم	پایان ماه اول			
.	۱۱/۴۶±۷/۰۹	۱۳/۰۶±۸/۲	۱۳/۶۱±۹/۳۴	۱۵/۸±۱۰/۰۲		خلقی و رفتاری
.	۱۱/۱۳±۶/۷۱	۱۲/۴۷±۷/۷۹	۱۱/۰۳±۷/۵۹	۱۲/۸۵±۸/۰۱		جسمی
.	۲۲/۵۸±۱۲/۵۴	۲۵/۵۶±۱۴/۸۲	۲۴/۶۶±۱۵/۷۹	۲۸/۴۲±۱۶/۷۲		جمع

## بحث

همراه هستند دارای عوارض جانبی شدید می باشند، هنوز نیاز به روش های جدید درمانی سندروم پیش از قاعده‌گی وجود دارد. در این بررسی علایم PMS در ۴۷۸ دانش آموز دختر شهرستان ساری در دو قسمت علایم جسمی و خلقی رفتاری مورد بررسی قرار گرفت. شایعترین علامت جسمی یافت شده در این مطالعه احساس درد و ناراحتی در شکم بود (۹۱/۴ درصد) که با مطالعه آقازاده و همکاران، ماهرخ دولتیان و همکاران و

سندروم پیش از قاعده‌گی به عنوان یکی از مشکل سازترین مسایل زنان و یکی از شایع ترین علل مراجعه زنان به پزشک می باشد. به همین دلیل استفاده از درمان هایی که بتواند در عین موثر بودن عارضه جانبی کمی داشته باشد، از صرف هزینه های درمانی به میزان زیادی می کاهد. از آنجایی که برخی از افراد مبتلا به سندروم پیش از قاعده‌گی به روش های رایج درمانی پاسخ نمی دهند، یا اینکه داروهایی که با پاسخ درمانی خوبی

قاعدگی شدند که درخصوص تفاوت رژیم غذایی آنها با رژیم غذایی مطالعه ما باید نقش تمرینات ورزشی را به عنوان عامل مداخله گر مد نظر داشت (۲۱). از طرفی هیچگونه ارتباط معنی داری بین مدارس مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی از نظر نمرات عالیم جسمی و رفتاری و خلقی و میزان پاسخگویی به درمان با این رژیم وجود نداشت که این نتیجه با توجه به سن جامعه مورد پژوهش با تحقیق balbi و همکاران همخوانی دارد (۲۷).

در پایان از نتایج حاصل از این تحقیق، می توان این گونه نتیجه گرفت که مصرف مواد نشاسته ای پیچیده به دلیل ذخیره چربی که باعث بالا بردن سطح استروژن خون می شود می تواند عاملی در بهبود عالیم سندرم پیش از قاعدگی باشد. (۲۸) نکته قابل توجه این که در دوره زمانی بررسی و تحقیق فرصت مناسبی برای ایجاد ارتباط قوی و آموزش لازم، بین محقق و شرکت کنندگان در این بررسی فراهم شد. البته بهتر بود که این مطالعه بصورت مقایسه ای با گروه کنترل با روش دیگری به طور همزمان انجام می شد. که می تواند آن را به عنوان تحقیق برای مراحل بعدی پیشنهاد کرد. ضمن اینکه می توان تاثیر این رژیم یا سایر رژیم های مطرح شده در تحقیقات قبلی را با تاثیر سایر روش های دارویی و هورمونی مورد مقایسه قرار داد.

شاید بتوان با ایجاد یک برنامه آموزشی مدون از جانب علوم پزشکی در مدارس و اطلاع رسانی به دانش آموزان از تاثیر این گونه رژیم ها بر روی عالیم سندرم پیش از قاعدگی از مصرف بی مورد داروها در این دوره زمانی جلوگیری به عمل آورد. و با این حرکت گامی مفید و موثر در بهداشت و سلامت دختران جوان به عنوان آینده سازان فردای ایران برداشته شود.

Derman و همکاران همخوانی دارد، (۲۲ و ۲۳ و ۲۴) کمترین شیوع علامت جسمی مربوط به ورم ساق پا بود (۱۱/۵ درصد) که با مطالعه پاکی گوهر و همکاران مطابقت دارد (۲۵). شایعترین علامت خلقی و رفتاری در مطالعه مابی حوصلگی بود. (۷۶/۳ درصد) که با مطالعه آغازده و همکاران همخوانی دارد ولی با مطالعه Angstj و همکاران که شایعترین علامت خلقی و رفتاری این مطالعه تحریک پذیری و عصبانیت گزارش شد، مخالف است (۲۶). شاید این اختلاف به دلیل تفاوت در منطقه ای جغرافیایی یا تفاوت سنی جامعه پژوهش باشد. کمترین میزان شیوع علامت خلقی رفتاری در مطالعه ما فراموشی بود (۲۵ درصد). در این مطالعه ارتباط معنی داری بین کاهش عالیم جسمی و رفتاری و خلقی در بد و ورود به مطالعه و در پایان سه ماهه رعایت رژیم وجود داشت ( $P=0$ ) که نشان دهنده تاثیر رعایت رژیم غذایی پیشنهادی بر روی کاهش عالیم PMS می باشد در مطالعه Raja sayegh و همکاران که یک مطالعه تجربی بود به بررسی تاثیر نوشابه های فرموله شده در مقایسه با دو نوع نوشابه دیگر (به عنوان پلاسیبو) پرداختند نتایج حاکی از آن است که مصرف نوشابه فرموله شده با کربوهیدرات بعد از ۳۰، ۱۸۰، ۹۰ دقیقه بعد از مصرف در مقایسه با دارونما (Placebo) افسردگی، عصبانیت، گیجی و قدرت تشخیص را با اختلاف معنی داری  $P<0.05$  بهبود بخشید (۲۰). اما در مطالعه D.NovakMs و همکاران در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارتباط بین رژیم غذایی- تمرینات ورزشی و سندرم پیش از قاعدگی که بر روی ۴۹ زن داوطلب که دارای عالیم سندرم پیش از قاعدگی بودند با رژیم غذایی پر پروتئین و کم چربی به همراه کاهش مصرف کربوهیدرات ها، موفق به کاهش عالیم سندرم پیش از

## سپاسگزاری

محمدپور و سرکار خانم عذرآ رضایی و خانم مینا گل محمدی صمیمانه سپاسگزاریم. ضمناً در پایان از برخورد صحیح و همکاری عالی جامعه پژوهش و مدیران محترم مدارس مربوطه کمال تشکر را داریم.

انجام این تحقیق با حمایت مالی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده است که نهایت تشکر و قدردانی را از این بزرگواران داریم. همچنین از تلاش همکاران ارجمند، آقای دکتر

## References

- Bertone- ohnson ER, Hankinson SE, Bendich A, Johnson SR, Willett WC/Manson JE. Calcium and vitamin D intake and risk of incident premenstrual syndrome. *Arch Intern Med* 2005; 165(11): 1246-52.
- French L. Dysmenorrhea. *Am Fam Physician* 2005; 71(2):285-91.
- Andrzej Milewica, A, Diana Je drzejuk premens trual syndrome: From etiology to treatment, Maturitas Volume SS, supplement 1,1 November 2006 Page 547-554
- StrinicT, Bukovic D, Pavelic L, Fajdic J, Herman I, Stipic I, et al. Anthropological and clinical characteristics in adolescent women with dysmenorrheal. *Coll Antropol* 2003; 27(2): 707-110.
- Speroff L. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7<sup>th</sup> ed. *Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia*. 2005: 531-546.
- Avril M, Anisha Abraham, Zhihuna Huang, Lawrence J.D Knowledge, Attitudes, and Consequence sofmental Health in urban Adolescont Female, *J Pediatric and Adolescent Gynecology* 2006; 19(4): 271-275.
- Willson R. *Obstetrics and Gynecology*. 2<sup>nd</sup> ed. Translated by Kazemi D, *Daneshpajo Tehran* 1995: 140-142.
- Aghazadeh Naeini A, et al. *Principle manifestations and treatment of gynecologic diseases*. 1992: 21-24.
- Akbarzadeh Pash H. *Drugs in gynecology*. 1<sup>st</sup> edition. Pasha, 2005: 344-345.
- Kent JR, Berkovitz SS, Robert L, et al. *Kistner's Gynecology*: Principles and practice. 6<sup>th</sup> ed. Louis Baltimore Boston Carlsbad Chicago Naples New York. Philadelphia, 1995: 46-49.
- Steiner M. Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder, guidelines

- for management. *J Psychiatry Neurosci* 2000; 25(5): 459-468.
12. Immk PW, Wyatt KM, Jones PW, O'Brien PM. Efficacy of selective serotonin-reuptake inhibitors in Premenstrual syndrome: a systematic review. *Lancet* 2000; 356(9236): 1131-6.
13. Emami Maybodi M, et al. Non medical methods in Treatment of Premenstrual syndrome. *Iranian J Obstetrics Infertility*. 2005; 9(1): 124-130.
14. WWW. Arborcom. Com Calcium, iron and premenstrual syndrome and. *Arbo Clinical Nutrition up dates* 1999; 60: 1-2  
Issn 1446-5450.
15. Katrina M Wyatt, Paul W Dimmock, A Peter W Jones, PM Shaughn O'Brien, Efficacy of Vitamin B6 in the treatment of Premenstrual syndrome Systematic review. *BMJ* 1999; 318: 1375-1381.
16. Sayeh D. Premenstrual syndrome and new treatment. *Am J Obs & Gyn* 2006; 101: 43-47.
17. V.N. Prilepskaya, A.V Ledina, A.V. Tagiyeva, F.S Revazova, Vitex agnus Castus, Successful treatment of moderate to severe Premenstrual syndrome. *Mturatas* 2006; 55(1): 555-563.
18. James R, Ronald S, Beth Y, Arthur F. Danforth's Obstetrics and Gynecology. 9<sup>th</sup> ed. Lippincott Williams & Wilkins. *Philadelphia*. 2004: 653-662.
19. Bryant M, Truesdale KP, Dye L. Modest Changes in dietary intake across the menstrual Cycle: *Implications for Food in Take Research Br J Nutr* 2006, 96(5): 888-94.
20. Raja Sa Yegh, et al. the effect of a carbohydrate-rich beverage on mood, appetite, and cognitive function in women with premenstrual syndrome. *Obs & Gyn* 1995; 86(4): 250-258.
21. Novak D, Archuleta M, et al. The Relationship among Diet, Exercise, and Pre menstrual symptoms. *J Am Dietetic Association* 1995; 95(9): A56.
22. Aghazadeh Naeini A, Tamjidi A, Vallaei N. Epidemiologic study of premenstrual syndrome in 15-45 years old women in Tehran during the year 1995. *Pajouhandeh Quarterly research Journal* 1996; 2(1): 53-61.
23. Dolatian M, Montazeri Sh, Valaei N, Ahmadi M. Effect of vitamin E on premenstrual syndrome. *J Zanjan Univ Med Sci Health Services*. 2002; 37(9): 10-15.
24. Orhan Derman, Nuray Oksiz Kanbur, Tulay Erdogan Tokur and Tezer Kutluk, Premenstrual Syndrome and associated symptoms in adolescent girls, *European J Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 2004; 116(2/15): 201-206.
25. Pak Gohar M, Ahmadi M, Salehi Surmaghi MH, Mehran A, Akhond zadeh

- Sh. Effect of hypericum perforatum L. for treatment of premenstrual syndrome. *J Med Plants* 2005; 15(4): 33-42.
26. Angst J, Tsellaro RT, Merik RT, Endicott J. The epidemiology of premenstrual psychological symptoms. *Acta Psychity Scand* 2001; 104(2): 110-6.
27. Balbi C, Musone R, Menditto A, Di Prisco L, Cassese E, D Ajello M, et al. Influence of menstrual factors and dietary habits on menstrual pain in adolescence age. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2000; 91(2): 143-8.
28. Chisato Nagata, Kumi Hirokawa, Natsuki Shimizu, Hiroyuki Shimizu, Soy, Fat and other dietary factors in relation to premenstrual symptoms in Japanese women, BJOG: an International, *J Obs Gynecology* 2004; 111: 594-599.
29. Balbi C, Musone R, Menditto A, Di Prisco L, Cassese E, D Ajello M, et al. Influence of menstrual factors and dietary habits on menstrual pain in adolescence age. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2000; 91(2): 143-8.