

بررسی میزان تکرار تصاویر رادیوگرافی و عوامل مرتبط با آن در مراکز درمانی بخش های دولتی شهرستان ساری در سال ۱۳۸۷

غلامرضا فلاح محمدی

چکیده

سابقه و هدف : بررسی میزان تکرار تصاویر رادیوگرافی و عوامل مرتبط با آن در راستای بهرهوری مناسب از منابع موجود بخش های درمانی صورت می گیرد. تکرار تصاویر رادیوگرافی سبب استهلاک سیستم ها و کاهش عمر مفید آنها می شود. و موجب پرتوگیری کارکنان و بیماران می شود. با شناخت درصد تکرار تصاویر رادیوگرافی و عوامل مرتبط با آن می توان نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کرد و در نهایت صرفه جویی قابل ملاحظه ای در منابع مالی حاصل خواهد شد.

مواد و روش ها : در این مطالعه توصیفی، نمونه ها (تصاویر رادیوگرافی) بصورت آمارگیری و غیر تصادفی به مدت سه ماه از ۸ اتاق رادیوگرافی و چهار تاریکخانه و چهار بیمارستان دولتی در شهرستان ساری جمع آوری شدند. در مدت مطالعه، تمامی فیلم های کنار گذاشته شده توسط کارشناسان مقیم در هر مرکز، مطالعه مشاهده شد و اطلاعات در فرم های طراحی شده وارد گردید. در این طرح عوامل مرتبط با تکرار تصاویر رادیوگرافی شامل: خطاب در شرایط تابش، خطاب در حالت گماری بیمار، عدم انتخاب درست نقطه تابش روی عضو و عدم انتباط مرکز تابش و مرکز کاست، انتخاب نامناسب اندازه فیلم، حرکت بیمار، خطای ناشی از دستگاه، تغییرات ظاهر تصویر ناشی از تاریکخانه و سایر موارد مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها : از ۳۶۷۵۸ فیلم استفاده شده در چهار مرکز درمانی، ۲۱۵۵ فیلم تکرار شد و درصد کل تکرار تصاویر رادیوگرافی ۵/۹ درصد بود. بیشترین درصد تکرار تصاویر رادیوگرافی در بیمارستان بوعلی سینا (۷/۲ درصد) و کمترین درصد تکرار مربوط به بیمارستان زارع (۰/۷ درصد) بود. از عوامل مرتبط با تکرار تصاویر رادیوگرافی، بیشترین درصد تکرار مربوط به شرایط تابش بالا (۱/۴ درصد) و کمترین درصد مربوط به انتخاب نامناسب اندازه فیلم (۰/۰۸ درصد) بود. درصد سایر عوامل شامل انتخاب شرایط تابش پایین (۱/۱۲ درصد)، خطاب در مرکز تابش (۰/۹۲ درصد)، سایر موارد (۰/۸۴ درصد)، تاریکخانه (۰/۷۸ درصد)، خطاب در حالت گماری بیمار (۰/۳۲ درصد)، خطای عملکردی دستگاه (۰/۲۷ درصد) و عامل حرکت (۰/۱۴ درصد) می باشد.

استنتاج : این مطالعه نشان می دهد که درصد تکرار تصاویر رادیوگرافی در بیمارستان های دولتی شهرستان ساری نسبت به آمارهای منتشر شده در سایر مراکز در سطح قابل قبولی قرار دارد. با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله آموزش پرسنلی که از تجربه کمتری برخوردارند، کنترل کیفی منظم دستگاه های مولد اشعه ایکس و مراحل تاریکخانه، طراحی روش های انتخاب مناسب شرایط تابش می توان درصد تکرار تصاویر رادیوگرافی را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد و از به هدر رفتن منابع مالی جلوگیری کرد.

واژه های کلیدی: فیلم های تکرار شده، رادیوگرافی، خطاب

مقدمه

بایهای ها و در راستای بهرهوری از منابع موجود و نیز با توجه به استفاده روز افرون از اشعه X در تشخیص

مؤلف مسئول: غلامرضا فلاح محمدی - ساری: کیلومتر ۱۸ جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده پیراپزشکی گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تاریخ دریافت: ۸۸/۱/۱۹ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۸۸/۲/۹ تاریخ تصویب: ۸۸/۳/۶

گرفتند. در این تحقیق ۸ اتاق رادیوگرافی و چهار تاریکخانه از چهار بیمارستان دولتی امام خمینی(ره)، بوعلی سینا، فاطمه زهرا(س)، مرکز سوختگی زارع در شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت. قبل از شروع تحقیق، جهت بررسی سلامت لوله ها و گیره ها چند تست فیریکی مشخص مانند انطباق میدان نور و اشمعه در کلیماتور و عدم زاویه تیوب اشعه در راستای محور عرض تخت روی دستگاه های رادیوگرافی و کترول کاسته های رادیوگرافی انجام شد. پس از جمع آوری فیلم های کنار گذاشته شده، این فیلم ها شمارش شده و با توجه به اطلاعات در دسترس از کل بیماران پذیرش شده و تعداد فیلم های استفاده شده، کسر تکرار مطابق رابطه زیر محاسبه گردید:

$$R_i = A_i / (A_i + B_i)$$

که در آن

R_i = کسر تکرار تصاویر رادیوگرافی در مرکز

A_i = تعداد کل تصاویر تکرار شده

B_i = تعداد کل فیلم های قابل قبول که جهت انجام گزارش تشخیصی فرستاده می شود.

در راستای تعیین عوامل مرتبط با تکرار تصاویر رادیوگرافی، فرم جمع آوری اطلاعات طراحی شد و در آن برخی از رایجترین عوامل تکرار تصاویر رادیوگرافی درج گردید. تعیین همه علتهای تکرار تصاویر رادیوگرافی از اهداف این طرح نبوده بلکه هدف شناسایی مهمترین عوامل موثر در تکرار تصاویر مطابق با فرم جمع آوری اطلاعات بود. رایجترین عوامل در تکرار تصاویر رادیوگرافی عبارتند از: ۱- خطای روش تابش که منجر به ایجاد تصویری کاملاً تاریک یا روشن می شود. این خطای با رویت تصویر قابل بررسی است؛ ۲- خطای در حالت گماری بیمار (positioning) که با مشاهده تصویری با بزرگنمایی نامتقارن و یا عدم رویت کامل عضو مورد بررسی قابل مطالعه است؛ ۳- عدم انتخاب درست نقطه تابش روی عضو و عدم انطباق مرکز تابش و مرکز کاست (centring)، این خطای با

کاهش هزینه ها بررسی میزان عوامل منجر به تکرار تصاویر رادیوگرافی از ضرورت های اجتناب ناپذیر است. استفاده نادرست از مولد پرتوهای X منجر به پرتوگیری بیش از اندازه بیماران و پرسنل بخش رادیولوژی می شود که مغایر (As low As Reasonably Achievable) ALARA با اصل ALARA بدبین معناست که طراحی و استفاده از چشمها و اثر مربوط به آنها به گونه ای باشد که نگهداشتن پرتووده ها را در پایین ترین حد تاثیر گذاری معقول تضمین کند.^(۲) علاوه بر آن تکرار تصاویر رادیوگرافی سبب استهلاک دستگاه ها و کاهش عمر مفید آنها، افزایش زمان خدمات رسانی به بیماران، ازدحام بخش های رادیولوژی و نارضایتی مراجعین می شود. در مقالات متعدد، موارد مختلفی به عنوان عوامل منجر به تکرار تصاویر رادیوگرافی معرفی شده است. این عوامل شامل، فاکتورهای تابش نادرست، تکنیک پرتو نگاری نادرست، نقص دستگاه های اشعه ایکس، نقص در فرآیند ظهور و ثبوت و عدم همکاری بیمار است.^(۳) در برخی دیگر از تحقیقات عواملی چون تصاویر خیلی تاریک، خیلی روشن، حالت گماری بیمار، نقطه تابش روی عضو، حرکت بیمار، ظهور و ثبوت فیلم، دستگاه های رادیوگرافی، خطای در آنatomی عضو مورد بررسی، خطای در اندازه فیلم و سایر موارد بعنوان عوامل مهم در تکرار تصاویر رادیوگرافی مطرح شده است.^(۴) در این طرح تحقیقاتی نیز سعی شده است تا ضمن بررسی میزان تکرار تصاویر رادیوگرافی مهمترین عوامل موثر بر تکرار تصاویر نیز شناسایی شود تا راهکارهای مناسب جهت کاهش تکرار تصاویر رادیوگرافی و به تبع آن کاهش هزینه های تحمیل شده بر مراکز درمانی دولتی ارائه گردد.

مواد و روش ها

در این طرح توصیفی، نمونه ها (تصاویر رادیوگرافی) بصورت آمارگیری و غیر تصادفی برای مدت سه ماه جمع آوری شدند و از طریق مشاهده مورد مطالعه قرار

رادیو گرافی و همچنین فراوانی مطلق، فراوانی نسبی و درصد فراوانی برای عوامل مرتبط با آن مطابق با موارد ذکر شده تعیین شد و بدین ترتیب اهداف کلی و اختصاصی طرح محقق گردید.

یافته ها و بحث

در مدت اجرای طرح، تعداد ۳۶۷۵۸ فیلم در چهار بیمارستان مورد بررسی، مصرف شد. جدول شماره ۱ درصد تکرار تصاویر رادیو گرافی در بیمارستان های مورد بررسی را نشان می دهد

جدول شماره ۱ : درصد تکرار تصاویر رادیو گرافی در بیمارستان های دولتی شهرستان ساری

بیمارستان های دولتی شهرستان ساری	درصد تکرار تصاویر رادیو گرافی
بعلی سینا	۷/۲
امام خمینی (ره)	۵/۳
فاطمه زهرا (س)	۵/۲
زارع	۰/۷

نتایج این بررسی نشان می دهد که درصد کل تکرار تصاویر رادیو گرافی ۵/۹ درصد می باشد. سهم درصدی هر یک از عوامل منجر به تکرار برای چهار بیمارستان مورد مطالعه در جدول شماره ۲ آمده است. با توجه به این که محدوده درصد تکرار تصاویر رادیو گرافی که در تحقیقات معرفی شده است بین ۰/۹ تا ۲۷/۶ درصد است (۱۰-۵)، می توان گفت درصد تکرار در بیمارستان های دولتی شهرستان ساری در محدوده

رویت تصویر قابل بررسی است؛ ۴- انتخاب نامناسب اندازه فیلم (film size)، ۵- حرکت بیمار (movement)؛ این خطای سبب محو شدن و عدم وضوح تصویر می شود؛ ۶- خطای ناشی از دستگاه (equipment) که با مطالعه تصویری با دو پروژکشن در یک فیلم (مانند تصویر روی رو و نیمرخ در یک فیلم) و رویت تصاویر یک بیمار در آزمایشاتی که چندین رادیو گرافی جهت پیگیری عملکرد عضو انجام می شود (مانند IVU، ترازیت) این خطای مطالعه می شود؛ ۷- تغییرات ظاهر تصویر ناشی از تاریکخانه (processing or darkroom)، که با مشاهده تصویر، این خطای قابل مطالعه است، زیرا اثر شستشوی نامناسب فیلم یا کنده شدن امولسیون فیلم ناشی از خرابی غلطک ها بوضوح مشهود است؛ و ۸) سایر موارد (others)، هر گونه عاملی غیر از عوامل فوق که منجر به تکرار کلیشه رادیو گرافی شود، در این دسته جای می گیرد، عواملی مثل عدم وجود اطلاعات بیمار و تاریخ انجام رادیو گرافی، آرتی فکت، خطای در انجام نوع رادیو گرافی مورد درخواست و غیره. بخشی از تصاویر رادیو گرافی که به همراه بیماران بستری به بخش مربوطه فرستاده می شود در صورت نیاز به تکرار به بخش رادیولوژی فرستاده می شد و یا توسط مسؤول بخش مربوطه جمع آوری و در آمار فیلم های کنار گذاشته شده قرار گرفت. پس از جمع آوری نمونه ها تصاویر رادیو گرافی توسط کارشناسان رادیولوژی هر بیمارستان که آموزش های لازم را دریافت کرده اند، رویت شده و در فرم مخصوص، مطابق با تعاریف بالا وارد گردید. پس از تکمیل فرم های مربوطه، میزان تکرار تصاویر

جدول شماره ۲ : تعداد (درصد) تصاویر تکرار شده بر حسب عوامل منجر به تکرار در بیمارستان های دولتی شهرستان ساری

تکرار تصاویر رادیو گرافی	شرط	اندازه فیلم	حالات	خطای عملکردی	حرکت بیمار	مرکز تابش	دستگاه	تاریکخانه	سایر موارد
تکرار									
تعداد (درصد)	تعداد بالا	تابش پایین	گماری بیمار						
(۱/۴) ۵۱۳	(۱/۱۲) ۴۱۳	(۰/۰۸) ۳۱	(۰/۰۳۲) ۱۱۶	(۰/۹۲) ۳۳۸	(۰/۱۴) ۵۰	(۰/۷۸) ۲۸۷	(۰/۲۷) ۹۹	(۰/۰۸۴) ۳۰۸	

لازمست نسبت به تعویض این سیستم در این مرکز اقدام شود. در بیمارستان امام خمینی(ره) خطای مربوط به مرکز تابش و سایر موارد از درصد بالایی برخوردار است. خطای مرکز تابش یا فاعلی است و یا مربوط به دستگاه است. با توجه به یافته‌های حاصل شده در این تحقیق اقدامات زیر می‌تواند در کاهش قابل ملاحظه درصد تکرار تصاویر رادیوگرافی در بیمارستان‌های دولتی شهرستان ساری موثر واقع شود: تهیه تجهیزات کمکی جهت محدود کردن حرکت عضو مورد بررسی یا بیمار (بخصوص بیمارستان بوعلی سینا)، تهیه چارت‌های مخصوص انتخاب شرایط تابش برای کارکنانی که از تجربه کمتری برخوردارند، تعویض برخی از دستگاه‌های مولد پرتو و پروسسورها، آموزش منظم پرسنل و کنترل کیفی منظم دستگاه‌های مولد اشعه ایکس و پروسسورها. پیشنهاد می‌شود پیرامون ارزیابی کیفی کلیشه‌های رادیوگرافی تحقیق جداگانه‌ای انجام شود.

سپاسگزاری

بدینوسیله بر خود لازم می‌دانم که از زحمات آقای توبه مسئول محترم بخش رادیولوژی و آقای شمیرانی کارشناس رادیولوژی بیمارستان امام خمینی، آقای صمدایی مسئول محترم بخش رادیولوژی بیمارستان بوعلی سینا، خانم کراسوس مسئول محترم بخش رادیولوژی بیمارستان فاطمه زهرا(س) و خانم ابراهیمی از پرتوکاران بخش رادیولوژی بیمارستان زارع کمال فدردانی را جهت همکاری در این طرح تحقیقاتی بنمایم.

References

- Clark PA, Hogg P. Reject/repeat analysis and the effect prior film viewing has on a department's reject/repeat rate. Radiography 2003; 9: 127-137.
- Rastikerdar S, Naderi MH. Chemical effects and radiation biology. Fundamentals of Radiation Protection. Rastikerdar S, Naderi MH. 1th ed. Isfahan: Isfahan University Press; 2002. P: 492 (Persian).

قابل قبول قرار دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که شرایط تابش بالا و انتخاب نادرست اندازه فیلم به ترتیب به عنوان بیشترین و کمترین دلایل تکرار می‌باشد. بیمارستان بوعلی، بالاترین و بیمارستان زارع کمترین درصد تکرار را دارند. در تحقیق جدیدی(۵)، Nixon (۱۰) خطا در حالت گماری را بعنوان مهمترین عامل تکرار تصاویر رادیوگرافی معرفی کردند، در حالیکه در تحقیق حاضر از میان نه فاکتور دخیل در تکرار تصاویر، این عامل در رده ششم قرار گرفت. در تحقیق اصغر زاده و همکاران بیشترین درصد تکرار مربوط به عدم انتخاب صحیح فاکتورهای تابش (۲ درصد) و عدم استفاده از تکنیک‌های پرتونگاری صحیح (۱ درصد) معرفی شده است(۳).

آمار پذیرش بیمار در بیمارستان زارع نسبت به سایر مراکز در این تحقیق بدلیل واقع شدن دور از شهر و عدم سهولت دستیابی به آن کمترین است و لذا درصد تکرار تصاویر نیز در آن از کمتر است. بیمارستان بوعلی مرکز تخصصی اطفال است و سهم حرکت بیمار در خرابی تصاویر و تکرار آن نسبت به سایر مراکز بیشتر است. انتخاب شرایط تابش بالا، بیشترین علت تکرار در بیمارستان امام خمینی و بوعلی است. برخی از دستگاه‌های دومرکز بوعلی و امام خمینی از عمر بالایی برخوردارند (باتوجه به تاریخ نصب آنها) و سهم خطای عملکردی دستگاه در آنها بالاست. نظر به آمار بالای پذیرش بیمار ان در این دو مرکز لازم‌ست نسبت به تهیه دستگاه‌های جدید اقدام شود. خرابی پروسسور در بیمارستان فاطمه زهرا(س)، درصد تکرار مربوط به تاریکخانه را در این مرکز افزایش داده است و

3. Ali asgharzadeh A, Mohseni M. Evaluation of repeated radiographic films and its causes in Kashan hospital in 2003. J Feiz 2005; 33(9): 50-56 (Persian).
4. URL:http://www.srp_uk.org/srpcdrom/p4-7.doc. Accessed Feb 21, 2009.
5. Jadidi M. Quality assessment of the radiography films. J Iran Univ Med Sci 2002; 30(9): 317-326 (Persian).
6. Peer S, Peer R, Giacomuzzi S.M, Jaschke W. Comparative Reject Analysis in Conventional Film-screen and Digital Storage Phosphor Radiography. Radiat Prot Dosim 2001; 94 (1-2): 69-71.
7. Lewentant G, Bohndorf K. Analisis of reject X-ray films as a quality assurance element in diagnostic radiology. Rofo 1997; 166: 376-381.
8. Nixon PP, Thorogood J, Holloway J, Smith NJ. An audit of film rejects and repeats in a department of dental radiology. Br J Radiol 1995; 68: 1304-1307.
9. Al-Malki MA, Abulfaraj W.H, Bhuiyan S.I, Kinsara AA. A study on radiographic repeat rate data of several hospitals in Jeddah. Radiat Prot Dosim 2003; 103: 323-330.
10. Morgan TL, Banks DA, Kagan AR. Radiation therapy port film, a quality assurance study. Int J Radiat Oncol Biol Physics 1998; 42(1): 223-227.