

ضروری بر نقش قارچ‌ها در درماتیت آتوپیک

مهدی طاهری سروتین^۱

زهره حاج حیدری^۲

محمد تقی هدایتی^۳

چکیده

سابقه و هدف: درماتیت آتوپیک (AD) یک بیماری پوستی مزمن یا التهابی عود کننده است که ۱۰-۲۰ درصد بچه‌ها و ۱-۳ درصد بالغین را گرفتار می‌کند. اخیراً عوامل میکروبی خصوصاً قارچ‌ها به عنوان عوامل تشید کننده درماتیت آتوپیک مورد توجه قرار گرفته‌اند. قارچ‌ها در سرتاسر جهان وجود دارند. بعضی از قارچ‌ها فلور طبیعی بدن و بعضی از آن‌ها به فراوانی در محیط وجود دارند. هدف این مطالعه مروری بر آخرین دانسته‌های مربوط به نقش قارچ‌ها در پاتوژنز بیماری درماتیت آتوپیک می‌باشد.

مواد و روش‌ها: بررسی گستره‌های در سایت PubMed/MEDLINE و همچنین پایگاه‌های جستجوی اطلاعات داخلی در زمینه مقالات مرتبط با نقش قارچ‌ها در بیماری درماتیت آتوپیک منتشر شده طی سال‌های ۱۹۶۶-۲۰۱۱ صورت گرفت.

یافته‌ها: مالاسزیا، کاندیدا، آلتنتاریا و کلادوسپوریوم شایع‌ترین قارچ‌هایی بودند که مطالعات به نقش آن‌ها در درماتیت آتوپیک پرداخته بودند. میزان کلونیزاسیون کاندیدا و مالاسزیا در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک بیشتر بود؛ علاوه بر این واکنش افزایش حساسیت تیپ I نسبت به مالاسزیا، کاندیدا، آلتنتاریا آلتنتاتا و کلادوسپوریوم هرباروم در درصد قابل توجهی از بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک دیده شده است.

استنتاج: قارچ‌ها منبع مهمی از آلرژن‌ها هستند و می‌توانند باعث ایجاد التهاب جلدی در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک شوند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که پزشکان به غربالگری و درمان هیرکلوزیزاسیون و افزایش حساسیت تیپ I نسبت به قارچ‌ها در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک خصوصاً بیمارانی که به درمان‌های سنتی پاسخ نمی‌دهند، توجه ویژه نمایند.

واژه‌های کلیدی: درماتیت آتوپیک، آلتنتاریا آلتنتاتا، کاندیدا، کلادوسپوریوم هرباروم، مالاسزیا

مقدمه

اشخاص مختلف، متفاوت باشد. شایع‌ترین علایم شامل خشکی، قرمزی، وجود ماکول، پاپول و وزیکول در پوست، نواحی اگراماتوس همراه با کبره، گلسنگی و کنده شدن پوست، عفونت ثانویه، لنفادنوباتی، حساسیت

علایم بالینی و پاتوژنر بیماری آتوپیک درماتیت آتوپیک^۱ بیماری مزمن و التهابی است که اولین بار در سال ۱۹۳۳ توسط Wise Sulzberger و مطرح شد^(۱). علایم بالینی این بیماری ممکن است در

1. Atopic dermatitis (AD)

مؤلف مسئول: دکتر محمد تقی هدایتی - ساری: کیلومتر ۱۸ جاده خزر آباد، مجتمع دانشگاهی پامبر اعظم، دانشکده پزشکی

۱. دانشجوی دکتری قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران و کرمان

۲. گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۳. گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۸/۲ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۰/۹/۶ تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰

هنوز رابطه بین اثر و عامل، اختلالات ایمونولوژیکی و همین طور بین اختلالات ایمونولوژیکی و دیگر یافته‌ها در بیماری درماتیت آتوپیک مشخص نیست(۱۰). اختلالات ایمونولوژیکی در توازن سیتوکاین‌ها، اوزینوفیلی، عوامل ماست سل، افزایش ترشحات بازوپلیل، هورمون‌های تحریک‌کننده ملانوسیت، استیل کولین، پیتیدهای IgE مرتبط با ژن کالسیتونین، نوروکینین A، تولید IgE اختصاصی و توتال، رسپتورهایFc ایمونوگلوبولین E و کاهش سلول‌های T اپیدرم و در نتیجه در پاتوژنر بیماری درماتیت آتوپیک مؤثر می‌باشند(۱۰). علاوه بر اختلالات ایمونولوژیکی، فاکتورهای ژنتیکی نیز در پاتوژنر این بیماری نقش دارند. مهمترین تصوری در این مورد این است که اختلال در یک ژن ناشناخته باعث افزایش cAMP-استراز می‌شود که افزایش cAMP داخل سلولی را در پی دارد. تغییر در غلظت cAMP باعث افزایش تحریک ماست سل‌ها و بازوپلیل‌ها می‌شود که منجر به افزایش ترشح هیستامین، لکوتین، افزایش سلول‌های Th₂ و ایجاد آتوپی می‌گردد(۱۱،۱۲). مواد شیمیایی، غذاها، آلرژن‌های موجود در هوای نیز ممکن است در پاتوژنر بیماری درماتیت آتوپیک نقش داشته باشند، اما هنوز نقش دقیق آن‌ها شناخته شده نیست(۱۳).

به نظر می‌رسد از میان عوامل مساعد کننده، افزایش حساسیت جلدی، پاسخ نامناسب سیستم ایمنی به قارچ‌ها و دیگر میکرووارگانیسم‌ها و همین طور عفونت ثانویه نقش مهمتری در ایجاد و پیشرفت درماتیت آتوپیک داشته باشند(۹).

نقش قارچ‌ها در بیماری‌های پوستی

قارچ‌ها قادر به رشد و عفونی کردن پوست هستند. عوامل قارچی از طریق تولید توکسین، تحریک واکنش‌های ایمونولوژیکی و تولید آنزیم‌ها و متabolیت‌ها قادر به ایجاد ضایعه در پوست هستند(۱۴). علایم ناشی از رشد قارچ‌ها بسته به سیستم ایمنی میزبان، نوع قارچ و موضع عفونت متفاوت می‌باشد. رشد قارچ‌ها بر روی

به نور و خارش است. خارش مهم‌ترین علامت این بیماری می‌باشد و خاراندن پوست ممکن است باعث تغییرات زیادی در پوست این افراد شود. پشت زانو، مچ دست، صورت و دست‌ها شایع‌ترین محل‌های گرفتاری را در این بیماران تشکیل می‌دهند(۴-۶). این بیماری دارای ۳ فاز می‌باشد که بر اساس سن و توزیع ضایعات تقسیم بندی می‌شوند. در مرحله نوزادی (از زمان تولد تا ۲ سالگی) صورت، زیر پوشک و ناحیه بیرونی زانو بیشتر گرفتار می‌شود. در مرحله کودکی (۲-۱۲ سالگی) خمیدگی زانو، اطراف گردن، مچ دست‌ها، قوزک پا، انگشت‌ها و ناخن‌ها بیشتر گرفتار می‌شوند. در مرحله بزرگسالی (بیشتر از ۱۲ سال) فلکسورها، دست‌ها، مقعد، واژن، پستان‌ها، لب‌ها و پوست اطراف آن بیشتر گرفتار می‌شوند. این علائم کلینیکی در تشخیص درماتیت آتوپیک بسیار ضعیف هستند و علائم کلینیکی و تست‌های آزمایشگاهی معتبری در این زمینه وجود ندارد(۶،۵). بیماران مبتلا خواب کمتر از طبیعی داشته و آسیب‌پذیری روحی و روانی پیدا کرده و در انجام کارهای روزمره دچار اختلال می‌شوند که هزینه زیادی برای خانواده و جامعه در پی دارد(۷). این بیماری معمولاً قبل از دو سالگی شروع می‌شود و اولین علائم کلینیکی در این سن دیده می‌شوند. ۷ درصد تا ۱۷ درصد بچه‌ها به این بیماری مبتلا می‌شوند که در دو سوم آن‌ها تا بزرگسالی ادامه می‌یابد و بسته به سن نواحی مختلفی از بدن را گرفتار می‌کند(۷). شواهد نشان می‌دهد که میزان بروز درماتیت آتوپیک در همه کشورهایی که به سبک غربی زندگی می‌کنند در حال افزایش است اما علت دقیق این امر شناخته شده نیست(۸). عقیده بر این است که عوامل ژنتیکی، اختلالات ایمنی، نقش در سد دفاعی پوست، تماس با آلرژن‌ها، آلوده کنندهای هوای دیگر عوامل محیطی در ایجاد این بیماری نقش داشته باشند. با این وجود هنوز مفهوم ثابتی از پاتوژنر درماتیت آتوپیک وجود ندارد(۹،۸). نقش اختلالات ایمونولوژیکی در ایجاد بیماری درماتیت آتوپیک پذیرفته شده است اما

پوست بوده و با تعدادی از بیماری‌های پوست مرتبط می‌باشند اما بیماری زایی آن‌ها معمولاً بعد از دوران بلوغ اتفاق می‌افتد. روش انتقال میکرووارگانیسم به طور دقیق مشخص نیست، اما در بیشتر موارد شنا در استخر و نزدیک سواحل دریا گزارش شده است(۲۲). این ارگانیسم در شرایط خاصی مسبب بیماری‌های پیتریازیس و رسیکالر و درماتیت سبورئیک می‌باشد. پیتریازیس شایع‌ترین بیماری است که توسط این قارچ‌ها ایجاد می‌شود و به صورت ماقول‌هایی تیره یا روشن در پوست دیده می‌شود. بهندرت در کودکان دیده می‌شود(۲۳،۲۴). درماتیت سبورئیک بیماری پوستی مزمن، التهابی و پوسته ریزی‌دهنده می‌باشد که ضایعات آن منتشر، چرب و توأم با شورش و خارش بوده و در پوست سر و صورت و قسمت‌های فوکانی تنه که غنی از غدد سیاسه می‌باشد دیده می‌شود(۲۴). عوامل قارچی علاوه بر بیماری‌های جلدی قادر به ایجاد عفونت‌های زیر جلدی نیز می‌باشند. بیماری‌های قارچی زیر جلدی گروه ناهمگنی از عفونت‌های قارچی هستند که در اثر ترومما و ورود قارچ به درم و بافت‌های زیر جلدی ایجاد می‌شوند و بهندرت به بیماری‌های سیستمیک تبدیل می‌شوند. عفونت به آهستگی پیشرفت می‌کند و عامل بیماری به تدریج با شرایط نامناسب بیمار سازگار می‌شود(۲۵). مهم‌ترین عفونت‌های قارچی زیر جلدی اسپوروتیکوزیس، مایستوما، زایگومایکوزیس زیر جلدی، کروموبلاستومایکوزیس، لوبومایکوزیس، رینوسپوریدیوزیس و فاوهایفومایکوزیس زیر جلدی می‌باشند و تشخیص آن‌ها بر اساس عالیم کلینیکی، هیستوپاتولوی و کشت عوامل اتیولوژیکی صورت می‌گیرد(۲۶). عفونت معمولاً در اثر نفوذ قارچ در اثر ترومما ایجاد می‌شود. شبیه سایر بیماری‌های قارچی، نقص سیستم ایمنی باعث افزایش خطر این گروه از بیماری‌های قارچی می‌شود. افراد زیادی در سراسر دنیا خصوصاً در نواحی تropیکال به این گروه از عفونت‌های قارچی مبتلا می‌شوند. درمان عفونت‌های قارچی

پوست می‌تواند باعث ایجاد راش‌هایی با ظاهر متفاوت شود. بعضی از این راش‌ها قرمز، فلسی شکل و خارش‌دار هستند؛ ولی بعضی از آنان می‌توانند ظاهری شبیه خشکی پوست ایجاد کنند(۱۵). عواملی مانند مصرف آنتی‌بیوتیک، استروئید، دیابت، چاقی، عفونت قارچی پوست در گذشته، ضعف سیستم ایمنی، خراش و بریده شدن پوست باعث افزایش عفونت‌های قارچی پوست می‌شود. عفونت‌های قارچی سطحی شایع‌ترین عامل بیماری‌های پوستی در بیشتر گروه‌های سنی می‌باشند. درماتوفیت‌ها، گونه‌های کاندیدا و گونه‌های مالاسزیا شایع‌ترین جنس‌های قارچی هستند که باعث بیماری‌های پوستی می‌شوند(۱۶). درماتوفیت‌ها قارچ‌های رشته‌ای هستند که از انسان‌ها، حیوانات و بهندرت از خاک به انسان منتقل می‌شوند. درماتوفیت‌ها شایع‌ترین عامل عفونت‌های قارچی پوست هستند و ۱۰-۲۰ افراد در طول زندگی خود دچار این عفونت می‌شوند(۱۷). این قارچ‌ها با تولید پروتئاز و شکستن کراتین باعث ایجاد بیماری می‌شوند و گروهی از عفونت‌ها را به نام تینه آ ایجاد می‌کنند که عالیم کلینیکی آن‌ها به نوع میکرووارگانیسم، پاسخ ایمنی میزان و محل عفونت بستگی دارد(۱۷،۱۶). گونه‌های کاندیدا به خصوص کاندیدا آلبیکس نیز قادر به ایجاد بیماری‌های پوستی می‌باشند. این میکرووارگانیسم‌ها به فراوانی در محیط خصوصاً در خاک‌های غنی از کود وجود دارند. علاوه بر این گونه‌های کاندیدا به صورت کامنسال در دهان، مجرای گوارشی، دستگاه ادراری تناسلی و گاهی در پوست سالم دیده می‌شوند(۱۸). افرادی که در مکان‌های گرم و مرطوب کار می‌کنند و یا با مواد حاوی مقادیر بالای قند سر و کار دارند مانند کارگران صنایع غذایی، آشپزها، رختشوری‌ها و شیردوش‌ها بیشتر در معرض عفونت با گونه‌های کاندیدا می‌باشند. نواحی چین دار مانند زیر بغل، کشاله ران و زیر پستان‌ها به علت گرما و رطوبت بیشتر مبتلا می‌شوند(۲۱،۲۰). گونه‌های مالاسزیا کامنسال شایع

پروتئاز مترشحه از قارچ‌ها و دیگر میکرووارگانیسم‌ها باعث افزایش pH استراتوم کورنثوم می‌شود که این افزایش pH با کلونیزاسیون بیشتر آن‌ها در سطح پوست کمک می‌کند(۴۰،۳۹). قارچ‌ها و سایر عوامل میکروبی تولید سیتوکاین‌های پیش التهابی را تحريك می‌کنند و این سیتوکاین‌ها به رسبتورهای اندوتیلوم عروق متصل می‌شوند و با فعال کردن مسیرهای انتقال سیگنانل و تحريك مولکول‌های چسپنده اندوتیال باعث ورود سلول‌های التهابی به پوست می‌شوند(۴۱). سیتوکاین‌های Th₂ مانند IL-4 باعث افزایش بیان فیرونکتین می‌شود که افزایش اتصال قارچ‌ها به پوست را در پی دارد(۴۲). میکرووارگانیسم‌ها همچنین باعث افزایش مقاومت به گلوکوکورتیکوئید و بدتر شدن حالات کلینیکی بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک می‌شود(۴۳). توکسین‌های مترشحه از قارچ‌ها و سایر عوامل میکروبی باعث فعال شدن سلول‌های T و ترشح مدیاتورهای پیش التهابی می‌شوند. علاوه بر این توکسین‌ها باعث افزایش اختلال در سیستم ایمنی، آسیب به کراتینوسیت‌ها و آپوپتوزیس لنفوسيت‌ها می‌شوند و همین طور با افزایش تولید INFγ در مزمن شدن بیماری درماتیت آتوپیک نقش دارند(۴۴). در مطالعه مروری حاضر با بهره‌گیری از سایت‌های معتبر جستجوی مقالات در زمینه پژوهشی به ویژه Pubmed ، Medline ، ISI و همچنین پایگاه‌های جستجوی اطلاعات داخلی به مرور همه جانبه در زمینه نقش قارچ‌ها در ایجاد و پیشرفت درماتیت آتوپیک پرداخته شده است.

قارچ‌های دخیل در بیماری درماتیت آتوپیک کلادوسپوریوم هرباروم، آلترناریا آلترناتا و قارچ‌های مخمری کاندیدا و مالاسزیا از جمله مهم‌ترین قارچ‌هایی هستند که در مطالعات مختلف به نقش پر اهمیت آن‌ها در درماتیت آتوپیک اشاره شده است؛ که در ادامه مقاله به طور اختصاصی راجع به هریک از آن‌ها بحث خواهد شد. مطالعات نشان داده است که

زیرجلدی به وسیله داروهای ضد قارچی و جراحی صورت می‌گیرد اما کنترل این بیماری‌ها مشکل بوده و غالب شاهد عود بیماری هستیم(۲۷،۲۶).

نقش قارچ‌ها در درماتیت آتوپیک بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک تمایل زیادی به کلونیزه یا عفونی شدن به وسیله میکرووارگانیسم‌ها دارند. IgE پاسخ نامناسب سیستم ایمنی به همراه افزایش سطح IgE توتال و اختصاصی با افزایش شدت بیماری و عوارض عفونی مرتبط است(۲۸،۲۹). قارچ‌ها از جمله میکرووارگانیسم‌هایی هستند که به صورت فلور طبیعی در بدن و همین طور در محیط به فراوانی وجود دارند. در سال‌های اخیر به نقش قارچ‌ها در ایجاد درماتیت آتوپیک بسیار توجه شده است(۳۰-۳۲). بعضی از مطالعات اشاره کرده‌اند که قارچ‌ها با ایجاد و تداوم واکنش‌های آлерژیک در بحرانی تر نمودن حالات کلینیکی این بیماری نقش دارند. در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک افزایش کلونیزاسیون قارچ‌ها همراه با افزایش سطح IgE اختصاصی نسبت به قارچ‌ها دیده می‌شود و بعضی از مطالعات به درمان‌های ضد قارچی در بهبود علایم کلینیکی اشاره کرده‌اند(۳۳-۳۵). کلونیزاسیون قارچ‌ها در پوست و مخاطرات باعث تحريك التهاب پوست در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در پاتوژنز این بیماری ایفاء کند. نقص در سد دفاعی پوست این بیماران باعث ورود قارچ‌ها و آлерژن‌های آن‌ها به لایه‌های زیرین پوست و جذب آن‌ها توسط سلول‌های لانگهانس و تحريك سلول‌های Th₂ می‌شود که تشديد التهاب و بدتر شدن وضعیت این بیماران را در پی دارد(۳۷،۳۶). قارچ‌ها همچنین قادر به فعال کردن کمپلمان از راه آلترناتیو هستند و همین طور با تحريك کراتینوسیت‌ها باعث تولید سیتوکاین‌های التهابی مانند IL-6 و TNFα می‌شوند که به نقش آن‌ها در پاتوژنز بیماری درماتیت آتوپیک کمک می‌کند(۳۸).

درماتیت آتوپیک کاهش می‌یابد(۵۵،۵۴). از این رو این افراد به عفونت‌های پوستی نیز حساس می‌شوند. تولید و متابولیسم لیپیدها در پوست مستلزم pH اسیدی پوست pH می‌باشد. در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک pH پوست افزایش یافته و میزان لیپید، اسکوالن و استرهای موئی متوجه از عدد سباه کاهش یافته و متعاقب آن میزان کلسترول آزاد و استریفیه شده افزایش می‌یابد. در این حالت میزان آنتی‌اکسیدان‌های چربی دوست و آنزیم‌های سم‌زا کاهش می‌یابد. بنابراین محیط بسیار مناسبی برای رشد و تکثیر میکرووارگانیسم‌ها فراهم می‌شود(۵۶،۵۷).

مالاسزیا و درماتیت آتوپیک

در سال ۱۸۴۶ برای اولین بار Eichstedt شبه مخمر مالاسزیا را گزارش کرد. این شبه مخمر متعلق به شاخه بازیدیومایکوتا می‌باشد و در خانواده کریتیوکوکاسه قرار دارد. در گذشته مطالعات مختلف از نام‌های متفاوتی مانند پیتیروسپوروم اوال و پیتیروسپوروم اوریکولار که نشأت گرفته از شکل ییضی و یا گرد این قارچ بود، استفاده می‌کردند؛ ولی امروزه نام مالاسزیا به افتخار Malassez مارچ شناس ایتالیایی برای این قارچ مخمری شکل به کار برده می‌شود(۵۸،۴۷). این قارچ قادر به ساخت اسیدهای چرب ضروری نمی‌باشد، بنابراین به دریافت چربی از میزان نیازمند می‌باشد(۵۹). ۱۳ گونه مختلف از مالاسزیا شناسایی شده است، که شامل ۱۰ گونه انسان دوست گلوبوزاء، رستربکتا، اسلوفایی، او بتوسا، فورفور، سیمپودیالیس، جاپونیکا، یاماتونسیس، درماتیس و نانا و سه گونه حیوان دوست پاکی درماتیس، کاپری و ایکوینا می‌باشد که با روش‌های مولکولی و بیوشیمیایی شناخته شده‌اند. اما اهمیت کلینیکی این گونه‌ها کمتر شناخته شده است. مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان می‌دهد که شیوع و تراکم گونه‌های مالاسزیا در نواحی مختلف پوست در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری‌های پوستی و همین طور در

کلینیزاسیون قارچ‌ها در پوست و متعاقب آن التهاب پوستی نقش مهمی در ایجاد بیماری درماتیت آتوپیک دارد. آرژن‌های قارچ‌های کلینیزه شده در پوست و مخاطرات و همین طور قارچ‌های موجود در محیط می‌تواند به طور مداوم در دسترس سیستم ایمنی قرار گیرند و با تداوم واکنش‌های آلرژیک در پاتوژنر درماتیت آتوپیک شرکت داشته باشند(۴۵-۵۰).

عوامل مستعد کننده کلینیزاسیون قارچی در پوست بیماران پوست افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک مستعد کلینیزاسیون تعداد زیادی از میکرووارگانیسم‌ها می‌باشد. پوست سالم و بی‌نقص با فراهم آوردن اولین سد دفاعی مانع تهاجم میکرووارگانیسم‌ها می‌شود. یک شبکه پیچیده، مشکل از سلول‌های مختلف و مکانیسم‌های مولکولی در طول تکامل پوست ایجاد می‌شود که به مکانیسم‌های دفاعی پوست کمک می‌کند. در افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک اختلال در سیستم دفاعی پوست و خشکی پوست دیده می‌شود، که احتمالاً ناشی از کاهش سرامید می‌باشد. سرامید یک اسفنگوکوپید است که در دفاع فیزیکی پوست نقش دارد و کاهش آن در بیماران به علت کاهش در میزان اسفنگوکوپین استراتوم کورنئوم می‌باشد(۵۱). حساسیت بالای افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک می‌تواند به علت اختلال در تولید پروتئین فیلاگرین اپیدرم نیز باشد. کاهش این پروتئین باعث دهیدراتاسیون استراتوم کورنئوم و اختلال در عمل آن می‌شود(۵۲). درمان خشکی پوست در درماتیت آتوپیک باعث افزایش مقاومت پوست به عفونت و کاهش عفونت‌های سیستمیکی می‌شود که از طریق پوست ایجاد عفونت به شوند. این موضوع نقش خشکی پوست را در ایجاد عفونت به خوبی نشان می‌دهد(۵۳). سلول‌های پوست پیتیدهای ضد میکروبی مانند بتا-دفسین و درمسیدین ترشح می‌کنند که در دفاع علیه میکرووارگانیسم‌ها مؤثر هستند. مطالعات نشان دادند که میزان این پیتیدهای ضد میکروبی در افراد مبتلا به

مالاسزیا بسیار سخت رشد هستند و سرعت رشد آن‌ها بسیار متفاوت است. از طرفی محیط مناسب برای رشد هر یک از گونه‌ها متفاوت است، بنابراین دسترسی به اطلاعات صحیح در زمینه کلونیزاسیون گونه‌های مالاسزیا در پوست بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک بسیار مشکل است (۷۳، ۷۲). علاوه بر بررسی کلونیزاسیون گونه‌های مالاسزیا در پوست این بیماران، مطالعات زیادی به بررسی آنتی‌بادی‌های ضد مالاسزیا در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک پرداختند. آنتی‌بادی IgE ضد مالاسزیا در درماتیت آتوپیک شیوع بالاتری نسبت به سایر آتوپی‌ها دارد. آنتی‌بادی IgE ضد مالاسزیا در ۲۰–۱۰۰ درصد بیماران گزارش شده و در بزرگسالان شیوع بالاتری نسبت به بچه‌ها دارد (۷۴–۷۷). در مطالعه Johansson و همکاران ۱۹ درصد بچه‌های بیمار، آنتی‌بادی IgE ضد مالاسزیا را در سرم خود داشتند (۷۴). در مطالعه Lindgren و همکاران ۲۲ درصد از بیماران آنتی‌بادی IgE ضد مالاسزیا را در سرم خود داشتند و بیماری در این افراد شدیدتر از افراد فاقد آنتی‌بادی اختصاصی بود (۷۵). در مطالعه Kim و همکاران ۶۸ درصد از بیماران آنتی‌بادی IgE ضد مالاسزیا را در سرم خود داشتند (۷۶). در مطالعه Bayrou و همکاران ۱۰۰ درصد بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک سر و گردن آنتی‌بادی IgE ضد مالاسزیا را در سرم خود داشتند (۵۰). مطالعات زیادی با انجام تست پوستی به بررسی افزایش حساسیت نوع I نسبت به گونه‌های مالاسزیا پرداختند. تست پوستی مثبت در ۱۳/۵–۷۹ درصد بیماران گزارش شده است (۷۷–۸۰). Kieffer و همکاران تست پوستی مثبت را در ۷۹ درصد بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک سر و گردن و ۴۵ درصد بیماران بدون گرفتاری نواحی Wessels و همکاران ۳۹ درصد بیماران زیر ۱۰ سال و ۶۴ درصد بیماران بالای ۱۰ سال تست پوستی مثبت نسبت به مالاسزیا داشتند (۷۸). Devos و همکاران تست پوستی مثبت را در ۱۳/۵ درصد بیماران مبتلا به درماتیت

کشورهای مختلف، متفاوت است (۶۱، ۶۰، ۵۸). بیشترین تراکم در سر و بالاتنه و کمترین تراکم در دست دیده می‌شود (۶۲). تراکم گونه‌های مالاسزیا با افزایش سن کاهش می‌یابد و میزان آن‌ها در بالغین بیشتر از بچه‌ها می‌باشد (۶۴، ۶۳). این قارچ در پوست ۹۰–۱۰۰ درصد افراد به صورت میکروفلور طبیعی وجود دارد (۶۵). لذا آلرژن‌های آن همیشه در دسترس سلول‌های لانگرهانس موجود در اپیدرم بوده و با ارائه آن‌ها به سلول‌های T سبب ایجاد و ادامه واکنش‌های آلرژیک می‌شود. در درماتیت آتوپیک که به طور مشخصی شروع آن با اریتم و خارش می‌باشد، به دنبال خاراندن، مالاسزیا به داخل ضایعات پوستی از قبل موجود انتقال یافته و به وسیله آنزیم‌های آزاد شده از سلول‌های التهابی هضم می‌شود و در نتیجه آلرژن‌های موجود در داخل آن آزاد شده و موجب بروز واکنش‌های مزمز اگزما می‌در این گونه بیماران می‌شود (۶۶). مطالعات مختلف نتایج متفاوتی از کلونیزاسیون گونه‌های مالاسزیا در پوست افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک و همچنین در مقایسه با افراد سالم گزارش کرده‌اند که به روش‌های نمونه‌گیری، کشت و تشخیص گونه‌های مالاسزیا مربوط می‌شود (۶۷–۷۲). در مطالعه Nakabayashi و همکاران، بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک گونه فورفور بیشتر و گونه‌های گلوبوزا و سیمپودیالس کمتری نسبت به افراد سالم در صورت و گردن خود داشتند (۶۷). در مطالعه Gupta و همکاران بیماران و افراد سالم به طور یکسان با گونه سیمپودیالس کلونیزه شده بودند (۶۸). در مطالعه Rincon و همکاران ۷۲ درصد بیماران با گونه فورفور و ۲۶ درصد بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک با گونه رستریکتا کلونیزه شده بودند (۶۹). در مطالعه Sandstrom و همکاران کلونیزاسیون گونه‌های مالاسزیا در بیماران کمتر از افراد سالم بود (۷۰). در مطالعه Sugita و همکاران سر و گردن بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک ۷–۱۲ برابر بیشتر از سایر قسمت‌های بدن با گونه‌های مالاسزیا کلونیزه شده بود (۷۱). گونه‌های

شود. بنابراین تماس مداوم با مالاسزیا که فلور طبیعی پوست است، می‌تواند مسؤول تکرار پاسخ‌های ایمنی میزبان و التهاب مجدد پوست باشد (۸۱-۹۱). چندین مطالعه نیز به بررسی آللرژن‌های مالاسزیا به روش ایمونوبلاتینگ پرداختند. شایع‌ترین آللرژن‌ها با وزن مولکولی ۹، ۱۵، ۲۵ و ۷۲ کیلو دالتونی معرفی شده‌اند (۹۲، ۹۱، ۶۶). در مطالعه Hedayati و همکاران (۹۲)، ایمنی ۱۵ جزء واکنش دهنده با IgE با وزن مولکولی ۲۲-۱۰۰ کیلو دالتون شناسایی شده (۶۶). در مطالعه Johansson و همکاران ۸ جزء واکنش دهنده با IgE با وزن مولکولی ۱۴-۹۴ کیلو دالتون شناسایی شده (۹۱). در مطالعه Jensen-Jarolim و همکاران ۱۴ جزء واکنش دهنده با IgE با وزن مولکولی ۹-۸۳ کیلو دالتون شناسایی شده (۹۲). این مطالعات ترکیبات آللرژنی متفاوتی را ذکر کرده‌اند که ممکن است به روش نگهداری عصاره مالاسزیا و شرایط کشت بستگی داشته باشد (۷۲). یکی دیگر از آللرژن‌های مالاسزیا آllerzen ۶۷ کیلو دالتونی است. آنتی‌بادی علیه این آllerzen واکنش متقطع با آllerzen‌های کاندیدا آلیکنس ندارد. بنابراین می‌توان از آن برای تشخیص حساسیت نسبت به مالاسزیا در مبتلایان به درماتیت آتوپیک استفاده کرد (۹۳).

کاندیدا و درماتیت آتوپیک بیش از ۱۵۰ گونه از کاندیدا شناسایی شده است که تعداد زیادی از آن‌ها در انسان حضور دارند. گونه‌های آلیکنس، گلابراتا، تروپیکالیس، پاراپسلیوزیس و دابلینیسیس غالباً از دهان، مجرای گوارشی، مجرای تناسلی و پوست انسان جدا می‌شوند. عفونت به وسیله این قارچ در شرایط زمینه‌ایی نظیر نقص سیستم ایمنی، دیابت ملیتوس، نقاچیس هورمونی و مصرف آنتی‌بیوتیک و کورتیکواستروئید ایجاد می‌شود (۹۴-۹۷). گونه‌های کاندیدا به خصوص کاندیدا آلیکنس از پوست و سیستم گوارشی مبتلایان به درماتیت آتوپیک نسبت به افراد سالم بیشتر جدا می‌شود؛ اما هیچ ارتباطی بین شدت

آتوپیک سر و گردن گزارش کرده (۷۹). Khosravi و همکاران تست پوستی مثبت را در ۴۹/۶ درصد بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک گزارش کرده (۸۰). مطالعات نشان دادند که نتیجه تست پوستی بستگی زیادی به سن بیمار و محل ضایعات دارد؛ به طوری که نتیجه مثبت در سینین بالا و در گرفتاری سر و گردن بیشتر دیده می‌شود (۷۸-۸۲). از میان بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک، IgE ضد مالاسزیا در مبتلایان با درگیری سر و گردن بالغین بیشتر دیده می‌شود. از آنجایی که تراکم گونه‌های مالاسزیا در سایر اشکال و همین‌طور افراد سالم بسیار بالا می‌باشد، محققین این گونه استنتاج نموده‌اند که گونه‌های مالاسزیا به عنوان عامل بیماری‌زا در درماتیت آتوپیک محسوب نمی‌شوند؛ بلکه تغییر در واکنش سیستم ایمنی نسبت به این قارچ در افراد مبتلا عامل اصلی در مکانیسم بیماری زایی مالاسزیا در درماتیت آتوپیک می‌باشد (۸۳، ۴۷). در مبتلایان به درماتیت آتوپیک نقص در عملکرد کراتینوسیت‌ها، کاهش پیتیدهای ضد میکروبی، ترشح عرق، IgA و ترانس گلوتامیناز-۱ دیده می‌شود. این نقاچیس به همراه pH قلیایی پوست ممکن است باعث افزایش ارائه آنتی‌زن‌های قارچ به سیستم ایمنی شود (۸۴-۸۷). تئوری ارائه شده در مورد نقش مالاسزیا در پاتوژنی درماتیت آتوپیک این است که مالاسزیا ممکن است از طریق توانایی خود در تحریک پاسخ‌های ایمنی وابسته به IgE و ایمنی سلولی در شروع واکنش‌های ایمنی که منجر به التهاب پوست می‌شوند، نقش داشته باشد (۸۸). در ابتدا مخمر از طریق رسپتورهای IgE به سلول‌های لانگرهانس متصل می‌شود؛ با انتقال آllerzen‌ها به سلول‌های T توسط سلول‌های لانگرهانس، سیستم ایمنی سلولی خصوصاً سلول‌های Th₂ فعال می‌شوند؛ ترشح سیتوکالین توسط سلول‌های Th₂ باعث ترشح IgE از سلول‌هایی مانند ماست سل و کراتینوسیت و تقویت پاسخ‌های ازدیاد حساسیت تیپ I می‌شود. تمام این مکانیسم‌ها می‌توانند باعث ایجاد خارش، التهاب و نقص در عمل پوست

تست پوستی مثبت در افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک شدید از میزان شیوع بالاتری برخوردار می‌باشد(۱۰۷، ۱۰۶). در مطالعه Kortekangas-Savolainen و همکاران، ۹۴ درصد افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک شدید، ۷۶ درصد افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک متوسط و ۲۵ درصد افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک خفیف تست پوستی مثبت داشته‌اند. در حالی که در افراد کنترل، تست مثبت تها در ۲ درصد موارد دیده شد(۱۰۶). در مطالعه Savolainen و همکاران، ۵۲ درصد افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک و ۵ درصد افراد کنترل تست پریک مثبت داشتند(۳۵). در مطالعه Tanaka و همکاران، ۳۰ درصد افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک آتوپیک و ۱۰ درصد افراد Nissen کنترل تست پریک مثبت داشتند(۳۳). در مطالعه و همکاران تست پریک مثبت در ۲۷ درصد افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک دیده شد(۱۰۷). مطالعات زیادی به بررسی IgE اختصاصی علیه کاندیدا آلیکنس در افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک پرداختند؛ در این مطالعات میزان شیوع IgE اختصاصی بر علیه کاندیدا ۷/۵ درصد تا ۸۸ درصد گزارش شده است(۱۰۹، ۱۰۸، ۳۶). در مطالعه Back و همکاران ۳۳ درصد بیماران IgE اختصاصی علیه کاندیدا آلیکنس را در سرم خود داشتند(۱۰۸). در مطالعه Tanaka و همکاران IgE اختصاصی علیه کاندیدا آلیکنس در افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک بیشتر از افراد کنترل بود(۳۳). در مطالعه Hedayati و همکاران ۷/۵ درصد بیماران IgE اختصاصی علیه کاندیدا آلیکنس را در سرم خود داشتند(۱۰۹). در مطالعه Matsumura و همکاران نیز IgE اختصاصی علیه کاندیدا آلیکنس در افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک بیشتر از افراد کنترل بود(۱۱۰). چندین مطالعه نیز به بررسی ترکیبات آنتی‌ژنیک کاندیدا آلیکنس با روش ایمونوبلاتینگ در سرم بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک که IgE اختصاصی علیه کاندیدا آلیکنس داشتند، پرداختند. در این مطالعات به آنتی‌بادی علیه انولاز (۴۶kDa)، فسفو‌گلیسرات کیناز (۴۳kDa)،

بیماری و کلونیزاسیون گونه‌های کاندیدا مشخص نشده است. در مطالعه Buslau و همکاران، گونه‌های کاندیدا از بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک بیشتر از سایر بیماری‌های پوستی جدا شدند و کاندیدا آلیکنس شایع‌ترین گونه‌ای بود که جدا شد(۹۸). در مطالعه Savolainen و همکاران، کاندیدا آلیکنس از پوست ۵۹ درصد بیماران جدا شد(۳۵). مجرای گوارشی وسیع‌ترین سطح بدن است که در آن واکنش‌های ایمنی صورت می‌گیرد(۹۹). گونه‌های کاندیدا به طور طبیعی در مجرای گوارشی وجود داشته و با باکتری‌های موجود در روده در تعادل هستند. مصرف آنتی‌بیوتیک، قرص‌های ضدبارداری و غذاهای غنی از کربوهیدرات‌باعث افزایش کلونیزاسیون کاندیدا در روده می‌شوند. بعضی از مطالعات کلونیزاسیون کاندیدا را در مجرای گوارشی با تظاهرات کلینیکی در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک مرتبط دانستند(۱۰۱، ۱۰۰، ۳۶). در مطالعه Henseler و همکاران، کلونیزاسیون گونه‌های کاندیدا در مجرای گوارشی بیماران بیشتر از افراد سالم بود(۱۰۲). Yamaguchi و همکاران نشان دادند که کلونیزاسیون گونه‌های کاندیدا در مجرای گوارشی باعث افزایش حساسیت در برابر غذا می‌شود و افزایش حساسیت نسبت به غذاها نقش مهمی در ایجاد درماتیت آتوپیک دارد(۱۰۳). کاندیدا در مجرای گوارشی رشد نموده و مایکوتوكسین و نوروتوكسین تولید و در مجرای گوارشی رها می‌کند؛ این متابولیت‌ها می‌توانند از طریق جذب روده‌ایی وارد جریان خون و مجاري لفافی شده و باعث ایجاد واکنش‌های آلرژیک و درماتیت آتوپیک شوند. از طرفی دیگر نتایج برخی از مطالعات به طور جالب توجهی نشان می‌دهد که کلونیزاسیون گونه‌های کاندیدا در مجرای گوارشی مانع جذب بسیاری از مواد غذایی می‌شود که در جلوگیری از واکنش‌های آلرژیک و درماتیت آتوپیک می‌تواند مؤثر باشد(۱۰۴، ۹۶). چندین مطالعه به انجام تست پوستی با عصاره کاندیدا آلیکنس در بیماران مبتلا درماتیت آتوپیک پرداخته‌اند.

کپکی است که در هوای آب، خاک و گیاهان در حال فساد وجود دارد. گونه‌های کلادوسپوریوم در انسان به جزء در موارد نقص سیستم ایمنی، قادر به ایجاد بیماری نیستند. ولی توانایی بالایی در تحریک واکنش‌های آرژیک در افراد حساس دارند. تماس طولانی مدت با حجم زیادی از اسپورهای این قارچ می‌تواند ایجاد واکنش‌های آرژیک کند. حجم ۳۰۰۰ اسپور قارچ در هر متر مکعب از هوای باغ عتوان آستانه‌ایی برای ایجاد عالیم کلینیکی ذکر شده است (۱۸). ولی افراد ممکن است بسته به حساسیت خود به حجم کمتری از اسپور نیز واکنش دهند. اسپورهای کلادوسپوریوم به شکل کروی، بیضی و دوکی در اندازه‌های ۱۳-۴۰×۳-۵ میکرون دیده می‌شوند. اسپورهای کوچک کلادوسپوریوم حدود ۰/۶ درصد اسپورهای این قارچ را در هوای تشكیل می‌دهند و به راحتی می‌توانند به انتهای برونش و آلوئول‌های ریه انسان برسند. گونه هرباروم مهم‌ترین گونه آرژی زای کلادوسپوریوم است. نتایج مطالعات چند سال اخیر نشان داده است که کلادوسپوریوم هرباروم می‌تواند به عنوان عاملی بیماری‌زا در القای واکنش‌های آرژی و بروز ضایعات اگزما می‌باشد (۱۹، ۴۲). مبتلا به درماتیت آرژیک نقش داشته باشد (۱۰، ۱۱۹). ۶۰ آرژن در کلادوسپوریوم هرباروم تشخیص داده شده است (۱۲۱). به طور کلی آرژن‌های قارچ‌ها را می‌توان در گروه‌های پروتازها، گلیکوزیدازها، پروتئین‌های پاسخ‌دهنده به استرس‌های اکسیداتیو، آنزیم‌های شرکت کننده در گلوكونوژنر یا مسیر پنتوز فسفات قرار داد (۱۲۲). Cla h1 (پروتئین ۱۳ کیلو دالتونی)، Cla h2 (پروتئین ۲۳ کیلو دالتونی)، Cla h3 (آلدهید دهیدروژناز)، Cla h5 (پروتئین ۱۱ کیلو دالتونی)، Cla h6 (انولاز)، Cla h7 (پروتئین YCP4)، Cla h8 (مانیتول دهیدروژناز)، Cla h9 (سرین پروتاز)، Cla h10 (آلدهید دهیدروژناز)، Cla h12 (پروتئین ریبوزومی)، Cla h42kD (پروتئین ۴۲ کیلو دالتونی)، Cla habH (آلfa و بتا هیدرولاز)، Cla h GST (پروتئین شک سرد)، Cla h8 CSP

آلدولاز (۳۷kDa) و مانان دیواره سلولی کاندیدا آلیکنس اشاره شده است (۱۱۱-۱۱۵). با توجه به نقش پاسخ‌های Th_1 و Th_2 در پاتوژن‌بیماری درماتیت آرژیک، بعضی از مطالعات به بررسی سیتوکاین‌های مترشحه از این لنفوسمیت‌ها در پاسخ به مالاسزیا و کاندیدا آلیکنس پرداختند. این مطالعات نشان دادند که نسبت IL-4/IFN\gamma القاء شده توسط مالاسزیا بیشتر از کاندیدا آلیکنس است. بنابراین میزان IgE تولید شده توسط مالاسزیا بیشتر است. کاندیدا آلیکنس نیز می‌تواند باعث القاء ترشح IgE شود اما توانایی زیادی در القاء ترشح IgG دارد بنابراین می‌توان گفت که مالاسزیا با تحریک پاسخ‌های Th_2 نقش بیشتری نسبت به کاندیدا آلیکنس در پاتوژن‌بیماری درماتیت آرژیک دارد (۴۷).

کلادوسپوریوم هرباروم و درماتیت آرژیک از دهه ۱۹۹۰ قارچ‌ها به عنوان یکی از آثروآلرژن‌های مهم شناسایی شدند. حتی مطالعات نشان دادند که در برخی نواحی، آرژی ناشی از قارچ‌ها از اهمیت بیشتری نسبت به دانه گرده گیاهان برخوردار است. تاکنون اصلی‌ترین راه ایجاد حساسیت در بیماران حساس شناخته شده است. مطالعات مختلف استنشاق میسلیوم‌های خشک شده موجود در گرد و غبار یا استنشاق اسپورهای موجود در هوا را محتمل‌ترین راه برای ایجاد حساسیت می‌دانند (۱۱۶). هر فرد روزانه ۲۲۰۰ بار تنفس می‌کند و تقریباً نزدیک به ۱۵ کیلوگرم هوا نیاز دارد. در نتیجه تعداد زیادی از آرژن‌های قارچ‌ها را استنشاق می‌کند. که در افراد حساس با ایجاد IgE اختصاصی می‌تواند منجر به واکنش‌های آرژیک شود. از آنجایی که برخلاف بسیاری از آرژن‌های دیگر، اجتناب از قارچ‌ها به جهت حضور همیشگی و همه‌جایی آن‌ها تقریباً غیرممکن است، حساسیت به قارچ‌ها می‌تواند به عنوان یکی از عوامل ابتلاء به واکنش‌های آرژیک مورد توجه باشد (۱۱۷). کلادوسپوریوم یکی از شایع‌ترین قارچ‌های

با روش وسترن بلاط، ده جزء با وزن‌های مولکولی ۱۵ تا ۱۴۳ کیلو دالتون مشخص گردید(۱۴۵). در مطالعه Hedayati و همکاران با روش وسترن بلاط ۴ جزء با وزن‌های مولکولی ۱۵/۱ تا ۱۱۰ کیلو دالتون در سرم افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک مشخص شد(۴۵). علت تفاوت در نتایج مطالعات ممکن است ناشی از تفاوت در سن بیماران مورد مطالعه، شدت بیماری، نوع ترکیب آنتی ژنی کلادوسپوریوم هرباروم، سطح IgE توtal و موقعیت جغرافیایی باشد.

آلترناریا آلترناتا و درماتیت آتوپیک آلترناریا آلترناتا از خانواده قارچ‌های سیاه است. این کپک‌ها به وسیله پیگمان تیره خود که ناشی از ملانین است تشخیص داده می‌شوند. این پیگمان به اشعه UV مقاوم است و با جذب این اشعه ارگانیسم را از آسیب محافظت می‌کند. آلترناریا آلترناتا میکروارگانیسمی ساپروفیت است و اسپورهای بزرگ و قهوه‌ای آن را که به صورت طولی و عرضی تقسیم شده‌اند به راحتی می‌توان از مواد در حال فساد، آب، خاک و هوا جدا کرد. آلترناریا آلترناتا نقش مهمی در تجزیه مواد ایفا می‌کند و به صورت لکه‌هایی به رنگ سبز زیتونی تیره بر روی مواد ساختمانی دیده می‌شود. این میکروارگانیسم در دمای ۵°C تا ۳۲°C رشد می‌کند. درجه رشد اپتیمم آن ۲۰°C است و رنچ وسیعی از pH ۲/۷-۸ را نیز تحمل می‌کند(۱۴۶،۱۴۷،۱۴۱) Alt a 1-Alt a 22 آلرژن در این قارچ تشخیص داده شده است که مهم‌ترین آن‌ها Alt a 1 (کیلو دالتون) است. این آلرژن از دو زنجیره که به وسیله باندهای دی سولفیدی به یکدیگر متصل شده‌اند، تشکیل شده است و IgE اختصاصی علیه آن در ۸۰-۹۰ درصد افرادی که به آلترناریا آلترناتا حساسیت دارند، قابل ردیابی می‌باشد(۱۴۸،۱۴۹). ۲ IgE نیز یک پروتئین ۲۵ کیلو دالتونی است(۱۵۰) که اختصاصی علیه آن در ۶۰ درصد افرادی که به آلترناریا آلترناتا حساسیت دارند، قابل ردیابی می‌باشد. این آلرژن

(گلوتاتیون ترانسفراز)، Cla h HCh1 (هیدروفوین)، Cla h HSP70 (پروتئین شوک حرارتی ۷۰)، Cla h NTF2 (فاکتور انتقال دهنده هسته‌ای ۲)، Cla h TCTP (پروتئین کنترل کننده تومور و فاکتور ترشح کننده هیستامین) از جمله آلرژن‌های شناسایی شده در کلادوسپوریوم هرباروم هستند، که بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند(۱۳۷-۱۴۳). مهم‌ترین این آلرژن‌ها Cla h1 و Cla h2 هستند که میزان آن‌ها در استرین‌های مختلف کلادوسپوریوم هرباروم متفاوت می‌باشد. واکنش‌های آلرژیک در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک به علت استنشاق میسلیوم خشک شده یا اسپورهای موجود در هوای حاوی این آلرژن‌ها باشند اتفاق می‌افتد(۱۳۸،۱۳۹). مطالعات زیادی به بررسی واکنش‌های آلرژیک نسبت به کلادوسپوریوم در افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک پرداختند(۱۴۰-۱۴۲). در مطالعه Khazaei و همکاران ۴۷/۱۲ درصد بیماران(۱۴۰) و در مطالعه Reijula و همکاران تنها ۲/۷ درصد بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک تست پوستی مثبت نسبت به کلادوسپوریوم هرباروم داشتند(۱۴۱). مطالعه Nolles و همکاران نشان داد که میزان شیوع IgE اختصاصی برعلیه کلادوسپوریوم هرباروم در بین قارچ‌ها رتبه اول را دارد. این مجتمع استنتاج نمود که حساسیت نسبت به قارچ‌ها در دوران کودکی شایع می‌باشد و با سن در ارتباط است(۱۴۲). در مطالعه Schäfer و همکاران IgE توtal و اختصاصی نسبت به آلرژن‌های موجود در هوای جمله کلادوسپوریوم (Radioallergosorbent test [RAST]) هرباروم با روش آنالیز قرار گرفت که ۳۷ درصد بچه‌ها حداقل نسبت به یک آلرژن حساس بودند(۱۴۳). Lowenstein و همکاران با استفاده از روش (Crossed- radioimmunolectrophoresis [CRIE]) نشان دادند که عصاره حاصل شامل ۵۷ آنتی ژن و حداقل ۵ آلرژن است(۱۴۴). Aukrust نشان داد که این عصاره شامل ۴ آلرژن ماثور و ۲۰-۱۰ آلرژن مینور می‌باشد(۱۴۱). در حالی که در مطالعه Zhang و همکاران

این واکنش متقاطع به طور واضحی کاهش می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد که قسمتی از IgE که به آرژن‌های کپک‌ها و مخمرها متصل می‌شود، به علت واکنش متقاطع با گلیکوپروتئین‌ها می‌باشد(۱۵۴). آلتناریا آلتناتا در تمام فضول در محیط اطراف وجود دارد. این قارچ یکی از شایع‌ترین قارچ‌های موجود در هوای داخل ساختمان‌ها و همین‌طور یکی از شایع‌ترین قارچ‌هایی است که در سطوح داخل ساختمان‌ها کلوئیزه می‌شود. بنابراین بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک دائمًا با این قارچ در تماس هستند. و این تماس می‌تواند به مزمن شدن بیماری در آن‌ها کمک کند. بنابراین کنترل رشد آلتناریا آلتناتا در داخل ساختمان‌ها و جلوگیری از تماس با پروپاگول‌های این قارچ می‌تواند نقش مهمی در کاهش واکنش‌های آرژیک در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک ایفا کند(۱۵۴،۴۳). هوای مربوط ممکن است برای ایجاد کلونی‌های کپک لازم باشد اما هوای خشک برای آزاد سازی اسپورها و تحریک واکنش‌های آرژیک مناسب است. آلتناریا آلتناتا نسبت به سایر کپک‌ها آرژن‌های خود را سریع‌تر آزاد می‌کند؛ به همین دلیل شدت واکنش‌های آرژیک تحریک شده به وسیله این قارچ از سایر قارچ‌ها بیشتر می‌باشد. بنابراین تشخیص سریع آرژی به این قارچ بسیار ضروری می‌باشد(۱۵۵).

سن، قارچ و درماتیت آتوپیک
زمان تأثیر و ایجاد حساسیت توسط قارچ‌ها هنوز اثبات نشده است. بعضی مطالعات گزارش کرده‌اند که حساسیت به قارچ‌ها در دوران بچگی شایع است و در ۷ سالگی به ماکزیم خود می‌رسد(۱۴۲،۱۵۶). بعضی مطالعات گزارش کرده‌اند که کلونی‌اسیون قارچی در دو ماه اول زندگی ممکن است قابل شناسایی باشد(۱۵۷،۱۵۸). بعضی مطالعات گزارش کرده‌اند که حضور قارچ‌ها در داخل ساختمان‌ها باعث افزایش خطر درماتیت آتوپیک در ۶ ماه اول زندگی می‌شود(۱۵۹).

تنها در ۶ استرین دیگر از آلتناریا آلتناتا شناسایی شده است؛ بنابراین ۲ Alt a یک پروتئین حفاظت شده در آلتناریا آلتناتا می‌باشد(۱۵۱). انولاز یکی دیگر از آرژن‌های اصلی آلتناریا آلتناتا می‌باشد که IgE اختصاصی علیه آن در ۵۰ درصد افرادی که به آلتناریا آلتناتا حساسیت دارند، قابل ردیابی می‌باشد(۱۵۲،۱۲۷). Alt a ۶ (۵۳ کیلو Dalton)، Alt a ۷ (۲۲ کیلو Dalton) و Alt a ۱۰ (۱۱ کیلو Dalton) از جمله آرژن‌های مینور این قارچ می‌باشد که IgE اختصاصی علیه آن به ترتیب در ۸ درصد، ۷ درصد و ۲ درصد افرادی که به آلتناریا آلتناتا حساسیت دارند، قابل ردیابی می‌باشد(۱۴۹،۱۲۴). آلتناریا آلتناتا به فراوانی در هوای داخل و خارج ساختمان‌ها وجود دارد و تماس با آرژن‌های آن می‌تواند باعث ایجاد واکنش‌های آرژیک در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک شود. چندین مطالعه به بررسی واکنش‌های آرژیک در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک پرداخته‌اند(۱۴۷،۱۴۴،۱۴۲،۴۶). در مطالعه Hedayati و همکاران ۳۲ درصد بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک IgE اختصاصی علیه آلتناریا آلتناتا را در سرم خود داشتند. در این مطالعه افراد بزرگتر از ۱۲ سال حساسیت بیشتری نسبت به این قارچ داشتند(۴۶). در مطالعه Nolles و همکاران IgE اختصاصی علیه آلتناریا آلتناتا سومین رتبه را بعد از کلادوسپوریوم و آسپرژیلوس به خود اختصاص داده بود. و این حساسیت در افراد با ۷/۷ تا ۷/۸ سال بیشتر دیده شد(۱۴۲). حساسیت به آلتناریا آلتناتا وابستگی آن به سن در مطالعه Maria و همکاران نیز گزارش شده است(۱۴۶). واکنش متقاطع بین IgE علیه کپک‌ها و مخمرها گزارش شده است. Leino و همکاران مشاهده کردند که ۴۰ درصد افرادی که IgE علیه کپک‌ها را دارند، با مالاسزیا نیز واکنش می‌دهند و IgE علیه آلتناریا آلتناتا و کلادوسپوریوم هرباروم به وسیله مالاسزیا در الیزا و ایمونوبلات مهار می‌شود(۱۵۳). آن‌ها نشان دادند که وقتی گلیکوپروتئین‌ها از عصاره قارچی حذف می‌شوند،

به علت اثرات جانبی کمتر آنها می‌توانند جایگزین مناسبی برای کتوکونازول باشند(۴۷). چندین مطالعه بهبودی بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک را که تست پوستی مثبت نسبت به کاندیدا آلیکنس و مالاسزیا داشته‌اند، با تجویز ایتراکونازول گزارش کرده‌اند(۱۶۸-۱۶۹). در مطالعه Kolmer و همکاران ۵ بیمار مبتلا به درماتیت آتوپیک به طور موقوفیت آمیزی با مصرف طولانی مدت ایتراکونازول خوراکی بهبود پیدا کردند در حالی که فلوکونازول اثر کمتری داشت(۱۶۹). ایتراکونازول با ممانعت از سنتز ارگوسترون اثر ضدقارچی خود را اعمال می‌کند. این دارو علیه درماتوفیت‌ها، مخمرها، قارچ‌های سیاه و دیگر کپک‌ها مؤثر است و شبیه کتوکونازول اثرات ضد التهابی آن از طریق مهار مسیر ۵-لیپواکسیژناز اعمال می‌شود(۱۷۰). ایتراکونازول نیز با مهار تولید IL-4 و IL-5 از تولید سیتوکاین توسط Th_2 ممانعت می‌کند. این دارو علاوه بر اثرات ضد قارچی اثر ضد خارش نیز دارد که مستقل از اثر ضدقارچی آن می‌باشد(۱۶۵). با این تفاصیل به نظر می‌رسد که ایتراکونازول به عنوان یک داروی ضدقارچی، درمان کمکی مناسبی برای مدیریت بهتر بیماری درماتیت آتوپیک باشد. با این وجود تعداد مطالعاتی که به نقش داروهای ضد قارچی در بهبود وضعیت بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک پرداخته است، بسیار محدود می‌باشد و نیاز است مطالعات بیشتری به بررسی آن پردازند و بهترین نوع داروی ضد قارچی، اپتیم دوز و مدت درمان لازم برای کنترل این بیماری ارائه شود.

چشم انداز بیماری درماتیت آتوپیک:

پوست ارگان مهمی است که به پاسخ‌های آлерژیک سیستمیک کمک می‌کند. بنابراین درمان‌های مؤثری لازم است تا باعث کاهش التهاب پوست در این بیماری شود. پیشرفت‌هایی لازم است تا زن‌هایی که باعث ایجاد بیماری درماتیت آتوپیک می‌شوند، شناسایی شوند. و

هر حال از نتایج مطالعات می‌توان استنباط کرد که آлерژن‌های قارچی در اوایل زندگی روی درماتیت آتوپیک تأثیر دارند. علاوه بر این مسیر ورود قارچ به کودکان مهم است و می‌تواند در نتیجه واکنش‌های آлерژیک IgE مؤثر باشد. تروی و همکاران نشان دادند که سطح عليه آлерژن‌های منتقله از هوا که از طریق تنفس وارد می‌شوند در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک که دچار آسم و رنیت آлерژیک نیز هستند، بیشتر است. در مقابل سطح IgE عليه آлерژن‌های کاندیدا آلیکنس و مالاسزیا که در پوست کلونیزه می‌شوند، در بیمارانی که فقط مبتلا به درماتیت آتوپیک هستند، بیشتر است(۱۵۹، ۱۶۰).

درمان‌های ضد قارچی در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک نتایج خوبی از درمان با داروهای ضد قارچی مانند فلوکونازول، ایتراکونازول، آمفوتیریسین B و نیستاتین در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک گزارش شده است(۱۶۱). در مطالعه Lintu و همکاران نشان داده شد که کتوکونازول خوراکی باعث کاهش IgE توتال و IgE اختصاصی علیه مالاسزیا و کاندیدا آلیکنس می‌شود(۱۶۲). کتوکونازول با آسیب به دیواره سلولی و میکروتوبول‌ها باعث از بین رفتن قارچ می‌شود(۱۶۳). علاوه بر این کتوکونازول اثر ضد التهابی دارد که از طریق مهار مسیر ۵-لیپواکسیژناز و مهار تکثیر سلول‌های T اثر خود را اعمال می‌کند(۱۶۴). این دارو تولید نیتریک اکساید را در ماکروفائز مهار می‌کند. بنابراین می‌تواند در درمان اریتم و ادم مؤثر باشد(۱۶۴). کتوکونازول تولید IL-4 و IL-5 را مهار می‌کند. بنابراین می‌تواند مانع تولید سیتوکاین‌ها توسط Th_2 شود(۱۶۵). بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک نیاز به درمان طولانی مدت دارند ولی از کتوکونازول به علت سمیت کبدی نمی‌توان بیشتر از ۱۴ روز استفاده کرد و در طول درمان لازم است که هر ۱۴ روز یک بار آنزیمهای کبدی بیمار چک شود. داروهای ضد قارچی مانند فلوکونازول و ایتراکونازول علی‌رغم قیمت بالای آنها

استفاده از مهار کننده پرتوثازها ممکن است یک درمان مناسب در بیماری درماتیت آتوپیک باشد. اگرچه نتایج مؤوس کننده‌ای از آن ذکر شده است (۱۷۴)، ولی مطالعاتی بیشتری نیاز است تا به بررسی نقش این مهار کننده‌ها در درمان بیماری درماتیت آتوپیک پردازد.

درماتیت آتوپیک بیماری است که عالیم کلینیکی آن در اثر تماس با میکروارگانیسم‌ها تغییر می‌کند. در افرادی که از لحاظ ژنتیکی مستعد به این بیماری هستند، تماس طولانی مدت با آنتی ژن‌های میکروبی باعث افزایش خطر بیماری می‌شود. در این مطالعه مروری به وجود از دیدار حساسیت تیپ I نسبت به قارچ‌ها و افزایش کلونیزاسیون فلور قارچی در درصد قابل توجهی از بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک اشاره شد. بنابراین می‌توان استنباط کرد که قارچ‌ها به عنوان یک منبع آلرژن می‌توانند در کنار عواملی مانند عوامل ژنتیکی، تغییر ساختمان پوست و اختلالات سیستم ایمنی، نقش مهمی در پاتوژنر و افزایش عالیم بالینی در این بیماران ایفا کنند. از آن جایی که قارچ‌ها به فراوانی در محیط زندگی و همین‌طور به عنوان فلور طبیعی در بدن وجود دارند، اجتناب از تماس با آن‌ها غیر ممکن است. اما می‌توان با بهبود شرایط زندگی و کاهش عوامل مستعد کننده رشد قارچ‌ها در محیط و همین‌طور تجویز داروهای ضد قارچی، تماس با این عوامل میکروبی را به حداقل رساند. کنترل رطوبت و دمای محیط و همین‌طور استفاده از فیلترهای HEPA نیز در کاهش تماس با قارچ‌ها بسیار مؤثر است. کاهش تماس با قارچ‌ها در کودکان به علت حساسیت بیشتر آنان ضروری تر به نظر می‌رسد. بنابراین توصیه می‌شود که پزشکان کلونیزاسیون قارچی و آنتی‌بادی‌های ضد قارچ‌های آлерژیک را در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک خصوصاً در کودکان و بیمارانی که به درمان‌های رایج جواب نمی‌دهند، مورد توجه قرار دهند.

همین‌طور اختلالات تنظیم سیستم ایمنی شناسایی شود و الگوی جدیدی برای جلوگیری از عود بیماری ارائه شود. چنین پیشرفت‌هایی قطعاً به کشف درمان‌های مناسب برای اشکال کلینیکی مختلف بیماری درماتیت آتوپیک کمک خواهد کرد. MnSOD انسانی (منگنز سوپر اکسید دیسموتاز) به عنوان یک آن‌آلرژن قادر به تحریک سلول‌های T در invitro و ایجاد ضایعات اگرماتوس در Patch Test می‌باشد و آنتی‌بادی علیه آن با فعالیت بیماری مرتبط می‌باشد. از طرف دیگر واکنش متقاطع بین MnSOD انسانی و MnSOD مالاسزیا سیمپودیالیس مشاهده شده است (۱۷۱). بنابراین مطالعاتی لازم است که به بررسی نقش MnSOD قارچی در بیماری درماتیت آتوپیک پردازند. از آن جایی که خارش مهم‌ترین علت شکایت بیماران است و خاراندن پوست آسیب ایدرم، خشکی پوست و کلونیزاسیون میکروارگانیسم‌ها را در سطح پوست افزایش می‌دهد (۱۷۲)، بنابراین لازم است علاوه بر درمان دارویی به بیماران آموزش داده شود که چگونه از خارش جلوگیری کنند. این آموزش‌ها می‌توانند شامل انتخاب لباس مناسب، آرایش مو و شناسایی تحریک کننده‌های عصبی باشد. با توجه به این که قارچ‌های بیماریزای زیادی شناخته شده است، ولی مطالعات به بررسی نقش تعداد معددی از آنان در ایجاد یا پیشرفت بیماری درماتیت آتوپیک پرداختند. بنابراین مطالعاتی لازم است که نقش سایر قارچ‌ها را در این بیماران بررسی کنند و همین‌طور آلرژن‌های مهم آنان و غلطی از اسپورها یا پروپاگولهای قارچی که باعث تحریک این بیماری می‌شوند را تعیین کنند. علاوه براین مطالعاتی لازم است که داروهای مناسب برای جلوگیری از رشد انواع قارچ‌ها را در این بیماران معرفی کنند. اصلاح پاسخ‌های ایمنی نسبت به قارچ‌ها برای درمان درماتیت آتوپیک ضروری به نظر می‌رسد (۱۷۳). بنابراین استفاده از آنتی ژن‌های نوترکیب جهت اصلاح پاسخ‌های ایمنی و درمان این بیماری باید مورد بررسی قرار گیرد.

References

1. Boguniewicz M, Leung DY. Atopic dermatitis: a disease of altered skin barrier and immune dysregulation. *Immunol Rev* 2001; 242(1): 233-246.
2. Williams H, Robertson C, Stewart A, Ait-Khaled N, Anabwani G, Anderson R, et al. Worldwide variations in the prevalence of symptoms of atopic eczema in the International Study of Asthma and Allergies in Childhood. *Allergy Clin Immunol* 1999; 103(1): 125-138.
3. Chrostowska-Plak D, Salomon J, Reich A, Szepietowski JC. Clinical aspects of itch in adult atopic dermatitis patients. *Acta Derm Venereol* 2009; 89(4): 379-383.
4. Turner JD, Schwartz RA. Atopic dermatitis. A clinical challenge. *Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat* 2006; 15(2): 59-68.
5. Beltrani VS. The clinical spectrum of atopic dermatitis. *J Allergy Clin Immunol* 1999; 104(3): 87-98.
6. Eigenmann PA. Clinical features and diagnostic criteria of atopic dermatitis in relation to age. *Pediatric Allergy and Immunology* 2001; 12(14): 69-74.
7. Mancini AJ, Kaulback K, Chamlin SL. The socioeconomic impact of atopic dermatitis in the United States: A systematic review. *Pediatr Dermatol* 2008; 25(1): 1-6.
8. Thestrup-Pedersen K. The incidence and pathophysiology of atopic dermatitis. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 1996; 7(1): 3-7.
9. Roll A, Cozzio A, Fischer B, Schmid-Grendelmeier P. Microbial colonization and atopic dermatitis. *Curr Opin Allergy Clin Immunol* 2004; 4(5): 373-378.
10. Eichenfield LF, Hanifin JM, Luger TA, Stevens SR, Pride HB. Consensus conference on pediatric atopic dermatitis. *Am Acad Dermatol* 2003; 49(6): 1088-1095.
11. Fauler J, Neumann C, Tsikas D, Frölich J. Enhanced synthesis of cysteinyl leukotrienes in atopic dermatitis. *Br J Dermatol* 1993; 128(6): 627-630.
12. James JM, Kagey-Sobotka A, Sampson HA. Patients with severe atopic dermatitis have activated circulating basophils. *J Allergy Clin Immunol* 1993; 91(6): 1155-1162.
13. Burks AW, James JM, Hiegel A, Wilson G, Wheeler JG, Jones SM, et al. Atopic dermatitis and food hypersensitivity reactions. *Pediatric* 1998; 132(1): 132-136.
14. Gupta AK, Batra R, Bluhm R, Boekhout T, Dawson TL Jr. Skin diseases associated with Malassezia species. *Am Acad Dermatol* 2004; 51(5): 785-98.
15. Güleç AT, Demirbilek M, Seçkin D, Can F, Saray Y, Sarifakioglu E, Haberal M. Superficial fungal infections in 102 renal transplant recipients: a case-control study. *Am Acad Dermatol* 2003; 49(2): 187-92.
16. Hay RJ. Fungal skin infections. *Arch Dis Child* 1992; 67(9): 1065-1067.
17. Weitzman I, Summerbell RC. The dermatophytes. *Clin Microbiol Rev* 1995; 8(2): 240-259.
18. Medeiros EA, Lott TJ, Colombo AL, Godoy P, Coutinho AP, Braga MS, et al. Evidence for a pseudo-outbreak of *Candida guilliermondii* fungemia in a university hospital in Brazil. *Clin Microbiol* 2007; 45(3): 942-947.
19. Khan ZK, Gyanchandani A. Candidiasis-a review. *Primary Immunodeficiency Network of South Africa* 1998; 64(1): 1-34.
20. Havlickova B, Czaika VA, Friedrich M. Epidemiological trends in skin mycoses

- worldwide. *Mycoses* 2008; 51(4): 2-15.
21. López-Martínez R. Candidosis, a new challenge. *Clin Dermatol* 2010; 28(2): 178-184.
 22. Marcon MJ, Powell DA. Human infections due to *Malassezia* spp. *Clin Microbiol Rev* 1992; 5(2): 101-119.
 23. Crespo-Erchiga V, Gómez-Moyano E, Crespo M. Pityriasis versicolor and the yeasts of genus *Malassezia*. *Actas Dermosifiliogr* 2008; 99(10): 764-771.
 24. Schwartz RA, Janusz CA, Janniger CK. Seborrheic dermatitis: an overview. *Am Fam Physician* 2006; 74(1): 125-130.
 25. Garber G. An Overview of Fungal Infections. *Drugs* 2001; 61(1): 1-12.
 26. Hay RJ. Fungal infections. *Clin Dermatol* 2006; 24(3): 201-212.
 27. Hitchcock TF, Amadio PC. Fungal infections. *Hand Clinics* 1989; 5(4): 599-611.
 28. Boguniewicz M, Schmid-Grendelmeier P, Leung DY. Clinical Pearls: Atopic dermatitis. *J Allergy Clin Immunol* 2006; 118(1): 40-43.
 29. Salt BH, Boguniewicz M, Leung DY. Severe refractory atopic dermatitis in adults is highly atopic. *Allergy Clin Immunol* 2007; 119(2): 508-509.
 30. Savolainen J, Lammintausta K, Kalimo K, Viander M. *Candida albicans* and atopic dermatitis. *Clin Exp Allergy* 1993; 23(4): 332-339.
 31. Zhang E, Tanaka T, Tajima M, Tsuboi R, Nishikawa A, Sugita T. Characterization of the skin fungal microbiota in patients with atopic dermatitis and in healthy subjects. *Microbiol Immunol* 2011; 55(9): 625-632.
 32. Hiruma M, Maeng DJ, Kobayashi M, Suto H, Ogawa H. Fungi and atopic dermatitis. *Nihon Ishinkin Gakkai Zasshi* 1999; 40(2): 79-83.
 33. Tanaka M, Aiba S, Matsumura N, Aoyama H, Tabata N, Sekita Y, et al. IgE-mediated hypersensitivity and contact sensitivity to multiple environmental allergens in atopic dermatitis. *Arch Dermatol* 1994; 130(11): 1393-1401.
 34. Brehler RBS, Luger TA. Atopic dermatitis: the role of *Pityrosporum ovale*. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2001; 15(1): 5-6.
 35. Savolainen J, Lintu P, Kosonen J, Kortekangas-Savolainen O, Viander M, Pène J, et al. *Pityrosporum* and *Candida* specific and non-specific humoral, cellular and cytokine responses in atopic dermatitis patients. *Clin Exp Allergy* 2001; 31(1): 125-134.
 36. Buentke E, Scheynius A. Dendritic cells and fungi. *APMIS* 2003; 111: 789-796.
 37. Tengvall Linder M, Johansson C, Zargari A, Bengtsson A, van der Ploeg I, et al. Detection of *Pityrosporum orbiculare* reactive T cells from skin and blood in atopic dermatitis and characterisation of their cytokine profiles. *Clin Exp Allergy* 1996; 26(11): 1286-1297.
 38. Baker BS. The role of microorganisms in atopic dermatitis. *Clin Exp Immunol* 2006; 144(1): 1-9.
 39. Yasueda H, Mita H, Akiyama K, Shida T, Ando T, Sugiyama S, et al. Allergens from *Dermatophagoides* mites with chymotryptic activity. *Clin Expl Allergy* 1993; 23(5): 384-390.
 40. Miedzobrodzki J, Kaszycki P, Bialecka A, Kasprowicz A. Proteolytic activity of *Staphylococcus aureus* strains isolated from the colonized skin of patients with acute-phase atopic dermatitis. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2002; 21(4): 269-276.
 41. Homey B, Steinhoff M, Ruzicka T, Leung DY. Cytokines and chemokines orchestrate atopic skin inflammation. *Allergy Clin Immunol* 2006; 118(1): 178-189.

42. Ou LS, Leung DY. Advances in atopic dermatitis. *Chang Gung Med J* 2005; 28(1): 1-8.
43. Incorvaia C, Frati F, Verna N, D'Alò S, Motolese A, Pucci S. Allergy and the skin. *Clin Exp Immunol* 2008; 153(1): 27-29.
44. Ong PY, Leung DY. The infectious aspects of atopic dermatitis. *Immunol Allergy Clin North Am* 2010; 30(3): 309-321.
45. Hedayati MT, Kaboli S, Hajheydari Z, Shokohi T, Mohamadpor RA. Investigation into allergenic components of *Cladosporium herbarum* by immunoblotting technique. *J Mazand Univ Med Sci* 2007; 15(59): 55-64 (Persian).
46. Hedayati MT, Arabzadehmoghadam A, Hajheydari Z. Specific IgE against *Alternaria alternata* in atopic dermatitis and asthma patients. *Eur Rev Med Pharmaco Sci* 2009; 13(3): 187-191.
47. Faergemann J. Atopic dermatitis and fungi. *Clin Microbiol Rev* 2002; 15(4): 545-563.
48. Allam JP, Bieber T. Review of recent journal highlights focusing on atopic dermatitis. *Clin Exp Allergy* 2003; 28(5): 577-578.
49. Roll A, Cozzio A, Fischer B, Schmid-Grendelmeier P. Microbial colonization and atopic dermatitis. *Curr Opin Allergy Clin Immunol* 2004; 4(5): 373-378.
50. Bayrou O, Pecquet C, Flahault A, Artigou C, Abuaf N, Leynadier F. Head and neck atopic dermatitis and *Malassezia-furfur*-specific IgE antibodies. *Dermatol* 2005; 211(2): 107-113.
51. Arikawa J, Ishibashi M, Kawashima M, Takagi Y, Ichikawa Y, Imokawa G. Decreased levels of sphingosine, a natural antimicrobial agent, may be associated with vulnerability of the stratum corneum from patients with atopic dermatitis to colonization by *Staphylococcus aureus*. *Invest Dermatol* 2002; 119(2): 433-439.
52. Elias PM. Skin Barrier Function. *Curr Allergy Asthma R* 2008; 8(4): 299-305.
53. Soll RF, Edwards WH. Emollient ointment for preventing infection in preterm infants. *Ochrane Database Syst Rev* 2000; (2): CD001150.
54. Borkowski AW, Gallo RL. The coordinated Response of the Physical and Antimicrobial Peptide Barriers of the Skin. *J Invest Dermatol* 2011; 131(2): 285-287.
55. Fazakerley J, Crossley J, McEwan N, Carter S, Nuttall T. In vitro antimicrobial efficacy of β -defensin 3 against *Staphylococcus pseudintermedius* isolates from healthy and atopic canine skin. *Vet Dermatol* 2010; 21(5): 463-468.
56. Ong PY, Ohtake T, Brandt C, Strickland I, Boguniewicz M, Ganz T, et al. Endogenous antimicrobial peptides and skin infections in atopic dermatitis. *N Engl J Med* 2002; 347(15): 1151-1160.
57. De Luca C, Valacchi G. Surface Lipids as Multifunctional Mediators of Skin Responses to Environmental Stimuli. *Mediators Inflamm* 2010; 2010: 321-494.
58. Shokohi T, Hajheidari Z, Barzgar A, Hashemi Sooteh MB, Hedayati MT, Aghili R, et al. Identification of *Malassezia* Species isolated from patients with pityriasis versicolor and seborrhoeic dermatitis by PCR-RFLP. *J Mazand Univ Med Sci* 2008; 18(66): 51-62 (Persian).
59. Faergemann J, Aly R, Maibach HI. Quantitative variations in distribution of *Pityrosporum orbiculare* on clinically normal skin. *Acta Derm-Venereol* 1983; 63(4): 346-348.
60. Gaitanis G, Velegraki A, Alexopoulos EC, Kapsanaki-Gotsi E, Zisova L, Ran Y, et al. *Malassezia furfur* fingerprints as possible

- markers for human phylogeography. ISME J 2009; 3(4): 498-502.
61. Gupta AK, Kohli Y, Faergemann J, Summerbell RC. Epidemiology of Malassezia yeasts associated with pityriasis versicolor in Ontario, Canada. Med Mycol 2001; 39(2): 199-206.
 62. Leeming JP, Notman FH, Holland KT. The distribution and ecology of Malassezia furfur and cutaneous bacteria on human skin. J Appl Bacteriol 1989; 67: 47-52.
 63. Bergbrant IM, Faergemann J. Variations of Pityrosporum orbiculare in middle-aged and elderly individuals. Acta Derm-Venereol 1988; 68(6): 537-540.
 64. Bergbrant IM, Broberg A. Pityrosporum ovale culture from the forehead of healthy children. Acta Derm Venereol 1994; 74(4): 260-261.
 65. Faergemann J, Fredriksson T. Tinea Versicolor: Some New Aspects on Etiology, Pathogenesis, and Treatment. Int J Dermatol 1982; 21(1): 8-12.
 66. Hedayati MT, Moazeni SM, Khosravi AR, Mansouri P. Identification of allergen components of Pityrosporum ovale by immunoblotting technique. J Mazand Univ Med Sci 1999; 8(19): 18-23 (Persian).
 67. Nakabayashi A, Sei Y, Guillot J. Identification of Malassezia species isolated from patients with seborrheic dermatitis, atopic dermatitis, pityriasis versicolor and normal subjects. Med Mycol 2000; 38(5): 337-41.
 68. Gupta AK, Kohli Y, Summerbell RC, Faergemann J. Quantitative culture of Malassezia species from different body sites of individuals with or without dermatoses. Med Mycol 2001; 39(3): 243-251.
 69. Rincon S, Celis A, Sopo L, Motta A, Cepero de Garcia MC. Malassezia yeast species isolated from patients with dermatologic lesions. Biomed 2005; 25(4): 189-195.
 70. Sandstrom Falk MH, Tengvall Linder M, Johansson C, Bartosik J, Back O, Sarnhult T, et al. The prevalence of Malassezia yeasts in patients with atopic dermatitis, seborrheic dermatitis and healthy controls. Acta Derm Venereol 2005; 85(1): 17-23.
 71. Sugita T, Tajima M, Tsubuku H, Tsuboi R, Nishikawa A. Quantitative analysis of cutaneous Malassezia in atopic dermatitis patients using real-time PCR. Microbiol Immunol 2006; 50(7): 549-52.
 72. Darabi K, Hostetler SG, Bechtel MA, Zirwas M. The role of Malassezia in atopic dermatitis affecting the head and neck of adults. Am Acad Dermatol 2009; 60(1): 125-136.
 73. Schmid-Grendelmeier P, Scheynius A, Cramer R. The role of sensitization to Malassezia sympodialis in atopic eczema. Chem Immunol Allergy 2006; 91: 98-109.
 74. Johansson S, Karlstrom K. IgE-binding components in Pityrosporum orbiculare identified by an immunoblotting technique. Acta Derm-Venereol 1991; 71(1): 11-16.
 75. Lindgren L, Wahlgren CF, Johansson SGO, Wiklund I, Nordvall SL. Occurrence and clinical features of sensitization to Pityrosporum orbiculare and other allergens in children with atopic dermatitis. Acta Derm-Venereol 1995; 75(4): 300-304.
 76. Kim TY, Jang IG, Park YM, Kim HO, Kim CW. Head and neck dermatitis: the role of Malassezia furfur, topical steroid use and environmental factor in its causation. Clin Exp Dermatol 1999; 24(3): 226-231.
 77. Kieffer M, Bergbrant IM, Faergemann J, Jemec GB, Ottevanger V, Skov PS, et al. Immune reactions to Pityrosporum ovale in adult patients with atopic dermatitis and

- seborrhoeic dermatitis. J Am Acad Dermatol 1990; 22(5): 739-742.
78. Wessels MW, Doeke G, van Leperen-van Dijk AG, Koers WJ, Young E. IgE antibodies to *Pityrosporum ovale* in atopic dermatitis. Brit J Dermatol 1991; 125(3): 227-232.
79. Devos SA, van der Valk PGM. The relevance of skin prick tests for *Pityrosporum orbiculare* in patients with head and neck dermatitis. Allergy 2000; 55(11): 1056-1058.
80. Khosravi AR, Hedayati MT, Mansouri P, Shokri H, Moazzeni M. Immediate hypersensitivity to *Malassezia furfur* in patients with atopic dermatitis. Mycoses 2007; 50(4): 297-301.
81. Rokugo M, Tagami H, Usuba Y, Tomota Y. Contact sensitivity to *Pityrosporum ovale* in patients with atopic dermatitis. Arch Dermatol 1990; 126(5): 627-632.
82. Clemmensen OJ, Hjorth N. Treatment of atopic dermatitis of the head and neck with ketoconazole in patients with type I sensitivity to *Pityrosporum orbiculare*. Semin Dermatol 1983; 2: 26-29.
83. Svejgaard E. The role of microorganisms in atopic dermatitis. Semin Dermatol 1990; 9(4): 255-261.
84. Selander C, Zargari A, Mollby R, Rasool O, Scheynius A. Higher pH level, corresponding to that on the skin of patients with atopic eczema, stimulates the release of *Malassezia sympodialis* allergens. Allergy 2006; 61(8): 1002-1008.
85. Stern UM, Hornstein OP, Salzer B. Do training-dependent differences in perspiration exist between healthy and atopic subjects? Dermatol 2000; 27(8): 491-499.
86. Baroni A, Perfetto B, Paoletti I, Ruocco E, Canozo N, Orlando M, et al. *Malassezia furfur* invasiveness in a keratinocyte cell line(HaCat): effects on cytoskeleton and on adhesion molecule and cytokine expression. Arch Dermatol Res 2001; 293(8): 414-419.
87. Vickery BP. Skin barrier function in atopic dermatitis. Curr Opin Pediatr 2007; 19(1): 89-93.
88. Aspres N, Anderson C. *Malassezia* yeasts in the pathogenesis of atopic dermatitis. Aust J Dermatol 2004; 45(4): 199-207.
89. Moretta A. The dialogue between human natural killer cells and dendritic cells. Curr Opin Immunol 2005; 17(3): 306-311.
90. Buentke E, Heffler LC, Wilson JL, Wallin RP, Lofman C, Chambers BJ, et al. Natural killer and dendritic cell contact in lesional atopic dermatitis skin *Malassezia*-influenced cell interaction. Invest Dermatol 2002; 119(4): 850-857.
91. Johansson A, Karlstrom K. IgE- binding component in *P. Orbicular* identified by an immunoblotting technique. Acta Derm Venereol 1991; 71(10): 11-16.
92. Jensen-Jarolim E, Poulsen LK, With H, Kieffer M, Ottевanger V, Stahl Skov P. Atopic dermatitis of the face scalp and neck: type 1 reaction to the yeast *Pityrosporum Ovalis*. J Allergy Clin Immunol 1992; 89(1): 44-51.
93. Zargari A, Harfast AB, Johansson S, Johansson SGO, Scheynius A. Identification of allergen components of the opportunistic yeast *Pityrosporum*. Allergy 1994; 49(1): 50-60.
94. Hedayati MT, Badali H, Vasheghani F, Aghili SR, Mohammadpour RA. Immunoblotting analysis of sera from patients with acute and chronic vaginitis for IgE and IgG antibodies against *Candida Albicans*. J Mazand Univ Med Sci 2004; 14(43): 24-17 (Persian).
95. Odds FC. Pathogenesis of *Candida* infections. Am Acad Dermatol 1994; 31(3): 2-5.

96. Koivikko A, Kalimo K, Nieminen E, Viander M. Relationship of immediate and delayed hypersensitivity to nasopharyngeal and intestinal growth of *Candida albicans* in allergic subjects. *Allergy* 1988; 43: 201-205.
97. Yildirim M, Ozaydin I, Sahin I, Yasar M. Acute Calculous Cholecystitis Caused by *Candida lusitaniae*: an Unusual Causative Organism in a Patient without Underlying Malignancy. *Infect Dis* 2008; 61(2): 138-139.
98. Buslau M, Menzel I, Holzmann H. Fungal flora of human faeces in psoriasis and atopic dermatitis. *Mycoses* 1988; 33(2): 90-94.
99. Caffarelli C, Cavagni G, Deriu FM, Zanotti P, Atherton DJ. Gastrointestinal symptoms in atopic eczema. *Arch Dis Child* 1998; 78(3): 230-234.
100. Samuilova TL, Mokronosova MA, Krasnoproshin LI, Sdokhova SA, Sergeeva AS. *Candida albicans* sensitization in patients with atopic bronchial asthma and atopic dermatitis. *Ter Arkh* 1997; 69(11): 41-44.
101. Wilson WH. Eczema responsive to treatment for *Helicobacter pylori*. *Ann Allergy Asthma Immunol* 1995; 75(3):290.
102. Henseler T, Tausch I. Mycoses in patients with psoriasis or atopic dermatitis. *Mycoses* 1997; 40(1):22-8.
103. Yamaguchi N, Sugita R, Miki A, Takemura N, Kawabata J, Watanabe J, et al. Gastrointestinal *Candida* colonization promotes sensitization against food antigens by affecting the mucosal barrier in mice. *Gut* 2006; 55(7): 954-960.
104. Savolainen J, Koivikko A, Kalimo K, Nieminen E, Viander M. IgE, IgA, and IgG antibodies and delayed skin response towards *Candida albicans* antigens in atopic with and without saprophytic growth. *Clin Exp Allergy* 1990; 20(5): 549-554.
105. Savolainen J, Kortekangas-Savolainen O, Nermes M, Viander M, Koivikko A, Kalimo K, et al. IgE, IgA, and IgG responses to common yeasts in atopic patients. *Allergy* 1998; 53(50): 506-512.
106. Kortekangas-Savolainen O, Kalimo K, Lammintausta K, Savolainen J. IgE-binding components of baker's yeast (*Saccharomyces cerevisiae*) recognized by immunoblotting analysis. Simultaneous IgE binding to mannan and 46-48 kD allergens of *Saccharomyces cerevisiae* and *Candida albicans*. *Clin Exp Allergy* 1993; 23(3): 179-184.
107. Nissen D, Petersen LJ, Esch R et al. IgE-sensitization to cellular and culture filtrates of fungal extracts in patients with atopic dermatitis. *Ann Allergy Asthma Immunol* 1998; 81(3): 247-255.
108. Back O, Scheynius A, Johansson SG. Ketoconazole in atopic dermatitis. Therapeutic response is correlated with decrease in serum IgE. *Arch Dermatol Res* 1995; 287(5): 448-451.
109. Hedayati MT, Hajhaydari ZZ, Bromand S. A Study on Specific IgE Against *Candida Albicans* in Atopic Dermatitis Patients Referred to Boali Hospital, Sari-Iran. *J Mazand Univ Med Sci* 2007; 17(60): 14-22.
110. Matsumura N, Aiba S, Tanaka M, Aoyama H, Tabata N, Tamura G, et al. Comparison of immune reactivity profiles against various environmental allergens between adult patients with atopic dermatitis and patients with allergic respiratory diseases. *Acta Derm-Venereol* 1997; 77(5): 388-391.
111. Ishiguro A, Homma M, Torii S, Tanaka K. Identification of *Candida albicans* antigens reactive with immunoglobulin E antibody of human sera. *Infect Immun* 1992; 60(4): 1550-1557.

112. Ito K, Ishiguro A, Kanbe T, Tanaka K, Torii S. Detection of IgE antibody against *Candida albicans* enolase and its crossreactivity to *Saccharomyces cerevisiae* enolase. *Clin Exp Allergy* 1995; 25(6): 522-528.
113. Ito K, Ishiguro A, Kanbe T, Tanaka K, Torii S. Characterization of IgE-binding epitopes on *Candida albicans* enolase. *Clin Exp Allergy* 1995; 25(6): 529-535.
114. Nermes M, Savolainen J, Kalimo K, Lammintausta K, Viander M. Determination of IgE antibodies to *Candida albicans* mannan with nitrocellulose- RAST in patients with atopic diseases. *Clin Exp Allergy* 1994; 24(4): 318-323.
115. Savolainen J, Viander M, Koivikko A. IgE- IgA- and IgGantibody responses to carbohydrate and protein antigens of *Candida albicans* in asthmatic children. *Allergy* 1990; 45(1): 54-63.
116. Breitenbach M, Simon-Nobbe B. The allergens of *Cladosporium herbarum* and *Alternaria alternata*. *Chem Immunol* 2002; 81: 48-72.
117. Hedayati MT, Maiahi S, Aghili SR, Gohari Moghadam K, Soltani A, Shokoohi T, et al. A survey on the incidence of IgE to common allergenic mold in Asthmatic patients from Sari, 2003. *J Mazand Univ Med Sci* 2006; 16(51): 87-81.
118. Hollins PD, Kettlewell PS, Atkinson MD, Stephenson DB, Corden JM, Millington WM, et al. Relationships between airborne fungal spore concentration of *Cladosporium* and the summer climate at two sites in Britain. *Int J Biometeorol* 2004; 48(3): 137-141.
119. Bogacka E, Jahnz-Rozyk K. Allergy to fungal antigens. *Polski Merkuriusz Lekarski* 2003; 14(83): 381-384.
120. Bisht V, Kukreja N, Singh BP, Arora N, Sridhara S. Current Status of Fungal Allergens. *Indian J Allergy Asthma Immunol* 2003; 17(1): 9-19.
121. Aukrust L. Crossed radioimmuno-electrophoretic studies of distinct allergens in two extracts of *Cladosporium herbarum*. *Int Arch Allergy Appl Immunol* 1979; 58(4): 375-90.
122. Denning DW, O'Driscoll BR, Hogaboam CM, Bowyer P, Niven RM. The link between fungi and severe asthma: a summary of the evidence. *Eur Respir J* 2006; 27(3): 615-626.
123. Vijay HM, Kurup VP. Fungal allergens. *Clin Allergy Immunol* 2008; 21: 141-160.
124. Achatz G, Oberkofler H, Lechenauer E, Simon B, Unger A, Kandler D, et al. Molecular cloning of major and minor allergens of *Alternaria alternata* and *Cladosporium herbarum*. *Mol Immunol* 1995; 32(3): 213-227.
125. Sward-Nordmo M, Paulsen BS, Wold JK. The glycoprotein allergen Ag-54 (Cla h II) from *Cladosporium herbarum*. Structural studies of the carbohydrate moiety. *Int Arch Allergy Appl Immunol* 1988; 85(3): 288-294.
126. Aukrust L, Borch SM. Partial purification and characterization of two *Cladosporium herbarum* allergens. *Int Arch Allergy Appl Immunol* 1979; 60(1): 68-79.
127. Breitenbach M, Simon B, Probst G, Oberkofler H, Ferreira F, Briza P, et al. Enolases are highly conserved fungal allergens. *Int Arch Allergy Appl Immunol* 1997; 113(1-3): 114-117.
128. Swärd-Nordmo M, Paulsen BS, Wold JK, Wehler T, Jansson PE. Further structural studies of the carbohydrate moiety of the allergen Ag-54 (Cla h II) from the mould *Cladosporium herbarum*. *Carbohydrate Res* 1991; 214(2): 267-279.

129. Wagner S, Breiteneder H, Simon-Nobbe B, Susani M, Krebitz M, Niggemann B, et al. Hev b 9, an enolase and a new cross-reactive allergen from hevea latex and molds. Purification, characterization, cloning and expression. *Eur J Biochem* 2000; 267(24): 7006-7014.
130. Simon-Nobbe B, Denk U, Schneider PB, Radauer C, Teige M, Crameri R, et al. NADP-dependent mannitol dehydrogenase, a major allergen of *Cladosporium herbarum*. *Biol Chem* 2006; 281(24): 16354-16360.
131. Pöll V, Denk U, Shen HD, Panzani RC, Dissertori O, Lackner P, et al. The vacuolar serine protease, a cross-reactive allergen from *Cladosporium herbarum*. *Mol Immunol* 2009; 46(7): 1360-1373.
132. Rid R, Onder K, Hawranek T, Laimer M, Bauer JW, Holler C, et al. Isolation and immunological characterization of a novel *Cladosporium herbarum* allergen structurally homologous to the alpha/beta hydrolase fold superfamily. *Mol Immunol* 2010; 47(6): 1366-1377.
133. Falsone SF, Weichel M, Crameri R, Breitenbach M, Kungl AJ. Unfolding and double-stranded DNA binding of the cold shock protein homologue Cla h 8 from *Cladosporium herbarum*. *Biol Chem* 2002; 277(19): 16512-16516.
134. Shankar J, Gupta PD, Sridhara S, Singh BP, Gaur SN, Arora N. Immunobiochemical analysis of cross-reactive glutathione-S-transferase allergen from different fungal sources. *Immunol Invest* 2005; 34(1): 37-51.
135. Weichel M, Schmid-Grendelmeier P, Rhyner C, Achatz G, Blaser K, Crameri R. Immunoglobulin E-binding and skin test reactivity to hydrophobin HCh-1 from *Cladosporium herbarum*, the first allergenic cell wall component of fungi. *Clin Exp Allergy* 2003; 33(1): 72-77.
136. Zhang L, Muradie G, De Vouge MW, Rode H, Vijay HM. An allergenic polypeptide representing a variable region of hsp 70 cloned from a cDNA library of *Cladosporium herbarum*. *Clin Exp Allergy* 1996; 26(1): 88-95.
137. Rid R, Simon-Nobbe B, Langdon J, Holler C, Wally V, Pöll V, et al. *Cladosporium herbarum* translationally controlled tumor protein (TCTP) is an IgE-binding antigen and is associated with disease severity. *Mol Immunol* 2008; 45(2): 406-418.
138. Peternel R, Culig J, Hrga I. Atmospheric concentrations of *Cladosporium* spp. and *Alternaria* spp. spores in Zagreb (Croatia) and effects of some meteorological factors. *Ann Agric Environ Med* 2004; 11(2): 303-307.
139. Bagni B, Davies RR, Mallea M, Nolard N, Spieksma FT, Stix E. Sporenkonzentrationen in Städten der Europäischen Gemeinschaft (EG). II *Cladosporium* und *Alternaria* Sporen. *Acta Allergol* 1977; 32(2): 118-138.
140. Khazaei HA, Hashemi SR, Aghamohammadi A, Farhoudi F, Rezaei N. The study of type 1 allergy prevalence among people of south-east of Iran by skin prick test using common allergens. *Iran J Allergy Asthma Immunol* 2003; 2(3): 165-168.
141. Reijula K, Leino M, Mussalo-Rauhamaa H, Nikulin M, Alenius H, Mikkola J, et al. IgE-mediated allergy to fungal allergens in Finland special reference to *Alternaria* alternate and *Cladosporium herbarum*. *Ann Allergy Asthma Immunol* 2003; 91(3): 280-287.
142. Nolles G, Heokstra MO, Schouten JP, Gerritsen J, Kauffman HF. Prevalence of immunoglobulin E for fungi in atopic children.

- Clin Exp Allergy 2001; 31(10): 1564-1570.
143. Schäfer T, Heinrich J, Wjst M, Adam H, Ring J, Wichmann H-E. Association between severity of atopic eczema and degree of sensitization to aeroallergens in schoolchildren. J Allergy Clin Immunol 1999; 104(6): 1280-1284.
144. Lowenstein H, Aukrust L, Gravesen S. Cladosporium herbarum extract characterized by means of quantitative immunoelectrophoretic methods with special attention to immediate type allergy. Int Arch Allergy Appl Immunol 1977; 55(1-6): 1-12.
145. Zhang L, Curran I, Muradie G, Rode H, Vijay HM. Two-dimensional immunoblot analysis of allergens of Cladosporium herbarum. Clin Exp Allergy 1994; 24(3): 263-269.
146. Maria A, Schneider P, Wally V, Breitenbach M, Simonnobbe B. Sensitization to fungi: epidemiology, comparative skin tests, and IgE reactivity of fungal extracts. Clin Exp Allergy 2003; 33(10): 1429-1438.
147. Horner WE, Helbling A, Salvaggio JE, Lehrer SB. Fungal Allergens. Clinical Microbiol 1995; 8(2): 161-179.
148. Yunginger JW, Jones RT, Nesheim ME, Geller M. Studies on Alternaria allergen, III. Isolation of a major allergenic fraction (ALT-I). J Allergy Clin Immunol 1980; 66(2): 138-147.
149. De Vougue MW, Thaker AJ, Zhang L, Muradie G, Rode H, Vijay HN. Molecular cloning of IgE-binding fragments of Alternaria alternata allergens. Int Arch Allergy Appl Immunol 1998; 116(4): 261-268.
150. Bush RK, Sanchez H, Geisler D. Molecular cloning of a major Alternaria allergen, rAlt a 2. J Allergy Clin Immunol 1999; 104(3): 665-671.
151. Breitenbach M, Achatz G, Oberkofler H, Simon B, Unger A, Lechenauer E, et al. Molecular characterization of allergen of Cladosporium herbarum and Alternaria alternata. Int Arch Allergy Appl Immunol 1995; 107(1-3): 458-459,
152. Unger A, Stöger P, Simon-Nobbe B, Susani M, Crameri R, Ebner C, et al. Clinical testing of recombinant allergens of the mold Alternaria alternata. Int Arch Allergy Appl Immunol 1999; 118(2-4): 220-221.
153. Leino M, Reijula K, Mkinen-Kiljunen S, Haahtela T, Mkel MJ, Alenius H. Cladosporium herbarum and Pityrosporum ovale Allergen Extracts Share Cross-Reacting Glycoproteins. Int Arch Allergy Appl Immunol 2006; 140(1): 30-35.
154. Hedayati MT, Shokohi T, Mayah S, Bahoosh M, Haghani I, Saltanatpori Z, Hajjar F. A survey on myco-flora of air, book and cabinet of Mazandaran University of Medical Sciences Libraries. J Mazand Univ Med Sci 2008; 18(67): 107-110.
155. Cantani A, Ciaschi V. Epidemiology of alternaria alternata allergy: a prospective study in 6840 Italian asthmatic children. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2004; 8(60): 289-294.
156. Wang IJ, Lin YT, Yang YH, Chen CL, Tsai YH, Chiang BL, et al. Correlation between age and allergens in pediatric atopic dermatitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2004; 93(4): 334-338.
157. Broberg A. Pityrosporum ovale in healthy children, infantile seborrhoeic dermatitis and atopic dermatitis. Acta Derm Venereol Suppl (Stockh) 1995; 191: 1-47.
158. Broberg A, Faergemann J, Johansson S, Johansson SG, Strannegard IL, Svegaard E. Pityrosporum ovale and atopic dermatitis in children and young adults. Acta Derm-Venereol 1992; 72(3): 187-192.

159. Wang IJ, Guo YL, Weng HJ, Hsieh WS, Chuang YL, Lin SJ, Chen PC. Environmental risk factors for early infantile atopic dermatitis. *Pediatr Allergy Immunol* 2007; 18(5): 441-447.
160. Terui T, Makino Y, Hashimoto A, Tagami H. Learning from fungus allergy in atopic dermatitis patients. *Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi* 2000; 41(3): 157-160.
161. Adachi A, Horikawa T, Ichihashi M, Takashima T, Komura A. Role of Candida allergen in atopic dermatitis and efficacy of oral therapy with various antifungal agents. *Arerugi* 1999; 48(7): 719-725.
162. Lintu P, Savolainen J, Kortekangas-Savolainen O, Kalimo K. Systemic ketoconazole is an effective treatment of atopic dermatitis with IgE-mediated hypersensitivity to yeasts. *Allergy* 2001; 56(6): 512-517.
163. Heel RC, Brogden RN, Carmine A, Morley PA, Speight TM, Avery GS. Ketoconazole: A review of its therapeutic efficacy in superficial and systemic fungal infections. *Drugs* 1982; 23(1-2): 1-36.
164. Van Cutsem J, Van Gerven F, Cauwenbergh G, Odds F, Janssen PAJ. The anti-inflammatory effects of ketoconazole. *American Academy of Dermatology*. 1991; 25(2): 257-261.
165. Kanda N, Enomoto U, Watanabe S. Antimycotics suppress interleukin-4 and interleukin-5 production in anti-CD3 plus anti-CD28-stimulated T cells from patients with atopic dermatitis. *Investigative Dermatology* 2001; 117(6): 1635-1646.
166. Kitamura K. Application of antifungal drugs to refractory cases of atopic dermatitis and problems. *Jpn J Dermatol* 1997; 107: 226-236.
167. Sugai T. Treatment with oral antimycotic drugs in patients strongly positive to intradermal injections of *C. albicans* antigen. *Australasian Journal of Dermatology* 1997; 38(242): 1-14.
168. Ikezawa Y, Ohsuna H, Ohnuma S, Ohsawa J, Kitamura K. Evaluation of oral therapy with antifungal drugs on refractory atopic dermatitis. *Japanese Journal of Pediatric Dermatology* 1998; 17: 121-130.
169. Kolmer HL, Taketomi EA, Hazen KC, Hughs E, Wilson BB, Platts-Mills TA. Effect of combined antibacterial and antifungal treatment in severe atopic dermatitis. *J Allergy Clin Immunol* 1996; 98(3): 702-707.
170. Haria M, Bryson HM, Goa KL. Itraconazole: A reappraisal of its pharmacological properties and therapeutic use in the management of superficial fungal infections. *Drugs* 1996; 51(4): 585-620.
171. Schmid-Grendelmeier P, Flückiger S, Disch R, Trautmann A, Wüthrich B, Blaser K, Scheinyus A, Crameri R. IgE-mediated and T cell-mediated autoimmunity against manganese superoxide dismutase in atopic dermatitis. *J Allergy Clin Immunol* 2005; 115(5): 1068-1075.
172. Krakowski AC, Eichenfield LF, Dohil MA. Management of atopic dermatitis in the pediatric population. *Pediatrics* 2008; 122(4): 812-824.
173. Roll A, Cozzio A, Fischer B, Schmid-Grendelmeier P. Microbial colonization and atopic dermatitis. *Current Opinion in Allergy & Clinical Immunology* 2004; 4(5): 373-378.
174. Boguniewicz M, Nicol N, Kelsay K, Leung DY. A multidisciplinary approach to evaluation and treatment of atopic dermatitis. *Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery* 2008; 27(2): 115-127.