

# مقایسه‌ی تاثیر درمانی ویتامین C و CoQ10 روی میزان کاهش سلول‌های آسیب دیده‌ی ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ موش سوری به دنبال ایسکمی-ریپرفیوژن

جلال حسن شاهی<sup>۱</sup>  
غلامحسین حسن شاهی<sup>۲</sup>  
محمد زمانی<sup>۳</sup>  
الهام حکیمی زاده<sup>۴</sup>  
منصوره سلیمانی<sup>۵</sup>

## چکیده

**سابقه و هدف:** ویتامین C و CoQ10 به عنوان دو آنتی اکسیدان قوی شناخته می‌شوند. مان نقش محافظتی CoQ10 و اسید اسکوربیک را در برابر ایسکمی-ریپرفیوژن بروزی کردیم. نهایتاً تاثیر درمانی این دو را با هم مقایسه کردیم.

**مواد و روش‌ها:** ۳۵ سر موش سوری نر بالغ، نژاد balb-C به پنج گروه هفت تایی تقسیم شدند. شامل گروه سالم، ایسکمی کنترل، شم کنترل، گروه تحت درمان با CoQ10 و گروه تحت درمان با ویتامین C بودند. در گروه‌های درمان، موش‌ها قبل از القای ایسکمی، با CoQ10 و ویتامین C به مدت یک هفته درمان شدند. سپس ایسکمی القاء شد و بعد از کاهش التهاب موش‌ها مجدداً به مدت یک هفته تحت درمان با CoQ10 و ویتامین C قرار گرفتند. از رنگ آمیزی نیسل برای شمارش سلول‌های نکروتیک و از کیت تانل برای بررسی آپوپتوز استفاده شد. در حالی که برای سنجش حافظه کوتاه مدت، تست‌های حافظه y-maze و شاتل باکس انجام شد.

**یافته‌ها:** ریت بالای آپوپتوزی سدر گروه ایسکمی دیده شد. در گروه تحت درمان با این دو آنتی اکسیدان، مرگ سلول‌ها به مقدار قابل توجهی پایین‌تر از گروه ایسکمی کنترل بود. بین دو گروه درمان، در گروه تحت درمان با CoQ10 مرگ نورون‌ها کمتر از گروه تحت درمان با اسید اسکوربیک بود. نتایج تست‌های حافظه با نتایج تست‌های باقی منطبق بود.

**استنتاج:** با توجه به یافته‌های این مطالعه، مصرف این دو آنتی اکسیدان به مقدار قابل توجهی مرگ سلول‌ها و از دست دادن حافظه را کاهش داد. اما اثرات آنتی اکسیدانی CoQ10 قوی‌تر از ویتامین C در این ناحیه از مغز بود.

**واژه‌های کلیدی:** هیپوکامپ، ایسکمی-ریپرفیوژن، اثرنوروپروتکتیو، CoQ10، اسید آسکوربیک

## مقدمه

اطلاعات هم نقش دارد و با احساسات و خاطرات در ارتباط است (۱، ۲). آسیب به هیپوکامپ باعث ایجاد

هیپوکامپ ساختاری در کف بطن طرفی در لوب تمپورال مغز است (۳، ۴). هیپوکامپ در سازماندهی

E-mail :ghhassanshahi@rums.ac.ir

مؤلف مسئول: غلامحسین حسن شاهی - رفسنجان: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  ۲. گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی و هماتولوژی، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  ۳. گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  ۴. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی-فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  ۵. گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
- تاریخ دریافت: ۹۱/۲/۳ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۹۱/۳/۱۸ تاریخ تصویب: ۹۱/۷/۳۰

بافتی گردد(۱۵). انسداد شریان کاروتید مشترک چپ و راست به مدت چند دقیقه باعث به وجود آمدن ایسکمی در ناحیه هیپوکامپ می‌گردد. که در میان قسمت‌های دچار ایسکمی شده در هیپوکامپ ناحیه هیلوس و نورون‌های ناحیه CA1 حساس‌ترین نقاط مستعد به آسیب، به‌دنبال ایسکمی هستند. به‌دنبال آسیب هیپوکامپ اختلالات حافظه بعدی و اشکالات یادگیری را داریم و وجود ضایعه باعث به وجود آمدن انواع اختلالات در طرح‌های رفتاری می‌شود(۱۶). روغن زیتون به علت داشتن اسیدهای چرب غیراشباع می‌تواند میزان کلسترول را کاهش دهد و به این ترتیب از رسوب کلسترول در رگ‌ها نیز جلوگیری کند(۱۸).

CoQ10 از جمله موادی است که معمولاً در میتوکندری و در ارتباط با تولید انرژی دیده می‌شود و آن نیز به عنوان یک آنتی‌اکسیدان هم شناخته شده است کوآنزیم Q10 یک آنتی‌اکسیدان قوی است و ممکن است در حفظ عملکرد طبیعی عضله نقش داشته باشد. کاهش سطوح سرمی آن در بیماری پارکینسون گزارش شده است(۱۹، ۲۰). آنتی‌اکسیدان‌ها موادی‌اند که با حذف رادیکال‌های آزاد و ترکیبات ناشی از صدمات سلولی، مانع آسیب به سلول‌های سالم به خصوص در قسمت‌هایی مثل غشای سلولی و نیز DNA می‌شوند. با این مکانیزم مانع مرگ سلول‌ها می‌شوند(۲۱). CoQ10 در بدن تولید می‌شود و برای کارکرد پایه‌ای سلول ضروری است. غنی‌ترین مواد غذایی حاوی CoQ10 روغن ماهی، مغز دانه‌ها، انواع ماهی‌ها و انواع گوشت‌ها می‌باشد(۲۲). آنتی‌اکسیدان‌ها مانند یک سد از بدن در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کنند. اگر چه سیستم‌های آنزیمی متعددی برای خشی کردن رادیکال‌های آزاد در بدن وجود دارد، ولی آنتی‌اکسیدان‌های اصلی، ویتامین‌های E، C و بتاکاروتون و نیز ماده معدنی سلنیم مهم هستند(۲۳). بدن قادر به تولید این ترکیبات نیست، بنابراین بایستی از طریق غذا آن‌ها را دریافت کرد(۲۴). نیاز روزانه به ویتامین C، ۶۰ میلی‌گرم است و نگهداری

فراموشی بعدی و ضعف حافظه کوتاه مدت و حافظه فضایی می‌شود ولی اطلاعات قبلی حفظ می‌شوند و بیمار دچار این ضایعه می‌تواند آن‌ها را به خاطر آورد(۵). این حافظه باقیمانده قبلی، ما را متقاعد می‌کند که تقویت بیشتر حافظه باعث انتقال اطلاعات به بیرون از هیپوکامپ و بخش‌های دیگری از مغز می‌شود(۶). آسیب به هیپوکامپ دو طرف، موجب فراموشی بعدی یا anterograde amnesia می‌شود ولی اگر یکی از آن‌ها آسیب بیند فرد دچار فراموشی بعدی نمی‌شود(۷). به کاهش خونرسانی به اندام یا ناحیه‌ای از بدن ایسکمی می‌گویند که باعث کاهش انتقال اکسیژن و مواد مغذی به بافت‌ها و در نتیجه اختلال عملکرد آن اندام می‌گردد(۸). مشاهدات اولیه نشان می‌دهد که آسیب‌های ایسکمی مغزی در اثر تغییر ارتباطات ساده بیوشیمیابی و فیزیولوژیکی در نتیجه اختلال جریان خون ایجاد می‌شود(۱۰). ایسکمی مغزی بعد از سرطان و سکته قلبی، از دلایل عمدۀ مرگ و میر در جهان است(۱۱، ۱۲). هیپوکامپ به ایسکمی و هیپوکسی بسیار حساس است و هیپوکسی در این قسمت باعث مهار پتانسیل سیناپسی شده که مکانیسمی برای کاهش انرژی مصرفی سلول در حالت هیپوکسی است(۱۳). صدمه به هیپوکامپ بعد از ایسکمی-ریپریوژن باعث اختلالات زیادی در عملکرد این عضو می‌شود. آسیب‌های ریپریوژن به آسیب‌هایی گفته می‌شود که در اثر بازگشت مجدد خون در بافت پس از یک دوره ایسکمیک ایجاد می‌شود، غیاب اکسیژن و مواد مغذی وضعیتی را ایجاد می‌کند که در آن بازگشت جریان خون به جای بازگشت فعالیت نرمال بافت باعث التهاب و آسیب‌های اکسیداتیو از طریق القای استرس اکسیداتیو می‌شود(۱۴). بعد از برقراری جریان خون مغزی، جریان بازگشتی به دنبال انسداد باعث بازگشت اکسیژن در سلول‌ها و آسیب‌های ناشی از تولید و تهاجم رادیکال‌های سوپرا اکسید می‌گردد. این امر می‌تواند بر روی سلول‌ها تأثیر گذاشته و باعث نکروز و آپوپتوز

## مواد و روش‌ها

### حیوانات

در این تحقیق تعداد ۳۵ موش سوری نر بالغ (با سن ۴ هفته‌ای) نژاد bulb-c با وزن ۴۰-۴۵ گرم از موسسه رازی ایران خریداری شد. موش‌ها در یک اتاق مخصوص در دمای  $21 \pm 1^\circ\text{C}$  نگهداری می‌شدند (با رطوبت  $50 \pm 10\%$  درصد و در یک سیکل ۲۴ ساعته که ۱۲ ساعت در نور و ۱۲ ساعت در تاریکی قرار داشتند). حیوان‌ها به آب لوله کشی و غذای مخصوص موش (شرکت خوراک دام پارس، کرج) دسترسی داشتند. در ضمن، بررسی بر اساس پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های توصیه شده توسط انتستیتو ملی پهداشت آمریکا برای نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی و راهکارهای علمی موجود در داخل کشور به انجام رسید و رعایت اصول اخلاق در پژوهش هنگام کار با حیوانات آزمایشگاهی طبق اساسنامه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، به انجام رسید.

### گروه‌های تحت بررسی

- موش‌ها به طور تصادفی به ۵ گروه‌های زیر تقسیم شدند:
۱. گروه سالم ( $n=7$ ) و بدون القای ایسکمی و بدون دریافت دارو
  ۲. گروه ایسکمی کنترل ( $n=7$ )
  ۳. گروه شم کنترل ( $n=7$ )
  ۴. گروه تحت درمان با ویتامین C ( $n=7$ )
  ۵. گروه تحت درمان با CoQ10 ( $n=7$ )

ابتدا آسکوربیک اسید و CoQ10 از یک هفته قبل از القای ایسکمی، روزانه و به مدت یک هفته به موش‌ها (گروه‌های درمان) داده شد که CoQ10 به صورت گواواز (450mg/kg) و اسید آسکوربیک به صورت تزریق داخل صفاتی (100mg/kg) به آن‌ها داده شد و سپس موش‌ها (گروه‌های درمان و ایسکمی کنترل) با کتابخانه (mg/kg 100) یا

طولانی مدت در یخچال، پختن، گرمای هوا، نور و دخانیات باعث از بین رفتن این ویتامین می‌شوند. از این رو افراد سیگاری به این ویتامین نیاز بیشتری دارند (۲۵). مرکبات بهترین منابع ویتامین C می‌باشد (۲۶). همچنین مصرف این ویتامین باعث جذب بهتر آهن در بدن می‌شود (۲۷). ویتامین C به عقیده برخی کارشناسان احتمال بروز سکته مغزی در افراد غیر سیگاری را تا ۳۰ درصد و در افراد سیگاری تا ۷۰ درصد کاهش می‌دهد. این ویتامین از اکسید شدن سلول‌های چرب حاضر در غشاء سلولی توسط عوامل اکسید کننده جلوگیری می‌کند (۳۰-۲۸) ما به این علت نورون‌های موجود در ناحیه CA1 هیپوکامپ را مورد بررسی قرار دادیم که این نورون‌ها نسبت به سایر نورون‌های موجود در مغز، از حساسیت فوق العاده بالاتری در برابر هیپوکسی برخوردارند و همچنین تجمع رادیکال‌های آزاد در اطراف این نورون‌ها به سرعت باعث فعال شدن روندهای نکروز و آپوپتوز سلولی می‌شود. در مطالعات مختلف تأثیرات آنتی اکسیدانی ویتامین C بررسی شده بود (۴۸، ۴۹). CoQ10 می‌تواند تخریب سلولی را مخصوصاً در غشاء سلولی و DNA کاهش دهد باعث کاهش عوارض پس از ایسکمی می‌شود (۵۱). تا به حال اثر ویتامین C و CoQ10 در ناحیه CA1 هیپوکامپ و تأثیرات درمانی آن‌ها در کاهش تخریب حافظه کوتاه مدت به دنبال آسیب دیدن نورون‌های موجود در آن به دنبال ایسکمی ریپر فیوژن بررسی نشده بود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و درمانی ویتامین C و CoQ10 روی کاهش میزان مرگ و میر نورون‌های این ناحیه از مغز به دنبال ایسکمی ریپر فیوژن و نهایتاً کاهش عوارض متعاقب آن (بهبود وضعیت حافظه کوتاه مدت و کاهش میزان نکروز و آپوپتوز نورون‌ها در گروه درمان نسبت به گروه ایسکمی کنترل) بوده است. در نهایت پس از آنالیز داده‌ها اثر آنتی اکسیدانی ویتامین C و CoQ10 با هم مقایسه گردید.

نمی‌کنند. در این تست انتهای کروماتین‌های شکسته شده برای تمایز آپوپتوz و رنگ آمیزی این هسته‌ها توسط آنزیم‌هایی مشخص شده و با دی‌آمینوبنزیدین (DAB) رنگ می‌شود (۳۲).

*Y-maze*: این دستگاه برای بررسی یادگیری و حافظه فضایی طراحی شده و از ۳ راهرو با انتهای بسته و ارتفاع ۴۰-۳۵ سانت ساخته شده است. قبل از ورود موش به بازوی شروع، همه بازوها از لحاظ تمیز بودن و عدم وجود سوراخ و شکاف بازیبینی می‌شود. هر یک از بازوهای دستگاه با یک حرف انگلیسی مشخص شده است. بازوی A محل استقرار موش در ابتدای آزمایش است. همزمان زمان سنج تنظیم می‌گردد. سپس هر سه حرکت پشت سر هم در صورت مشابه نبودن بازوهای طیش دهیک امتیاز مثبت و در صورت تکراری بودن و باز و از سه بازوی ثبت شده یک امتیاز منفی محسوب می‌شود. ورود حیوان به داخل یک بازو، زمانی است که پاهاي عقبی حیوان به طور کامل در داخل باز و قرار گیرد. موش به مدت ۸ دقیقه در بازوهای دستگاه به دنبال محل خروج می‌گردد. با عبور قاعده دم موش از ابتدای هر بازوی دستگاه نام ان بازو ثبت می‌شود تا زمان مورد نظر تمام شود. سپس نتایج ثبت شده با استفاده از فرمول زیر، PerCent Alternation محاسبه و آنالیز می‌گردد.

$$\text{PerCent Alternation} = \frac{x}{y} \times 100$$

(x=number of CorreCt and y = CorreCt + wrong number)

#### شاتل باکس


این دستگاه شامل یک شوکر الکتریکی و دو محفظه روشن و تاریک و یک لامپ ۱۵ وات است. ته دستگاه از یک شبکه فلزی رسانا ساخته شده است. بین دو محفظه درب کشویی قرار دارد. این تست که بر اساس ترس طراحی شده است در ۴ روز پیاپی انجام می‌شود. مانند آزمایش قبل، ابتدا دستگاه کاملاً تمیز شده و تست شروع می‌شود. روز اول و دوم برای آموزش و آشنايی موش‌ها با دستگاه می‌باشد هر دو

ketamin (SigmaChemical Co., Saint Louis, USA) (mg/kg, I.P injection) و زایلazین (۱۰ mg/kg, I.P injection) xylozine (SigmaChemical Co., Saint Louis, USA) (۱۰ mg/kg, I.P injection) بیهوش شدن و به دنبال دریافت داروی بیهوشی ایسکمی با جراحی ناحیه قدامی- طرفی گردن با مشخص شدن غلاف کاروتید و سپس بستن شریان کاروتید مشترک توسط کلمپ میکروبولداگ (micro bulldog clamp) (به مدت ۱۵ دقیقه القا شد. تا یک هفته بعد از ایسکمی برای کاهش التهاب ناحیه ایسکمیک و به دلیل این که جذب این داروها در ناحیه التهاب کم است هیچ دارویی تزریق نشد. از یک هفته بعد از القای ایسکمی مجدداً داروها با همان دوز اولیه، به مدت یک هفته و به صورت روزانه به موش‌ها داده شد سپس با اتمام دوره درمان، تست‌های آزمون حافظه کوتاه مدت (شاتل باکس و y-maze) در تمام گروه‌ها انجام شد. این تست‌ها فقط در پایان دوره درمان انجام شد. سپس مغز موش‌ها با پارافرمالدئید به روش پروفیوژن فیکس شده و خارج و سپس برش‌های با ضخامت ۷ میکرونی از قالب‌های پارافینی تهیه شد. با تهیه این برش‌ها از هر گروه ۵ برش با فاصله ۵۰ میکرونی از یکدیگر انتخاب شد به طوری که فاصله هر برش نسبت به برگما در تمام گروه‌ها یکسان باشد و برای مطالعات بافتی آماده شد که شامل رنگ آمیزی بافتی با استفاده از رنگ کرزیل ویوله (نیسل) و تست تانل بود.


**رنگ آمیزی نیسل:** این روش برای رنگ آمیزی اجسام نیسل در سیتوپلاسم نورون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش اجسام نیسل به رنگ بنفش - آبی دیده می‌شوند. این رنگ آمیزی معمولاً برای شناسایی ساختار پایه‌ای نورون‌های سالم از نورون‌های نکروز شده در بافت مغز و طناب نخاعی استفاده می‌شود (۳۱).

**تست تانل:** با کمک کیت تانل هسته نورون‌های آپوپتویک به رنگ قهوه‌ای تیره مشخص می‌شود ولی نورون‌های نکروتیک و سالم رنگ زیادی را جذب


۲- گروه ایسکمی کنترل با تعداد زیادی سلول های نکروتیک، ۳- گروه شم کنترل (روغن زیتون) با سلول های نکروتیک کمتر نسبت به گروه ایسکمی کنترل، ۴- گروه تحت درمان با ویتامین C با سلول های نکروتیک کمتر نسبت به گروه ایسکمی کنترل و گروه شم کنترل ۵- گروه تحت درمان با CoQ10 با سلول های نکروتیک بسیار کمتر نسبت تمام گروه ها (به جز گروه ایستکت).



تصویر شماره ۱: رنگ آمیزی نیسل در پنج گروه در این روش، سلول های نکروتیک با هسته های تیره جمع شده دیده می شوند.



تصویر شماره ۲: کنترل مثبت. تعداد بسیار زیادی سلول تانل مثبت در این گروه دیده می شود که با کمک DNase با تانل رنگ می شوند (500nm)



تصویر شماره ۳: تست تانل در پنج گروه مورد مطالعه

تست حافظه بعد از ظهر باید انجام شود و به این صورت است که موش در اتفاقک روشن به مدت ۵ دقیقه می ماند و سپس لامپ دستگاه روشن شده و همزمان درب کشویی بین اتفاقک روشن و تاریک باز می شود. به طور معمول به خاطر نور تشید شده اتفاقک روشن و تمایل ذاتی جوندگان به محیط تاریک، حیوان به اتفاقک تاریک رفته و در آنجا هم ۵ دقیقه می ماند و در نهایت از دستگاه خارج می شود. روز دوم کاملاً شیوه روز اول آزمایش ادامه می یابد. در روز سوم با ورود حیوان به اتفاقک تاریک شوک الکتریکی به میزان  $0.3\text{ میلی آمپر}$  به مدت ۱ ثانیه داده می شود و سپس حیوان از دستگاه خارج می شود. در روز چهارم حیوان ۲ دقیقه در اتفاقک روشن می ماند و با روشن شدن لامپ و باز شدن دریچه بین دو اتفاقک، زمان ورود موش به اتفاقک تاریک اندازه گیری می شود.

#### پردازش آماری داده ها

طرح کلی این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی (Randomized Design Completely) و کلیه اطلاعات ثبت شده در طول آزمایش به وسیله آنالیز واریانس یک طرفه (one-way ANOVA) و تست LSD به عنوان Post Hoc جهت مقایسه میانگین ها مورد تعزیز و تحلیل قرار گرفت. اختلافات بین میانگین ها در تیمارهای مختلف با سطح اطمینان  $p < 0.05$  تعیین گردید. کلیه عملیات مربوطه به وسیله نرم افزار SPSS با ورژن ۱۶ مورد سنجش قرار گرفت.


#### یافته ها

در این مطالعه ما از رنگ آمیزی نیسل برای شمارش سلول های نکروتیک استفاده کردیم و از تست تانل نیز برای شناسایی سلول های آپوپوتیک در منطقه CA1 هیوکامپ استفاده شد. تصاویری که در زیر نشان داده شده نتیجه های حاصل از این روش هاست.


۱- گروه سالم بدون سلول های نکروتیک،

رنگ آمیزی کرزیل ویوله (نیسل) وضعیت سلول‌های سالم و نکروتیک را در ناحیه تحت بررسی نشان داد. حیوانات درمان شده با آنتی اکسیدان‌ها مرگ سلولی کمتر و تراکم سلولی بیشتری در مقایسه با گروه ایسکمی داشتند. در گروه‌های درمانی، کمترین سلول‌های نکروتیک در گروه تحت درمان با CoQ10 دیده شد. در کنترل مثبت، تعداد بسیار زیادی سلول تانل دیده شد. در گروه تحت درمان با ویتامین C با این گروه دیده می‌شد که با کمک DNase با تانل رنگ می‌شوند.

- ۱- گروه سالم بدون سلول‌های آپوپتویک،
- ۲- گروه ایسکمی کنترل با تعداد زیادی سلول‌های آپوپتویک (سلول‌های قهوه‌ای تیره)،
- ۳- گروه شم کنترل با سلول‌های آپوپتویک کمتر در مقایسه با گروه ایسکمی کنترل،
- ۴- گروه تحت درمان با ویتامین C با سلول‌های آپوپتویک کمتر نسبت به گروه ایسکمی و شم کنترل،
- ۵- گروه تحت درمان با CoQ10 با سلول‌های آپوپتویک بسیار کمتر نسبت تمام گروه‌ها (به جز گروه ایستکت).




نمودار شماره ۳: مقایسه حافظه کوتاه مدت با تست شاتل باکس. گروه ایسکمی با تمام گروه‌های درمانی مقایسه شد که تفاوت معنی داری داشت.\*( $p<0.05$ ). تفاوت معنی داری بین گروه تحت درمان با ویتامین C با گروه تحت درمان با CoQ10 مشاهده شد.\*\*( $p<0.001$ ).



نمودار شماره ۱. مقایسه تراکم سلول‌های سالم در منطقه CA1 هپیوکamp در گروه ایسکمی کنترل تعداد سلول‌های سالم بسیار کاهش یافته است.\*( $p<0.05$ ). تراکم سلول‌های سالم در گروه‌های تحت درمان با CoQ10 در مقایسه با گروه تحت درمان با ویتامین C افزایشی معنی دار داشت\*\*( $p<0.001$ ).

تست تانل که برای شناسایی سلول‌های آپوپتویک استفاده می‌شد که این تست افزایش این سلول‌ها را در گروه ایسکمیک و کاهش این سلول‌ها را در گروه‌های تحت درمان نشان داد. در گروه‌های درمان، سلول‌های آپوپتوییک متري نسبت به گروه ایسکمیک دیده شد، این سلول‌های در حال آپوپتوز در گروه سالم دیده نشد. تست رفتاری شاتل باکس نشان داد که ایسکمی منجر به اختلال زیادی در حافظه کوتاه مدت می‌شود. در گروه‌های درمانی نتایج بسیار بهتری نسبت به گروه ایسکمی کنترل به دست آمد به طوری که در گروه شم کنترل که روغن زیتون به



نمودار شماره ۲: مقایسه حافظه کوتاه مدت y-maze (آنالیز داده‌ها، بهبود بیشتر حافظه را در گروه درمانی CoQ10 در مقایسه با ویتامین C نشان داد.\*\*( $p<0.001$ )).

ایسکمی-ریپرفیوژن است.

دانشمندان مشاهده کردند که مصرف هم زمان روغن زیتون و روغن نباتی جامد در خرگوش با کاهش معنی دار سطح تری گلیسرید خون همراه بود (۳۷). محققان مصرف مکرر روغن زیتون را در پیشگیری از اختلالات حافظه‌ای ناشی از ایسکمی به اثر آنتی اکسیدان‌های موجود در آن مربوط دانسته‌اند (۳۸-۴۰). در CoQ10 این مطالعه ما از روغن زیتون به عنوان حلal استفاده کردیم. روغن زیتون روی میزان کاهش مرگ و میر سلول‌های ناحیه CA1 هیپوکامپ نیز بررسی شد. که به دنبال بررسی، در گروه تحت درمان با این روغن کاهش میزان مرگ و میر سلول‌ها در ناحیه CA1 هیپوکامپ مشاهده شد که احتمالاً به علت اثرات آنتی اکسیدان‌ها و چربی‌های غیر اشباع موجود در این روغن می‌باشد. مشخص شده که ترکیبات موجود در روغن زیتون، بر فعالیت سیستم کولینرژیک مغزی نیز اثر تعديلی دارد (۴۱، ۴۲). و سیستم کولینرژیک، دوپامینرژیک، سروتونرژیک نقش مهمی در فرآیند یادگیری و حافظه دارد (۴۳، ۴۴). با توجه به یافته‌های به دست آمده از تست حافظه در گروه تحت درمان با روغن زیتون مشخص شد که حافظه در گروه تحت درمان نسبت به گروه ایسکمی تغییرات تخریبی بسیار کمتری داشته است که علت این نیز احتمالاً به خاطر وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی مؤثر در روغن زیتون بوده که قبل و بعد از ایسکمی به موهش‌های این گروه داده شده بود. علاوه بر آن بخشی از تأثیرات روغن زیتون بر فرآیند بازیابی یادگیری و حافظه کوتاه مدت نیز شاید مربوط به تعدیل فعالیت این سیستم‌های نوروترانسمیتری باشد. از اثرات ویتامین C بر روی بیماران می‌توان به تقویت سیستم ایمنی، کاهش متابولیزم سلول‌های سرطانی و اثر مستقیم سمی بر روی سلول‌های سرطانی اشاره کرد (۴۵-۴۷).

ویتامین C یک آنتی اکسیدان مهم در رژیم غذایی است. این ویتامین به طور مطلوب عوارض جانبی مولکول‌های واکنشی موجود در ترکیبات بدن که به

موش‌ها داده شده بود اختلالات حافظه کاهش یافته بود و در گروه تحت درمان با ویتامین C نیز به مقدار زیادی کاهش اختلالات حافظه کوتاه مدت را داشتیم. در گروه تحت درمان با CoQ10 به دلیل وجود آنتی اکسیدان‌های قوی و مؤثر موجود در آن عالیم بهبود حافظه کوتاه مدت را بیشتر از گروه‌های تحت درمان با روغن زیتون و ویتامین C مشاهده کردیم. در گروه y-maze سالم این اختلالات دیده نشد. تست رفتاری نشان داد که ایسکمی منجر به آسیب زیادی در حافظه کوتاه مدت می‌شود. بهترین نتایج در گروه تحت درمان با CoQ10 به دست آمد. ما می‌توانیم در گروه‌های تحت درمان به دلیل وجود آنتی اکسیدان‌ها در آن‌ها عالیم بهبود سلامت ذهنی را به‌وضوح ببینیم. در گروه سالم این اختلالات وجود نداشت.

## بحث

ایسکمی-ریپرفیوژن باعث کاهش سطح اکسیژن درون سلولی می‌شود که متابولیسم طبیعی سلول را مختلف می‌کند و در صورت نرسیدن سریع اکسیژن، سلول می‌میرد. به دنبال ریپرفیوژن مرگ سلول شروع می‌شود. در این شرایط سلول یا بلا فاصله تحت تأثیر این مواد دچار نکروز می‌شود و یا این که یکسری از واکنش‌ها درون سلول شروع می‌شود که در نهایت باعث مرگ سلول به صورت برنامه ریزی شده یا همان آپوپتوز می‌شود (۳۳-۳۵). هنگامی که ایسکمی مغزی به صورت تجربی در موش‌ها القاء شد تغییراتی در رفتار و حرکات موش‌ها نسبت به قبل از القای ایسکمی رخ داد که ناشی از مرگ تعدادی از سلول‌های دستگاه عصبی مرکزی می‌باشد (۳۶). ناحیه CA1 هیپوکامپ یکی از حساس‌ترین قسمت‌های مغز در مقابل ایسکمی می‌باشد. نتایج به دست آمده از رنگ آمیزی نیسل پس از القای ایسکمی، در گروه ایسکمی کنترل کاهش سلول‌های سالم را در ناحیه هیپوکامپ نشان داد که دلیل واضحی بر وجود تخریب نورونی در این ناحیه از مغز به دنبال

خود می‌تواند تخریب سلولی را مخصوصاً در غشای سلولی و DNA کاهش دهد و شرایط و زمان کافی را برای ترمیم در اختیار سلول قرار دهد. پس در مجموع مصرف CoQ10 باعث کاهش تعداد سلول‌های تخریب شده و به دنبال آن کاهش عوارض پس از ایسکمی می‌شود(۵۱).

در این مطالعه تأثیر CoQ10 روی میزان کاهش مرگ و میر سلول‌های هیپوکامپ مغز بررسی شد. به دنبال این بررسی در گروه تحت درمان با آن، کاهش میزان مرگ سلول‌ها در این ناحیه مشاهده شد که به علت اثرات آنتی‌اکسیدان آن و احتمالاً اثرات سینزرویستی آن با ویتامین E می‌باشد. این ترکیبات بعد از جذب از دستگاه گوارش وارد خون می‌شود. مقداری از آن بعد از این که به مغز رسید به علت خاصیت محلول بودن در چربی، وارد قسمت‌های مختلف آن از جمله هیپوکامپ مغز می‌شود. در این محل باعث اثرات قوی آنتی‌اکسیدانی بر روی رادیکال‌های آزاد و اسیدهای تجمع یافته به دنبال ایسکمی می‌شوند. با آن‌ها واکنش داده و آن‌ها را خنثی می‌کنند. از این طریق از واکنش این رادیکال‌ها با لیپیدهای موجود در غشای سلول‌های مجاور آن‌ها جلوگیری می‌کنند و نتیجتاً باعث کاهش وسعت تخریب نورون‌های این ناحیه از مغز به دنبال ایسکمی-ریپرفیوژن می‌شوند و این حقایق با تست‌های انجام شده در گروه درمان با این آنتی‌اکسیدان نیز منطبق است. در این مطالعه ما با استفاده از رنگ آمیزی بافتی نیسل و تست تانل سعی کردیم تا کلیه نتایج به دست آمده را از همه زوایا مورد بررسی قرار دهیم و بتوانیم داده‌های مربوط به هر تست را با سایر داده‌ها مقایسه کنیم تا از صحت آن اطمینان حاصل کنیم. در رنگ آمیزی نیسل کاهش سلول‌های نکروتیک در گروه‌های درمانی دیده شد و تست تانل این کاهش را در مورد سلول‌های آپوپتوتیک اثبات کرد. در مجموع آنالیز داده‌های به دست آمده از تست‌های این مطالعه نشان داد که استفاده از آنتی‌اکسیدان‌هایی مثل CoQ10

دبیال ایسکمی در بدن تولید می‌شوند را کاهش می‌دهد که در غیاب آن، تجمع و ترکیب این مولکول‌ها با یکدیگر می‌توانستند سبب آسیب اکسیداتیو به ماکرومولکول‌هایی شبیه لیپیدهای غشای سلول‌ها، DNA و پروتئین‌های موجود در آن شوند که به نوبه خود در بیماری‌های مزمن شامل بیماری‌های قلبی و عروق، سکته، سرطان بیماری‌های دژنریتیسو عصبی دخیل هستند(۴۸، ۴۹).

اثر آنتی‌اکسیدانی ویتامین C برای ما کاملاً روشی بود اما در این مطالعه، اثر آنرا روی میزان کاهش عوارض حافظه‌ای و جلوگیری از تخریب وسیع سلولی در ناحیه CA1 هیپوکامپ بررسی کردیم. ویتامین C به صورت pre-treatment و post-treatment به موش‌ها داده شد. این ویتامین از طریق جریان خون وارد قسمت‌های مختلف مغز از جمله هیپوکامپ می‌شود و احتمالاً در این ناحیه به علت خاصیت آنتی‌اکسیدانی خود با رادیکال‌های ایجاد شده به دنبال القای ایسکمی واکنش داده و آن‌ها را خنثی می‌سازد و از واکنش دادن این ترکیبات با کروموزوم و لیپیدهای غشای سلول‌ها مستعد جلوگیری می‌کند و نتیجتاً عوارض متعاقب ایسکمی را کاهش می‌دهد. در مقایسه نتایج بافتی این گروه با گروه ایسکمی کترل، تخریب نورونی کمتری در گروه تحت درمان مشاهده شد که به علت تأثیر درمانی این آنتی‌اکسیدان بوده است. در گروه تحت درمان نتایج تست‌های شاتل باکس و y-maze با گروه ایسکمی کترل به نتایج این تست‌ها در گروه نزدیک‌تر بود که این نیز دلیلی بر اثرات درمانی ویتامین C بر سلول‌های این ناحیه است. روغن ماهی که منبعی از CoQ10 می‌باشد نیز اثرات نوروپروتکتیو و آنتی‌اکسیدانی موثری در هیپوکامپ مغزدارد. احتمالاً این اثر آن به علت وجود آنتی‌اکسیدان‌های موجود در آن می‌باشد. با توجه به سایر اثرات مفید این روغن استفاده از آن در رژیم غذائی می‌تواند در سلامت جامعه نقشی اساسی را ایفا کند(۵۰). CoQ10 با این توانایی اخیر

در پایان می توان نتیجه گیری کرد که ناحیه CA1 مغز در مقابل ایسکمی و هیپوکسی و رادیکال های آزاد آسیب پذیر می باشد. مصرف آنتی اکسیدان های مثل روغن زیتون، CoQ10، ویتامین C به دنبال ایسکمی های مغزی می تواند مرگ و میر نورون های این ناحیه را کاهش دهد و باعث حفظ نورون ها از عوامل مضر شود. مصرف CoQ10 قبل و بعد از ایسکمی های مغزی می تواند حتی این سلول های حساس در مقابل ایسکمی را هم در مقابل عوارض منعکب آن محافظت کرده و با کاهش دادن مرگ آن ها عوارض نامطلوب متعاقب ایسکمی را در حد چشمگیری کاهش دهد که این اثرات در مصرف ویتامین C نیز دیده شد. اثرات آنتی کسیدانی CoQ10 قوی تر از ویتامین C است.

روغن زیتون ، ویتامین C بصورت یک عامل پیشگیرانه و نیز یک عامل درمانی می تواند با کاهش آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد در شرایط استرس زا، آسیب های واردہ به نورون ها را کاهش و در نتیجه بقای نورون های هیپو کامپ مغز را افزایش دهد. در نهایت نتایج حاصل از رنگ آمیزی ها و تست های حافظه ای نشان دادند که هر چند هر دو آنتی اکسیدان مورد مطالعه اثرات نورو پرو تکتیو موثری را در کاهش مرگ سلول های این ناحیه از مغز ایفا کردند اما اثرات آنتی اکسیدانی CoQ10 قوی تر از ویتامین C بوده است و پیش آگهی بهتری را در بهبود حافظه بعد از مصرف CoQ10 نسبت به ویتامین C داشتیم.

## References

- Paul CM, Magda G, Abel S. Spatial memory: Theoretical basis and comparative review on experimental methods in rodents. *Behav Brain Res* 2009; 203(2): 151-164. PMID: 19467271.
- Ganong W.F. Medical physiology. Harcourtace Jovanovich, Inc; 2007. p. 643-645.
- Meilandt WJ, Barea-Rodriguez E, Harvey SA, Martinez JL Jr. Role of hippocampal CA3 mu-opioid receptors in spatial learning and memory. *J Neurosci* 2004; 24(12): 2953-2962. PMID: 15044534
- Salmanzadeh F, Fathollahi Y, Semnanian S, Shafizadeh M. Dependence on morphine impairs the induction of long-term potentiation in the CA1 region of rat hippocampal slices. *Brain Res* 2003; 965(1-2): 108-113. PMID: 12591126
- Ahmadiasl N, Alaei H, Hanninen O. Effect of exercise on learning, memory and levels of epinephrine in rats hippocampus. *J Sports Sci Med* 2003; 2: 106-109.
- Barinaga M. Neurobiology. How cannabinoids work in the brain. *Science* 2001; 291(5513): 2530-2531. PMID: 11286259
- Guyton A C, Hall JE. Textbook Of Medical Physiology. 11<sup>rd</sup>ed. Elsevier Saunders; 2006.
- Hadjinikolaou L, Kotidis K, Galinanes M. Relationship between reduced elasticity of extracardiac vessels and left main stem coronary artery disease. *Eur Heart J* 2004; 25(6): 508-513. PMID: 15039131
- Nussmeier NA. A review of risk factors for adverse neurologic outcome after cardiac surgery. *J Extra Corpor Technol* 2002; 34(1): 4-10. PMID: 11911628
- Wityk RJ, Goldsborough MA, Hillis A, Beauchamp N, Barker PB, Borowicz LM Jr, et al. Diffusion-and perfusion-weighted brain magnetic resonance imaging in patients with neurologic complications after cardiac surgery. *Arch Neurol* 2001; 58(4): 571-576. PMID: 11295987

11. Doyle KP, Simon RP, Stenzel-Poore MP. Mechanisms of ischemic brain damage. *Neuropharmacology* 2008; 55(3): 310-318. PMID: 18308346
12. Huang L, Chen N, Ge M, Zhu Y, Guan S, Wang JH. Ca<sup>2+</sup> and acidosis synergistically lead to the dysfunction of cortical GABAergic neurons during ischemia. *Biochem Biophys Res Commun* 2010; 394(3): 709-714. PMID: 20227392
13. Simonova Z, Sterbova K, Brozek G, Komarek V, Sykova E. Postnatal hypobaric hypoxia in rats impairs water maze learning and the morphology of neurones and macroglia in cortex and hippocampus. *Behav Brain Res* 2003; 141(2): 195-205. PMID: 12742256
14. Petito CK, Feldmann E, Pulsinelli WA, Plum F. Delayed hippocampal damage in humans following cardiorespiratory arrest. *Neurology* 1987; 37: 1281-1286. PMID: 3614648
15. Weglicki WB, Dickens BF, Mak IT. Enhanced lysosomal phospholipid degradation and lysophospholipid production due to free radicals. *Biochem Biophys Res Commun* 1984; 124(1): 229-235. PMID: 6497879
16. Kesner RP, Adelstein TB, Crutcher KA. Equivalent spatial location memory deficits in rats with medial septum or hippocampal formation lesions and patients with dementia of the Alzheimer's type. *Brain Cogn* 1989; 9(2): 289-300. PMID: 2923719
17. Amonrat T, Soottawat B, Wonnop V, Eric A, Decker C. The effect of antioxidants on the quality changes of cuttlefish (*Sepia pharaonis*) muscle during frozen storage. *Food Science and Technology* 2008; 41(1): 169-161.
18. Capannesi C, Palchettia I, Mascinia M, Parenti A. Electrochemical sensor and biosensor for polyphenols detection in olive oils. *Food Chemistry* 2000; 71(4): 553-562.
19. Baluchnejadmojarad T, Roghani M. Coenzyme Q10 Ameliorates Neurodegeneration, Mossy Fiber Sprouting, and Oxidative Stress in IntrahippocampalKainate Model of Temporal Lobe Epilepsy in Rat. *J Mol Neurosci* 2012. [Epub ahead of print] PMID: 23008120
20. Greenberg S, Frishman WH. Co-enzyme Q10: a new drug for cardiovascular disease. *J Clin Pharmacol* 1990; 30(7): 596-608. PMID: 2202752
21. Gokce M, Saydam O, Hanci V, Can M, Bahadir B. Antioxidant vitamins A, C, E and coenzyme Q10 vs Dexamethasone: comparisons of their effects in pulmonary contusion model. *J Cardiothorac Surg* 2012; 7(1): 92. PMID: 23013526
22. Turunen M, Olsson J, Dallner G. Metabolism and function of coenzyme Q. *Biochim Biophys Acta* 2004; 1660(1-2): 171-199. PMID: 14757233
23. Thanonkaewa A, Benjakula S, Visessanguanb W, Deckerc EA. The effect of antioxidants on the quality changes of cuttlefish (*Sepia pharaonis*) muscle during frozen storage. *Food Science and Technology* 2008; 41(1): 161-169.
24. Ramaiya SD, Bujang JS, Zakaria MH, King WS, Sahrir MA. Sugars, ascorbic acid, total phenolic content and total antioxidant activity in passion fruit (*Passiflora*) cultivars. *J Sci Food Agric.* 2012. doi: 10.1002/jsfa.5876. [Epub ahead of print]. PMID: 23027609
25. Frei B, Trabue MG. The new US Dietary Reference Intakes for vitamins C and E. *Redox Rep* 2001; 6(1): 5-9. PMID: 11333117
26. Justi KC, Visentainer JV, Evelázio de Souza N, Matsushita M. Nutritional composition and vitamin C stability in stored camu-camu (*Myrciariadubia*) pulp. *Arch Latinoam Nutr* 2000; 50(4): 405-408. PMID: 11464674

27. Frei B. Vitamin C as an antiatherogen: mechanism of action. In: Vitamin C in Health and disease. Packer L. 4<sup>th</sup>ed. New York: Taylor & Francis; 1997. p. 163-182.
28. Okamoto K. Vitamin C intake and apolipoproteins in a healthy elderly Japanese population. Prev Med 2002; 34(3): 364-369. PMID: 11902853
29. Matsuoka Y, Yamato M, Yamasaki T, Mito F, Yamada KI. Rapid and convenient detection of ascorbic acid using a fluorescent nitroxide switch. Free Radic Biol Med 2012. pii: S0891-5849 (12) 01166-5. doi: 10.1016/j.freeradbiomed. 2012.09.032. [Epub ahead of print] PMID: 23026412
30. Combs GF. Vitamins. In: Mahan LK, Escott-stump S, (eds). Krause's food·nutrition & diet therapy. 10<sup>th</sup> ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. p. 67-109.
31. Erdogan S, Sagsoz H, Akbalik ME. Anatomical and histological structure of the tongue and histochemical characteristics of the lingual salivary glands in the Chukar partridge (Alectoris chukar, Gray 1830). Br Poult Sci 2012; 53(3): 307-315. PMID: 22978586
32. Chang S, Sen S, Zhang P, Gyarfas B, Ashcroft B, Lefkowitz S, et al. Palladium electrodes for molecular tunnel junctions. Nanotechnology. 2012; 23(42): 425202. doi: 10.1088/0957-4484/23/42/425202. Epub 2012 Oct 4. PMID: 23037952
33. Jassem W, Fugle SV, Rela M, Koo DD, Heaton ND. The role of mitochondria in ischemia/reperfusion injury. Transplantation. 2002; 73(4): 493-499. PMID: 11889418
34. Hammerman C, Goldschmidt D, Caplan MS, Kaplan M, Bromiker R, Eidelman AI, et al. Protective effect of bilirubin in ischemia-reperfusion injury in the rat intestine. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002; 35(3): 344-349. PMID: 12352525
35. Wu B, Ootani A, Iwakiri R, Fujise T, Tsunada S, Toda S, et al. Ischemic preconditioning attenuates ischemia- reperfusion- induced mucosal apoptosis by inhibiting the mitochondria-dependent pathway in rat small intestine. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2004; 286(4): G580-7. PMID: 15010362
36. Contartese A, Valoti M, Corelli F, Pasquini S, Mugnaini C, Pessina F, et al. A novel CB2 agonist, COR167, potently protects rat brain cortical slices against OGD and reperfusion injury. Pharmacol Res. 2012. pii: S1043-6618(12) 00163-6. doi: 10.1016/j.phrs. 2012.08.003. [Epub ahead of print] PMID: 23036353
37. Paniagua JA, de la Sacristana AG, Sánchez E, Romero I, Vidal-Puig A, Berral FJ, et al. A MUFA-rich diet improves postprandial glucose, lipid and GLP-1 responses in insulin-resistant subjects. J Am Coll Nutr 2007; 26(5): 434-444. PMID: 17914131
38. Cho J, Kang JS, Long PH, Jing J, Back Y, Chung KS. Antioxidant and memory enhancing effects of purple sweet potato anthocyanin and cordyceps mushroom extract. Arch Pharm Res 2003; 26(10): 821-825. PMID: 14609130
39. Reis EA, Zugno AI, Franzon R, Tagliari B, Matté C, Lammers ML, et al. Pretreatment with vitamins E and C prevent the impairment of memory caused by homocysteine administration in rats. Metab Brain Dis 2002; 17(3): 211-217. PMID: 12322790
40. Castagne V, Rougemont M, Cuenod M, Do KQ. Low brain glutathione and ascorbic acid associated with dopamine uptake inhibition during rat's development induce long-term cognitive deficit: relevance to schizophrenia.

- Neurobiol Dis 2004; 15(1): 93-105. PMID: 14751774

41. Hasselmo ME. The role of acetylcholine in learning and memory. Curr Opin Neurobiol 2006; 16(6): 710-715. Epub 2006 Sep 29. PMID: 17011181

42. Myhrer T. Neurotransmitter systems involved in learning and memory in the rat: a meta-analysis based on studies of four behavioral tasks. Brain Res Brain Res Rev 2003; 41(2-3): 268-287. PMID: 12663083

43. Lee L, Kang SA, Lee HO, Lee BH, Jung IK, Lee JE, et al. Effect of supplementation of vitamin E and vitamin C on brain acetylcholinesterase activity and neurotransmitter levels in rats treated with scopolamine, an inducer of dementia. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2001; 47(5): 323-328. PMID: 11814146

44. Biessels GJ, Kerssen A, de Haan EH, Kappelle LJ. Cognitive dysfunction and diabetes: implications for primary care. Prim Care Diabetes 2007; 1(4): 187-193. doi: 10.1016/j.pcd.2007.10.002. Epub 2007 Nov 26. PMID: 18632044

45. Padayatty SJ, Riordan HD, Hewitt SM, Katz A, Hoffer LJ, Levine M. Intravenously administered vitamin C as cancer therapy: three cases. CMAJ 2006; 174(7): 937-942. PMID: 16567755

46. Yeom CH, Jung GC, Song KJ. Changes of terminal cancer patients' health-related quality of life after high dose vitamin C administration. J Korean Med Sci 2007; 22(1): 7-11. PMID: 17297243

47. Yarish M. The Benefits of IV Vitamin C in Cancer Treatment. 2011. Available at :<http://www.thelakesideclinic.com>. Accessed .

48. Simone II CB, Simone NL, Simone V, Simone CB. Antioxidants and other nutrients do not interfere with chemotherapy or radiation therapy and can increase kill and increase survival, Part 2. Alternative Therapies 2007; 13(2): 40-47.

49. Orrenius S, Gogvadze V, Zhivotovsky B. Mitochondrial oxidative stress: implications for cell death. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2007; 47: 143-183. PMID: 17029566

50. Pepe S, Marasco SF, Haas SJ, Sheeran FL, Krum H, Rosenfeldt FL. Coenzyme Q10 in cardiovascular disease. Mitochondrion. 2007; 7(Suppl): S154-167. Epub 2007 Mar 16. PMID: 17485243

51. Sam F, Kerstetter DL, Pimental DR, Mulukutla S, Tabaei A, Bristow MR, et al. Increased reactive oxygen species production and functional alterations in antioxidant enzymes in human failing myocardium. J Card Fail 2005; 11(6): 473-480. PMID: 16105639