

بررسی اثرات کرایوپرزرویشن بر سلول های اپی تلیال قبل و بعد از جداسازی از پرده آمینون انسانی

حسن نیک نژاد^۱

حسب الله پیروی^۲

چکیده

سابقه و هدف: یکی از تکنیک های جدید در نگهداری طولانی مدت سلول های بنیادی به منظور استفاده از آن ها در سلول درمانی، استفاده از داربست های مختلف برای افزایش بازده کرایوپرزرویشن سلولی است. از مشکلات عمده کرایوپرزرویشن، کاهش تعداد سلول های زنده و ایجاد تمایزهای ناخواسته در سلول ها می باشد که به منظور بررسی روش های احتمالی کاهش این مشکلات، این مطالعه طراحی شد و در آن سلول های اپی تلیال آمینون انسانی با استفاده از داربست پرده آمینون که داربست طبیعی این سلول ها است کرایوپرزرو شدند.

مواد و روش ها: پس از تهیه بافت و جداسازی سلول های اپی تلیال آمینون انسانی، این سلول ها در دو گروه بدون داربست و با داربست در ۲۴ حالت مختلف در دمای 196°C - در نیتروژن مایع به مدت ۱۲ ماه نگهداری شدند و پس از آن درصد سلول های زنده و میزان پرتوانی (pluripotency) سلول ها قبل و بعد از کرایوپرزرویشن بررسی شد. نتایج حاصل با روش آماری ANOVA (Tukey Post-Test) مقایسه گردید.

یافته ها: تعداد سلول های زنده و درصد بیان Oct-4 در گروه با داربست نسبت به گروه بدون داربست بیشتر بود. تعداد سلول های زنده و میزان پرتوانی در سلول هایی که به همراه داربست کرایوپرزرو شده بودند با سلول های تازه جدا شده تفاوت معنی داری نداشت. همچنین حضور گلیسرول در محیط میزان بازده کرایوپرزرویشن را کاهش داد.

استنتاج: این مطالعه نشان داد که استفاده از پرده آمینون به عنوان یک داربست در کرایوپرزرویشن سلول های اپی تلیال آمینون انسانی می تواند تعداد سلول های زنده پس از کرایوپرزرویشن را افزایش داده و از ایجاد تمایزهای ناخواسته طی نگهداری طولانی مدت جلوگیری نماید.

واژه های کلیدی: کرایوپرزرویشن، سلول های اپی تلیال آمینون انسانی، داربست، پرده آمینون، پرتوانی

مقدمه

غشاء پایه ضخیم و یک لایه استرومایی بدون عروق قرار دارد. آمینون یک بافت فاقد هرگونه رگ و عصب است، این بافت مواد غذایی و سایر مواد مورد نیازش را مستقیماً با مکانیسم انتشار از مایع آمینونی و یا از لایه

پرده آمینون انسان از رشد و نمو بافت های خارج رویانی جنین به وجود می آید، این پرده شامل یک لایه اپی تلیوم حاوی سلول های اپی تلیال آمینونی انسانی (hAECs) است که به طور یکنواخت و منظم بر روی

E-mail: niknejad@sbm.ac.ir

مؤلف مسئول: حسن نیک نژاد - تهران: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت

۱. گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲. گروه جراحی، مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاریخ دریافت: ۹۱/۴/۱۰ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۹۱/۶/۱۹ تاریخ تصویب: ۹۱/۷/۳۰

زیرین خود یعنی جفت و اجزای آن بدست می‌آورد(۱). پرده آمیون انسان خصوصیات ویژه‌ای دارد که از میان آن‌ها می‌توان به توانایی آن در جلوگیری از رشد باکتری‌ها(۲)، مهار و جلوگیری از ایجاد واکنش‌های التهابی سیستم ایمنی(۳)، جلوگیری از ایجاد زخم(۴)، کمک به ترمیم زخم و تسریع اپیتلیالزاسیون(۵) اشاره کرد. این ویژگی‌ها باعث شده است که از پرده آمیون در پزشکی به‌طور وسیعی استفاده شود. از جمله می‌توان به استفاده از پرده آمیون به عنوان یک پوشش بیولوژیک در سوختگی‌های پوستی(۶)، درمان زخم‌ها(۷) و بسیاری دیگر از بیماری‌های پوستی اشاره کرد. همچنین پرده آمیون برای درمان بیماری‌های چشمی از جمله درمان انواع ناهنجاری‌ها و بیماری‌های قرنیه و ملتحمه(۸)، ترمیم سوختگی‌ها و آسیب‌های چشم که به دلیل مواد شیمیایی و غیره ایجاد شده، استفاده وسیعی دارد(۹). علاوه بر موارد فوق از آمیون برای جراحی‌های دیگر نیز استفاده می‌شود(۱۰). اخیراً در زمینه استفاده از آمیون به عنوان یک داربست مناسب و همچنین منبع سلولی ایده‌آل در مهندسی بافت مطالعات جدیدی انجام گرفته است(۱).

از سوی دیگر سلول‌های اپی‌تلیال آمیون مارکرهای سطحی سلول‌های بنیادی جنینی مثل SSEA-3, SSEA-4, TRA-1-60, TRA-1-80 را بیان می‌کنند. این سلول‌ها همچنین فاکتورهای مرتبط با پرتوانی (pluripotency) سلول‌های بنیادی نظیر Oct-4 و Nanog را نیز بیان می‌نمایند(۱۱، ۱۲). تحقیقات بیشتر بر روی سلول‌های اپی‌تلیال آمیونی نشان داده است که این سلول‌ها پرتوان هستند و توانایی تمایز به هر سه رده مزودرمی، اکتودرمی و اندودرمی را دارا می‌باشند(۱۳)، از جمله می‌توان به مطالعاتی در زمینه تمایز این سلول‌ها به سلول‌های رده مزودرمی مانند میوسیت، کاردیومیوسیت، استئوسیت و آدیپوسیت(۱۴)، سلول‌های رده اندودرمی مانند هیاتوسیت(۱۵) و سلول‌های

پانکراس(۱۶) و سلول‌های رده اکتودرمی مانند سلول‌های عصبی(۱۷، ۱۸) اشاره کرد. سلول‌های اپی‌تلیال آمیونی همچنین خصلت کلونوزایی دارند(۱۴). نشان داده شده است که با وجود این که سلول‌های اپی‌تلیال آمیونی پرتوان هستند اما در پیوند به موش‌هایی با سیستم ایمنی سرکوب شده (SCID)، توانایی ایجاد تراوما را ندارند(۱۴، ۱۹). علاوه بر آن، سلول‌های اپی‌تلیال آمیونی از نظر ایمونولوژیکی خنثی هستند و این موضوع ریسک رد پیوند یا واکنش‌های ایمونولوژیکی پس از پیوند این سلول‌ها را کاهش می‌دهد(۲۰، ۲۱). همچنین این سلول‌ها بدون نیاز به سلول‌های ثانویه به عنوان لایه مغذی (Feeder layer) قدرت رشد و تکثیر دارند(۱۱). با توجه به این خصوصیات ویژه، سلول‌های اپی‌تلیال آمیونی به عنوان جایگزینی مناسب برای سلول‌های بنیادی جنینی در کاربردهای تحقیقاتی و درمانی مطرح می‌باشند. استفاده از درمان‌های نوین از جمله سلول درمانی و مهندسی بافت در ترمیم ضایعات گوناگون و درمان بیماری‌های مختلف افزایش روز افزونی داشته است و از سوی دیگر پتانسیل بالقوه جهت به‌کارگیری سلول‌های اپی‌تلیال آمیونی و پرده آمیون در این درمان‌ها وجود دارد. در این راستا، ضروری به نظر می‌رسد که روش‌های مناسبی برای نگهداری طولانی مدت سلول‌های اپیتلیال آمیون انسانی ایجاد شود تا بتوان از این سلول‌ها به نحو مناسب‌تر، سریع‌تر و بهتری در کاربردهای تحقیقاتی و درمانی استفاده کرد. در تمامی مطالعاتی که تا به حال در زمینه تهیه بانک سلولی انجام گرفته، کاهش تعداد سلول‌های زنده و ایجاد تمایزهای ناخواسته در طول کرایوپرزرویشن به‌عنوان دو مشکل اساسی در نگهداری طولانی مدت سلول‌های بنیادی مورد توجه قرار گرفته است(۲۲، ۲۳، ۲۴). برای رفع این مشکلات تکنیک‌های مختلفی بررسی و پیشنهاد شده است. یکی از تکنیک‌های جدید که در کرایوپرزرویشن سلول‌های مختلف در سال‌های اخیر

سرولوژیکی مربوط به بیماری‌های عفونی مانند HIV، HCV، HBV و سیفلیس بر روی مادران انجام گرفت و مادرانی که از نظر بیماری‌های عفونی فوق سالم بودند وارد مطالعه شدند. اطلاعات لازم برای استفاده از جفت به والدین ارائه شد و فرم رضایت کتبی نیز از آنها اخذ گردید.

بافت جفت به محض انجام جراحی و خارج‌سازی از بدن در ظروف استریل حاوی بافر فسفات سالین (PBS) و $50 \mu\text{g/ml}$ پنی سیلین و $50 \mu\text{g/ml}$ استرپتومایسین قرار داده شد و در دمای 4°C سریعاً به آزمایشگاه منتقل گردید. کلیه مراحل بعدی کار در محیط آزمایشگاه در زیر هود کشت سلولی و به صورت استریل انجام شد. پرده آمیون با روش مکانیکی (Peeling) از کوریون جفت جداسازی شده و چندین بار توسط بافر فسفات سالین سرد (4°C) شستشو داده شد تا لکه‌های خونی کاملاً از روی آن شسته شوند. نتایج به دست آمده از مطالعات اولیه نشان می‌داد که نقاط تاخورده و چروکیده شده بافت پس از کرایوپرزرویشن مقدار *viability* کمتری دارند. به منظور جلوگیری از این مشکل در گروه‌هایی که سلول‌ها به همراه داربست استفاده می‌شدند پس از شستشوی کامل، بافت بر روی غشاهای نیتروسولوز طوری پهن می‌شد که سمت اپی‌تلیوم آن به سمت بالا قرار گیرد و سپس بافت به قطعات با ابعاد 0.5×0.5 سانتی متر بریده می‌شد و استفاده می‌گردید.

به منظور یکسان کردن شرایط در هر دو گروه با داربست و بدون داربست، تعداد سلول‌های اپی‌تلیالی روی پرده آمیون در زیر میکروسکوپ فاز معکوس با عدسی چشمی مدرج در یک مساحت خاص شمارش شد و به همان تعداد سلول در گروه‌های بدون داربست مورد استفاده قرار گرفت. تعداد سلول‌ها در پرده آمیون با ابعاد فوق به‌طور میانگین 2×10^7 بود و غلظت نهایی گروه بدون داربست نیز با توجه به این نتایج تنظیم گردید.

مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده از بسترها و داربست‌ها است. گنم سلولی (Niche) که شامل مواد مختلف مانند پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی، فاکتورهای رشد و سایر عوامل است، نقش بسیار مهمی در رشد، تمایز و عملکرد فیزیولوژیک سلول‌های بنیادی دارد (۲۲) از این رو استفاده از شرایط خاصی که بتواند محیط طبیعی رشد سلول‌های بنیادی را در حین کرایوپرزرویشن تقلید نماید، می‌تواند در بهبود روند کرایوپرزرویشن این سلول‌ها نقش مهمی داشته باشد. مطالعات مختلفی در این زمینه بر روی سلول‌های مختلف صورت گرفته است که در آنها سلول‌ها قبل از کرایوپرزرویشن در داربست‌های مختلف و به شکل منجمد و طولانی مدت نگهداری شده‌اند (۲۳، ۲۴). از این رو وجود داربست‌های مشابه با گنم سلول‌ها منجر به افزایش تعداد سلول‌های زنده و کاهش تمایزهای ناخواسته پس از کرایوپرزرویشن سلول‌های بنیادی می‌گردد.

در این مطالعه با استفاده از روش‌های رایج در کرایوپرزرویشن سلولی و با به کارگیری مواد مختلف محافظ انجماد (DMSO، Glycerol)، سرم حیوانی (FBS)، محیط کشت سلول (DMEM) و استفاده از پرده آمیون به عنوان گنم طبیعی سلول‌های اپی‌تلیال آمیون انسانی، تأثیر شرایط مختلف کرایوپرزرویشن بر میزان زنده بودن (*Viability*) و بیان مارکر پرتوانی (Oct-4) سلول‌های اپی‌تلیال آمیون انسانی پس از انجام مراحل کرایوپرزرویشن و نگهداری طولانی مدت (۱۲ ماه) بررسی گردید.

مواد و روش‌ها

جمع‌آوری بافت

نمونه‌های جفت و اجزای آن از سزارین‌های انتخابی (Elective) مادرانی که در هفته‌های ۳۵ و ۳۶ بارداری قرار داشتند، از بیمارستان‌های عرفان و آیت‌الله طالقانی تهران تهیه گردید. پیش از آن تست‌های

دمای محیط نگهداری شدند، به مدت ۲۴ ساعت در فریزر 80°C قرار گرفتند و پس از ۲۴ ساعت سریعاً به تانک نیتروژن مایع انتقال داده شدند. پس از ۱۲ ماه کرایوتیوب‌ها از نیتروژن مایع خارج و در دمای محیط ذوب شدند. درصد زنده ماندن و بیان نشانگر Oct-4 در همه نمونه‌ها بعد از کرایوپرزرویشن اندازه‌گیری شد و نتایج حاصل با روش ANOVA بررسی گردید. برای به‌دست آوردن نتایج قابل قبول و مقایسه‌های آماری نمونه‌ها از ۱۲ جفت به‌دست آمد و به‌صورت مستقل بررسی گردید و برای هر گروه ۵ بار ($n=5$) تکرار انجام شد.

۲- گروه سلول با داربست: در این گروه از پرده آمینون با سلول استفاده شد. بدین منظور قطعات بافتی تهیه شده با شرایط و مواد مختلف که جزییات آن در جدول شماره ۱ نشان داده شده است، کرایوپرزرو گردیدند. حجم نهایی محتویات کرایوتیوب توسط PBS به ۱ میلی لیتر رسانده شد. شرایط کرایوپرزرویشن این گروه کاملاً مشابه با گروه سلول بدون داربست بود. همچنین در این گروه از نمونه‌های به‌دست آمده از همان جفت‌های گروه سلول بدون داربست و با همان تعداد تکرار استفاده شد تا بتوان خطاهای احتمالی را کاهش داد و تاثیر شرایط مختلف کرایوپرزرویشن را در میزان زنده بودن سلول‌ها و بیان مارکر Oct-4 در دو گروه بهتر با هم مقایسه نمود. از آزمون (Tukey Post-Test) ANOVA برای مطالعات آماری استفاده شد.

روش‌های بررسی Viability

برای بررسی میزان زنده بودن سلول‌ها از دو روش استفاده گردید:

۱- روش رنگ آمیزی Trypan blue: در این روش از محلول تریپان بلو استفاده شد. این روش فقط برای غربالگری اولیه مورد استفاده قرار گرفت و بافت‌ها و سوسپانسیون‌هایی که درصد سلول‌های زنده در آن‌ها کمتر از ۸۵ درصد بود از مطالعه حذف شدند و تعداد

برای جداسازی سلول‌های اپی‌تلیال آمینونی، پرده آمینون به قطعات کوچک‌تر تقسیم شد و برای هضم آنزیمی در محلول (0.15%) Trypsin-EDTA (Sigma-Aldrich) قرار گرفت (۷، ۲۰). از این مرحله به بعد، کلیه کارها در دمای 37°C انجام شد. هضم آنزیمی در سه مرحله صورت گرفت. مواد حاصل از ۱۰ دقیقه مرحله اول هضم آنزیمی که بیشتر زوائد حاصل از پرده آمینون بودند، دور ریخته شده و محلول حاصل از هضم آنزیمی مرحله دوم و سوم که هر کدام ۴۰ دقیقه طول کشید به مدت ۱۰ دقیقه با سرعت 2300 rpm سانتریفیوژ شد و سلول‌های حاصل جمع‌آوری گردید. سپس سلول‌ها در PBS به شکل سوسپانسیون مورد استفاده قرار گرفت، تعداد سلول در سوسپانسیون فوق طوری تنظیم گردید که تعداد نهایی سلول‌ها در هر ویال کرایو 2×10^7 سلول در هر میلی‌لیتر (برابر تعداد سلول‌ها در گروه با داربست پرده آمینون) باشد.

گروه‌های مطالعه

گروه‌های مورد بررسی در این طرح شامل دو گروه اصلی بود که عبارتند از:

۱- گروه سلول بدون داربست: در این گروه سلول‌های اپی‌تلیال آمینونی جدا شده از پرده آمینون به صورت سوسپانسیون سلولی محلول در PBS استفاده شدند و مواد لازم برای کرایوپرزرویشن به آن‌ها اضافه شد و با حجم‌های ۱ میلی لیتری در کرایوتیوب قرار داده شدند. هدف از انتخاب این گروه بررسی تأثیر شرایط و مواد مختلف مانند FBS، محیط کشت DMEM (Invitrogen)، DMSO (Sigma-Aldrich) و گلیسرول در کرایوپرزرویشن سلول‌های اپی‌تلیال آمینون انسانی بود. بنابراین این گروه شامل سه دسته اصلی (DMSO, Glycerol, DMSO+Glycerol) بود که جزییات هر یک از گروه‌ها در جدول شماره ۱ نشان داده شده است. پس از این که ویال‌ها به مدت ۵ دقیقه در

برای بررسی مارکر Oct-4 از آنتی بادی اولیه Anti-POU5F1 (Sigma-Aldrich) و آنتی بادی ثانویه Goat anti-rabbit IgG (Chemicon) کوئز و گه شده با رودامین استفاده شد. به منظور محاسبه درصد سلول‌های بیان کننده پروتئین، رنگ آمیزی هسته سلول‌ها توسط DAPI (Sigma-Aldrich) صورت گرفت. همچنین از گروه‌های کنترل مثبت و منفی برای کنترل مراحل ایمونوسیتوشیمی استفاده شد (۷).

کنترل میکروبی بانک سلولی

با این که کلیه مراحل تهیه و آماده سازی بافت و جداسازی سلول‌ها در شرایط استریل انجام گرفت، اما احتمال وجود آلودگی‌های ناخواسته میکروبی به خصوص هنگام تهیه بافت و انتقال آن به آزمایشگاه وجود دارد و این آلودگی‌های میکروبی می‌تواند درصد viability سلول‌ها را به میزان چشمگیری کاهش دهد، بدین جهت همه بافت‌ها و سلول‌ها قبل و بعد از کرایوپرزرویشن از نظر وجود عوامل میکروبی (باکتری‌ها و قارچ‌ها) به شرح زیر بررسی و در مواردی که کوچک‌ترین آلودگی دیده شد از گروه مطالعه حذف شدند.

محیط‌های کشت برای بررسی آلودگی باکتریایی و قارچی شامل:

(الف) محیط کشت Trypticase soy broth برای فراهم کردن شرایط رشد هوازی برای گونه‌های گرم مثبت و گرم منفی هوازی و بی‌هوازی اختیاری و قارچ‌ها.

(ب) محیط کشت Blood agar برای فراهم کردن شرایط رشد مغذی برای گونه‌های گرم مثبت هوازی و بی‌هوازی اختیاری.

(ج) محیط کشت Thioglycollate broth برای فراهم کردن شرایط رشد برای گونه‌های بی‌هوازی اجباری.

(د) محیط کشت Sabouraud's dextrose agar برای فراهم کردن شرایط رشد مغذی برای قارچ‌ها.

سلول‌های زنده در نمونه‌های باقی مانده از این مرحله با روش MTT مورد بررسی دقیق تری قرار گرفت.

جدول شماره ۱: ترکیب مواد استفاده شده برای کرایوپرزرویشن سلول‌های اپی تلیال آمینون انسانی در هر دو گروه سلول بدون داربست و سلول با داربست.

ترکیب محتویات نمونه‌ها در هر دو گروه با و بدون داربست				
ردیف	DMSO(10%)	Glycerol(50%)	FBS(10%)	DMEM(10%)
۱	●	○	○	○
۲	●	○	●	○
۳	●	○	○	●
۴	●	○	●	●
۵	○	●	○	○
۶	○	●	○	○
۷	○	●	○	○
۸	○	●	○	○
۹	○	○	○	○
۱۰	○	○	○	○
۱۱	○	○	○	○
۱۲	○	○	○	○

گروه‌های مورد بررسی در این طرح شامل سه گروه اصلی بود که با توجه به نوع ماده محافظ انجماد تقسیم بندی شدند: DMSO، Glycerol و DMSO+Glycerol. به هر یک از این گروه‌ها بر اساس جدول بالا، افزودنی‌های دیگر شامل سرم و DMEM اضافه گردید. (●) ماده مورد نظر در نمونه موجود است. (○) ماده مورد نظر در نمونه موجود نیست.

۲- روش MTT: اساس این روش احیاء تترازول زرد رنگ به نام 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) توسط آنزیم‌های میتوکندری سلول‌های زنده، به Formazan با رنگ بنفش است که در طول موج ۵۷۰ نانومتر حداکثر جذب را دارد. درصد سلول‌های زنده به طور دقیق قبل و پس از کرایوپرزرویشن با این روش مورد بررسی قرار گرفتند (۷).


ایمونوسیتوشیمی

در این روش با استفاده از آنتی بادی‌های اختصاصی بر علیه مارکرهای سلول‌های اپی تلیال آمینون انسانی بیان پروتئین‌های Pancytokeratin و Oct-4 ارزیابی شدند. برای بررسی مارکر Pancytokeratin از آنتی بادی Monoclonal Anti-Pan Cytokeratin (Sigma-Aldrich) کوئز و گه شده با FITC استفاده شد.

در همه گروه‌های مورد مطالعه، مقداری از سوسپانسیون‌های سلولی و بافت‌ها در محیط‌های فوق کشت داده شده و در دماهای 37°C و 15°C به مدت ۱۴ روز انکوبه شدند. محیط‌های کشت به ترتیب پس از گذشت ۲۴ ساعت، ۷۲ ساعت و ۱۴ روز از نظر رشد میکروبی بررسی می‌گردید.


یافته‌ها

نتایج حاصل از بررسی مارکر Pancytokeratin نشان داد که همه سلول‌های اپی‌تلیال آمینون انسانی پس از جداسازی Pancytokeratin را بیان می‌کنند که بیانگر جداسازی صحیح این سلول‌ها و عدم آلودگی به سلول‌های مزانشیمال می‌باشد (شکل شماره ۱الف).



شکل شماره ۱: الف: واکنش آنتی بادی کوئزوگه شده با FITC بر علیه مارکر Pancytokeratin در سلول‌های اپی‌تلیالی آمینون انسانی. ب: واکنش آنتی بادی ثانویه کوئزوگه شده با رودامین با آنتی بادی اولیه بر علیه مارکر پرتوانی Oct-4 در سلول‌های اپی‌تلیال آمینون انسانی قبل از کرایوپرزرویشن (Scale bar = 50μm).

درصد زنده ماندن سلول‌های اپی‌تلیال آمینون انسانی به دو روش MTT و تریپان بلو قبل از کرایوپرزرویشن بررسی گردید و نتایج حاصل نشان داد که بیش از ۹۴ درصد از سلول‌های اپی‌تلیال آمینون انسانی پس از جداسازی از پرده آمینون قدرت حیات دارند. درصد سلول‌های زنده پس از کرایوپرزرویشن سلول‌های اپی‌تلیال آمینون انسانی با روش MTT بررسی گردید. در گروهی که سلول‌ها به همراه داربست نگهداری می‌شدند، سلول‌های اپی‌تلیال آمینون انسانی پس از کرایوپرزرویشن جداسازی شده و سپس مورد ارزیابی قرار گرفتند. در گروه سلول بدون داربست درصد سلول‌های زنده در سوسپانسیون سلول‌های اپی‌تلیال آمینون انسانی پس از کرایوپرزرویشن بررسی گردید که نتایج حاصل به همراه درصد سلول‌های زنده قبل از کرایوپرزرویشن (Fresh cell) در نمودار شماره ۱ نشان داده شده است.



نمودار شماره ۱: مقایسه درصد سلول‌های زنده قبل و پس از کرایوپرزرویشن در سلول‌های اپی‌تلیال آمینون انسانی در گروه بدون داربست. ترکیب DMSO+FBS+DMEM دارای تفاوت معنی‌داری نسبت به سایر گروه‌ها می‌باشد ($P < 0.05$). با اینحال در این گروه کاهش معنی‌دار زنده ماندن سلول‌ها نسبت به سلول‌های قبل از کرایوپرزرویشن مشاهده می‌شود. ($P < 0.01$ ★★)

در دسته‌ای که ماده محافظ انجماد فقط شامل DMSO بود بالاترین درصد سلول‌های زنده توسط




شکل شماره ۲: تصویری از نتایج کشت میکروبی منفی پس از ۷۲ ساعت انکوباسیون در دمای 37°C ؛ الف) در محیط کشت Trypticase soy broth، ب) در محیط کشت Sabouraud's dextrose agar.

در گروه‌هایی دیده شد که فقط ماده محافظ حضور داشت و بیشترین درصد سلول‌های زنده در حالت‌هایی مشاهده گردید که علاوه بر ماده محافظ، ترکیبی از FBS و محیط کشت DMEM هم اضافه شده بود (77.9 ± 4.8). در نمونه‌هایی که حاوی DMSO+FBS و DMSO+DMEM بود، درصد سلول‌های زنده به ترتیب $23/4$ و $30/2$ درصد گزارش شد. در دسته‌های که از گلیسرول و گلیسرول+DMSO به عنوان عوامل محافظت از انجماد استفاده شده بود درصد سلول‌های زنده پس از کرایوپرزرویشن کمتر از گروه حاوی DMSO بود.

به منظور بررسی تمایزهای ناخواسته سلول‌های اپی‌تلیال آمیون انسانی در حین نگهداری طولانی مدت در بانک سلولی، درصد بیان مارکر پرتوانی Oct-4 در نمونه‌هایی که بیشترین میزان سلول‌های زنده را داشتند، با روش رنگ‌آمیزی ایمونوسیتوشیمی بررسی گردید. نتایج حاصل از بررسی بیان مارکر Oct-4 در سلول‌های جدا شده از پرده آمیون نشان داد که $14/7 \pm 3/1$ درصد از این سلول‌ها مارکر فوق را قبل از کرایوپرزرویشن بیان می‌کنند. در شکل شماره ۱- ب نمونه ای از سلول‌های اپی‌تلیال آمیون انسانی که مارکر پرتوانی را بیان می‌کنند نشان داده شده است. با توجه به شرایط مختلف نگهداری که در گروه سلول بدون داربست ایجاد شد و نتایج حاصل از درصد سلول‌های زنده، میزان بیان مارکر Oct-4 در حالت‌هایی که ترکیبی از مواد FBS و DMEM به همراه مواد محافظ انجماد در محیط سلول‌ها وجود دارند، بررسی گردید و نتایج حاصل از آن به همراه درصد بیان Oct-4 قبل از کرایوپرزرویشن (Fresh cell) در نمودار شماره ۳ آورده شده است. درصد بیان مارکر Oct-4 پس از کرایوپرزرویشن در دسته‌ای از سلول‌ها که فقط از ماده گلیسرول برای محافظت از انجماد در آن‌ها استفاده شده بود پائین‌ترین مقدار به دست آمد، به طوری که در سلول‌هایی که در محیط حاوی گلیسرول، FBS و


ترکیبی از مواد FBS و DMEM به دست آمد ($62.2 \pm 4.6\%$) و کمترین میزان سلول‌های زنده در ویال‌هایی بود که فقط حاوی DMSO بودند. در دسته‌ای از نمونه‌ها که ماده محافظ انجماد فقط شامل گلیسرول بود درصد سلول‌های زنده کمتر از گروه‌های حاوی DMSO مشاهده گردید. در دسته‌ای که سلول‌ها در حضور هر دو ماده محافظ انجماد DMSO و گلیسرول نگهداری شدند بالاترین میزان سلول‌های زنده پس از کرایوپرزرویشن در نمونه‌هایی دیده شد که علاوه بر مواد محافظ انجماد، حاوی ترکیبی از FBS و DMEM بودند. در گروه سلول با داربست، سلول‌های اپی‌تلیال آمیون انسانی بدون جداسازی از بستر در شرایط کاملاً مشابه با گروه بدون داربست نگهداری شدند و درصد سلول‌های زنده پس از یکسال بررسی گردید که نتایج آن به همراه درصد سلول‌های زنده قبل از کرایوپرزرویشن (Fresh cell) در نمودار شماره ۲ نشان داده شده است.



نمودار شماره ۲: مقایسه درصد سلول‌های زنده قبل و پس از کرایوپرزرویشن در سلول‌های اپی‌تلیال آمیون انسانی در گروه با داربست ($P < 0.05$). تفاوت معنی‌داری بین سلول‌های تازه تهیه شده (Fresh) و سلول‌های کرایو شده بر روی داربست در گروه DMSO+FBS+DMEM وجود ندارد.

در دسته‌ای که فقط از DMSO به عنوان ماده محافظ انجماد استفاده شد کمترین میزان سلول‌های زنده

DMEM نگهداری شده بودند میزان بیان مارکر Oct-4 به حدود ۴ درصد رسید. از سوی دیگر بالاترین میزان بیان مارکر Oct-4 در سلول‌هایی دیده شد که از DMSO به عنوان ماده محافظ انجماد آنها استفاده شده بود. در این دسته بیشترین درصد بیان Oct-4 در حالتی گزارش شد که سلول‌ها در DMSO، FBS و DMEM نگهداری می‌شدند. نتایج حاصل همچنین نشان داد که در دسته‌ای از سلول‌ها که از DMSO و گلیسرول به همراه هم به عنوان مواد محافظ انجماد استفاده می‌شد، به‌طور کلی بیان مارکر Oct-4 کمتر از حالتی است که DMSO به تنهایی استفاده شود.



نمودار شماره ۳: مقایسه درصد بیان Oct-4 قبل و پس از کرایوپرزرویشن سلول‌های اپی تلیال آمینون انسانی در هر دو گروه بدون داربست و با داربست ($P < 0.05$), ($P < 0.01$).

در سلول‌هایی که به همراه بسترشان نگهداری شده بودند نیز میزان بیان مارکر Oct-4 پس از کرایوپرزرویشن سلول‌ها بررسی گردید که نتایج حاصل از آن به همراه درصد بیان Oct-4 قبل از کرایوپرزرویشن در نمودار شماره ۳ نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود در این گروه نیز بیشترین میزان بیان مارکر Oct-4 در سلول‌هایی دیده می‌شود که در محیطی حاوی DMSO، FBS و DMEM نگهداری می‌شدند که در این حالت 10.9 ± 2.6 درصد از سلول‌ها مارکر Oct-4 را بیان می‌کردند. کمترین میزان بیان مارکر Oct-4 نیز در سلول‌هایی دیده شد که با استفاده از DMSO، FBS و DMEM

و گلیسرول نگهداری شده بودند.

با توجه به نتایج به دست آمده از میزان سلول‌های زنده و میزان بیان مارکر Oct-4 و مقایسه این نتایج با سلول‌های کرایوپرزرو نشده (Fresh cells)، اختلاف معنی‌داری در میزان سلول‌های زنده نمونه‌های حاوی DMSO+FBS+DMEM در گروه سلول بدون داربست با سلول‌هایی که کرایوپرزرو نشده‌اند وجود دارد ($P < 0.05$), در صورتی که اختلاف معنی‌داری در درصد سلول‌های زنده در نمونه‌های مشابه در گروه سلول با داربست وجود ندارد. در مورد بیان Oct-4 نتایج حاصل نشان داد که میزان بیان Oct-4 در گروه با داربست تفاوت معنی‌داری با سلول‌های قبل از کرایوپرزرویشن ندارد، در حالی که بیان این مارکر در گروه بدون داربست پس از کرایوپرزرویشن کاهش معنی‌داری ($p < 0.05$) را نشان می‌دهد (نمودار شماره ۳). برای بررسی اثرات مواد محافظ در کرایوپرزرویشن سلول‌های اپی تلیال آمینون انسانی، میزان بیان Oct-4 در نمونه‌هایی که در ترکیب آن‌ها DMSO+FBS+DMEM محافظ انجماد بود، در هر دو گروه سلول با داربست و بدون داربست مقایسه شد. (نمودار شماره ۳). در گروهی که از گلیسرول استفاده شده است کاهش معنی‌داری نسبت به گروه DMSO در بیان Oct-4 دیده می‌شود ($p < 0.01$). این وضعیت در هر دو گروه با و بدون داربست مشاهده می‌گردد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که در گروه سلول بدون داربست، نمونه‌هایی که در ترکیب آن‌ها DMSO به عنوان ماده محافظت کننده از انجماد به کار رفته است نسبت به گروه حاوی گلیسرول تمایزهای ناخواسته کمتری دارند.

بحث

یکی از چشم اندازهای بسیار مهم در پزشکی استفاده از روش‌های نوین مانند سلول درمانی جهت درمان بیماری‌ها است. از سوی دیگر با روشن شدن زوایای مختلف بیولوژیک سلول‌های بنیادی و

پتانسیل‌های بالقوه آن‌ها، نحوه نگهداری و استفاده از سلول‌های بنیادی یکی از مباحث مهمی است که در سراسر دنیا مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. در همین راستا تهیه بانک سلولی مناسب از سلول‌های بنیادی دانشمندان مختلفی را در سراسر دنیا به چالش کشیده است و بدین منظور تحقیقات وسیعی در زمینه بهینه‌سازی نگهداری طولانی مدت سلول‌ها در حال انجام است. از مشکلات عمده نگهداری طولانی مدت سلول‌هایی که خواص بنیادی دارند می‌توان به کاهش تعداد سلول‌های زنده و تمایزهای ناخواسته در طول زمان نگهداری سلول‌ها اشاره کرد. هدف این مطالعه بررسی اثر داربست آمینون در کرایوپرزرویشن سلول‌های اپی‌تلیال آمینون انسانی به منظور افزایش تعداد سلول‌های زنده و کاهش میزان تمایزهای ناخواسته پس از کرایوپرزرویشن می‌باشد.

اولین هدف ما در این مطالعه استفاده از پرده آمینون به عنوان داربست سلولی در کرایوپرزرویشن سلول‌های اپی‌تلیال آمینون انسانی بود. طبق نتایج مطالعه حاضر، کرایوپرزرو کردن سلول‌ها بر روی بستر طبیعی‌شان باعث افزایش ماندگاری در مقایسه با سلول‌های جدا شده می‌گردد. این نتایج در راستای گزارش‌هایی است که حضور بستر برای انجماد سلول‌ها را ضروری می‌دانند. در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۰ توسط Liu و همکاران بر روی سلول‌های فیروبیلاست انجام شد، سلول‌هایی که در بستر سه بعدی قرار داده شده بودند نسبت به سلول‌های فاقد بستر، بیشتر زنده ماندند (۲۵). در مطالعه دیگری که توسط آقای Birraux و همکارانش در ۲۰۰۲ انجام گردید سلول‌های کبدی به شکل ساندویچی بین دو لایه کلاژن قرار داده شدند و پس از نگهداری طولانی مدت افزایش در تعداد سلول‌های زنده و افزایش در عملکرد ترشحی این سلول‌ها پس از کرایوپرزرویشن گزارش گردید و نتایج بیانگر تأثیر مثبت داربست بود (۲۴). همچنین، در مطالعه‌ای که توسط Lin و همکارانش در سال ۲۰۰۴ انجام شد

سلول‌های بنیادی جنینی قبل از انجماد در Matrigel قرار داده شده و سپس کرایوپرزرو شدند که تعداد سلول‌های زنده پس از نگهداری به این شیوه به‌طور چشمگیری افزایش داشت و همچنین درصد سلول‌هایی که به شکل ناخواسته در طول کرایوپرزرویشن تمایز پیدا می‌کردند کاهش پیدا کرد (۲۳). در اکثر موارد استفاده از داربست‌ها باعث افزایش بهره‌وری کرایوپرزرویشن می‌شود. همچنین در این مطالعه نشان داده شد که کرایو کردن سلول‌ها بر روی بستر می‌تواند باعث کاهش تمایزهای ناخواسته در پروسه نگهداری سلول‌ها به روش انجماد گردد، که بدین منظور از Oct-4 استفاده گردید. این نشانگر یکی از مجموعه فاکتورهای همانندسازی سلول‌های انسانی است که در سلول‌های بنیادی که خاصیت پر توانی دارند دیده می‌شود و یکی از مارکرهای شناسایی سلول‌های بنیادی تمایز نیافته و پرتوان می‌باشد (۲۶). برای توجیه اثر مثبت داربست آمینون در کرایوپرزرویشن طولانی مدت سلول‌های اپی‌تلیال آمینون انسانی می‌توان دلایل مختلفی را مطرح نمود. از جمله این که استفاده از آمینون به عنوان کنام می‌تواند شرایط طبیعی زندگی سلول‌های اپی‌تلیال آمینونی را در طول کرایوپرزرویشن حفظ نماید. پرده آمینون بافتی غنی از پروتئین‌های ماتریکس خارج سلولی مانند کلاژن تایپ‌های I و IV، فیرونکتین، لامینین، پرلکان و غیره است (۲۷) و حضور این پروتئین‌ها به عنوان عوامل اصلی کنام سلول‌های اپی‌تلیالی می‌تواند از آسیب‌های ایجاد شده در طول کرایوپرزرویشن سلول‌ها بکاهد. نتایج این مطالعه علاوه بر تأیید نتایج مطالعاتی که قبلاً در این راستا صورت گرفته بود، پرده آمینون را به عنوان یک داربست جدید در روند کرایوپرزرویشن سلول‌ها معرفی می‌نماید. بدیهی است که انجام مطالعات بیشتر در زمینه استفاده از پرده آمینون در نگهداری طولانی مدت سایر سلول‌ها نیز ضروری به نظر می‌رسد. یکی دیگر از اهداف این مطالعه بررسی اثرات حضور DMSO و گلیسرول در

جلوگیری کننده از تشکیل کریستال یخ باید بر اساس نوع سلول تعیین گردد.

در پایان می توان نتیجه گیری کرد که آمینون به عنوان یک داربست طبیعی و کنام سلول های اپی تلیال آمینون انسانی می تواند نقش مثبتی در کرایوپرزرویشن این سلول ها داشته باشد. استفاده از آمینون می تواند از مرگ و میر ناشی از کرایوپرزرویشن سلول ها جلوگیری کرده و قدرت پرتوانی آن ها را حفظ نماید. با انجام مطالعات بیشتر در این زمینه می توان پرده آمینون را به عنوان داربست جدیدی در تهیه بانک سلول های مختلف معرفی نمود.

سپاسگزاری

بدین وسیله از پرسنل محترم اتاق عمل بیمارستان های عرفان و آیت الله طالقانی به خصوص سرکار خانم دکتر نیرومنش و سرکار خانم یوسفی کمال قدردانی و تشکر به عمل می آید. این مطالعه با حمایت مالی مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گردید.

References

1. Niknejad, H., Peirovi, H. Jorjani, M., Ahmadiani, A., Ghanavi, J., Seifalian, A.M. Properties of the amniotic membrane for potential use in tissue engineering. *Eur Cell Mater*, 2008; 15:88-99.
2. Ganatra, M.A., Amniotic membrane in surgery. *J Pak Med Assoc*, 2003; 53(1):29-32.
3. Gomes JA, Romano A, Santos MS, Dua HS. Amniotic membrane use in ophthalmology. *Curr Opin Ophthalmol*, 2005; 16(4):233-40.
4. Dua HS, Gomes JA, King AJ, Maharajan VS. The amniotic membrane in ophthalmology. *Survey of Ophthalmology* 2004; 49(1): 51-77.

نگهداری طولانی مدت سلول های اپی تلیال آمینون انسانی بود. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که در نمونه هایی که در ترکیب آن ها گلیسرول وجود دارد پرتوانی سلول های اپی تلیال آمینون انسانی در طول کرایوپرزرویشن کاهش بیشتری دارد. همچنین حضور گلیسرول در کرایوپرزرویشن سلول های اپی تلیال آمینون انسانی می تواند باعث کاهش تعداد سلول های زنده گردد. در مورد استفاده از مواد محافظ انجماد، مطالعات بسیار زیادی صورت گرفته است. مواد مختلفی برای جلوگیری از تشکیل کریستال های یخ و آسیب های سلولی ناشی از آن در کرایوپرزرویشن سلولی استفاده می شود که انتخاب نوع ماده با توجه به نوع سلول، نحوه انجام کرایوپرزرویشن، مدت زمان نگهداری سلول و غیره انتخاب می گردد (۲۸). نتایج متناقضی در مورد اثرات مثبت و منفی استفاده از گلیسرول یا DMSO در کرایوپرزرویشن سلول ها وجود دارد (۲۸). از عوامل مؤثر در این زمینه می توان به میزان نفوذپذیری ماده محافظ به درون سلول، نوع سلول، غلظت مواد محافظ، مکانیسم محافظت در برابر انجماد و غیره اشاره کرد (۲۹). بنابراین به نظر می رسد ماده

5. Hao Y, Ma DH, Hwang DG, Kim WS, Zhang F. Identification of antiangiogenic and antiinflammatory proteins in human amniotic membrane. *Cornea* 2000; 19(3):348-52.
6. Hao Y, Ma DH, Hwang DG, Kim WS, Zhang F. Identification of antiangiogenic and antiinflammatory proteins in human amniotic membrane. *Cornea* 2000; 19(3):348-52.
7. Niknejad H, Deihim T, Ahmadiani A, Jorjani M, Peirovi H. Permanent expression of midbrain dopaminergic neurons traits in differentiated amniotic epithelial cells. *Neurosci Lett* 2012; 506:22-27.

8. Niknejad H, Deihim T, Solati-Hashjin M, Peirovi H. The effects of preservation procedures on amniotic membrane's ability to serve as a substrate for cultivation of endothelial cells. *Cryobiology* 2011; 63:145-151.
9. Assaro-Giordano M, Caporossi A, Toti P. Amniotic membrane transplantation in ocular surface disorders. *J Cell Physiol* 2005; 202: 849-851.
10. Gomes JA, Romano A, Santos MS, Dua HS. Amniotic membrane use in ophthalmology. *Curr Opin Ophthalmol* 2005; 16:233-240.
11. Andonovska D, Dzokic G, Spasevska L, Trajkovska T, Popovska K, Todorov I, et al. The advantages of the application of amniotic membrane in the treatment of burns. *Prilozi* 2008; 29(1):183-98.
12. Georgy MS, Aziz NL. Vaginoplasty using amnion graft: New surgical technique using the laparoscopic transillumination light. *J Obstet Gynecol* .1996; 16: 262-264.
13. Miki T, Lehmann T, Cai H, Stolz DB, Strom SC. Stem cell characteristics of amniotic epithelial cells. *Stem Cells* 2005; 23 (10):1549-59.
14. Miki T, Mitamura K, Ross MA, Stolz DB, Strom SC. Identification of stem cell marker-positive cells by immunofluorescence in term human amnion. *J Reprod Immunol* 2007; 75 (2):91-6.
15. Miki T: Amnion-derived stem cells: in quest of clinical applications. *Stem Cell Res Ther*. 2011; 2(3): 25.
16. Ilancheran S, Michalska A, Peh G, Wallace EM, Pera M, Manuelpillai U. Stem cells derived from human fetal membranes display multilineage differentiation potential. *Biol Reprod* 2007; 77 (3):577-88.
17. Takashima S, Ise H, Zhao P, Akaike T, Nikaido T. Human amniotic epithelial cells possess hepatocyte-like characteristics and functions. *Cell Struct Funct* 2004; 29 (3):73-84.
18. Wei JP, Zhang TS, Kawa S, Aizawa T, Ota M, Akaike T, Kato K, Konishi I, et al. Human amnion-isolated cells normalize blood glucose in streptozotocin-induced diabetic mice. *Cell Transplant*. 2003; 12(5): 545-52.
19. Sakuragawa N, Thangavel R, Mizuguchi M, Hirasawa M, Kamo I. Expression of markers for both neuronal and glial cells in human amniotic epithelial cells. *Neurosci Lett*. 1996; 209(1):9-12.
20. Niknejad H, Peirovi H, Ahmadiani A, Ghanavi J, Jorjani M: Differentiation factors that influence neuronal markers expression in vitro from human amniotic epithelial cells. *Eur Cell Mater* 2010; 19: 22-9.
21. Miyamoto K, Hayashi K, Suzuki T, Ichihara S, Yamada T, Kano Y, et al. Human placenta feeder layers support undifferentiated growth of primate embryonic stem cells. *Stem Cells* 2004; 22 (4):433-40.
22. Lensch MW, Daheron L, Schlaeger TM: Pluripotent stem cells and their niches. *Stem Cell Rev* 2006; 2(3): 185-201.
23. Ji L, de Pablo JJ, Palecek SP: Cryopreservation of adherent human embryonic stem cells. *Biotechnol Bioeng* 2004; 88(3): 299-312.
24. Birraux J, Genin B, Matthey-Doret D, Mage R, Morel P, Le Coultre C. Hepatocyte cryopreservation in a three-dimensional structure. *Transplant Proc* 2002; 34(3): 764-7.
25. Liu K, Yang Y, Mansbridge J. Comparison of the stress response to cryopreservation in monolayer and three-dimensional human fibroblast cultures: stress proteins, MAP

-
- kinases, and growth factor gene expression. *Tissue Eng* 2000; 6(5): 539-54.
26. Hitoshi N, Jun-ichi M, Austin G.S. Quantitative expression of Oct-3/4 defines differentiation, dedifferentiation or self-renewal of ES cells. *Nature Genetics* 2000; 24, 372 – 376.
27. E.J. Lee , G. Vunjak-Novakovic, Y. Wang , L.E. Niklason, A biocompatible endothelial cell delivery system for in vitro tissue engineering, *Cell Transplant* 2009; 18(7) :731-43.
28. Jomha NM, Weiss ADH, Forbes JF, Law GK, Elliott JAW, McGann LE. Cryoprotectant agent toxicity in porcine articular chondrocytes. *Cryobiology* 2010; 61: 297-302.
29. Hennerbichler S, Reichl B, Pleiner D, Gabriel C, Eibl J, Redl H. The influence of various storage conditions on cell viability in amniotic membrane. *Cell Tissue Banking* 2006; 8:1–8.

Archive of SID