

تأثیر عصاره الکلی اسپند بر غلظت مالون دی آلدئید و فعالیت کاتالاز و گلوتاتیون پر اکسیداز در موش های تیمار شده با نانو ذرات نقره

سمیرا کرم سیچانی^۱

نوشین نقش^۲

نعمت الله رزمی^۳

چکیده

سابقه و هدف: نانوذرات نقره با استرس اکسیداتیو به واسطه تولید رادیکال آزاد ارتباط دارد. آنتی اکسیدان ها می توانند باعث بروز اثرات مخرب رادیکال های آزاد در طولانی مدت گردد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات حفاظتی و آنتی اکسیدانی گیاه اسپند (*Peganum harmala L.*) بر روی موش های نر تیمار شده با نانو ذرات نقره می باشد.

مواد و روش ها: در این مطالعه موش های آزمایشگای نر نژاد آلبینو (۳۰-۲۵ گرم) به چهار گروه تقسیم شدند: کنترل، گروه تزریق شده با نانو ذرات نقره 500 ppm ، گروه دریافت کننده عصاره اتانولی اسپند خوراکی به میزان 20 mg/Kg/day به مدت ۳۰ روز و گروه آخر دریافت کننده نانو ذرات و خورنده عصاره اسپند با دوزهای فوق می باشد. تمامی تزریقات در ۳ روز متوالی در ابتدای آزمایش به صورت داخل صفاقی انجام شد. پس از دوره تیمار خون از قلب موش ها گرفته و فعالیت آنزیم های کاتالاز (CAT) سرم و گلوتاتیون پر اکسیداز (GPx) گلیول های قرمز و غلظت مالون دی آلدئید (MDA) سرم اندازه گیری شد.

یافته ها: در گروه تیمار شده با نانوذرات نقره افزایش معنی داری در غلظت مالون دی آلدئید و کاهش معنی دار میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و گلوتاتیون پر اکسیداز صورت گرفت ($p < 0.001$). همچنین عصاره اتانولی اسپند اثرات فوق را معکوس نمود به طوری که غلظت مالون دی آلدئید را کاهش و افزایش معنی داری در میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و گلوتاتیون پر اکسیداز ایجاد کردید ($p < 0.001$).

استنتاج: در واقع می توان عصاره اتانولی اسپند، با خاصیت آنتی اکسیدانی را به عنوان کاهش دهنده رادیکال های آزاد حاصل از نانو ذرات نقره پیشنهاد نمود.

واژه های کلیدی: اسپند (*Peganum harmala L.*), نانوذرات نقره، کاتالاز، گلوتاتیون پر اکسیداز و مالون دی آلدئید

مقدمه

استرس اکسیداتیو به صورت تغییر در تعادل پرواکسیدان و آنتی اکسیدان ها می باشد^(۱). در اغلب موارد وضعیت آنتی اکسیدان ها می باشد^(۱).

E-mail: samirakaramsichani@yahoo.com

مؤلف مسئول: سمیرا کرم سیچانی - فارس: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس

۱. دانشجویی کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس

۲. گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان

۳. گروه بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس

تاریخ دریافت: ۹۱/۶/۴ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۹۱/۷/۲۲ تاریخ تصویب: ۹۱/۸/۲۱

تزریق نانو ذرات نقره از طریق داخل صفاقی با دو دوز مختلف ppm ۱ و ۱۰ ادارای اثرات سمی (Toxic effects) بر روی تخدمان بوده و با فعال کردن مسیرهای کاسپازی ایجاد استرس اکسیداتیو کرده و تخمک گذاری را تحت تاثیر قرار داده است^(۷). طبق گفته Sriram و همکاران (۲۰۱۰) به علت فعال شدن کاسپاز ۳ (Caspase3) در اثر رادیکال آزاد حاصل از نانو ذرات نقره، این رادیکال قادر است مسیر داخلی آپوپتوز را فعال کند^(۸). با توجه به کاربردهای مختلف نانو ذرات مخصوصاً نانو ذرات نقره در کشور ما و عدم انجام آزمایش‌های دقیق مبنی بر تاثیرات این نانو ذرات در بدن، در این تحقیق به بررسی تأثیرات عصاره اتانلی اسپند در تغییر خواص نانو ذرات نقره پرداخته شده است. در واقع لبیدها از مهم‌ترین مولکول‌هایی هستند که مورد تهاجم رادیکال‌های آزاد قرار می‌گیرند. این فرآیند منجر به پراکسیداسیون لبیدها که در نهایت موجب کاهش حیات و مرگ سلولی می‌شود. در این میان غشای سلول‌ها که غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع (PUFA=Poly Unsaturated Fatty Acid) است بیشتر از سایر قسمت‌های سلول به پراکسیداسیون حساس است^(۹). پراکسیداسیون لبیدها منجر به کاهش سیالیت غشاء و ازین رفته ساختمان و عملکرد آن می‌شود که در پاتوژن‌بیماری از بیماری‌ها دخالت دارد. محصول نهایی ناشی از پراکسیداسیون لبید‌های مولکولی (MDA=Malondialdehyde) می‌باشد. مولکول‌هایی به نام آنتی‌اکسیدان (آنزیمی و غیر آنزیمی) برای حفظ هموستانز اکسیداتیو و مقابله با استرس اکسیداتیو وجود دارند. این مولکول‌ها امکان دارد رادیکال‌های آزاد را خشی کنند از جمله مکانیسم‌های دفاع آنتی‌اکسیدانی آنزیمی شامل گلوتاپیون پراکسیداز (Glutathione peroxidase (GPx)، کاتالاز (Catalase (CAT))، سوپر اکسید دیس موتاز (Superoxide Dismutase (SOD) است^(۱۰). هر آنزیم دارای یک عملکرد ویژه و منحصر به فرد می‌باشد که همگی برای زنده ماندن سلول در شرایط نرمال ضروری

که در نهایت منجر به آسیب بافتی می‌گردد^(۲). به نظر می‌رسد که گونه‌های فعال واکنش گر اکسیژن (ROS=Reactive oxygen species) در تمامی بافت‌ها از طریق مکانیسم‌های گوناگونی تولید می‌شوند. محققان نانو تکنولوژی با ابعاد وسیعی از کاربردهای نانو ذرات آشنا شده‌اند که ممکن است نقش بسیار زیادی در پژوهشی، پیشگیری و درمان بیماری‌ها و تولید دارو داشته باشد. خاصیت میکروب کشینقه در ابعاد نانو به بیش از ۹۹ درصد افزایش می‌یابد که بر متابولیسم، تنفس و تولید مثل میکرو ارگانیسم‌ها اثر می‌گذارد. تاکنون بیش از ۶۵ نوع باکتری شناخته شده را ازبین برده است^(۳). نانو ذرات نقره به عنوان یکی از قوی‌ترین مواد ضد باکتری (Antibacterial) و ضد قارچ (Antifungal) معروف هستند، اما این نگرانی وجود دارد که استفاده بیش از اندازه از این ماده خطری بالقوه برای اکوسیستم، حیات بشر و سایر موجودات زنده را در پی داشته باشد^(۴). از شایع‌ترین اثرات مواجهه طولانی مدت با نقره ایجاد یک پیگماتاسیون مشخص غیر قابل برگشت در پوست (Argyria) یا در چشم‌ها (Agyria) است^(۴). در سلول‌هایی که در معرض نانو ذرات نقره بودند فعالیت میتوکندری، کاهش یافته و عملکرد لاکتات دهیدروژنаз، به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد^(۵). این کاهش فعالیت نشان دهنده مرگ سلولی می‌باشد. نانو ذرات ممکن است از طریق مسیرهای مختلف وارد بدن شود و باعث ایجاد آسیب‌های مختلف به ارگان‌های متفاوت بدن موجودات زنده می‌شود. Tang و همکاران در سال ۲۰۰۸ نشان دادند که موش‌هایی که نانو ذرات نقره با سایزهای متفاوت دریافت کرده بودند بعد از ورود به جریان خون، در بافت‌ها مخصوصاً کبد، کلیه، طحال، ریه و مغز انباسته شده بودند. بر اساس این تحقیق ثابت شده است که نانو ذرات نقره سبب تخریب دیواره خونی مغزی شده و تخریب عصبی را به وجود می‌آورد^(۶). همچنین در مطالعه‌ای دیگر که توسط Ghorbanzadeh و همکاران در سال ۲۰۱۱ انجام شد، نشان دادند که

در شرایط درجه حرارت مناسب آزمایشگاهی (درجه حرارت ۲۰-۲۵ درجه سانتی گراد) و نور کافی اتاق (۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی) نگهداری شدند. حیوانات آزمایشگاهی با وزن ۲۵-۳۰ گرم بودند.

الف- روش تهیه عصاره اتانولی

دانه گیاه اسپند از بیابان‌های اطراف اصفهان جمع آوری شد. به منظور شناسایی و تشخیص گونه در هر باریوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان تأیید گردید. ۲۰۰ گرم از دانه‌های اسپند را شسته و بعد از گذشت ۲۴ ساعت که در محیطی تاریک خشک شد آنها را با استفاده از هاون برقی پودر کردیم. مقدار ۳۲ گرم پودر دانه گیاه اسپند را با اتانول ۱۰۰ درصد توسط دستگاه سوکسیله به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد عصاره گیری کردیم. سپس در دستگاه روتاری حلال خشک شده و پودر جامد به دست آمده را توسط آب مقطر دو بار تقطیر به حجم رسانیده شد و به میزان ۲۰ mg/kg/day به مدت سی روز به موش‌ها خورانده شد.

ب- تقسیم بندی گروه‌های آزمایشی

در این بررسی ۴ گروه آزمایشی شامل ۸ موش در هر یک از گروه‌ها می‌باشد. گروه ۱ به عنوان گروه کنترل یک سی سی آب مقطر به طریق تزریق داخل صفاقی (interpritonealy) دریافت کردند، به گروه ۲ تزریق داخل صفاقی شد، گروه ۳/۰ سی سی آب مقطر ۵۰۰ ppm به طریق تزریق داخل صفاقی و دوز ۲۰ mg/kg/day عصاره اتانولی دانه گیاه اسپند را به صورت خوراکی دریافت کردند و گروه ۴ یک سی سی نانو ذرات نقره ۵۰۰ ppm را به طریق تزریق داخل صفاقی و دوز ۲۰ mg/kg/day به مدت سی روز عصاره اتانولی دانه گیاه اسپند را به صورت خوراکی دریافت کردند. قابل ذکر است که تمام تزریقات در همه ۴ گروه قبل از ۳۰ روز تیمار به مدت ۳ روز متوالی تکرار شدند. در ضمن

هستند(۱۱). آبیون سوپر اکساید اولین رادیکال آزاد مشتق از اکسیژن است که به وسیله SOD به اکسیژن و پراکسید هیدروژن تبدیل می‌گردد. آنزیم کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز موجب تبدیل پراکسید هیدروژن به آب و اکسیژن می‌شوند(۱۰). تری پیتید گلوتاتیون، تیول غیرپروتئینی اصلی موجودات هوایی و فراوان ترین آنتی اکسیدان غیر آنزیمی داخل سلولی می‌باشد(۱۲). فلاونوئیدها گروهی از ترکیبات فنولیک با خاصیت آنتی اکسیدانی می‌باشند که دارای خاصیت ضد سرطانی و ضد توموری است. گیاه اسپند (Peganum harmala L) گیاهی حاوی فلاونوئیدها است. گیاه اسپندیکی از گیاهان دارویی می‌باشد. آنتی اکسیدان‌های موجود در اسپند ممکن است به مقابله در برابر این رادیکال‌های آزاد پرداخته و سعی در جبران مکانیسم‌های استرس اکسیداتیو (Oxidative stress) داشته باشند. تعدادی از این آنتی اکسیدان‌ها در اسپند شامل فنول‌ها و پلی‌فنول‌ها (فلاونوئیدها)، توکوفرول می‌باشد. گیاه اسپند در طب سنتی دارای اثراتی از قبیل: خواب‌آور، تعریق آور، ضد انگل، قاعده‌آور، سقط کننده جنین، ضد سرطان، ضد قارچی، ضد باکتری، محرك سیستم ایمنی و مهار کننده آنزیم مونو‌آمینو اکسیداز (MAO) می‌باشد(۱۳). با توجه به استفاده گسترده از نانو ذرات نقره در زمینه‌های مختلف در کشور ما و با توجه به اطلاعات بسیار کم اثرات حفاظتی و آنتی اکسیدانی اسپند در از بین بردن رادیکال‌های آزاد حاصل از نانو ذرات نقره، در این پژوهش به بررسی تأثیرات اسپند در تغییرات آنزیم‌های آنتی اکسیدان موش‌های نراز نژاد آلینو پرداخته شد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه به صورت تجربی بر روی ۳۲ سر موش نر از نژاد آلینو انجام شد. این حیوانات از انسیتو پاستور تهران خریداری شدند و به منظور آماده‌سازی برای آزمایش به مدت یک ماه در اطاق حیوانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان نگهداری شدند. حیوانات

یافته‌ها

مقایسه غلظت MDA گروه کنترل با سایر گروه‌های تیمار: سی روز پس از انجام آزمایش میانگین غلظت مالون دی آلدئید در گروه اول (Control) (Control) معادل $1/63 \text{ nmol/ml} \pm 1/63$ که با سایر گروه‌های تیمار مقایسه می‌شود. میانگین گروه دوم (Nan silver= 500 ppm Nanosilver= Ns) نشان داد میزان غلظت مالون دی آلدئید بعد از سی روز معادل $22/41 \pm 22/41$ که در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی‌داری را نشان می‌دهد ($p=0/00$). میانگین میزان غلظت مالون دی آلدئید بعد از سی روز در گروه سوم (Peganum harmala= Ph) معادل $5/33 \text{ nmol/ml} \pm 5/33$ است که در مقایسه با گروه کنترل افزایش نشان داده است. گروه چهارم (500ppm Nanosilver+Peganum harmala=Ns.Ph) میانگین غلظت مالون دی آلدئید معادل $1/041 \text{ nmol/ml} \pm 1/041$ که نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داده است. میزان $F=37/852$ و $P<0/001$ که از طریق تست ANOVA مشخص شد (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱: مقایسه غلظت مالون دی آلدئید (MDA) بین گروه کنترل و تیمار

گروه‌ها	تعداد	میانگین	انحراف معیار (SD)	انحراف استاندارد معنی‌داری (SE)	سطح
گروه ۱ (Control)	۸	۲۲/۴۱	۴/۶۲	۱/۶۳	
گروه ۲ (500Ns)	۸	۷۷/۱۲	۱۴/۶۱	۵/۱۷	
گروه ۳ (Ph)	۸	۳۶/۲۵	۱۵/۰۷	۵/۳۳	
گروه ۴ (Ns.Ph)	۸	۴۰/۴۱	۷/۹۴	۱/۰۴۱	

نتایج به دست آمده از تحلیل Descriptive و ANOVA مالون دی آلدئید: مقایسه غلظت مالون دی آلدئید گروه کنترل و سایر گروه‌های تیمار شده در این جدول p-value معادل صفر است و نشان دهنده به طور قوی معنی‌دار بودن اختلاف می‌باشد. انحراف معیار (SD=Standard deviation)

گروه ۲ و ۴ تا ۳۰ روز قبل از اولین تزریق تحت تیمار با عصاره اتانولی اسپند قرار گرفتند. به گروه کنترل برای حذف اثر ناشی از شوک $0/5$ سی سی آب مقطر تزریق شد. ۳۰ روز بعد از تیمار خونگیری انجام شد. در ضمن، خونگیری از قلب موش‌ها انجام می‌شود. برای اندازه‌گیری فعالیت آنزیم CAT سرم از روش Abei بر اساس میزان تجزیه شدن پر اکسید هیدروژن در طول موج 240 nm استفاده شد^(۱۶). فعالیت آنزیم گلوتاتیون پر اکسیداز گلوبول‌های قرمز به طور غیر مستقیم و از طریق واکنش جفت شده با آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز (GR) سنجیده شد. احیا گلوتاتیون اکسید حاصل از واکنش گلوتاتیون پر اکسیداز با مصرف NADPH و در حضور GR صورت می‌گیرد. در این واکنش اکسیداسیون NADPH به NADP^+ باعث کاهش جذب در طول موج 340 nm می‌گردد که متناسب با فعالیت GPx می‌باشد^(۱۵). میزان MDA سرم بر اساس روش Satoh اندازه گیری شد^(۱۶). در ضمن نانوذرات نقره با میانگین قطر 10 نانومتر و کروی شکل از شرکت نانونصب پارس تهیه شده است. شیوه تهیه این نانوذرات بر اساس احیای نیترات نقره و پوشش دهی آن با سیترات می‌باشد. با دستگاه X-RD(X-Ray Diffraction) نظر و شکل نانوذرات تأیید شد.

آنالیز آماری:

به منظور مقایسه تغییرات میزان آنزیم‌های CAT سرمی و GPx گلوبول قرمز در کل گروه‌های تیمار با یکدیگر بعد از اعمال تیمار، در غلظت‌های 500 ppm نانوسیلور از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شد. حد معنی‌دار بودن تفاوت بین نمونه‌ها ۱ درصد و ۵ درصد در نظر گرفته شد. طرح آماری استفاده شده در این تحقیق طرح کاملاً تصادفی است. تعداد تکرار نمونه‌ها ۸ راس موش نر در نظر گرفته شد. در ضمن، برای سنجش آماری دادها، از برنامه نرم افزاری SPSS15 استفاده می‌شود.

می شود. میانگین گروه دوم (500 ppm Nanosilver= Ns) نشان داد میزان فعالیت GPx بعد از سی روز معادل $2/93 \pm 0/60$ U/gHb است که در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان می دهد ($p=0/00$). میانگین فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز بعد از سی روز در گروه سوم (Peganum harmala=Ph) برابر $1/61 \pm 0/59$ U/gHb است که در مقایسه با گروه کنترل کاهش نشان داده است. در گروه چهارم (500 ppm Nanosilver+Peganum harmala=Ns.Ph) میانگین فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز معادل $0/36 \pm 0/57$ U/gHb که مشابه گروه کنترل است و تفاوت معنی داری مشاهده نشده است. میزان ($p>0/001$) و $F=8/897$ که از طریق تست ANOVA مشخص شد (نمودار شماره ۳).

جدول شماره ۳: مقایسه فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) بین

گروه کنترل و تیمار

معنی داری	سطح معنی داری (SE)	گروه ها			
		تعداد (N)	میانگین (Mean)	انحراف معیار (SD)	انحراف استاندارد (SE)
	۰/۹۰	۸	۹/۹۸	۲/۵۶	۰/۹۰
	۰/۰۰	۸	۷/۹۳	۱/۷۱	۰/۹۰
	۱/۶۱	۸	۶/۵۹	۴/۵۷	۰/۶۱
	۰/۵۷	۸	۸/۳۶	۱/۶۱	۰/۵۷

نتایج به دست آمده از تحلیل Descriptive و ANOVA گلوتاتیون پراکسیداز: مقایسه گلوتاتیون پراکسیداز گروه کنترل و سایر گروه های تیمار شده در این جدول p-value معادل صفر است و نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف تا حد زیاد است. انحراف معیار (SD=Standard deviation) است.

بحث

در بررسی حاضر از مقایسه سایر گروه ها با گروه کنترل می توان فهمید که گروه دریافت کننده نانو ذرات نقره از طریق تولید رادیکال آزاد سبب پراکسیداسیون لیپیدی و تولید مالون دی آلدئید

مقایسه فعالیت CAT گروه کنترل با سایر گروه های تیمار: سی روز پس از انجام آزمایش میانگین فعالیت کاتالاز در گروه اول (Control) معادل $85/72 \pm 7/80$ U/ml که با سایر گروه های تیمار مقایسه می شود. میانگین گروه دوم (500 ppm Nanosilver= Ns) کاتالاز بعد از سی روز معادل $2/32 \pm 0/49$ IU/ml است که در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان می دهد ($p=0/00$). میانگین میزان فعالیت کاتالاز بعد از سی روز در گروه سوم (Peganum harmala= Ph) معادل $56/78 \pm 10/63$ U/ml است که در مقایسه با گروه کنترل کاهش نشان داده است. در گروه چهارم (500 ppm Nanosilver+Peganum harmala=Ns.Ph) میانگین فعالیت کاتالاز معادل $86/79 \pm 14/14$ IU/ml که مشابه گروه کنترل است و تفاوت معنی داری مشاهده نشده است. میزان ($p>0/001$) و $F=16/757$ که از طریق تست ANOVA مشخص شد (جدول شماره ۲).

جدول شماره ۲: مقایسه فعالیت کاتالاز (CAT) بین گروه کنترل و تیمار

معنی داری	سطح معنی داری (SE)	گروه ها			
		تعداد (N)	میانگین (Mean)	انحراف معیار (SD)	انحراف استاندارد (SE)
	۷/۸۰	۸	۸۵/۷۲	۲۲/۰۷	۰/۹۰
	۰/۰۰	۸	۲۱/۳۲	۱/۴۰	۰/۴۹
	۱۰/۶۳	۸	۵۶/۷۸	۳۰/۰۵	۱/۶۱
	۱۴/۱۴	۸	۸۶/۷۹	۳۹/۹۸	۰/۵۷

نتایج به دست آمده از تحلیل Descriptive و ANOVA کاتالاز: مقایسه فعالیت کاتالاز گروه کنترل و سایر گروه های تیمار شده در این جدول p-value صفر است و نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف به میزان زیاد است. انحراف معیار (SD=Standard deviation) است.

مقایسه فعالیت GPx گروه کنترل با سایر گروه های تیمار: سی روز پس از انجام آزمایش میانگین فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در گروه اول (Control) معادل $9/98 \pm 0/90$ U/gHb که با سایر گروه های تیمار مقایسه

اسپند مورد استفاده برای موش‌های نر 20 mg/kg/day در سی روز است.

حقوقان توانسته‌اند با آزمایش‌های گوناگون، ساختار ترکیبی متفاوت بعضی از ذرات را شناسایی کنند. برخی از این مواد دارای قدرت خودسازی و یا تکثیر مجدد هستند و این ویژگی یکی از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین خواص مواد نانو به شمار می‌رود. Portney و Ozkan در سال ۲۰۰۵ نشان دادند هر چه قطر نانو ذرات نقره کوچک‌تر باشد نفوذ آن به سلول و اثرات مولکولی آن بر مکانیسم‌های داخل سلولی افزایش می‌یابد(۱۸). با توجه به تحقیقات انجام شده و تأثیر بهتر قطر کم نانوذرات نقره بر روی سلول در مطالعه حاضر از میانگین قطر 10 نانومتر و شکل کروی آن استفاده کردیم.

اخیراً گزارش‌هایی توسط Hussain و همکاران در سال ۲۰۰۵ بر روی سمیت نانو ذرات نقره انجام شده که در آن میتوکندری به عنوان هدف اولیه نانو ذرات نقره در سلول‌های کبد موش صحرایی به حساب می‌آید(۱۹). علاوه بر این گزارش شده که نانو ذرات نقره از طریق تولید ROS و کاهش گلوتاتیون در کبد موش صحرایی عمل می‌کند. Hansen and Nagley در سال ۲۰۰۳ نشان دادند رادیکال‌های آزاد حاصل از مکانیسم کاتالیستی نانو ذرات نقره از طریق فرآیند پراکسیداسیون لیپیدی به اسیدهای چرب اشباع نشده موجود در فسفولیپیدهای غشاء آسیب می‌رساند و موجب پیر شدن سلول یا آپوپتوز می‌شود(۲۰). در مطالعه حاضر مشابه دو پژوهش قبل با اندازه‌گیری میزان MDA و افزایش آن در گروه ۲ دریافت کننده نانو ذرات نقره در مقایسه با سه گروه دیگر به این نتیجه رسیدیم که نانو ذات نقره باعث ایجاد پراکسیداسیون لیپیدی می‌شود. همچنین با اندازه‌گیری CAT و GPx متوجه شدیم که نانو ذرات نقره در مقایسه با گروه کنترل قادر فعالیت آنتی‌اکسیدانی می‌باشد. از طرفی Sriram و همکاران (۲۰۱۰) نشان دادند که رادیکال آزاد حاصل از نانو ذرات نقره، این رادیکال

می‌شود. در واقع نانو ذرات نقره باعث افزایش MDA سرم و کاهش CAT سرم و گلبول‌های قرمز می‌شود. گروه دریافت کننده اسپند در مقایسه با گروه کنترل مشابه گروه دریافت کننده نانو ذرات نقره است. اما گروه دریافت کننده عصاره اتانولی اسپند در مقابل گروه نانوذرات نقره باعث کاهش MDA سرم و افزایش CAT سرم و گلبول‌های قرمز شد. گروه ۴ که ترکیب نانوذرات نقره و عصاره اتانولی اسپند است در مقایسه با گروه تیمار شده توسط نانوذرات نقره سبب کاهش MDA سرم و افزایش CAT سرم و گلبول‌های قرمز شد. از طرفی در هنگام تزریق، سرسرنگ‌ها از جنس نقره می‌باشند و در جراحی‌ها و دندانپزشکی امکان آزاد شدن این نانوذرات به فرم تزریقی در خون وجود دارد لذا اگر با ماده‌ای خصوصاً عصاره‌های گیاهی به طور خوراکی قبل از عمل جراحی بدن ذخایر آنتی‌اکسیدانیش تأمین باشد از اثرات مضر این نانو ذرات جلوگیری می‌شود. به همین دلیل در این تحقیق از اسپند به طور خوراکی و نانو ذرات به طور تزریقی استفاده شده است. در مطالعه حاضر به بررسی تأثیرات آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی اسپند به میزان 20 mg/kg/day در مدت سی روز بر روی موش‌های تیمار شده با نانو ذرات نقره پرداخته است. در پژوهشی که توسط Moshera and Seliem در سال ۲۰۱۱ بر روی جوجه‌ها انجام شد تأثیر دانه‌های اسپند بر روی استرس گرمایی (heat stressed) بررسی شد. در این تحقیق تأثیر استرس گرمایی مشابه با تزریق نانو ذرات نقره در مطالعه حاضر می‌باشد. این محققین نشان دادند که اسپند باعث کاهش اثرات اکسایشی گرمایش شده است در واقع استرس گرمایی همانند نانو ذرات نقره عمل می‌کند و باعث تولید رادیکال آزاد و افزایش مالون دی آلدید می‌شوند. اما اسپند برخلاف نانوذرات نقره باعث کاهش مالون دی آلدید و افزایش آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان می‌شود. میزان اسپند استفاده شده برای جوجه‌ها $2/5 \text{ g/kg}$ بوده است(۱۷). میزان

مالون دی آلدئید سرم، کاتالاز سرم و گلوتاتیون پر اکسیداز گلوبول‌های قرمز پرداخته شد. موش‌های تیمار شده با نانو ذرات نقره افزایش معنی‌داری در میزان مالون دی آلدئید سرم و کاهش معنی‌داری را در میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز سرم و گلوتاتیون پراکسیداز گلوبول‌های قرمز نشان دادند ($p < 0.001$). در واقع می‌توان از ترکیب این دو پژوهش به این نتیجه رسید که نانو ذرات نقره از طریق تولید رادیکال آزاد باعث تخریب سلول‌های کبدی و افزایش میزان آنزیم ALT در خون می‌شود.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که عصاره اتانولی اسپند از طریق افزایش معنی‌دار آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و کاهش مالون دی آلدئید باعث از بین بردن رادیکال‌های آزاد حاصل از نانو ذرات نقره می‌شود. در واقع از عصاره اتانولی اسپند می‌توان یک نانو ترکیب گیاهی ساخت که باعث کاهش عوارض نانو ذرات نقره می‌شود.

قادرند مسیر داخلی آپوپتوز را فعال کنند^(۸). در تحقیقی که توسط Naghsh و همکاران در سال ۱۳۹۰ انجام شد، نشان داده شد بعد از ۵ روز پی‌در پی تزریق با نانو ذرات نقره می‌توان فعالیت آنزیم کبدی ALT و گلوبول سفید تغییر یافتد به طوری که بیشترین اثر نانو سیلور بر گلوبول‌های سفید رت‌ها در غلظت ۴۰۰ ppm بعد ۱۲ روز از آخرین تزریق بود. همچنین بیشترین اثر نانو سیلور بر آنزیم کبدی ALT رت‌ها در غلظت ۵۰ ppm بعد ۳ روز از آخرین تزریق بود^(۲۱).

البته نانو ذرات نقره به کار رفته در تحقیق نقش و همکاران به قطر ۴ نانومتری و کروی بوده است اما در پژوهش حاضر ابتدا تزریق نانو ذرات نقره ۵۰۰ ppm و بعد از سی روز تیمار خونگیری به طور مستقیم از قلب موش‌های سوری انجام شد. ضمناً نانو ذرات نقره به قطر ۱۰ نانومتری و کروی بود. اما در تحقیق حاضر به دلیل پی بردن به این موضوع که نانو ذرات نقره چگونه باعث تغییر در میزان آنزیم‌های کبدی شده به بررسی غلظت

References

1. Antolovic H, Penzler P, Patsalides E, Donald S, Robards K. Methods for Testing Antioxidant Activity. *The Analyst* 2002; 127: 183-198.
2. Baynes J. Role of Oxidative Stress in Development of Complications in Diabetes. *Diabetes* 1991; 40: 405-412.
3. Christoforidis G, Frank J, Lindau M, Lockman G, Jones C, Petricoin E, et al. Nanoparticles: potential biomarker harvesters. *Curr Opin Chem Biol* 2006; 10: 56-61.
4. Nordberg G, Gerhardsson L. Silver. In seiler HG, Sigel HSigel A, editors. *Handbook on toxicity of inorganic Compounds* New York: Marcel Dekker1988; 24: 619.
5. Hussain S, Hess K., Gearhart J, Geiss K, Schlager J. In vitro toxicity of nanoparticles in BRL 3A rat liver cells. *Toxicology in Vitro* 2005; 19(7): 975-983.
6. Tang J, Xi T. Status of biological evaluation on silver nanoparticles. *Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi* 2008; 25(4): 61-958.
7. Ghorbanzadeh V, Moshtaghian J, Ebadi A.H. Influence of Nano-Silver on Graffian Follicles via Intraperitoneal Injection in Rats. *Middle-East Journal of Scientific Research* 2011; 8(1): 228-230.
8. Sriram M, Kanth S, Kalishwaralal K, Gurunathan S. Antitumor activity of silver nanoparticles in Dalton's lymphoma ascites tumor model. *Int J Nanomedicine* 2010; 5: 753-762.
9. Pryor W, Stanley J, Bleir E. Autoxidation of

- polyunsaturated fatty acids. *Lipids* 1976; 2: 370-379.
10. Mates J, Perez-Gomez C, Decastro I. Antioxidant enzymes and human diseases. *Clin Biochem* 1999; 32: 595-603.
11. Michiels C, Raes M, Toussaint O, Remacle J. Importance of Se-glutathione peroxidase, catalase, and Cu/Zn-SOD for cell cervical against oxidative stress. *Free Radic Biol Med* 1994; 17: 48-235.
12. Dringen R. Metabolism and functions of glutathione in brain. *Prog Neurobiol* 2000; 62: 71-649.
13. Mahmoudian M, Jalilpour H, Salehian P. Toxicity of *Peganum harmala*: Review and a Case Report. *Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics* 2002; 11: 1-4.
14. Aeb H. Catalase in vitro. *Methods Enzymology* 1984; 105: 121-126.
15. Paglia D, Valentine W. Studies on the quantitative and qualitative characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. *J Lab Clin Med* 1967; 70(1): 9-158.
16. Satoh K. Serum lipid peroxidation in cerebrovascular disorders determined by a new colorimetric method. *Clin Chim Acta* 1978; 90: 37-43.
17. Moshera M, Seliem E. Effect of harmful seeds on heat stressed chickens. *Journal of American Science* 2011; 7(12): 606-610.
18. Portney N, Ozkan M. Nano-oncology: Drug delivery, imaging, and sensing. *Anal Bioanal Chem* 2006; 384(3): 30-620.
19. Hansen T, Nagley P. A multifunctional cog in the life and death machine. *Sci STKE* 2003; 31: 1-4.
20. Hussain S, Hess K, Gearhart J, Geiss K, Schlager J. In vitro toxicity of nanoparticles in BRL 3A rat liver cells. *Toxicology in Vitro* 2005; 19(7): 975-983.
21. Naghsh N, Aqababa H, Amirkhani dehkordi S. The effect of nanosilver particles on alanine aminotransferase (ALT) activity and white blood cells level in male wistar rats, in vivo condition. *Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS)* 2012; 13(9): 1-7.

Archive & SID