

بررسی آگاهی و نگرش مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی درباره مصرف نمک

سید ابوالحسن نقیبی^۱

رقیه یحیی زاده^۲

جمشید یزدانی چراتی^۳

چکیده

سابقه و هدف: مصرف زیاد نمک با ابتلاء به بیماری‌های قلبی- عروقی و کلیوی و عوارض دیگر مرتبط است با توجه به اهمیت نقش آگاهی و نگرش در مصرف نمک، هدف این مطالعه بررسی میزان آگاهی، نگرش مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ساری درباره مصرف نمک می‌باشد.

مواد و روش ها: روش مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی و تحلیلی می‌باشد. حجم نمونه شامل ۴۱۶ نفر مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ساری بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای تصادفی در ۵ مرکز بهداشتی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که توسط فرد آموزش دیده اطلاعات جمع‌آوری شد و داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد میانگین نمره آگاهی ۵۳/۶۷ درصد و عملکرد ۴۷/۴ درصد و همچنین میانگین میزان نمک مصرفی خانوار ۱۲/۸ گرم بوده است. در این بررسی بین میزان آگاهی با سن و جنس ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشده است ($p=0.05$). بین نگرش با تأهی رابطه آماری معنی دار مشاهده شده است ($p=0.01$). اما بین نگرش با جنس رابطه معنی دار آماری مشاهده نشد.

استنتاج: با توجه به بالا بودن مصرف نمک و همچنین آگاهی، نگرش و عملکرد نامناسب در نمونه‌های پژوهش، لزوم آموزش بهداشت و اصلاح الگوی مصرف نمک باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: نمک، بیماری قلبی و عروقی، بیماری کلیوی

مقدمه

صرف کمتر میوه و سبزی، افزایش استفاده از گوشت و اخیراً غذایی صنعتی منجر به مصرف نمک بالاتر از حد توصیه در گروههای جمعیتی مختلف شده است^(۱) نمک به عنوان منبع تأمین کننده یون‌های ضروری بدن

تجذیه یکی از عوامل مؤثر بر سلامتی و از مهم‌ترین عوامل محیطی است که برای بهبود سلامتی (رشد، نمو، تکامل ...) به صورت متنوع، متناسب و معادل باید مورد توجه قرار گیرد. تغییر در الگوهای غذایی با

مؤلف مسئول: سید ابوالحسن نقیبی- ساری: کیلومتر ۱۸ جاده خزر آباد، مجتمع دانشگاهی پامبر اعظم(ص)، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشجویی دکترای آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۱. دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۲. دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۳. گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۴. تاریخ دریافت: ۹۰/۱۱/۲۹ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۹۱/۱۱/۲۰ تاریخ تصویب: ۹۱/۶/۸

نمک بیشتر از حد پیامدهایی مانند تجمع کلسترول در انتیمای شرایین بزرگ را دارد. برخی محققان مصرف زیاد نمک طعام را یکی از عوامل مهم در ایجاد هیپرتانسیون شریانی دانسته‌اند^(۵). براساس تحقیق عزیزی و همکاران (۱۳۸۴) از نظر عملکرد $90/3$ درصد خانوارهای ایرانی از نمک ید دار $9/8$ درصد از نمک معمولی استفاده می‌کردند تنها 13 درصد نمک را سر سفره به غذا اضافه می‌کردند و در مجموع $83/8$ درصد زنان در رابطه با شرایط مطلوب نگهداری از نمک ید دار در منزل عملکرد متوسط داشتند^(۳).

بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که تغییرات زیادی در زمینه الگوی مصرف نمک در بین جمعیت‌های مختلف وجود دارد^(۲). از آن‌جا که بیماری‌های قلبی و عروقی جزء اولویت‌های اساسی است به‌طوری که در کشور ما به عنوان اولین عامل مرگ و میر محاسب می‌گردد^(۶) بنابراین اصلاح الگوی غذایی جامعه در این بخش بسیار حائز اهمیت است. از طرفی بررسی آگاهی، نگرش و الگوی مصرف نمک در مناطق مختلف یک امر ضروری جهت برنامه‌ریزی و تعیین استراتژی‌های مداخله از جمله برنامه‌های آموزش سلامت می‌باشد لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی، نگرش مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ساری درباره مصرف نمک می‌باشد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه به صورت مقطعی- توصیفی و تحلیلی می‌باشد که بر روی افراد مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی- درمانی شهر ساری انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از مطالعات مشابه قبلی 416 تعیین شد. روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای بوده، از 15 مرکز بهداشتی- درمانی موجود سطح شهر ساری به طور تصادفی 5 مرکز بهداشتی- درمانی از مناطق مختلف انتخاب شد نمونه‌ها به صورت تصادفی ساده از مراجعین به مراکز فوق و از هر مرکز بهداشتی- درمانی 85 نمونه، جمع آوری

(سدیم و کلر) می‌باشد که در تنظیم هموستانز و آب بدن، تعیین حجم خون کنترل ماهیچه‌ها و فعالیت‌های عصبی تنظیم درجه حرارت بدن نقش دارد که 78 درصد آن از غذاهای فرایند شده $12-10$ درصد در غذاها $15-10$ درصد آن از طریق نمک اضافه شده به غذا تأمین می‌شود^(۲). عدم تعادل در مصرف نمک به صورت مصرف بیش از حد نیاز ممکن است با فشارخون بالا افزایش خطر سکته مغزی و بیماری قلبی- عروقی بیماری کلیوی، افزایش خطر چاقی، پوکی استخوان، شکل گیری سنگ‌های کلیوی، سرطان معده و... همراه باشد. نمک ماده‌ای مرکب از کلر (60 درصد) و سدیم (40 درصد) می‌باشد که از انواع نمک سنگ نمک، نمک سبزیجات، نمک دریایی، نمک طعام به دست می‌آید^(۳-۱). نمک نه تنها در طیعت بلکه در صنایع غذایی نیز برای طعم دهنده‌گی، خاصیت نگهداری و فرایند جداسازی کنترل تخمیر، بهبود رنگ و بافت محصول به عنوان حامل افزودنی به کار می‌رود که ارزیابی مقدار نمک مورد نیاز بدن در بعضی شرایط مانند شدت و مقدار فعالیت فیزیکی و مقدار و ترکیب عرق بدن، شرایط محیطی به ویژه درجه حرارت و میزان سازش بدن و بالاخره عوامل ژنتیک بستگی دارد در امریکا میزان نمک دریافتی $10-12$ گرم می‌باشد (که 3 گرم آن در مواد غذایی، 3 گرم سر میز غذا و $6-4$ گرم در پروسه‌های صنعتی در صنایع به آن اضافه می‌شود)^(۴). میزان دریافت نمک به فرهنگ و قانون، عادات غذایی، سطح سواد هر کشور، ناحیه و منطقه بستگی دارد شهرنشینی تأثیر زیادی بر عادات غذایی دارد. استفاده از فست فودها (کالباس، سوسیس، مرغ سوخاری و...) که حاوی مقادیر زیاد نمک می‌باشد به طور مثال یک بش پیترای حاوی حدود یک گرم نمک می‌باشد. با توجه به مصرف استاندارد نمک که (6 گرم) است در ایران این میزان $10-15$ گرم (گاهی تا 15 گرم) در روز گزارش شده است^(۲).

در مطالعه جعفر پور و همکاران (۱۳۹۱) مصرف

نشان داد میانگین آگاهی نمونه های پژوهش ۵۳/۶۷ درصد و میانگین نگرش ۳۷/۶۹ درصد و میانگین t-test آنان ۴۷/۴۷ درصد بود. بر اساس آزمون t-test در گروه های جنسی و سنی متفاوت از نظر سطح آگاهی، نگرش، عملکرد ($p < 0.05$) اختلاف معنی داری وجود نداشت. ۷۶/۳ درصد شرکت کنندگان دارای تحصیلات دانشگاهی، در مورد نمک از آگاهی متوسط برخوردار بودند و افراد دارای تحصیلات راهنمایی از میزان آگاهی ضعیفی برخوردار بودند.

بر اساس آزمون همبستگی پیرسون بین آگاهی و سطح تحصیلات ($p = 0.137$) رابطه معنی داری وجود ندارد. ۵/۵۳ درصد افراد مخالف این بودند که فقط افراد سالخورده باید نگران مصرف نمک باشند. از این گروه مخالفان ۴۸/۶ درصد دارای تحصیلات دبیرستانی و ۳۹/۶ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. میانگین میزان آگاهی افراد از راه های ورود نمک به بدن ۵۲/۲ درصد می باشد. میانگین میزان آگاهی افراد از راه های ورود نمک به بدن بر حسب BMI نشان می دهد که آگاهی افراد با BMI متفاوت با هم اختلاف معنی داری نداشته است (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱: توصیف آگاهی افراد از راه های ورود نمک به بدن در افراد مورد پژوهش بر حسب BMI

آگاهی	۵۳/۳۹	۵۲/۲۴	۵۳/۳۳	تعداد	۸	۱۷۶	۱۵۰	۸۲	آفرازه وزن
				آگاهی					نرمال

براساس نتایج بررسی وضعیت آگاهی و نگرش و عملکرد نمونه های پژوهش بر حسب BMI، میانگین نمره میزان آگاهی افراد با BMI متفاوت با هم اختلاف معنی داری نداشته است میزان نگرش و عملکرد نیز در افراد کم وزن بیشتر بوده است.

نتایج بررسی در مورد وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد نمونه های پژوهش بر حسب تأهیل نشان می دهد. ۷۵/۳ درصد افراد مجرد محدود متاهیلین از آگاهی

گردید. ابزار جمع آوری در این مطالعه پرسشنامه با ۳۰ سؤال می باشد سؤالات در ۴ حیطه، (اطلاعات دموگرافیک شامل: سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، شغل، BMI بعد خانوار، سابقه ابتلاء به بیماری (فشارخون، قلبی- عروقی و کلیوی)، آگاهی، نگرش و عملکرد طراحی شده پرسشنامه توسط پژوهشگر و استاد و متخصصین مربوطه در دانشگاه تهیه و تنظیم شد. روایی (Validit) به روش روایی (Reliability) و پایایی (Contact Validity) به روش کرونباخ و ICC (ضریب خود همبستگی) سنجیده شد. پس از اخذ مجوزهای لازم از دانشگاه علوم پزشکی مازندران و کسب رضایت شفاهی و اعلام محرومانه بودن اطلاعات و اختیاری بودن شرکت در پژوهش، افراد مورد مطالعه پرسشنامه را در مدت زمان ۳۰ دقیقه در حضور پژوهشگر تکمیل نمودند پس از جمع آوری داده ها، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از نرم افزار SPSS16 و برای ترسیم نمودارها از نرم افزار Microsoft excel استفاده می شود و برای دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات و داده های گردآوری شده با طیف لیکرت کمی گردید. در سطح توصیفی از جداول یک بعدی، فراوانی، درصد، انحراف معیار و ترسیم نمودار و در سطح استباطی از آزمون t-test، همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شده است.

یافته ها

میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه $33/07 \pm 9/68$ بود. از نظر جنس، ۳۴۲ نفر زن و ۷۴ نفر مرد در این مطالعه شرکت داشتند. از نظر وضعیت تحصیل، ۴۲/۷ درصد افراد شرکت کننده دارای تحصیلات دانشگاهی، ۵/۴۲ درصد دارای تحصیلات دبیرستانی، ۹/۲ درصد دارای تحصیلات راهنمایی و ۰/۶ درصد افراد بی سواد بودند. نتایج بررسی در مورد وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد نمونه های پژوهش

جدول شماره ۳: توصیف آگاهی، نگرش و عملکرد در نمونه های پژوهش بر حسب ابتلاء به بیماری و غیر بیمار

بیماران فشارخون بالا	بیماران قلبی-عروقی	بیماران کلیوی	افراد سالم
۵۳/۶۱	۵۴/۱۱	۵۹/۰۵	۵۲/۲۳
۳۷/۶۵	۴۰/۲۶	۳۵/۵۷	۲۸/۴۷
۴۷/۵۱	۵۰/۵۱	۴۷/۱۳	۴۳/۴۹

بحث

در بررسی کامران و همکاران (۱۳۸۹)، در مورد آگاهی نگرش عملکرد نسبت به مصرف نمک در افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشتی- درمانی اردبیل میزان آگاهی ۷/۵ از ۱۶ برآورد شد که آگاهی در آن متوسط رو به پایین ارزیابی گردید.^(۷).

در مطالعه مطلق و همکاران (۱۳۹۱) در مورد بررسی سطح نمک دریافتی در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی یزد سال ۱۳۸۹، بیش از نیمی از افراد از حداقل میزان نمک نا آگاه بودند^(۱) که با نتایج این مطالعه مشابه دارد ولی در بررسی Grimes و همکاران (۲۰۰۹) ۷۳ درصد از شرکت کنندگان از حداقل میزان مصرف نمک نا آگاه بودند که میزان آن، از این مطالعه بیشتر بوده است.^(۸).

در بررسی کامران (۱۳۸۸) ۸۰ درصد افراد سر سفره غذا از نمک استفاده می کردند.^(۷) در مطالعه عزیزی و همکاران (۱۳۸۴)، در مورد آگاهی و نگرش زنان متأهل تحت پوشش عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه در زمینه مصرف نمک، ۱۳ درصد زنان نمک را سر سفره به غذا اضافه می کردند.^(۹).

در مطالعه مطلق و همکاران ۱۳/۵ درصد از نمونه ها همه روزهای هفت و ۷/۴ درصد بیشتر روزهای هفتگی سفره به غذا اضافه می کردند^(۱) در بررسی عاقلی و همکاران (۱۳۸۵) ۵۵/۲ درصد از زنان شهر رشت به غذا نمک اضافه می کردند.^(۹) در مطالعه باریکانی و همکاران (۱۳۸۹) ۲۷/۳ درصد زنان بالای ۳۰ سال شهر قزوین سر سفره نمک به غذا اضافه می کردند^(۱۰) در مطالعه vandevijvere و همکاران (۲۰۱۰) در بلژیک

متوسط برخوردار بودند. با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف معنی داری به لحاظ میانگین نمره آگاهی در گروه های مشخص کننده وضعیت تأهل وجود نداشت، اما بر اساس همین آزمون تفاوت معنی داری از نظر میزان نگرش با تأهل وجود داشت ($p=0.19$). در این بررسی افراد با فشارخون بالا دارای میانگین نمره آگاهی ضعیف تری بودند و همچنین ۷۶/۴ درصد افراد سالم از بیشترین آگاهی متوسط و ۳۶/۸ درصد افراد مبتلا به بیماری قلبی- عروقی از بیشترین آگاهی خوب برخوردار بودند.

با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف معنی داری از نظر میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد در بین بیماران وجود نداشت ($p>0.05$) بر اساس جدول شماره ۳ بیشترین میزان آگاهی به افراد مبتلا به بیماری قلبی- عروقی و بیشترین میزان نگرش و عملکرد به بیماران کلیوی اختصاص داشت. ۵۰/۸ درصد افراد سر سفره غذا از نمک استفاده می کنند و ۸۰/۵ درصد برای خوردن میوه نمک می زند. ۵/۸ درصد افراد غذا را شور، ۳۸/۳ درصد افراد غذا را کم نمک مصرف می کنند. براساس نتایج به دست آمده از این بررسی میانگین میزان نمکی که هر فرد به صورت روزانه دریافت می نماید ۱۲/۱۸ گرم بود. با استفاده از آزمون t-test این میزان مصرف نمک در مقایسه با میزان استاندارد نمک مورد نیاز بدن (۶ گرم) تفاوت معنی داری داشت ($p<0.05$ ، $d=0.5$) از محدودیت های این مطالعه کمبود بررسی های مشابه جهت مقایسه داده ها و بحث بیشتر در این مورد می باشد.

جدول شماره ۲: توصیف آگاهی، نگرش و عملکرد در افراد مورد

پژوهش بر حسب BMI	BMI	افراد کم وزن	نرمال	افراد اضافه وزن	چاق
آگاهی	۵۴	۵۲/۸	۵۴/۱۶	۵۴	۵۴
نگرش	۳۹/۱	۳۶/۷	۳۷/۵	۴۳	۴۳
عملکرد	۴۵/۹	۴۷/۳	۴۷/۹	۵۲/۵	۵۴

نتایج آن مطالعات با نتایج این مطالعه مشابهت دارد، اگرچه عمدۀ مطالعات میزان نمک دریافی را بیش از حد توصیه شده سازمان بهداشت جهانی گزارش کرده‌اند.

در پایان می‌توان نتیجه‌گیری کرد که با توجه به مصرف نمک زیاد و میانگین نمره آگاهی و نگرش کم در نمونه‌های پژوهش و همچنین عوارض ناشی از مصرف زیاد نمک بر سلامت انسان، لزوم برنامه‌ریزی و انجام مداخلات آموزشی برای اصلاح الگوی مصرف نمک به منظور ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی و ... یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

سپاسگزاری

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی می‌باشد که با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است بدین وسیله لازم می‌دانم از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و همچنین از همکاری پرسنل محترم مراکز بهداشتی - درمانی، تقدیر و تشکر نمایم.

References

- Motlagh Z, Mazloomy S, MozaffariKhosravi M, Morowatisharifabad M, Askarshahi H. Salt intake among women referred to medical health centers, Yazd, Iran, 2011. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci; 19(4): 550-560. (Persian)
- Sedaghet S et al, Evaluation of the impact of social marketing approach based on education to reduce salt intake in female employees Welfare Administration in 2010 in Sari city, Mazandaran University of Medical Sciences, Faculty of Health.
- Azizi A, Amirian F, Amirian M. Effects of Knowledge, Attitude and Practice of Married Women with Community Oriented Medical

۱۴/۴۳ درصد از زنان هنگام صرف غذا نمک اضافه می‌کردند(۱۱). از آن جایی که تغییرات زیادی در زمینه اضافه کردن نمک در سفره به غذا در بین جمعیت‌های مختلف داخل کشور و خارج وجود دارد این تفاوت نتایج مطالعات به ذائقه‌های متفاوت مردم و گرایش به طعم مزه شور مربوط می‌شود.

در بررسی صداقت و همکاران در مورد مصرف نمک در کارمندان زن اداره بهزیستی ساری در سال ۱۳۸۹ میزان نمک مصرفی $9/21$ گرم در روز برآورد شد(۲). در مطالعه مطلق و همکاران (۱۳۹۱) $44/9$ درصد از زنان ۵ الی 10 گرم در روز و 51 درصد بیشتر از 10 گرم در روز نمک دریافت می‌کردند. به طور کل افراد مورد مطالعه با میانگین سنی $29/91 \pm 6/75$ سال به طور متوسط $2/97 \pm 10/09$ گرم نمک در روز مصرف می‌کردند(۱).

رفیعی و همکاران(۱۳۸۷) میزان نمک دریافی در زنان شهر اصفهان را $9/6 \pm 2/9$ گرم گزارش نمودند(۱۲) در مطالعه Ribic و همکاران (۲۰۱۰) در زنان اسلونیایی میزان نمک مصرفی $2/5 \pm 10/4$ گرم بوده است(۱۳).

Education in City of Kermanshah City on Iodized Salt Consumption (2004). Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2008; 10(3): 205-210 (Persian).

4. Tajik mahla and Associates, the amount of salt in food products Semnan 2004 -2009 and comparison with standards, Journal of Nursing Midwifery Relaxation V(2): 52-56.

5. Jafarpur Mukhtar and colleagues, the effects of excessive intake of sodium chloride on the wall structure of large arteries, Journal of Laboratory Medicine 2012; 16(1): 33-37.

6. Books medical textbook of social preventive Volume 4, GE Park, translation doctor

- shojaiy, Second ed.
7. Kamran Aziz and colleagues, examined knowledge, attitude towards the consumption of salt in people referred to the Health Center School of Nursing and Midwifery Policy Journal, Year 2010
8. Grimes CA, Riddell LJ, Nowson CA. Consumer knowledge and attitudes to salt intake and labelled salt information. *Appetite* 2009; 53(2): 189-194.
9. Agheli N, Assefzadeh S, Rajabi M, Ghoddousi A. Study of calories and macronutrients intake in people of Rasht and Qazvin. *J Qazvin Univ Med Sci* 2006; 10(1): 24-30 (Persian).
10. Barikani A, Saeedi F. Prevalence of hypertension among women aged 30+ in Minoodar region of Qazvin in 2009. *J Qazvin Univ Med Sci* 2010; 14(1): 41-48 (Persian).
11. Vandevijvere S, De Keyzer W, Chapelle JP, Jeanne D, Mouillet G, Huybrechts I, et al. Estimate of total salt intake in two regions of Belgium through analysis of sodium in 24-h urine samples. *Eur J Clin Nutr* 2010; 64(11): 1260- 1265.
12. Rafiei M, Boshtam M, Sarraf-Zadegan N, Seirafian Sh. The relation between salt intake and blood pressureamong Iranians. *Kuwait Med J* 2008; 40(3): 191-195 (Persian).
13. Ribic CH, Zakotnik JM, Vertnik L, Vugnati M, Cappuccio FP. Salt intake of the Slovene population assessed by 24 h urinary sodium excretion. *Public Health Nutr* 2010; 13(11): 1803-1809.