

ضروری بر پروپوتوکها و نقش آنها در مقابله با سرطان

فرزانه بنیادی^۱

امیر توکمچی^۲

هادی محب علیان^۳

چکیده

پروپوتوکها میکروارگانیسم‌های زنده و مفیدی هستند که در صورت مصرف در انسان یا حیوان و با اثر بر فلور میکروبی بدن باعث بروز اثرات مفیدی بر سلامتی می‌شوند. امروزه پروپوتوکها به عنوان عاملی برای پیشگیری از ابتلاء به بسیاری از بیماری‌های عغونی و سرطانی شناخته شده‌اند. خاصیت ضد کارسینوژنیک پروپوتوکها با خنثی‌سازی مسمومیت موادی که باعث آسیب‌های ژنی می‌گردد، صورت می‌گیرد. هدف از مطالعه حاضر، مرور نظاممندی بر مطالعات گذشته در بررسی اثرات مثبت پروپوتوکها بر سلامتی و ارتباط آن‌ها با سرطان بود. مقالات مرتبط با موضوع در پایگاه‌های Springer، Science Direct و Google Scholar به زبان انگلیسی جستجو و کارآزمایی‌های بالینی و مقالات مژده سیستماتیک که اثرات پروپوتوکها را در پیشگیری و درمان سرطان بررسی کرده بودند، وارد مطالعه شدند. از نظر شاخص‌های مورد استفاده، نوع میزان و شرایط آزمایش تفاوت‌هایی در مقالات مشاهده شد. نتایج تحقیقات حاکی از آن بود که باکتری‌ها و مخمرهای پروپوتوک می‌توانند سمیت حاصل از سرطان‌ها را از بین بزند و باعث القای مرگ سلول‌های سرطانی در شرایط آزمایشگاهی شوند. همچنین مصرف پروپوتوکها سبب کاهش خطر ابتلاء به سرطان، تقویت سیستم ایمنی و مبارزه با عوامل سرطان‌زا می‌گردد. با وجود شواهد قابل قبول در مورد خواص ضد سرطانی آن‌ها، مطالعات در مورد انسان محدود است؛ بنابراین به برنامه‌ریزی‌هایی برای مطالعات بالینی دقیق در مورد انسان نیاز می‌باشد تا بتوان از اطلاعات به دست آمده جهت درمان استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: پروپوتوکها، سرطان، سیستم ایمنی، درمان

منظور استفاده می‌شوند. از مخمرهای نیز ساکارومیسین سروزیریه، ساکارومیسین بولاردی و کاندیدا/ایتوولايسرا را می‌توان به عنوان پروپوتوک نام برد. بیشتر باکتری‌های لاکتوبراسیلوس و بیفیلوباكتریوم بی خطر تشخیص داده شده‌اند و به جز استرپتوكوکوس و انتروکوکوس، سایر باکتری‌های مولد اسید لاکتیک به ندرت برای انسان و حیوان بیماری‌زا هستند و کاربرد آن‌ها از دیرباز در تهیه محصولات غذایی بدون ایجاد اثرات سوء به اثبات رسیده است (۳). شواهد نشان داده‌اند که پروپوتوکها با تأثیر بر آنزیم‌های گوارشی حیوانات و انسان‌ها، مهار عوامل سرطان‌زا در داخل بدن و شرایط آزمایشگاهی، سرکوب لوسیون‌ها و ترکیبات الکا کننده

مقدمه

پروپوتوکها میکروارگانیسم‌های زنده و مفیدی هستند که در صورت مصرف در انسان یا حیوان و با اثر بر فلور میکروبی بدن، باعث بروز اثرات مفیدی بر سلامتی می‌شوند. بیشتر پروپوتوکها متعلق به گروه بزرگی از باکتری‌های اصلی فلور میکروبی روده انسان می‌باشند و در آن‌جا زندگی همسفرگی بی‌ضرری دارند (۲، ۱). معمول‌ترین میکروارگانیسم‌های پروپوتوکی به دو گروه باکتری‌ها و قارچ‌ها تقسیم می‌شوند. بعضی از این میکروارگانیسم‌ها سویه‌های انتخابی باکتری‌های لاکتوبراسیلوس و بیفیلوباكتریوم هستند؛ گرچه گونه‌هایی از انتروکوکوس، استرپتوكوکوس و اشرشیاکلای نیز برای این

E-mail: farzane.bonyadi@yahoo.com

مؤلف مسئول: فرزانه بنیادی - ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی

۱. کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

۲. استادیار، گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی، پژوهشکده آرتیما و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

۳. استادیار، گروه ایمونولوژی دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۲/۱۲/۶ تاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۱/۳۱

بیماری‌زا و مضر شناخته شده‌اند؛ در حالی که این شناخت درست نمی‌باشد و اجرام بسیار بیشتری یافت می‌شوند که مثل پریوپوتیک‌ها در زندگی انسان مفید هستند^(۷). در سال ۱۹۸۰ در ژاپن غذاهای فعال در سوپرمارکت‌ها عرضه گردید. این غذاها تحت عنوان غذاهای FOSHU (Foods for specified health use) نامیده می‌شدند. Fuller (به نقل از Austin و Irianto) نیز در سال ۱۹۸۷ پریوپوتیک‌ها را مکمل‌های غذایی نامید^(۸).

پریوپوتیک چیست؟

پریوپوتیک‌ها عبارتند از مکمل‌های غذایی میکروبی زنده که با تولید ترکیبات مهاری و ممانعت کننده، رقابت با عوامل پاتوژنی برای مواد شیمیایی و مکان‌های اتصال، تحریک و تنظیم فعالیت سیستم ایمنی و بهبود تعادل میکروبی روده، اثرات سودمندی بر میزبان دارند^(۹-۱۱). تعریف پریوپوتیک همواره در طول زمان در حال تغییر و تکمیل شدن بوده است. در ابتدا آن‌ها را به عنوان نوعی ماده میکروبی تعریف کردند که سبب تحریک رشد میکرووار گانیسم‌ها می‌شوند^(۱۲). طبق Fuller، پریوپوتیک‌ها باید دارای اثرات سودمندی بر بدن میزبان باشند و بتوانند در لوله گوارش میزبان زندگی کنند و برای مدت زمان طولانی ادامه حیات دهند. امروزه پریوپوتیک‌ها نه تنها به عنوان محرك رشد، بلکه برای تحریک سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری‌های عفونی به کار گرفته می‌شود^(۸).

ارگانیسم‌های پریوپوتیک

تاکنون عوامل مختلفی از دسته باکتری‌ها و قارچ‌ها جهت سلامتی انسان استفاده شده‌اند. باکتری‌هایی که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و نقش آن‌ها به عنوان یک عامل پریوپوتیک مثبت ارزیابی شده است؛ عبارت از انواع لاکتوباسیلوس‌ها (*Lactobacilli*) [از گونه‌های اسیدوفیلوس، (*L. bulgaricus*), (*L. acidophilus*), بولگاریکوس (*L. casei*), کازئی (*L. helveticus*)]

سرطان و تومورها در حیوانات آزمایشگاهی نقش مؤثری در جهت مقابله با سرطان ایفا می‌کنند^(۴).

هدف از مطالعه حاضر، مرور نظاممندی بر مطالعات گذشته در بررسی اثرات مثبت پریوپوتیک‌ها بر سلامتی و ارتباط آن‌ها با سرطان بود. در ابتدا تاریخچه و تعریف کلی از پریوپوتیک ارایه شد و سپس علل انتخاب پریوپوتیک‌ها به عنوان عاملی برای سلامت به میان آمد. در مراحل بعدی خواص ژنتوکسیتی پریوپوتیک‌ها و ارتباط بین باکتری‌ها و مخمرهای پریوپوتیک با سرطان بررسی گردید.

تاریخچه

تاریخچه استفاده از میکرووار گانیسم‌های زنده در غذا به ویژه باکتری‌های تولید کتنده اسید لاکتیک به منظور حفظ و بهبود سلامت انسان به صد سال قبل بر می‌گردد. ۷۶ سال قبل از میلاد مسیح، استفاده از فراورده‌های تخمیری شیر به منظور درمان گاستروانتریت (Gastroenteritis) توسط مورخ رومی توصیه شد^(۵). اولین مطالعات بالینی بر روی پریوپوتیک‌ها در دهه ۱۹۳۰ در مورد اثربخشی در یبوست انجام شد. از آن به بعد تعداد این مطالعات به طور پیوسته افزایش یافته است و بسیاری از این مطالعات در اروپا و آسیا انجام شده‌اند^(۶). عبارت پریوپوتیک (زیست‌یار) از کلمه یونانی پروویوس (Probios) (منشأ گرفته است و برخلاف آنتی‌بیوتیک که به معنی ضد حیات (Antibiotic) می‌باشد، در لغت به معنی برای حیات (Probiotic) است. افزودن باکتری به خوراک، دارای سابقه دیرینه می‌باشد و به آغاز سده گذشته بر می‌گردد که Metchnikoff در انتیتو پاستور پژوهش‌های مهمی را در این زمینه انجام داد. Metchnikoff متوجه شد که داشتن عمر طولانی در روسیاییان کشور بلغارستان ناشی از مصرف فراوان شیر تخمیر شده است. داشمندان دیگر طی سال‌های ۳۰-۱۹۲۰، میکرووار گانیسم‌هایی را در دستگاه گوارش انسان به کار برداشت که فلور طبیعی دستگاه گوارش بیشتر جانوران بود. شاید توجیه مصرف میکروب یا باکتری کمی تعجب‌آور باشد؛ چرا که میکروب‌ها در بیشتر مواقع به عنوان عوامل


جمله رت و حتی آبزیان صورت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به تأثیر پروپویوتیک‌ها و به ویژه لاکتوپلیسیلوس‌ها بر بهبود شاخص‌های رشد و بهبود عملکرد سیستم ایمنی و مقاومت در برابر بیماری‌ها در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان اشاره کرد (۱۵، ۱۶) که در مواردی مصرف پروپویوتیک‌ها همراه با مکمل‌های دیگری مانند ویتامین C (۱۷) و سیاه دانه (۱۸) بوده است. توکمه‌چی و همکاران به این نتیجه رسیدند که علاوه بر باکتری‌های پروپویوتیک، مخمرهای پروپویوتیک نیز باعث همین اثرات در آبزیان می‌شوند (۱۹). همچنین توکمه‌چی و شهرکی در مطالعه دیگری، مخمر پروپویوتیک غنی شده با سلنیوم را به عنوان عاملی برای مقابله با استرس‌ها و آلودگی‌های محیطی در آبزیان معرفی کردند (۲۰). تحقیقات در مورد حیوانات آزمایشگاهی دیگر از جمله رت نشان داد که مصرف لاکتوپلیسیلوس‌های پروپویوتیک به همراه رافتیلوز، باعث افزایش فعالیت آنزیم‌های کبدی در شرایط طبیعی می‌شود (۲۱). مطالعات در حیوانات آزمایشگاهی حاکی از درمان اسهال با مصرف پروپویوتیک‌ها است، اما نتایج مربوط به انسان به طور کامل ثابت نیست و نیاز به انجام مطالعات کنترل شده دارویی دارد (۲۲). کاربرد درمانی پروپویوتیک‌ها محدودیت‌هایی را به دنبال دارد؛ با این حال درمان پروپویوتیکی پیش‌تر در بیماری‌های کودکان و بیماران دارای نقص سیستم ایمنی گزارش شده است (۲۳).

از جمله مزایای بالقوه غذای‌های پروپویوتیک در سلامتی انسان، بهبود تعادل میکروفلور دستگاه گوارش، تحریک سیستم ایمنی و فعالیت ضد سرطانی، درمان عدم تحمل لاکتوز، درمان سندرم روده تحریک‌پذیر، پیشگیری و درمان اسهال و کاهش کلسترول می‌باشد (۲۴). مطالعات نشان داده‌اند که خاصیت ضد سرطانی پروپویوتیک‌ها از آنزیم‌های حاصل از روده بزرگ انسان‌ها و حیوانات، مهار سمیت حاصل از سرطان زاهای در شرایط داخل بدن و همچنین شرایط آزمایشگاهی توسط آنها، سرکوب آسیب‌های القا کننده سرطان و تومورها در شرایط آزمایشگاهی، ناشی می‌گردد (۲۵).

پاراکسانزی (L. *paracasei*)، پلاتتروم (L. *plantarum*) و سایک (L. *sake*)، بیفیلدو باکتریوم لانگ‌سوم (*Bifidobacterium longum*)، انتروکوکوس فکالیس (*Enterococcus faecium*)، لاکتوکوکوس لاكتیس (*Lactococcus lactis*)، استرپتوکوکوس ترموفیلوس (*Streptococcus thermophilus*)، *Clostridium butyricum*، مخمرهای ساکارومیسیس بولاردی (*Saccharomyces boulardii*)، سرویسیه (S. *cerevisiae*) و ... می‌باشد. طبق مطالعات انجام شده از میان باکتری‌های پروپویوتیک اشاره شده، لاکتوپلیسیلوس‌ها و بیفیلدو باکتریوم‌ها دارای بیشتری اثربخشی و از میان مخمرهای ساکارومیسیس بولاردی دارای بیشترین تأثیر می‌باشد (۱۳).

عمل انتخاب پروپویوتیک‌ها به عنوان عاملی برای سلامت انتخاب گونه‌های پروپویوتیک به طور عمده بر پایه سابقه تاریخی استفاده از آن‌ها برای مدت‌های طولانی بدون داشتن عوارض جانبی مضر صورت می‌گیرد. سایر معیارهای مطرح برای استفاده از گونه‌های باکتریایی مناسب عبارت از ۱. مقاومت و زنده ماندن در مراحل تهیه، ۲. زنده و فعال ماندن در دستگاه گوارش که به معنی مقاومت در برابر اسید معده و اسیدهای صفرایی است، ۳. توانایی اتصال به سلول‌های ابی تلیال روده و ۴. توانایی مقابله با عوامل بیماری‌زا از طریق تولید ترکیبات ضد باکتری، حذف رقابتی آن‌ها یا کاهش pH داخل کولون (تصویر شماره ۱) (۶). پروپویوتیک‌ها به خصوص باکتری‌ها با مکانیسم‌های متفاوت، اثرات مفیدی را در میزبان خود به وجود می‌آورند که از آن جمله می‌توان به برقراری تعادل در فلور روده و ممانعت از اتصال باکتری‌های بیماری‌زا به دیواره مخاطی روده، سرکوب التهاب و کاهش وقوع سرطان اشاره کرد که همگی با استناد به عامل تنظیم سیستم ایمنی بدن توسط آن‌ها صورت می‌گیرد (۱۴).

تحقیقات گسترده‌ای در رابطه با پروپویوتیک‌ها و تأثیری که بر سلامتی دارند، در انسان و بیشتر در حیوانات آزمایشگاهی از



تصویر شماره ۱: مهار باکتری‌های پاتوژن و افزایش اعمال ضد حفاظتی توسط پروبیوتیک‌ها؛ الگوی کلی از تداخل بین پروبیوتیک‌ها و موکوس روده (۲۶)

بستگی دارد (۴).

پروبیوتیک و سرطان

از آنجایی که تکثیر غیر قابل کنترل سلولی و مقاومت آن به مرگ برنامه‌ریزی شده، ویژگی اصلی سلول‌های سرطانی می‌باشد؛ بنابراین عاملی که باعث بروز آپوپتوز در سلول‌های سرطانی شود، می‌تواند به عنوان ماده ضد سرطانی شناخته شود. با این حال در دهه‌های اخیر مقاومت به شیمی درمانی مشکل بزرگی محسوب می‌شود. گفته شده است که حداقل یک دوم کل سرطان‌ها به دلیل ترکیبات موجود در رژیم غذایی ایجاد می‌گردند. از این رو ترکیبات غذایی و ارتباط آن‌ها با سلامت افراد، توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است که پروبیوتیک‌ها از جمله این مواد می‌باشند و همان طور که گفته شد، میکرووارگانیسم‌های غیر بیماری‌زایی هستند که در سیستم گوارشی افراد وجود دارند و اثرات مفیدی بر میزان دارند. گفته شده است که پروبیوتیک‌های خاصی دارای فعالیت‌های ضد سرطانی هستند (۲۹). مصرف خوراکی پروبیوتیک‌ها می‌تواند اثر ضد سرطانی (Anti carcinogen) داشته باشد و این عمل با خشی‌سازی مسمومیت حاصل از موادی که باعث آسیب‌های ژنی در روده می‌گردد، صورت می‌گیرد. اثبات این مسأله در آزمایشگاه با استفاده از کارسینوژن ۱ و ۲ دی‌متیل هیدرازین در کولون موش نشان داده شده است (۳۰).

ساز و کار تأثیر پروبیوتیک‌ها و انواع فعالیت‌های آن‌ها پروبیوتیک‌ها بر خلاف عوامل ضد میکروبی سنتیک (که از یک روش اشر خود را اعمال می‌نمایند)، دارای ساز و کارهای مختلفی می‌باشند که تأثیرپذیری و دوام آن‌ها را برای میزبان چند برابر کرده است (۲۷). مهم‌ترین ساز و کارهای در گیر در عمل پروبیوتیک‌ها (به عنوان عوامل مهم در هوئوستازی اکولوژی فلور بدن) و فواید اختصاصی و غیر اختصاصی آن در جدول شماره ۱ عنوان شده است.

خاصیت آنتی ژنوتوکسیسیتی پروبیوتیک‌ها مطالعات داخل بدن و آزمایشگاهی نشان داده‌اند که پروبیوتیک‌های خاصی دارای فعالیت آنتی ژنوتوکسیسیتی هستند. برای مثال توانایی لاکتوباسیلوس کازئی در مهار آسیب DNA (Deoxyribonucleic acid) در کولون رت‌هایی که در معرض موتازن‌های نیتروز و گوانیدین بودند، بیان شده است. همچنین مطالعات نشان داده‌اند که لاکتوباسیلوس کازئی ول. پاراکازئی توانایی اتصال به موتازن‌هایی با منشأ غذایی را دارند و می‌توانند باعث عدم فعالیت آن‌ها شوند (۲۸). نتایج تحقیقات صورت گرفته در این زمینه دلالت بر این دارد که لاکتوباسیلوس‌ها می‌توانند سمیت حاصل از سرطان‌ Zahای موجود در مواد غذایی را از بین ببرند که در صد مهار آن‌ها به نوع پروبیوتیک مربوطه

جدول ۱: مکانیسم‌های اثر شاخته شده پروپیوتیک‌ها (۲۷)

اعمال	مکانیسم اثر
تولید مواد ضد میکروبی	تولید پراکسید هیدروژن
رقبات بر سر اشغال گیرنده‌های سلولی میزان	تولید باکتریوسین‌ها
رقبات با میکروب‌های پاتوژن بر سر مواد غذایی موجود	نتیجه: نابودی، جلوگیری از رشد و تکثیر سایر میکروارگانیسم‌ها در محیط اکلولژیکی پروپیوتیک‌ها
توانایی تغییر در گیرنده‌های ویژه پاتوژن‌ها که در سطح سلول‌های میزان وجود دارند	پروپیوتیک‌ها با توان اتصال به سلول‌های میزان، از اتصال بیماری‌زاها به گیرنده‌های سلولی و ایجاد عفونت جلوگیری می‌کنند
کاهش pH محیط	صرف مواد غذایی مفید، مورد نیاز مثل ویتامین‌های برای رشد و تکثیر عوامل بیماری‌زا
افزایش پاسخ ایمنی غیر اختصاصی و اختصاصی بدنه	تخرب گیرنده به معنای عدم اتصال باکتری بیماری‌زا و یا متابولیت‌های سمی بر سلول هدف است
کمک به جذب مواد غذایی	تولید اسیدهایی برای اسیدی کردن محیط، مانع رشد برای پاتوژن‌های حساس به محیط اسیدی
سامخت ویتامین‌ها	تنظیم تولید و ترشح سیتوکین‌ها
تحمل لاکتوز	القای پاسخ ایمنی غیر اختصاصی (کمپلمان، سیستیم بیگانه‌خواری)
ضد سرطان‌زایی	القای پاسخ ایمنی اختصاصی (ایمنی هومولال و سلولی)
کاهش کلسترول خون	تبديل درشت مولکول‌ها به اجزای سازنده آن‌ها و تسهیل هضم و جذب آن‌ها توسط میزان
کترول دیابت نوع دو	نقش بزرگ در فعالیت‌های بیوشیمیایی میزان
	تبديل لاکتوز شیر به گلوكالاكتوز
	تعویت ایمنی، غیرفعال نمودن آنزیم‌های مؤثر در تومورزایی
	پایین آوردن سطوح کلسترول و لیپوپروتین‌های مضر خون
	مهار انتقال اندوتوكسین‌های باکتریایی از روده به جریان خون
	کاهش لیپوپلی‌ساکاریدها و سیتوکین‌های پیش‌نهایی در گردش خون
	کاهش التهاب و در نتیجه کاهش مقاومت انسولینی و جلوگیری از تخریب سلول‌های بتای پانکراس

مطالعات انجام شده نشان داده است که باکتری‌های اسید لاکتیک موجود در شیرهای تخمیری می‌توانند اثرات مهار کننده‌ای روی گلسترش عوامل سرطان‌زا و تومورها در مدل‌های حیوانی داشته باشند (۳۲). همچنین مطالعه کاظمی درسنگی و همکاران نشان داد که باکتری‌های پروپیوتیک لاکتوپاسیلوس بلگاریس و لاکتوپاسیلوس پلاتتروم حاصل از ماستها و قرص‌های پروپیوتیکی، دارای اثرات ضد موتاسیونی و ضد سرطانی بسیار خوبی می‌باشند. این باکتری‌ها با تغییر فلور روده سبب کاهش جذب مواد سرطان‌زا و جهش‌زا شده و به سلامت انسان کمک می‌کنند (۳۳).

بیشترین شواهد آزمایشگاهی برای فعالیت ضد سرطانی پروپیوتیک‌ها، از مطالعات آزمایشگاهی ناشی می‌شود و در بررسی‌های داخل بدن نیز جلوگیری از القای شیمیایی تومورهای روده بزرگ در مدل‌های جوندگان دیده شده است

مطالعات جدید نشان می‌دهند که ترکیبات متابولیتی جدا شده از شیر که عمر کوتاهی دارند و توسط سویه‌هایی مانند لاکتوپاسیلوس بلگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس تخمیر شده‌اند، در غیرفعال کردن عوامل خطرزا و کارسینوژن روده بسیار مؤثر می‌باشند (۳۰). مصرف پروپیوتیک‌ها منجر به تولید طیف وسیعی از محصولات تخمیری مانند غلظت بالایی از اسیدهای چرب با زنجیر کوتاه می‌گردد. از طرف دیگر مشاهده شده است که مصرف پروپیوتیک‌ها در کولون موس، باعث القای آنزیم محافظت کننده گلوتاتیون ترانسفراز II می‌گردد. مجموع این عوامل موجب کاهش بار عوامل ژنوتوكسیک در روده و همچنین باعث افزایش تولید عواملی می‌گردد که ترکیبات سمی را غیرفعال می‌سازند. به عنوان مثال، بوتیرات یکی از این عوامل محافظتی می‌باشد که باعث کاهش خطر ابتلا به سرطان می‌گردد (۳۱).

از تأثیر پروبیوتیک‌ها بر مهار رده‌های سرطانی بود و این اثر را به پیتیدوگلیکان‌های آن‌ها نسبت دادند (۳۵). Lee و همکاران در تحقیقی گزارش کردند که عصاره سیتوپلاسمی باکتری‌های لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم (*Bifidobacterium*) تأثیر مستقیمی بر مهار رشد رده سلول‌های سرطانی داشته است (۳۶).

از آنجایی که تکثیر بی‌رویه سلول‌های سرطانی، مشکل اصلی در بیماران مبتلا به سرطان محسوب می‌گردد؛ بنابراین هر عاملی که بتواند باعث مهار تکثیر آن‌ها شود، می‌تواند برای پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت آن‌ها مفید باشد. بهترین حالت مهار یا سرکوب تکثیر سلولی، القای مرگ سلولی برنامه‌ریزی شده یا آپوپتوز می‌باشد؛ چرا که باعث ایجاد التهاب در بدن و سلول‌های مجاور تومورها نخواهد شد و در نتیجه عامل اینمنی برای سرکوب تومورها خواهد بود. Altonsy و همکاران در مطالعه خود به القای مسیر متیوکندریایی آپوپتوز در سلول‌های کارسینومای کولون انسانی (Caco-2) توسط باکتری‌های پروبیوتیک *Lactobacillus rhamnosus* و *Lactobacillus lactis* (یوفیدوباکتریوم لاکتیس) اشاره کردند (۳۷).

نتایج حاصل از تحقیقات Baldwin و همکاران نیز پیشنهاد می‌کند که لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (*Lactobacillus acidophilus*) می‌توانند باعث افزایش القای آپوپتوز در رده سلولی کارسینومای LS513 شوند و می‌توانند به عنوان ادجوانات با

(۴). مصرف پروبیوتیک‌ها ممکن است بر فاز ابتدایی سرطانی شدن تأثیر گذار باشد؛ به این ترتیب که فشار اپی‌تیالی بر کارسینوژن‌های فعلی را کاهش می‌دهد. طبق مطالعات این فرضیه پیش می‌آید که مصرف پروبیوتیک‌ها فاز ابتدایی سرطانی شدن را مهار می‌کند (۲۸). در دهه‌های گذشته بررسی‌هایی در مورد انسان انجام گرفته است که باعث اثبات خاصیت ضد سرطانی پروبیوتیک‌ها می‌شود که در جدول شماره ۲ به چند نمونه از آن‌ها اشاره شده است.

مکانیسم تأثیر پروبیوتیک‌ها بر سرطان
همان طور که گفته شد، مصرف پروبیوتیک‌ها می‌تواند از بروز جهش‌های ژنی جلوگیری نماید. در حالت کلی باکتری‌های اسید لاکتیک با مکانیسم‌هایی مانند تغییر فعالیت‌های متابولیک میکروفلور روده، تغییر شرایط فیزیکی و شیمیایی کولون، متصل شدن به مواد سرطان‌زا و تخریب آن‌ها، تغییرات کیفی و کمی میکروفلور روده و جلوگیری از تولید سرطان‌زاها مانند آمونیاک و اسیدهای صفرایی ثانویه، تولید مواد ضد سرطان و تقویت پاسخ‌های اینمنی میزان می‌تواند از سرطان‌ها به ویژه سرطان کولون پیشگیری کند (۳۴).

مهار سرطان توسط باکتری‌های پروبیوتیک
مطالعات نشان می‌دهند که عصاره سیتوپلاسمی و پیتیدوگلیکان مشتق شده از باکتری‌های اسید لاکتیک سبب مهار تکثیر سلول‌های سرطانی می‌شوند. در این راستا، Kim و همکاران تأثیر اجزای سلولی ده نوع پروبیوتیک مختلف را بر یازده نوع رده سرطانی بررسی کردند. نتایج این محققان حاکی

جدول شماره ۲: تأثیر پروبیوتیک‌ها بر سرطان / مارکرهای زیستی سرطان در مطالعات مداخله‌گر بر انسان (۴)

گروه‌ها	موضوع مورد مطالعه	بروکیو/پری‌بیوتیک	نتایج
۶ فرد سالم	سرطان‌زا ادرار بعد از مصرف گوشت سرخ شده گاو	<i>L. casei</i>	کاهش در سرطان‌زاها ادرار
۱۱ فرد سالم	سرطان‌زا ادرار و مدفوع بعد از مصرف گوشت سرخ شده گاو	<i>L. acidophilus</i>	دفع جهش‌زاها ادراری ۵۰-۷۰ درصد و دفع جهش‌زاها مدفوعی، ۳۰ درصد
۲۰ بیمار با آدنومای روده بزرگ	تکثیر سلولی در بیوپسی موکوس راست روده	<i>L. acidophilus</i> and <i>B. bifidum</i>	وجود لاکتوباسیلوس‌ها که باعث کاهش التهاب راست روده تنها در بیمارانی با التهاب اساسی

شد، تغییر تعداد سلول‌های سرطانی که در معرض دیواره سلولی (در شرایط آزمایشگاهی) قرار گرفتند، هیچ تأثیری بر نتایج ندارد (۴۷)؛ طبق نتایج حاصل شده می‌توان گفت که باکتری‌های پروبیوتیک به ویژه جنس‌های لاکتوپاسیلوس و بیفیدوپاکتریوم توانایی مهار سلول‌های سرطانی را در هر دو شرایط طبیعی و آزمایشگاهی دارند و نیاز به مطالعاتی است که بتوان کارایی آن‌ها در سطح بالینی سنجید.

نقش مخمرهای پروبیوتیک در مهار سرطان

همان طور که گفته شد، مخمرهای نیز جزیی از پروبیوتیک‌ها می‌باشند و مانند باکتری‌های پروبیوتیک، تأثیر بسزایی در درمان و تأمین سلامت بدن دارند که مهم‌ترین آن‌ها ساکارومیسیس‌ها هستند. برای اثبات این موضوع تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته است؛ برای مثال در مطالعه Ghoneum و Gollapudi مشخص شد که مخمر ساکارومیسیس سرویسیه کشته شده با حرارت می‌تواند باعث قوع آپوپتوز سلولی در سه رده سرطان سینه (MCF-7)، ZR-75-1 و HCC70 (گردد ۴۸، ۴۹). در مطالعه دیگری، MCF-7 حیوانات آزمایشگاهی توسط تزریق سلول‌های مبتلا به سرطان سینه شدند و با تزریق ۴۵ روزه ساکارومیسیس سرویسیه بر تومورهای ایجاد شده، به مرور زمان کاهش بسیاری در حجم تومور آن‌ها دیده شد (۵۰). Ghoneum و همکاران نشان دادند که تزریق مستقیم داخل توموری مخمر ساکارومیسیس سرویسیه کشته شده با حرارت می‌تواند باعث پسرفت قابل توجه تومور، القای آپوپتوز و تنظیم فعالیت طبیعی سیستم ایمنی گردد (۵۱). همچنین ساکارومیسیس سرویسیه کشته شده با گرماباعث القای آپوپتوز در سلول‌های سرطان سینه می‌شود که به کلسیم درون سلولی وابسته می‌باشد؛ بدین معنی که با القا و افزایش آپوپتوز، کلسیم درون سلولی نیز افزایش می‌یابد و نشان دهنده به راه افتادن مسیرهای آپوپتوزی است. کاهش در میزان Bcl-2 (مولکول عامل آنتی آپوپتوزیک) و افزایش در میزان Bax (مولکول پروآپوپتوزیک) نیز در این سلول‌ها دیده شده است (۵۲).

شیمی درمانی به کار گرفته شوند (۳۸). تحقیقات دیگر نشان داده‌اند که بیفیدوپاکتریوم لاکتیس پاسخ‌های آپوپتوزی را در سرطان زاهای ژنوتوكسیک در مدت کمی بعد از القای کارسینوژن‌ها در کولون نزولی رت الفا می‌کند (۳۹). از بین بردن سلول‌ها با آپوپتوز فرایند تنظیمی مهمی برای حفاظت در برابر انکوژن‌ها می‌باشد. علاوه بر این، گروه‌های زیادی از دانشمندان گزارش کرده‌اند که ترکیبات حاصل از بیفیدوپاکتریوم لاکتیس از پیشرفت سرطان روده بزرگ در مدل‌های حیوانی جلوگیری می‌کنند (۴۰، ۴۱). Chiu و همکاران نیز با تحقیقات خود نشان دادند که ترکیبات محلول ترشح شده از لاکتوپاسیلوس کازئی رامنوسوس باعث القای آپوپتوز در سلول‌های لوکمیای مونوسیتی می‌شوند (۴۲)؛ در نتیجه می‌توان پروبیوتیک‌ها را به عنوان عاملی برای مبارزه با سرطان در نظر گرفت که بسیار ایمن می‌باشد و هیچ گونه عارضه جانبی در پی ندارد.

به هر حال پروبیوتیک‌ها فعالیت سلول‌کشی را افزایش می‌دهند و به عنوان دارویی به همراه شیمی درمانی استفاده می‌شوند. شیر تخمیر شده با پروبیوتیک‌ها می‌تواند از سرطان جلوگیری کند و باعث بروز درمان در افراد مبتلا به سرطان گردد (۴۳). مهرابیان و همکاران بیان کردند که لاکتوپاسیلوس جدا شده از ترخینه دارای اثر ضد جهشی و ضد سرطانی بالایی می‌باشد و در واقع به تقویت سیستم ایمنی توسط پروبیوتیک‌ها برمی‌گردد (۴۴). مطالعه دیگری دلالت بر این دارد که پلی ساکاریدهای حاصل از لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس باعث مرگ سلول‌های سرطانی به طریق اتوفاژی (Autophagy) می‌شوند (۴۵). کبیری و همکاران نیز در آزمایش‌های خود توانستند رشد رده سرطانی K562 (لوکمیای میلوئیدی مزمن) را توسط عصاره سیتوپلاسمی پروبیوتیک‌هایی مانند لاکتوپاسیلوس کازئی و لاکتوپاسیلوس پاراکازئی در شرایط آزمایشگاهی مهار نمایند (۴۶). آن‌ها در ادامه تحقیقات ثابت کردند که دیواره سلولی لاکتوپاسیلوس‌ها نیز به طور معنی داری باعث القای مرگ در سلول‌های سرطان میلوئیدی خون می‌شوند. همچنین مشخص

محرك‌های ایمنی انجام دادند. آن‌ها نشان دادند که یک نوع مانوبروتین محلول و یک گلوکان نامحلول استخراج شده از دیواره سلولی با تحریک سلول‌های کشنده طبیعی (Natural killer) یا NK و تحریک ماکروفائزها بسیار شبیه به مواد محرك و القا کننده ایمنی عمل می‌کند و باعث لیز شدن رده‌های سلولی YAC-1 (رده سلولی لنفوم موشی) و P-815 (رده سلولی شبه لنفوبلاستی موش) در شرایط آزمایشگاهی می‌شود (۵۸). مطالعه Chan و همکاران اثر مستقیم سلول کشی β -گلوکان در رده‌های مختلف سرطانی شامل کارسینوما، سارکوما و بلاستوما را مورد بررسی قرار داد. مطالعه آن‌ها حاکی از این بود که β -گلوکان مسیرهای آپوپتوزی را فعال می‌کند، ولی اثر مستقیمی بر آنزیم تلومراز و طول تلومر ندارد، اما سلول‌های لوکمیابی با منشأ مونوцитی را در شرایط آزمایشگاهی تحریک می‌کند و می‌تواند بلوغ سلول‌های دندربیتیک مشتق شده از سلول‌های لوکمیابی را تسهیل کند و در نتیجه بر تقویت فعالیت سیستم ایمنی مؤثر می‌باشد و باعث افزایش فعالیت آن می‌شود (۵۹).

همچنین در مخمر نان (ساکارومیسیس سرویسیه) ترکیبی به نام ارگوسترون وجود دارد که یکی از اجزای اصلی غشاء سیتوپلاسمی آن محسوب می‌شود. ارگوسترون یک استرون گیاهی است که توسط نور فرابنفش به ویتامین D تبدیل می‌شود. در مطالعه‌ای نشان داده شد که این ترکیب رشد سلول‌های سرطان سینه (یعنی MCF-7 و MDA-231) را در شرایط آزمایشگاهی با مکانیسمی که ممکن است شامل محصولات اکسایشی ارگوسترون باشد، مهار می‌کند (۶۰). مطالعه بنیادی و همکاران نشان داد که دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی حاصل از مخمر ساکارومیسیس سرویسیه و ساکارومیسیس بولاردی قادر است رشد سلول‌های سرطان میلوبیدی خون انسان (رده K562) را در شرایط آزمایشگاهی مهار کند (۵۳). القای آپوپتوز در رده سرطانی K562 (سرطان سلول‌های میلوبیدی خون) نیز توسط ترکیبات دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی مخمر ساکارومیسیس سرویسیه نشان داده شده است (۵۴). در نتیجه با انجام تحقیقات گسترده‌تر می‌توان

مطالعه بنیادی و همکاران نشان داد که مخمرهای ساکارومیسیس سرویسیه و ساکارومیسیس بولاردی توانایی مهار رشد در سلول‌های سرطان میلوبیدی خون را در شرایط آزمایشگاهی دارند (۵۳). همچنین مطالعه دیگر بنیادی و همکاران، القای آپوپتوز در سلول‌های لوکمیاب میلوبیدی خون انسان توسط مخمر پریوپوتیک ساکارومیسیس سرویسیه را به اثبات رساند (۵۴). مطالعات دیگر حاکی از القای آپوپتوز در سلول‌های سرطان سینه انسانی به دلیل فاگوسیتوز آن‌ها توسط مخمر در شرایط آزمایشگاهی است (۵۰).

طبق نتایج حاصل از تحقیقات، مخمرهای پریوپوتیکی مانند باکتری‌های پریوپوتیک می‌توانند گام بزرگی برای درمان بیماری‌ها و در رأس آن‌ها سرطان باشند، با تأکید بر این نکته که مکانیسم تأثیر مخمرها بر اصل القای آپوپتوز در سلول‌های سرطانی و توموری استوار است؛ بنابراین مخمرها نیز مانند باکتری‌های پریوپوتیک این می‌باشند و بدون عوارض جانبی بر سلامت میزان، تأثیر خود را اعمال می‌کنند که اهمیت آن‌ها را بسیار افزایش می‌دهد.

ترکیبات حاصل از مخمرها و چگونگی ارتباط آن با سرطان بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که ترکیبات استخراج شده از دیواره سلولی مخمر (گونه‌هایی مثل ساکارومیسیس سرویسیه) می‌توانند پاسخ‌های ایمنی را در شرایط داخل بدن و آزمایشگاهی تنظیم کند (۵۵). برای مثال β -گلوکان جدا شده از ساکارومیسیس سرویسیه قادر است مقاومت میزان را در برابر آنتی‌ژن‌های خارجی مختلف مانند ویروس‌ها، باکتری‌ها و آلدگی‌های انگلی افزایش دهد و همچنین ممکن است باعث فعالیت میزان علیه تومورها به وسیله تحریک سیستم ایمنی گردد (۵۶). بررسی‌های انجام گرفته در حیوانات آزمایشگاهی نیز نشان می‌دهد که β -گلوکان به همراه اینترفرون گاما، حالت توموری و متاستازی کبد را مهار می‌کند (۵۷).

Scaringi و همکاران مطالعه‌ای در مورد اجزای دیواره سلولی کاندیدا آلبیکانس (*Candida albicans*) به عنوان

سرطان‌ها داشته باشد. شواهد بسیاری وجود دارند که پروبیوتیک‌ها می‌توانند نقشی در تنظیم تکثیر سلولی و آپوپتوز داشته باشند (۶۶). Iyer و همکاران پی برند که لاکتوپاسیلوس روتری (*L. reuteri*) می‌تواند تکثیر سلولی را با پیشبرد آپوپتوز و از طریق افزایش پروتئین کینازهایی که در فرایندهای پیش آپوپتوزی نقش دارند، افزایش دهد (۶۷). به تازگی مطالعاتی نشان داده‌اند که پروبیوتیک بیفیلوباکتریوم لاکتیس (*B. lactis*) می‌تواند فرایندهای پیش آپوپتوزی را در پاسخ به سرطان‌زای AOM (آزوکسی متان) که باعث القای سرطان روده بزرگ می‌شود، به جریان بیندازد (۴۰، ۴۱).

Baricault و همکاران اثرات شیر تخمیری را بر رشد و تکثیر سرطان کولون بررسی کردند (۶۸). شیرهای مورد بررسی به وسیله یکی از جمعیت‌های باکتریایی لاکتوپاسیلوس هلوتیکوس، بیفیلوباکتریوم، لاکتوپاسیلوس اسیدوفیلوس و یا مخلوطی از استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوپاسیلوس بلگاریس تخمیر شده بودند. بعد از افزودن سلول‌های سرطانی به شیر تخمیری، تنها اسیدوفیلوس اثربر رشد و تکثیر سلول‌های سرطانی نداشت؛ در حالی که سه گروه دیگر کاهش مهمی را در نرخ رشد سلول‌های سرطانی نشان دادند که این کاهش رشد حدود ۵۰-۱۰ درصد بود (۶۸، ۶۹). Singh و همکاران نیز در مطالعه خود نشان دادند که مصرف بیفیلوباکتریوم لونگکوم لیوفیلیزه شده و از طریق غذایی، سرکوب شدید و مهمی را در القای تومورهای روده بزرگ ایفا می‌کند و همچنین حجم تومور را نیز کاهش می‌دهد. تحلیل بیومارکرها نشان داد که ب. لونگکوم تکثیر سلولی القا شده توسط AOM (نوعی سرطان‌زا) را با کاهش فعالیت اورنیتین دکربوکسیلاز، مهار می‌کند. اورنیتین دکربوکسیلاز در بیوستر پلی آمینه‌هایی که باعث تکثیر و تمایز سلولی مخاط روده بزرگ می‌شوند، مؤثر است (۷۰). بر اساس این اطلاعات، پیشرفت زیادی در زمینه اثرات پروبیوتیک‌ها بر آپوپتوز و مسیرهای تکثیر سلولی ایجاد شده است که ممکن است زمینه‌ای برای استفاده از پروبیوتیک‌ها

اجزای سلولی مخمرها را طی فرایندهایی جدا کرد و به بررسی تک‌تک اجزا در مقابله با سرطان پرداخت و با کارآزمایی‌های بالینی، این ترکیبات را وارد عرصه درمان کرد.

پیشگیری از سرطان کولون با پروبیوتیک‌ها مصرف پروبیوتیک‌ها می‌تواند اثرات ضد جهش‌زایی داشته باشد (۶۱، ۶۲). باکتری‌های اسید لاکتیک با مکانیسم‌هایی مانند تغییر فعالیت‌های متابولیک میکروفلور روده، تغییر شرایط فیزیکی و شیمیایی کولون، متصل شدن به کارسینوژن‌ها و تخریب آن‌ها، تغییرات کمی و کیفی میکروفلور روده و جلوگیری از تولید سرطان‌زاها مانند آمونیاک و اسیدهای صفرایی ثانویه، تولید مواد ضد سرطان و تقویت پاسخ‌های ایمنی میزبان، می‌توانند از سرطان کولون پیشگیری کنند (۳۶، ۶۳). مطالعاتی نشان داده‌اند که افزایش رشد بیفیلوباکتریوم‌ها که نوعی از پروبیوتیک‌ها می‌باشند، می‌توانند باعث مهار سرطان‌زاها کولون شوند. محققان حدس می‌زنند که کاهش سطح pH کولون توسط بیفیلوباکتریوم‌ها می‌تواند علت مهار سرطان‌زاها باشد. باکتری‌های پروبیوتیک با ایجاد حالت اسیدیته، از رشد و تکثیر باکتری‌های بیماری‌زای موجود در کولون جلوگیری می‌نمایند و در سطح آنزیم‌های باکتریایی (مانند بتاگلوکورونیدازها) که باعث تبدیل پیش سرطان‌زاها به سرطان‌زاها می‌شوند، تعادل ایجاد می‌کنند (۶۴). در زمینه تأثیر پروبیوتیک‌ها در پیشگیری از سرطان کولون نیز نیاز به مطالعات انسانی بیشتری می‌باشد.

خاصیت ضد تکثیری پروبیوتیک‌ها با القای آپوپتوز آپوپتوز مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی است که نقش کلیدی در تنظیم تعداد سلول‌ها دارد. در بسیاری از سرطان‌ها، کاهش توانایی در پیش بردن آپوپتوز باعث تغییر در فرایند تکثیر سلولی و به هم خوردن آن می‌شود (۶۵). تنظیم در زنده‌مانی و مرگ سلول‌ها توسط مولکول‌های عمل کننده در فرایند آپوپتوز می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری و درمان

در جهت مقابله با سرطان و القای آپوپتوز در آن‌ها، در آینده‌ای نزدیک باشد.

بحث

همان طور که بیان شد، مطالعات مختلف حاکی از مهار سرطان توسط پروبیوتیک‌ها است. بررسی‌های انجام شده بر روی حیوانات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که باکتری‌های پروبیوتیک ممکن است خطر سرطان را از طریق کاهش بروز آن‌ها و سرکوب تومورها کاهش دهند. همچنین طبق مطالعات بالینی، مصرف پروبیوتیک‌ها فعالیت سلول‌های کشنده طبیعی و سطح ایمنوگلوبین‌ها را افزایش می‌دهد. با وجود تحقیقات محدودی که در انسان انجام گرفته است، نتایج حاصل شده ممکن است برای افرادی که دارای سیستم ایمنی با عملکرد ضعیف هستند، مفید باشد. این اعتقاد که برخی از پروبیوتیک‌ها از طریق القای آپوپتوز فعالیت ضد سرطانی دارند، باعث شده است که بتوان آن‌ها را به عنوان عاملی برای درمان در نظر گرفت که بسیار ایمن می‌باشد و هیچ اثر جانبی را در میزان بر جای نمی‌گذارد. مکانیسم‌های مختلفی از جمله اثرات ضد سرطانی، تعدیل فرایند تمایز در سلول‌های توموری، تولید اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه و تغییر در بیان زن تومور که از سمت پروبیوتیک‌ها اعمال می‌شود، باعث شده است که توجه زیادی به سمت آن‌ها جلب گردد. از جمله فواید بالقوه استفاده از پروبیوتیک‌ها در درمان بیماری‌های مختلف، می‌توان به هزینه به نسبت کم، عدم بروز پاسخ‌های ایمنولوژیکی علیه آن‌ها توسط بدن و مهار پاتوژن‌ها توسط

آن‌ها اشاره نمود.

با وجود این که شواهد قابل قبولی در مورد خواص ضد سرطانی پروبیوتیک‌ها در جوندگان و شرایط آزمایشگاهی وجود دارد، شواهد برای مطالعات در انسان هنوز اندک است. محققان سیاری به این نکته اشاره کرده‌اند که نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیقی وجود دارد که مطالعات بالینی برای انسان در این زمینه انجام گردد تا بتوان اطلاعات به دست آمده آزمایشگاهی را کاربردی کرد و برای درمان از آن‌ها استفاده نمود. احتمال دارد که درمان با پروبیوتیک‌ها در تمام زمینه‌ها کارآمد نباشد، البته میزان درمان به فلور میکروبی فرد مورد آزمایش نیز وابسته است. ایده‌های جدیدی در مورد دست کاری ژنتیکی پروبیوتیک‌ها وجود دارد تا به عنوان یک عامل ضد سرطانی در کولون عمل کنند. اگرچه این زمینه از مطالعه پیشنهاد شده است، اما این حقیقت وجود دارد که زمان بسیار زیادی نیاز است تا کاربرد آن‌ها عملی شود و حتی ممکن است مصرف آن‌ها محدود باقی بماند؛ بنابراین برای به نتیجه رساندن این مطالعات نیاز به سرمایه‌گذاری و کار بسیاری در این زمینه است. در ضمن مکانیسم اثر پروبیوتیک‌های مختلف باید با پسحه بیشتری شرح داده شوند تا بتوان بر اساس آن، بهترین جنس و گونه پروبیوتیکی را برای استفاده علیه سلول‌های سرطانی انتخاب نمود. همچنین باید به سؤالات موجود در مورد دوز مصرفی و نیز طول دوره درمان و انتخاب مناسب ترین پروبیوتیک‌ها پاسخ داده شود. به هر حال می‌توان نتیجه گرفت که پروبیوتیک‌ها پتانسیل خوبی دارند تا به عنوان یک استراتژی جدید برای درمان سرطان معرفی شوند.

References

1. Stanton C, Gardiner G, Meehan H, Collins K, Fitzgerald G, Lynch PB, et al. Market potential for probiotics. *Am J Clin Nutr* 2001; 73(2 Suppl): 476S-83S.
2. Campieri M, Gionchetti P. Bacteria as the cause of ulcerative colitis. *Gut* 2001; 48(1): 132-5.
3. Morselli P. The role of probiotics in health. AJA University of Medical Sciences 2008; 3(2): 21-7. (Persian).
4. Burns AJ, Rowland IR. Anti-carcinogenicity of probiotics and prebiotics. *Curr Issues Intest Microbiol* 2000; 1(1): 13-24.
5. Bottazzi V. Food and feed production with microorganisms. *Biotechnology* 1983; 5: 315-63.
6. Kopp-Hoolihan L. Prophylactic and therapeutic uses of probiotics: a review. *J Am Diet Assoc* 2001; 101(2): 229-38.
7. Metchnikoff II. The Prolongation of Life: Optimistic Studies. Berlin, Germany: Springer Publishing Company; 2004.
8. Irianto A, Austin B. Use of probiotics to control furunculosis in rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*. *Food and Feed Production with microorganisms* 1983; 5: 315-63.

- mykiss (Walbaum). *Journal of Fish Diseases* 2002; 25(6): 333-42.
9. Tukmechi A, Bandboni M. Effects of *Saccharomyces cerevisiae* supplementation on immune response, hematological parameters, body composition and disease resistance in rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss* (Walbaum, 1792). *Journal of Applied Ichthyology* 2014; 30(1): 55-61.
 10. Tukmechi A, Morszedi A, Delirezh N. Changes in Intestinal Microflora and Humoral Immune Response Following Probiotic Administration in Rainbow Trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Journal of Animal and Veterinary Advances* 2007; 6(10): 1183-9.
 11. Tukmechi A, Bandboni M. The effect of yeast supplementation on the growth and immune system in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Journal of Veterinary Research* 2013; 68(1): 69-78.
 12. Lilly DM, Stillwell RH. Probiotics: growth-promoting factors produced by microorganisms. *Science* 1965; 147(3659): 747-8.
 13. Mattila-Sandholm T, Mylläriinen P, Crittenden R, Mogensen G, Fondén R, Saarela M. Technological challenges for future probiotic foods. *International Dairy Journal* 2002; 12(2-3): 173-82.
 14. Salinas I, Meseguer J, Esteban MA. Antiproliferative effects and apoptosis induction by probiotic cytoplasmic extracts in fish cell lines. *Vet Microbiol* 2008; 126(1-3): 287-94.
 15. Rahmati Andani HR, Tukmechi A, Meshkini S, Ebrahimi H. Enhanced resistance of rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*, against *Aeromonas hydrophila* and *Yersinia ruckeri* challenged with isolated Lactobacilli from common carp intestine. *Iranian Veterinary Journal* 2011; 7(31): 26-35. (Persian).
 16. Rahmati Andani HR, Tukmechi A, Meshkini S, Sheikhzadeh N. Antagonistic activity of two potential probiotic bacteria from fish intestines and investigation of their effects on growth performance and immune response in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Journal of Applied Ichthyology* 2012; 28(5): 728-34. (Persian).
 17. Tookmehchi A, Shamsi H, Meshkini S, Delshad R, Ghasemi Moghanjoei A. Dietary administration of vitamin C and *Lactobacillus rhamnosus* in combination enhanced the growth and innate immune response of the rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*. *Iranian Scientific Fisheries Journal* 2012; 21(3): 13-21. (Persian).
 18. Mohammadi H, Agh N, Tukmechi A, Noori F. Effects of using *Lactobacillus rhamnosus* probiotic and *Nigella sativa* (black seed) on the growth parameters of Rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Journal of Applied Biology* 2011; 24(1): 50-62. (Persian).
 19. Tukmechi A, Rahmati Andani HR, Manaffar R, Sheikhzadeh N. Dietary administration of beta-
 - mercapto-ethanol treated *Saccharomyces cerevisiae* enhanced the growth, innate immune response and disease resistance of the rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*. *Fish Shellfish Immunol* 2011; 30(3): 923-8.
 20. Tokmechi A, Shahraki R. Nutritional effects of *Saccharomyces cerevisiae* enriched with selenium on growth and resistance of rainbow trout to environmental stresses bacterium *Yersinia ruckeri*. *Journal of Animal Environment* 2013; 4(4): 49-58.
 21. Seyed B, Heidary R, Tukmechi A. Dietary effect of *L. casei* and *L. paracasei* as probiotic bacteria with Raftilose as peribiotic on the growth and liver enzymes in rat. *Razi j Med Sci* 2013; 20(107): 1-9. (Persian).
 22. Fuccio L, Guido A, Eusebi LH, Laterza L, Grilli D, Cennamo V, et al. Effects of probiotics for the prevention and treatment of radiation-induced diarrhea. *J Clin Gastroenterol* 2009; 43(6): 506-13.
 23. Luong ML, Sareyyupoglu B, Nguyen MH, Silveira FP, Shields RK, Potoski BA, et al. Lactobacillus probiotic use in cardiothoracic transplant recipients: a link to invasive Lactobacillus infection? *Transpl Infect Dis* 2010; 12(6): 561-4.
 24. Ehsani A, Mahmudi R, Tokmechi A, Pajohi MR. Iranian white cheese as a food carrier for probiotic bacteria. *Journal of Food Science and Technology* 2011; 8(3): 77-83.
 25. De Groote MA, Frank DN, Dowell E, Glode MP, Pace NR. *Lactobacillus rhamnosus* GG bacteremia associated with probiotic use in a child with short gut syndrome. *Pediatr Infect Dis J* 2005; 24(3): 278-80.
 26. Ng SC, Hart AL, Kamm MA, Stagg AJ, Knight SC. Mechanisms of action of probiotics: recent advances. *Inflamm Bowel Dis* 2009; 15(2): 300-10.
 27. Ranjbar R. How do probiotic microorganisms influence man's general good health? *J Ilam Univ Med Sci* 2004; 11(40): 38-46. (Persian).
 28. Commane D, Hughes R, Shortt C, Rowland I. The potential mechanisms involved in the anti-carcinogenic action of probiotics. *Mutat Res* 2005; 591(1-2): 276-89.
 29. Daniluk U. Probiotics, the New Approach for Cancer Prevention and/or Potentialization of Anti-Cancer Treatment? *J Clin Exp Oncol* 2012; 1: 2.
 30. Wollowski I, Rechkemmer G, Pool-Zobel BL. Protective role of probiotics and prebiotics in colon cancer. *Am J Clin Nutr* 2001; 73(2 Suppl): 451S-5S.
 31. Abrahamse SL, Pool-Zobel BL, Rechkemmer G. Potential of short chain fatty acids to modulate the induction of DNA damage and changes in the intracellular calcium concentration by oxidative stress in isolated rat distal colon cells. *Carcinogenesis* 1999; 20(4): 629-34.
 32. Brady LJ, Gallaher DD, Busta FF. The role of

- probiotic cultures in the prevention of colon cancer. *J Nutr* 2000; 130(2S Suppl): 410S-4S.
33. Kazemi Darsangi R, Ghaemi N, Mirpour M, Mirdavoudi F. Evaluating Antimutagenic Activity of Probiotic Bacteria Isolated from Probiotic Products. *Qom Univ Med Sci J* 2011; 6(2): 37-44. (Persian).
 34. Koebnick C, Wagner I, Leitzmann P, Stern U, Zunft HJ. Probiotic beverage containing Lactobacillus casei Shirota improves gastrointestinal symptoms in patients with chronic constipation. *Can J Gastroenterol* 2003; 17(11): 655-9.
 35. Kim JY, Woo HJ, Kim YS, Kim KH, Lee HJ. Cell cycle dysregulation induced by cytoplasm of *Lactococcus lactis* ssp *lactis* in SNUG2A, a colon cancer cell line. *Nutr Cancer* 2003; 46(2): 197-201.
 36. Lee JW, Shin JG, Kim EH, Kang HE, Yim IB, Kim JY, et al. Immunomodulatory and antitumor effects in vivo by the cytoplasmic fraction of *Lactobacillus casei* and *Bifidobacterium longum*. *J Vet Sci* 2004; 5(1): 41-8.
 37. Altonsy MO, Andrews SC, Tuohy KM. Differential induction of apoptosis in human colonic carcinoma cells (Caco-2) by Atopobium, and commensal, probiotic and enteropathogenic bacteria: mediation by the mitochondrial pathway. *Int J Food Microbiol* 2010; 137(2-3): 190-203.
 38. Baldwin C, Millette M, Oth D, Ruiz MT, Luquet FM, Lacroix M. Probiotic *Lactobacillus acidophilus* and *L. casei* mix sensitize colorectal tumoral cells to 5-fluorouracil-induced apoptosis. *Nutr Cancer* 2010; 62(3): 371-8.
 39. Roberfroid MB. Prebiotics and synbiotics: concepts and nutritional properties. *Br J Nutr* 1998; 80(4): S197-S202.
 40. Le Leu RK, Brown IL, Hu Y, Bird AR, Jackson M, Esterman A, et al. A synbiotic combination of resistant starch and *Bifidobacterium lactis* facilitates apoptotic deletion of carcinogen-damaged cells in rat colon. *J Nutr* 2005; 135(5): 996-1001.
 41. Le Leu RK, Hu Y, Brown IL, Woodman RJ, Young GP. Synbiotic intervention of *Bifidobacterium lactis* and resistant starch protects against colorectal cancer development in rats. *Carcinogenesis* 2010; 31(2): 246-51.
 42. Chiu YH, Hsieh YJ, Liao KW, Peng KC. Preferential promotion of apoptosis of monocytes by *Lactobacillus casei rhamnosus* soluble factors. *Clin Nutr* 2010; 29(1): 131-40.
 43. Cousin FJ, Jouan-Lanhuet S, Dimanche-Boitrel MT, Corcos L, Jan G. Milk fermented by *Propionibacterium freudenreichii* induces apoptosis of HGT-1 human gastric cancer cells. *PLoS One* 2012; 7(3): e31892.
 44. Mehrabian S, Tajabadi Ebrahimi M, Abbas Ahmadi M, Bahrami H. Study of antimutagenic and anticancer effect of lactic acid bacteria isolated from Tarkhineh by Ames Test. *J Arak Univ Med Sci* 2012; 15(7): 72-9. (Persian).
 45. Kim Y, Oh S, Yun HS, Oh S, Kim SH. Cell-bound exopolysaccharide from probiotic bacteria induces autophagic cell death of tumour cells. *Lett Appl Microbiol* 2010; 51(2): 123-30.
 46. Kabiri F, Nejati V, Tukmechi A, Delirezh N, Nikbaksh P. Inhibitory properties of cytoplasmic extract of *Lactobacilli* isolated from common carp intestine on human chronic myelocytic leukemia K562 cell line: an in vitro study. *Tehran Univ Med J* 2011; 68(12): 691-8. (Persian).
 47. Riki M, Farokhi F, Tukmechi A. The best time of cytotoxicity for extracted cell wall from *Lactobacillus casei* and *paracasei* in K562 cell line. *Tehran Univ Med J* 2013; 70(11): 691-9. (Persian).
 48. Ghoneum M, Gollapudi S. Phagocytosis of *Candida albicans* by metastatic and non metastatic human breast cancer cell lines in vitro. *Cancer Detect Prev* 2004; 28(1): 17-26.
 49. Ghoneum M, Gollapudi S. Modified arabinoxylan rice bran (MGN-3/Biobran) enhances yeast-induced apoptosis in human breast cancer cells in vitro. *Anticancer Res* 2005; 25(2A): 859-70.
 50. Ghoneum M, Wang L, Agrawal S, Gollapudi S. Yeast therapy for the treatment of breast cancer: a nude mice model study. *In Vivo* 2007; 21(2): 251-8.
 51. Ghoneum M, Badr El-Din NK, Noaman E, Tolentino L. *Saccharomyces cerevisiae*, the Baker's Yeast, suppresses the growth of Ehrlich carcinoma-bearing mice. *Cancer Immunol Immunother* 2008; 57(4): 581-92.
 52. Ghoneum M, Matsuura M, Braga M, Gollapudi S. *S. cerevisiae* induces apoptosis in human metastatic breast cancer cells by altering intracellular Ca²⁺ and the ratio of Bax and Bcl-2. *Int J Oncol* 2008; 33(3): 533-9.
 53. Boniadi F, Tukmechi A, Nejati V. Comparative study on the effect of obtained cell wall and cytoplasmic fraction from *Saccharomyces cerevisiae* and *Saccharomyces boulardii* on K562 cell line. *Pharmaceutical Sciences* 2012; 18(1): 69-78.
 54. Bonyadi F, Nejati V, Tukmechi A, Hasanzadeh SH, Riki M. Evaluation of Apoptotic Effects of Cell Wall and Cytoplasmic Extract from *Saccharomyces cerevisiae* on K562 Cell Line. *Armaghane-danesh* 2013; 18(9): 699-710. (Persian).
 55. Estrada A, Yun CH, Van KA, Li B, Hauta S, Laarveld B. Immunomodulatory activities of oat beta-glucan in vitro and in vivo. *Microbiol Immunol* 1997; 41(12): 991-8.
 56. Rodriguez A, Cuesta A, Ortuno J, Esteban MA, Meseguer J. Immunostimulant properties of a cell wall-modified whole *Saccharomyces cerevisiae* strain administered by diet to seabream (*Sparus*

- aurata L.). *Vet Immunol Immunopathol* 2003; 96(3-4): 183-92.
57. Sveinbjornsson B, Rushfeldt C, Seljelid R, Smedsrød B. Inhibition of establishment and growth of mouse liver metastases after treatment with interferon gamma and beta-1,3-D-glucan. *Hepatology* 1998; 27(5): 1241-8.
58. Scaringi L, Marconi P, Boccanfuso M, Tissi L, Bistoni F, Cassone A. Cell wall components of *Candida albicans* as immunomodulators: induction of natural killer and macrophage-mediated peritoneal cell cytotoxicity in mice by mannoprotein and glucan fractions. *J Gen Microbiol* 1988; 134(5): 1265-74.
59. Chan WK, Cheung CC, Law HK, Lau YL, Chan GC. *Ganoderma lucidum* polysaccharides can induce human monocytic leukemia cells into dendritic cells with immuno-stimulatory function. *J Hematol Oncol* 2008; 1: 9.
60. Subbiah MT, Abplanalp W. Ergosterol (major sterol of baker's and brewer's yeast extracts) inhibits the growth of human breast cancer cells in vitro and the potential role of its oxidation products. *Int J Vitam Nutr Res* 2003; 73(1): 19-23.
61. Rafter J. Probiotics and colon cancer. *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 2003; 17(5): 849-59.
62. Homayouni Rad A. Therapeutic effects of functional probiotics and symbiotic foods. Tabriz, Iran: Tabriz University of Medical Sciences Publication; 2008. (Persian).
63. Rafter J. Lactic acid bacteria and cancer: mechanistic perspective. *Br J Nutr* 2002; 88(Suppl 1): S89-S94.
64. Liang MT. Roles of probiotics and prebiotics in colon cancer prevention: Postulated mechanisms and in-vivo evidence. *Int J Mol Sci* 2008; 9(5): 854-63.
65. Elmore S. Apoptosis: a review of programmed cell death. *Toxicol Pathol* 2007; 35(4): 495-516.
66. Fesik SW. Promoting apoptosis as a strategy for cancer drug discovery. *Nat Rev Cancer* 2005; 5(11): 876-85.
67. Iyer C, Kosters A, Sethi G, Kunnumakkara AB, Aggarwal BB, Versalovic J. Probiotic *Lactobacillus reuteri* promotes TNF-induced apoptosis in human myeloid leukemia-derived cells by modulation of NF-kappaB and MAPK signalling. *Cell Microbiol* 2008; 10(7): 1442-52.
68. Baricault L, Denariaz G, Houry JJ, Bouley C, Sapin C, Trugnan G. Use of HT-29, a cultured human colon cancer cell line, to study the effect of fermented milks on colon cancer cell growth and differentiation. *Carcinogenesis* 1995; 16(2): 245-52.
69. Marvin-Guy LF, Duncan P, Wagniere S, Antille N, Porta N, Affolter M, et al. Rapid identification of differentiation markers from whole epithelial cells by matrix-assisted laser desorption/ionisation time-of-flight mass spectrometry and statistical analysis. *Rapid Commun Mass Spectrom* 2008; 22(8): 1099-108.
70. Singh J, Rivenson A, Tomita M, Shimamura S, Ishibashi N, Reddy BS. *Bifidobacterium longum*, a lactic acid-producing intestinal bacterium inhibits colon cancer and modulates the intermediate biomarkers of colon carcinogenesis. *Carcinogenesis* 1997; 18(4): 833-41.

REVIEW ARTICLE

An overview of probiotics and their role in managements of cancer

Farzaneh Bonyadi¹,
Amir Tukmechi²,
Hadi Mohebalian³,

¹ M.Sc., Department of Biology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran

² Assistant Professor, Department of Pathobiology and Quality Control, Artemia and Aquatic Animals Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran

³ Assistant Professor, Department of Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

(Received January 8, 2014; Accepted April 20, 2014)

Abstract

Probiotics are alive microorganisms which have useful effects on health of host by balancing its intestinal micro flora. Nowadays probiotics are known as a factor for prevention from infectious disease and cancer. Anti cancer properties of probiotics exert with the toxify of materials that cause genetic damages. The aim of this study is systematic review on studies in checking positive effects of probiotics on health and their relationship with cancer. Related articles were searched in English at ACM, IEEE, Springer, Science Direct, Google Scholar, clinical trials and systematic review literatures that have assessed effects of probiotics at prevention and treatment of cancer, enrolled in this study. There was a wide variation among studies in imaging parameters, type of used probiotics, host type and test conditions. The results imply that probiotic bacteria and yeasts can eliminate toxicity of carcinogens and induce cancer cell death in vitro. Also consumption of probiotics caused reduces cancer risk, stimulation of immune system and struggle to carcinogens. Despite acceptable evidence about their anti cancer properties, studies in humans are still limited. Therefore, there is a need to plan for detailed clinical studies in human in such a way obtained information can be used to treat.

Keywords: Probiotics, Cancer, Immune System, Treatment

J Mazand Univ Med Sci 2014; 24(112): ??-?? (Persian).