

شناسایی و تشخیص سویه های تهاجمی هموفیلوس آنفلوانزای تایپ b در نمونه های بالینی، به روش واکنش زنجیره ای پلیمرز

سمیه باقرزاده خداشهری^۱سید داور سیادت^۲محمد رهبر^۳

چکیده

سابقه و هدف: هموفیلوس آنفلوانزای تایپ b (Hib)، یکی از مهم ترین عوامل مننژیت های باکتریایی در کودکان زیر ۵ سال، به خصوص در کشورهای است که واکسیناسیون علیه Hib را انجام نمی دهند. در این مطالعه، ما سروتایپ، سویه های کپسول دار هموفیلوس آنفلوانزای جدا شده از نمونه های بالینی را به روش واکنش زنجیره ای پلیمرز (PCR)، تعیین کردیم.

مواد و روش ها: در این تحقیق، DNA نمونه های بالینی هموفیلوس آنفلوانزا به روش جوشاندن استخراج گردید. سویه های دارای کپسول توسط آغازگرهای ژن *bexA* تعیین و نوع سروتایپ سویه های کپسول دار توسط مجموعه آغازگرهای اختصاصی تایپ "f تا a" مشخص شد.

یافته ها: از ۵۰ سویه هموفیلوس آنفلوانزای جدا شده از نمونه های بالینی، ۴ سویه ژن *bexA* را نشان دادند که تمام آن ها دارای کپسول بودند و هر ۴ جدایه، به عنوان سویه های تایپ b تعیین شدند.

استنتاج: با توجه به عدم رشد باکتری های تعیین شده در این بررسی در آزمایشگاه های اولیه (جواب های منفی کاذب) و وجود سویه های بیماری زای Hib در نمونه ها بالینی، انجام روش PCR با ژن های اختصاصی روی نمونه ها و موارد مشکوک ضروری به نظر می رسد.

واژه های کلیدی: هموفیلوس آنفلوانزای تایپ b، سروتایپ، PCR

مقدمه

جدایه های هموفیلوس آنفلوانزا، می توانند بر اساس حضور و یا عدم حضور کپسول به اشکال کپسول دار (Typeable) و یا بدون کپسول (Non-typeable or NTHi) طبقه بندی شوند (۱). سویه های کپسول دار هموفیلوس آنفلوانزا به خصوص Hib (Haemophilus influenzae type b) عفونت خون، مننژیت، اپی گلویتیت در کودکان جوان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه هستند که میزان واکسیناسیون در آن ها پایین است و یا انجام نتمی شوند (۲). در میان سویه های کپسول دار، Hib به عنوان شایع ترین و بیماری زاترین نوع هموفیلوس آنفلوانزا در نظر گرفته شده است که در بیش از ۹۵

جدایه های هموفیلوس آنفلوانزا، می توانند بر اساس حضور و یا عدم حضور کپسول به اشکال کپسول دار (Typeable) و یا بدون کپسول (Non-typeable or NTHi) طبقه بندی شوند (۱). سویه های کپسول دار هموفیلوس آنفلوانزا به خصوص Hib (Haemophilus influenzae type b) عفونت خون، مننژیت، اپی گلویتیت در کودکان جوان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه هستند که میزان واکسیناسیون در آن ها پایین است و یا انجام نتمی شوند (۲). در میان سویه های کپسول دار، Hib به عنوان شایع ترین و بیماری زاترین نوع هموفیلوس آنفلوانزا در نظر گرفته شده است که در بیش از ۹۵

E-mail: d.siadat@gmail.com

مؤلف مسئول: سید داور سیادت - ایران، تهران، کدپستی: ۱۳۱۶۹۴۳۵۵۱، انستیتو پاستور ایران، گروه میکروبیشناسی

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمان، کرمان، ایران

۲. دانشیار، گروه میکروبیشناسی بخش هیاتیت و ایدز، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران

۳. استاد، بخش میکروبیشناسی، مرکز تحقیقات آزمایشگاه مرجع سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۳/۱/۲۴ تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۳/۲۷

بعدی DNA نمونه‌های دریافتی به روش جوشاندن جدا شد و به منظور استفاده‌های بعدی در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد ذخیره شد (۷) در مجموع از ۳ سویه ATCC هموفیلوس آنفلوانزا، به عنوان سویه‌های کنترل برای واکنش PCR استفاده گردید. این سویه‌ها شامل سویه‌های ATCC 9006 تایپ a، ATCC 10211 تایپ b و سویه ATCC 49766 برای NTHi بودند که از بانک میکروبی بخش باکتری شناسی انستیتو پاستور ایران تهیه شدند. برای شناسایی سویه‌های کپسول دار از سویه‌های بدون کپسول، از جفت آغازگرهای اختصاصی ژن *bexA* و برای تعیین سروتایپ سویه‌های کپسول دار هموفیلوس آنفلوانزا، از مجموعه آغازگرهای a تا f (تمامی آغازگرهای مورد استفاده از شرکت تکاپو زیست تهران- ایران تهیه شدند) استفاده شد، کلیه این پرایمرها در مطالعه Falla و همکاران آمده است (۷). واکنش PCR، به منظور تکثیر DNA الگو در حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر صورت گرفت که مواد و مقادیر آن در جدول شماره ۱ آمده است.

جدول شماره ۱: مواد و مقادیر مورد نیاز در واکنش PCR جهت تکثیر ژن *bexA* و سروتایپینگ کپسولی

مقادیر (μl)	مواد
۲/۵	بافر (۱۰X)
۱/۵	MgCl ₂ (۵۰ میلی مولار)
۰/۵	dNTP (۱۰ میلی مولار)
هر کدام ۰/۵	پرایمرهای (F-R) (۱۰ پیکومول)
۰/۲	آنزیم Taq پلی مراز (۵ U/μl)
۲	DNA الگو
۱۷/۳	آب دو بار تقطیر
۲۵	حجم نهایی

فرآیند PCR شامل ۵ دقیقه واسرشتگی ابتدایی در دمای ۹۴ درجه سانتی گراد، سپس ۲۵ چرخه حرارتی، شامل ۳ مرحله واسرشتگی در ۹۴ درجه سانتیگراد به مدت ۱ دقیقه، اتصال آغازگرها به رشته الگو در ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱ دقیقه و طویل شدن قطعه تکثیر شده در ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۱ دقیقه می‌باشد. در نهایت، مرحله تکثیر نهایی در ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ دقیقه صورت گرفت (۷). سپس

درصد موارد، کودکان زیر ۵ سال را مبتلا می‌کند (۳). در دوران قبل از ارائه واکسن هموفیلوس آنفلوانزا، حدود ۹۰ درصد از موارد تهاجمی، به علت سویه‌های تایپ b ایجاد می‌شد که بعد از معرفی واکسن ترکیبی Hib در اروپا و آمریکا، شیوع بیماری‌های تهاجمی هموفیلوس آنفلوانزای تایپ b در این کشورها، بطور چشمگیری کاهش یافت (۴، ۵). ولی در کشور ما، با توجه به این که واکسیناسیون علیه Hib، به صورت واکسیناسیون روتین در برنامه کار وزارت بهداشت قرار نگرفته است، به همین دلیل هموفیلوس آنفلوانزای تایپ b به عنوان یکی از بیماری‌های تهاجمی شایع، به‌خصوص در کودکان زیر ۵ سال معرفی می‌شود (منبع ۹). با توجه به اینکه در تشخیص هموفیلوس آنفلوانزا به روش کشت و یا به دلیل استفاده از آنتی بیوتیک، نتایج منفی کاذب گزارش می‌گردد و یا احتمال مثبت شدن کشت در خون و دیگر مایعات بدن، به خصوص مایع مغزی نخاعی کم می‌گردد، می‌توان از روش مولکولی PCR که روش سریع و مطمئن است، برای شناسایی این باکتری استفاده نمود تا بتوان در نمونه‌های بالینی باکتری را به سرعت و با حساسیت بیشتری تشخیص داد. هدف از این مطالعه، شناسایی سویه‌های کپسول دار و همچنین تشخیص نوع سروتایپ سویه‌های کپسول دار هموفیلوس آنفلوانزای جدا شده از نمونه‌های بالینی مشکوک به عفونت‌های هموفیلوسی به روش PCR (واکنش زنجیره ای پلیمرز) بود.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه، تعداد ۵۰ سویه هموفیلوس آنفلوانزاکه از خون، حلق، چشم، مایع مغزی نخاعی و مایع شستشوی ریه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان میلاد، امام خمینی و مفید شهر تهران در طی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ جمع آوری شده بودند، استفاده شد. ابتدا سویه‌ها از لحاظ مورفولوژی و تست‌های بیوشیمیایی و نیاز به هر دو فاکتور X و V مورد بررسی قرار گرفتند (۶). در مرحله

بررسی، تنها ۱۴ مورد کشت مثبت از نظر هموفیلوس *آنفلوانزا* داشتند در حالی که به روش PCR، ۳۷ مورد نتایج مثبت نشان دادند (۱۰).

آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که در منطقه مدیترانه شرقی (که کشور ما نیز در این محدوده قرار دارد)، Hib شایع ترین عامل مننژیت باکتریال است (۱۱). در این مطالعه با توجه به اینکه اکثر نمونه های دریافتی از حلق جدا شده بودند با این حال از مجموع ۵۰ سویه جدا شده از نمونه های مشکوک به هموفیلوس آنفلوانزا، ۴ مورد از نوع Hib بودند که ۸ درصد سویه های مورد آزمایش را تشکیل می دادند هم چنین وجود این تعداد سویه های هموفیلوس آنفلوانزا در نمونه های بالینی که از لحاظ کشت های روتین، منفی کاذب به نظر می رسند، نشان می دهد که انجام روش های مولکولی از تشخیص جنس تا حد گونه و تایپ برای این باکتری ضروری است. در آزمایشگاه های روتین جدا کردن هموفیلوس آنفلوانزا از نمونه های خون و csf بسیار مشکل می باشد و به همین علت موارد کشت مثبت به ندرت گزارش می گردد. از طرفی، کودکان مبتلا به مننژیت معمولاً قبل از رسیدن به بیمارستان با تشخیص سایر عفونت ها، تحت درمان انواع آنتی بیوتیک ها قرار می گیرند که همین امر سبب عدم رشد باکتری بر روی محیط های کشت آزمایشگاهی می شود و حتی باعث حذف سریع این باکتری از مایع نخاع شده که منجر به نتایج کشت منفی کاذب خواهد شد، به همین دلیل استفاده از روش هایی که بتواند وجود مقادیر کم باکتری در نمونه های بالینی، به خصوص مایع مغزی نخاعی را تشخیص دهد ضروری به نظر می رسد (۱۲). در نتیجه با توجه به عدم تشخیص قطعی هموفیلوس آنفلوانزا به روش کشت و یا به دلیل استفاده از آنتی بیوتیک، می توان از روش مولکولی PCR که روش سریع و مطمئن و دارای حساسیت بیش تری برای شناسایی این باکتری است، استفاده نمود تا بتوان باکتری فوق را در نمونه های بالینی مثل مایع مغزی نخاعی و سایر مایعات بیولوژیکی به سرعت

محصولات PCR بر رول ژل آگاروز ۱ درصد الکتروفورز و قطعات تکثیر یافته توسط دستگاه ژل داکيومنشن (Gel Documentation) مشاهده شدند.

یافته ها و بحث

از مجموع ۵۰ سویه هموفیلوس آنفلوانزای جمع آوری شده، ۵ مورد (۱۰ درصد) از چشم، ۱ مورد (۲ درصد) از مایع شستشوی ریه، ۲ مورد (۴ درصد) از مایع مغزی نخاعی، ۳ مورد (۶ درصد) از خون و ۳۹ مورد (۷۸ درصد) نیز از حلق بیماران جدا سازی شده بودند. جهت شناسایی سویه های کپسول دار، پس از بهینه سازی و انجام آزمون PCR بر روی تمام نمونه های هموفیلوس آنفلوانزای دریافتی، ۴ سویه از ۵۰ سویه از نظر ژن *bexA* مثبت بودند یعنی این سویه ها در سطح خود دارای کپسول هستند که طول باند قطعه تکثیر شده توسط این جفت آغازگر، ۳۴۳ جفت باز می باشد و هر ۴ سویه پس از سرو تایپینگ توسط مجموعه آغازگرهای a تا f، باند ۴۸۰ جفت باز مربوط به سرو تایپ b هموفیلوس آنفلوانزای کپسول دار را نشان دادند یعنی هر ۴ سویه کپسول دار از نوع تایپ b بودند.

سرو تایپینگ کپسولی روش مهمی برای بررسی خصوصیات هموفیلوس آنفلوانزا است. تشخیص ژن *bexA* و ژن های اختصاصی کپسولی توسط PCR، رایج ترین روش مورد استفاده برای تعیین سرو تایپ کپسول است (۸). Falla و Leaves چنین بیان کردند که روش مبتنی بر PCR، نوع کپسول را بدون ابهام بیان می کند. موتانت های کپسول ناقص از سویه های تایپ b (سویه های Hib) که به طور خود به خودی اتفاق می افتد نیز توسط این روش می تواند شناسایی شود، هم چنین این روش برای ارزیابی دقیق از تأثیر واکنش های تایپ b مطلوب است (۷، ۹).

Singhi و همکاران در سال ۲۰۰۲، روش های کشت میکروبی و PCR را برای Hib از نمونه های مایع مغزی نخاعی کودکان مبتلا به مننژیت باکتریال مورد مقایسه قرار دادند که نتایج نشان داد، از ۱۰۷ نمونه مورد

دانشجویی کارشناسی ارشد استخراج شده است که با حمایت‌های مالی و معنوی مرکز تحقیقات باکتری شناسی انستیتو پاستور ایران و حمایت معنوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات کرمان و بخش میکروبیولوژی بیمارستان میلاد تهران، انجام شده است و بدین وسیله نویسندگان، مراتب قدردانی خود را نسبت به همکاری‌های صورت گرفته برای انجام این تحقیق اعلام می‌دارند.

تشخیص داد. بنابراین از اهم فعالیت‌های مراکز پژوهشی بهداشت و درمان، توسعه و ابداع روش‌های جایگزین جهت تشخیص به موقع باکتری‌های سخت رشد می‌باشد. از بین روش‌های جایگزین، امروزه تشخیص سریع به کمک PCR، نقش مهمی در تشخیص به موقع هموفیلوس آنفلوانزای جدا شده دارد.

سپاسگزاری

این مقاله به طور مشترک از طرح تحقیقاتی و پایان‌نامه

References

- Pittman M. Variation and type specificity in the bacterial species hemophilus influenzae. J Exp Med 1931; 53(4): 471-492.
- Morris SK, Moss WJ, Halsey N. Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine use and effectiveness. Lancet Infect Dis 2008; 8(7): 435-443.
- Hallstrom T, Blom AM, Zipfel PF, Riesbeck K. Nontypeable Haemophilus influenzae protein E binds vitronectin and is important for serum resistance. J Immunol 2009; 183(4): 2593-2601.
- Fogarty J, Moloney AC, Newell JB. The epidemiology of Haemophilus influenzae type b disease in the Republic of Ireland. Epidemiol Infect 1995; 114(3): 451-463.
- Ueno K, Nishi J, Imuta N, Tokuda K, Kawano Y. Presence of multiple copies of capsulation loci in invasive Haemophilus influenzae type b (Hib) strains in Japan before introduction of the Hib conjugate vaccine. Microbiol Immunol 2010; 54(3): 160-163.
- Kilian M. A taxonomic study of the genus Haemophilus, with the proposal of a new species. J Gen Microbiol 1976; 93(1): 9-62.
- Falla TJ, Crook DW, Brophy LN, Maskell D, Kroll JS, Moxon ER. PCR for capsular typing of Haemophilus influenzae. J Clin Microbiol 1994; 32(10): 2382-2386.
- Davis GS, Sandstedt SA, Patel M, Marrs CF, Gilsdorf JR. Use of bexB to detect the capsule locus in Haemophilus influenzae. J Clin Microbiol 2011; 49(7): 2594-2601.
- Leaves NI, Falla TJ, Crook DW. The elucidation of novel capsular genotypes of Haemophilus influenzae type b with the polymerase chain reaction. J Med Microbiol 1995; 43(2): 120-124.
- Singhi SC, Mohankumar D, Singhi PD, Ganquly NK. Evaluation of polymerase chain reaction (PCR) for diagnosing Haemophilus influenzae b meningitis. Ann Trop Paediatr. 2002; 22(4):347-53.
- Sasan MS, Naderi Nasab M, Kaffi M, Hamedi AK, Kharazmi AA. Haemophilus influenzae meningitis in infants and children. J Med Mashhad 2009;52(3): 141-146 (Persian).
- Moller Lv, Regelink AG, Grasselie H, Van Alphen L, Dankert J. Antimicrobial susceptibility of Haemophilus Influenzae in the respiratory tracts of patients with cystic fibrosis. Int J Antimicrob Agent Chemother. 1998; 42(2): 319-27.

Identification and Detection of Invasive Haemophilus Influenzae Type b Strains in Clinical Samples Using Polymerase Chain Reaction

Somayeh Bagherzadeh Khodashahri¹,
Seyed Davar Siadat²,
Mohammad Rahbar³

¹ MSc Student in Microbiology, Department of Microbiology, Islamic Azad University, Kerman Science and Research Branch, Kerman, Iran

² Associate Professor, Department of Microbiology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran

³ Professor, Department of Microbiology, Reference Health Laboratories Research Center, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran

(Received March 4, 2013 ; Accepted Jun 17, 2014)

Abstract

Background and purpose: *Haemophilus influenzae* type b (Hib), is one of the major causes of bacterial meningitis in children younger than five years of age, especially in countries that immunization against Hib is not conducted. In this study we have determined the serotype, encapsulated *Haemophilus influenzae* strains isolated from clinical samples by polymerase chain reaction (PCR) method.

Material and Methods: In this study, DNA of *H. Influenzae* spp was extracted through boiling method. The encapsulated strains were determined by *bexA* gene primers. The encapsulated strains serotype were then detected using type-specific primer sets "a to f".

Results: From the total of 50 strains of the *Haemophilus influenzae* isolated from clinical specimen, four strains have shown the *bex A* gene which all of them were encapsulated and all of four isolates have been determined as type b strains.

Conclusion: It is well shown that *H influenzae* spp were not detected by routinely culture method in many clinical laboratories. Despite the presence of pathogenic strains of Hib in different clinical specimens, molecular diagnostic such as PCR should be replaced and performed for miss detected bacteria.

Keywords: *Haemophilus influenzae* type b, serotype, PCR

J Mazand Univ Med Sci 2014; 24(114): 135-139 (Persian).