

بررسی سروولوژی توکسیپلاسموزیس در زنان باردار

سید عبدالله حسینی^۱

نرگس دهگانی^۲

مهند شریف^۳

احمد دریانی^۴

سارا غلامی^۵

فاطمه ابراهیمی^۱

عبدالستار پقه^۳

نصیبیه عارف خواه^۵

چکیده

سابقه و هدف: توکسیپلاسموزیس، توسط تک یاخته درون سلولی توکسیپلاسمما گوندی ایجاد می‌شود. شیوع این انگل در مناطق مختلف با توجه به شرایط جغرافیایی، عادات غذایی و سابقه تماس با گربه متفاوت است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع سرمی توکسیپلاسمما در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان‌های رامسر و تنکابن در سال ۱۳۹۱ بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعي، ۲۸۹ نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان‌های رامسر و تنکابن در سال ۱۳۹۱ به طور تصادفي انتخاب شدند. پس از ثبت اطلاعات در پرسشنامه و تهیه نمونه خون از این افراد، آنتی‌بادی Immunoglobulin M (IgM) و Immunoglobulin G (IgG) علیه توکسیپلاسمما گوندی با روش الیزا مورد آزمایش قرار گرفت پس از انجام آزمایش‌های فوق داده‌ها با آزمون مجدول کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد ۱۷۰ نفر (۵۸/۸ درصد) از افراد مورد مطالعه IgG مثبت، ۷ نفر (۲/۴ درصد) IgM مثبت و ۴ نفر (۱/۴ درصد) نیز هر دو نوع آنتی‌بادی IgM و IgG احتصاصی علیه توکسیپلاسمما را در سرم خود داشتند و ۱۰۸ نفر (۳۷/۴ درصد) از نظر هر دو نوع آنتی‌بادی منفی بودند هم‌چنین در بررسی حاضر بین سطح سرمی IgM و IgG با فاکتورهای اپیدمیولوژیک سن، شغل، سطح تحصیلات، تماس با گربه، مصرف گوشت خام و محل سکونت ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.

استنتاج: مطالعه حاضر نشان دهنده شیوع بالای انگل توکسیپلاسمما در بین زنان باردار در شهرستان‌های رامسر و تنکابن بوده است. با توجه به اهمیت توکسیپلاسموز در زنان باردار، می‌توان با آموزش بهداشت و افزایش سطح آگاهی‌های افراد و اقدامات کنترلی دیگر از ایجاد آلدگی و عوارض آن کاست.

واژه‌های کلیدی: الیزا، IgG، IgM، توکسیپلاسمما

مقدمه

توکسیپلاسمما گوندی ایجاد می‌شود^(۱) این بیماری

یکی از شایع‌ترین عفونت‌های مشترک انگلی بین انسان

توکسیپلاسموزیس یک عفونت مهم در موجودات

زنده است که توسط انگل میکروسکوپی به نام

E-mail: satar2011@gmail.com

مؤلف مسئول: عبدالستار پقه- کیلومتر ۱۸ جاده خزر آباد-مجتمع دانشگاهی پامبر اعظم(ص)- دانشکده پزشکی

۱. گروه انگل شناسی و فارج شناسی، دانشکده پزشکی ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۲. کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، مرکز بهداشت رامسر

۳. مرکز تحقیقات توکسیپلاسموزیس، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۴. کارشناسی ارشد ژنتیک، علوم پزشکی مشهد

۵. کارشناسی ارشد انگل شناسی، علوم پزشکی شهر کرد

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ تاریخ ارجاع چهت اصلاحات: ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ تاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۷/۲۷

درصد و به منظور اطمینان بیشتر با توجه به پیش‌بینی حذف بعضی واحدهای مورد پژوهش، ۲۸۹ نفر در نظر گرفته شد. پس از آگاه کردن افراد از تحقیق و اخذ رضایت از آن‌ها ابتدا اطلاعات اپیدمیولوژیک مورد نیاز شامل سن، جنس، سابقه سقط جنین، تماس با گربه، مصرف کباب و ... در پرسشنامه ثبت شد. سپس از هر فرد ۵ میلی‌لیتر خون جهت انجام آزمایشات گرفته شد و سرم آن‌ها بالا فاصله جدا گردیده و در دمای ۲۰-۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. تمامی نمونه‌ها طبق دستورالعمل کارخانه سازنده کیت Pishtazteb و IgG-ELISA (Diagnosis) _____ دو روش IgM-ELISA مورد آزمایش قرار گرفتند. در این روش برای تعیین جواب‌های مثبت و منفی، مقادیر ایندکس از تقسیم جذب نوری نمونه بر مقدار cut-off به دست آمده است. بر این اساس مقادیر بالاتر از ۱/۱ مثبت و پایین‌تر از ۰/۹ منفی قلمداد شدند. هم‌چنین نمونه‌هایی که ایندکس آن‌ها بین ۰/۹ تا ۱/۱ بود مشکوک در نظر گرفته شد پس از مدتی با استفاده از سرم یا پلاسمای تازه مجدد آزمایش شدند. پس از انجام آزمایش‌های فوق کلیه داده‌ها جمع آوری و با کمک نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی معنی‌داری رابطه از آزمون‌های مجذور کای با ضریب اطمینان ۹۵ درصد استفاده شد.

یافته‌ها و بحث

در این مطالعه از ۲۸۹ خانم باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشت، ۵۸/۸ درصد نفر (۱۷۰ نفر) در سرم خود IgG علیه توکسوپلاسما گوندی داشتند. آنتی‌بادی IgM علیه انگل توکسوپلاسما در ۹۷/۶ درصد موارد ۲۸۲ نفر) منفی بود. ۱/۴ درصد (۴ نفر) از افراد مورد مطالعه هر دو نوع آنتی‌بادی (IgM و IgG) اختصاصی علیه توکسوپلاسما را در سرم خود داشتند و ۳۷/۴ درصد (۱۰۸ نفر) از نظر هر دو نوع آنتی‌بادی منفی بودند. محدوده سنی افراد مورد مطالعه ۱۵ تا ۴۵ سال بود.

و حیوان است. میزان آلودگی به این انگل به دلیل تفاوت در آداب و رسوم، عادات غذایی، وضعیت آب و هوایی و میزان مخزن متغیر می‌باشد. مطالعات در زمینه تعیین شیوع توکسوپلاسموزیس حاکی از گسترش جهانی این انگل است و در کشورهای مختلف میزان شیوع آن متفاوت است^(۲،۳). آلودگی افراد با سیستم ایمنی نرمال به توکسوپلاسموزیس اغلب بدون علائم بالینی است آلودگی به توکسوپلاسموز در خانم‌های باردار اهمیت بیشتری دارد زیرا موجب ابتلاء جنین به توکسوپلاسموز مادرزادی می‌شود چون این انگل توانایی عبور از جفت به جنین را داشته و بسته به زمان آلودگی مادر باردار، عوارضی چون سقط جنین، میکروسفالی، هیدروسفالی، عقب افتادگی ذهنی، کلسفیکاسیون مغزی، کوری و مرگ جنین را به دنبال خواهد داشت^(۴). اطلاع از جمعیت دختران و زنان غیر ایمن به توکسوپلاسما می‌تواند معیار خوبی برای پی بردن به جمعیت زنان در معرض خطر سقط یا مرگ جنین به علت توکسوپلاسما و همچنین میزان کودکان در معرض توکسوپلاسموز مادرزادی باشد تا با تدوین برنامه‌های مراقبتی و آموزشی و ارائه آن به این قشر مهم از جامعه در راستای پیشگیری از توکسوپلاسموز مادرزادی و عوارض ناشی از آن اقدامات مناسب انجام شود. لذا مطالعه حاضر، با هدف تعیین میزان شیوع سرمی آنتی‌بادی علیه عفونت توکسوپلاسموز در زنان باردار مراجعة کننده به مرکز بهداشت شهرستان‌های رامسر و تنکابن در سال ۱۳۹۱ انجام شد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه توصیفی- مقطعی (cross-sectional) در سال ۱۳۹۱ در خانم‌های باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان‌های رامسر و تنکابن به عنوان جامعه مورد مطالعه انجام گرفت. نمونه‌گیری به صورت خوش‌های صورت گرفت و حجم نمونه با توجه به میزان شیوع آلودگی (۵۵ درصد در شمال) و سطح اطمینان ۹۵

درصد از افراد دارای آنتی بادی IgG ضد توکسوپلاسمای بودند که نشان دهنده ابتلا قدیمی این افراد با توکسوپلاسمای باشد. به طور کلی وجود IgM یا IgA اختصاصی علیه انگل توکسوپلاسمای در سرم مادر دال بر وجود عفونت اخیر است اما اگر تیتر آنتی بادی IgG وجود توکسوپلاسمای در هر بار تست در دوران بارداری افزایش یابد و همچنین تیتر آنتی بادی IgM برای این بیماری مثبت باشد، فرد به احتمال فراوان به بیماری توکسوپلاسموز فعال مبتلا می‌باشد.^(۴، ۶). در مناطق شمالی ایران به دلیل رطوبت بالا و درجه حرارت مناسب، شرایط هاگ سازی و بقای اووسیست به خوبی صورت می‌گیرد. مطالعات مختلف در ایران نشان داده است بالاترین میزان شیوع توکسوپلاسموز مربوط به حاشیه دریایی خزر بوده است که با مطالعه حاضر هم خوانی دارد.^(۷-۹). در بررسی حاضر رابطه آماری معنی داری بین میزان موارد مثبت آنتی بادی ها و سن به دست نیامد، که یکی از دلایل این امر محدود بودن گروه سنی خانم های باردار و کاهش تعداد افراد در گروه سنی بالاتر می باشد. این مورد با تحقیقاتی که دریانی و همکاران در شهر اردبیل انجام دادند، هم خوانی دارد.^(۱۰). با توجه تنش راه های انتقال توکسوپلاسمای توان حضور و فراوانی گریه ها در یک منطقه را به تهایی توجیه مستقلی برای شیوع عفونت محسوب نمود. نتایج برخی مطالعات نشان می دهد علی رقم وفور گریه ها میزان شیوع واکنش های سرمی مثبت بر این توکسوپلاسمای در حد پائینی بوده است.^(۱۱). نتایج این پژوهش نشان داد بین محل سکونت، میزان تحصیلات مادر و شغل با تیتر آنتی بادی علیه توکسوپلاسمای رابطه معنی داری وجود ندارد. در مطالعه شریف در استان مازندران و Ertug در ترکیه نیز بین این متغیرها و آلدگی به انگل توکسوپلاسمای تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.^(۷). که از مهم ترین دلایل این امر می تواند افزایش سطح رعایت اصول بهداشتی در عموم افراد جامعه به ویژه در مناطق روستایی و خانه های خانه

فراوانی مثبت شدن تست در گروه های سنی مختلف نشان داد که بالاترین فراوانی در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال بود بین سن افراد باردار و ابتلا به توکسوپلاسموزیس از نظر آماری ارتباط معناداری وجود نداشت ($p=0.62$). همچنین جمعیت مورد مطالعه از نظر تماس با گریه نیز مورد بررسی قرار گرفتند که ارتباط معنی داری مشاهده نشد ($p=0.8$) در نهایت بررسی افراد از نظر شغل و عادات غذایی در استفاده از گوشت خام یا خوب پخته نشان داد هیچ گونه ارتباط معنی داری بین این متغیرها و مثبت شدن آزمایش وجود ندارد (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱: توزیع فراوانی آنتی بادی های ضد توکسوپلاسمای بحسب عوامل ایدئیولوژیک

مادران باردار غیر مبتلا	مادران باردار مبتلا	سطح معنی داری
(درصد) (۵۰/۸)۶۲ $p=0.88$	(درصد) (۵۹/۲)۹۰	شهر
(۴۱/۶)۵۷	(۵۸/۴)۸۰	روسی
(۳۴/۸)۸	(۶۵/۱)۱۵	شغل
$p=0.51$		
(۴۱/۷)۱۱۱	(۵۸/۳)۱۵۵	خانه دار
(۴۲/۹)۱۸	(۵۷/۱)۲	دارد
$p=0.81$		تعاس با گریه
(۴۰/۹)۱۰۱	(۵۹/۱)۱۴۶	ندارد
(۳۳/۳)۲	(۶۶/۷)۴	بی سواد
$p=0.95$		سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی
(۴۲/۳)۶۹	(۵۷/۷)۶۴	دبیل و بالاتر
(۴۰/۷)۲۲	(۵۹/۳)۳۲	پخته
$p=0.94$	(۴۰/۹)۹	صرف گوشت خام نیز پخته
(۴۱/۳)۸۸	(۵۸/۷)۱۲۵	هردو

ابتلا به توکسوپلاسموز در صورتی که در طی دوران بارداری برای اولین بار اتفاق بیفتد، خطر انتقال انگل از مادر به جنین را دارد و بسته به زمان آلدگی مادر باردار خدمات جبران ناپذیری را برای نوزاد در بی خواهد داشت.^(۳، ۵). در مطالعه حاضر ۳۷/۴ درصد جامعه مورد بررسی از نظر آنتی بادی های علیه توکسوپلاسمای منفی هستند که این زنان بالقوه در معرض ابتلا به توکسوپلاسموز اکتسابی حاد طی دوران بارداری و انتقال آن به جنین خود می باشند. همچنین ۵۸/۸

همچنین راه های انتقال انگل و شیوه پیشگیری از آن را به زنانی که در سنین باروری هستند، مورد تاکید قرار گیرد که این امر مهم، اهمیت ویژه ای در کاهش شیوع توکسپلاسموز مادرزادی دارد.

دار باشد. با توجه به اهمیت این بیماری در دوران بارداری و اثرات سوء این عفونت روی جنین لازم است مسئولین امر و کارکنان مراکز بهداشتی استان با تدوین و اجرای برنامه های آموزشی اهمیت و پیامدهای بیماری و

References

- Hosseinzadeh M, KhoSravi A, Shidelzade L, Kalantari B, Ranjbar R. Seroepidemiological assessment of toxoplasmosis in women with and without abortion history in Ilam. J Health Syst Res .2011; 4 (6): 626-633.
- Hatam GH, Shamseddin A, Nikouee F. Seroprevalence of toxoplasmosis in high school girls in Fasa district Iran. IJI. 2005; 3(2): 177-181.
- Jiménez- Coello M, Acosta-Viana KY, Guzmán-Marín E, Puerto-Solís M, Ortega-Pacheco A. Toxoplasmosis: A relevant zoonotic food borne disease in tropical conditions AFR J Microbiol Res. 2012; 6(12): 2956-2964.
- Jones J, Lopez A, Wilson M. Congenital toxoplasmosis. Am Fam Physician. 2003; 67(10): 2131-2138.
- Rafiei A, Hamadi A, Amani F. Seroprevalence of Toxoplasma among girl students in Ahvaz city,Iran. J Infect Trop Dis. 2006; 10: 35-41.
- Thulliez P. Screening programms for congenital toxoplasmosis in France. Scand J Infect Dis Suppl. 1992; 84: 43-45.
- Sharif M, Ziae H, Daryani A, Ajami A. Seroepidemiological study of toxoplasmosis in intellectual disability children in rehabilitation centers of northern Iran. Res Dev Disabil 2007; 28(3): 219-224.
- Sharif M, Ajami A, Daryani A, Ziae H, Khalilian A. Serological survey of Toxoplasmosis in women referred to Medical Health Laboratory before marriage, Northern, Iran, 2003-2004. Int J Mol Med Adv Sci. 2006; 2(2): 134-137.
- Pagheh A S, Fakhar M, Sharif M, AsadiKia A. Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* infection among children in rural areas of Maraveh-tapeh district in Golestan Province. J Mazand Univ Med Sci 2013; 22(2): 110-115.
- Daryani A, Sagha M. Seroepidemiology of toxoplasmosis in women referring to the laboratory of health center in Ardabil for premarital medical examination. J Ardabil Univ Med Sci .2004; 4(13): 19-25.
- Kamyabi Z, Atapour M. Investigation of the Prevalence of *Toxoplasma Antibodies* in Women during Marriage Consultation in Kerman City. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 1999; 6(3): 127-133.
- Ertug S, Okyay P, Turkmen M, Yuksel H. Seroprevalence and risk factors for toxoplasma infection among pregnant women in Aydin province, Turkey. BMC Public health. 2005; 5: 66.

Serological Survey of Toxoplasmosis in Pregnant Women

Seyad Abdollah Hoseini¹,
Narges Dehgani²,
Mehdi Sharif³,
Ahmad Daryani³,
Sara Gholami⁴,
Fatemeh Ebrahimi¹,
Abdol Sattar Pagheh¹,
Nasibeh Arefkhah⁵

¹ PhD Student in Parasitology, Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

² MSc in Microbiology, Mazandaran University of Medical Sciences, Ramsar, Iran

³ Toxoplasmosis Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

⁴ MSc in Genetics, Mashhad University of Medical Sciences, Iran

⁵ MSc in Parasitology, Shahrood University of Medical Sciences, Iran

(Received Jan 4, 2013; Accepted April 27, 2014)

Abstract

Background and purpose: Toxoplasmosis is an infection caused by an intercellular protozoan called *Toxoplasma gondii*. Toxoplasma has global expansion and its prevalence is different in regions according to geographical conditions, habits and history of contact with cats. The present study determined the seroepidemiology of toxoplasma in pregnant women attending health centers in two cities in north of Iran.

Material and Methods: In this cross-sectional study, 289 pregnant women who referred to health centers in Ramsar and Tonekabon were randomly selected. After the debriefing questionnaire, blood samples were taken from the subjects. Then IgG and IgM antibodies against *T. gondii* were examined by ELISA method. Finally the data was analyzed in SPSS

Results: Positive IgG and IgM anti-Toxoplasma antibody were found in 170 (58.8%) and 7 (2.4%) expectant mothers, respectively. Among the participants four (1.4%) were positive for both IgM and IgG and 116 (40.1%) were negative for both types of antibodies. There was no significant relation between the possible risk of *T. gondii* infection and pregnant women's place of living, educational level, age, occupation, exposure to cats, and the consumption of raw meat.

Conclusion: This study demonstrates a high prevalence of Toxoplasma among pregnant women in Ramsar and Tonekabon. Hence, more training are necessary to raise awareness especially in pregnant women

Keywords: Toxoplasma, IgG, IgM, ELISA

J Mazand Univ Med Sci 2014; 24(114): 146-150 (Persian).