

بررسی میزان رعایت اصول خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

سینا صبوریان جویباری^۱

هدایت جعفری^۲

سید حسام میرانی^۱

فاطمه مطلق^۳

امیرحسین گودرزیان^۱

Investigating Self-care Behavior in Patients with Heart Failure

Sina Sabourian Jouybari¹,

Hedayat Jafari²,

Seyyed Hessam Mirani¹,

Fateme Motlagh¹,

Amir Hossin Goudarzian¹

^۱ MSc Student in Nursing, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences Sari, Iran

^۲ Assistant Professor, Department of Medical-Surgical Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences Sari, Iran

مریبوط به سنجش توان خود مراقبتی بیماران نارسایی قلبی، بهترین رفشار به ترتیب شامل مصرف دارو طبق تجویز، استراحت کافی در طول روز، مصرف غذاهای کم نمک بود و ضعیف ترین رفشارها به ترتیب شامل: تزریق واکسن آنفولانزا و ورزش منظم بوده است. نتایج نشان داد که میانگین رفشارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در حد متوسط (۳۸/۰۴) بوده است که این نتایج با نتایج مطالعه Koeling (۳) هم خوانی دارد و با نتایج Oksel (۴) که در کشور ترکیه انجام شد، هم خوانی ندارد. عوامل زیادی بر انجام رفشارهای خود مراقبتی موثر هستند که از جمله آنها می توان به مواردی نظیر کمبود اطلاعات، محدودیت های جسمی، عدم سازگاری با درمان های متعدد و مشکلات عاطفی اشاره کرد (۵). لذا فرایند یاد دهنده و یادگیری فعالیت های خود مراقبتی می تواند فرد را به سمت سلامتی، رفاه، سازگاری، افزایش توان مراقبت از خود، کاهش از کار افتادگی و روند تسریع و بهبودی خود سوق دهد.

نارسایی قلبی (Heart Failure) یکی از شایع ترین اختلالات قلبی - عروقی است (۱). خود مراقبتی توانایی افراد جهت انجام اعمال خود مراقبتی بر روی خودشان می باشد (۲). هدف از این پژوهش توصیفی - مقطعی تعیین میزان رعایت اصول خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در مرکز قلب مازندران (ساری) در سال ۱۳۹۳ بوده است. نمونه های پژوهش شامل ۴۷ بیمار مبتلا به نارسایی قلبی بود. ابزار این پژوهش پرسشنامه اروپایی رفشارهای خود مراقبتی نارسایی قلبی بود. این پرسشنامه که شامل دوازده سوال مرتبط با توزین وزن روزانه، محدود کردن مایعات، غذاهای کم نمک و غیره می باشد. در این پژوهش، توان خود مراقبتی بیماران بر اساس نمره کسب شده به سه سطح خوب (۱ الی ۲۰)، امتیاز، متوسط (۲۱ الی ۴۰ امتیاز) و ضعیف (۴۱ الی ۶۰ امتیاز) تقسیم شد. از مجموع ۴۷ بیمار شرکت کننده در این مطالعه، ۷۳/۸ درصد زن بودند که میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۴۷±۱/۲۷ سال بود. از بین دوازده سوال

E-mail: Hedayat2003@yahoo.com

مؤلف مسئول: هدایت جعفری - ساری: دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه

۱. دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۲. استادیار، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۳. تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ تاریخ ارجاع چهت اصلاحات: ۱۳۹۴/۱/۲۴ تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۶/۱۵

References

1. Jackson SF, Cole DC. Graduate global public health education: activities and outcomes in relation to student prior experience. Glob J Health Sci 2013; 5(3): 54-63.
2. Sherina MS, Rampal L, Kaneson N. Psychological stress among undergraduate medical students. Med J Malaysia 2004; 59(2): 207-211.
3. Aghajanolou A, Haririan H, Ghafourifard M. Violence during clinical training among nursing students of Zanjan universities of medical sciences. Iran J Nurse Res 2010; 5(17): 46-54.
4. Crilly J, Chaboyer W, Creedy D. Violence towards emergency department nurses by patients. Accid Emerg Nurs 2004; 12(2): 67-73.
5. Riegel B, Carlson B. Facilitators and barriers to heart failure self-care. Patient Edu Couns 2002; 46(4): 287-295.

Archive of SID