

ORIGINAL ARTICLE

Heavy Metal Contamination in the Effluent and Sludges of Wastewater Treatment Plant in Gorgan, Iran

Yousef Dadban Shahamat¹,
 Nasrin Sangbari²,
 Ali Zafarzadeh¹,
 Somayeh Beiram³

¹ Assistant Professor, Environmental Health Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

² MSc in Civil Engineering, water and wastewater, Lamei Gorgani Institute of Higher Education, Gorgan, Iran

³ MSc in Analytical Chemistry, Environmental Health Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

(Received Jan 9, 2017 Accepted April 24, 2017)

Abstract

Background and purpose: Environmental pollution by heavy metals and their transfer to soil and crops are a growing global problem. This study aimed to measure the concentrations of heavy metals in wastewater and sludge wastewater treatment plant in Gorgan, Iran.

Materials and methods: In this cross-sectional study, 176 samples of effluent, and returned and dried sludges were analyzed in wastewater treatment plant in Gorgan, during six months in 2016. The concentration of Pb, Cd, Ni, and Cr were determined using polarography (Metrohm797 AV) and furnace atomic adsorption spectroscopy (AA 240 Varian Co.) in the laboratory of Health Faculty in Golestan University of Medical Sciences.

Results: The average concentrations of Pb, Cd, Ni, and Cr in the effluent were 0.105 ± 0.06 , 0.0089 ± 0.008 , 0.095 ± 0.108 , and 0.102 ± 0.175 mg /L, respectively. The concentrations of Pb, Cd, Ni, and Cr in returned sludge were 323.48 ± 217.65 , 2.44 ± 3.3 , 354.14 ± 322.79 , and 388.53 ± 252.59 mg /kg of dry weight, respectively. Also, in dried sludge, the average concentrations of lead, cadmium, nickel, and chromium were 58.48 ± 2.67 , N.D, 30.31 ± 1.98 , and 506.25 ± 813.81 mg/kg of dry weight, respectively.

Conclusion: The concentrations of heavy metals in wastewater effluent and dried sludge, except in returned sludge, were below the standards. Due to long-term use of effluents, necessity of treatment of other parameters, and the effect of bioaccumulation of metals in sludge, caution should be taken for their agricultural application. Also, because of importance of this type of contaminants in soil and food products, continuous monitoring by water companies is highly necessary.

Keywords: heavy metals, wastewater, sludge, Gorgan

J Mazandaran Univ Med Sci 2017; 27 (150):158-169.(Persian).

بررسی فلزات سنگین در پساب و لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری گرگان

¹ یوسف دادبان شهامت

² نسرین سنگ بری

¹ علی ظفرزاده

³ سمیه بیرامی

چکیده

سابقه و هدف: آلودگی محیط زیست با فلزات سنگین و انتقال آن به محصولات به عنوان یک مشکل جهانی در حال گسترش، مطرح می‌باشد. این مطالعه با هدف سنجش فلزات سنگین در پساب و لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر گرگان انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی است که تعداد 176 نمونه پساب و لجن برگشتی و خشک شده از محل تصفیه خانه فاضلاب گرگان طی 6 ماه در سال 95 نمونه برداری و غلظت فلزات سرب، کادمیوم، نیکل و کروم توسط دستگاه پلارو گراف مدل متروم ساخت کشور سوئیس و جذب اتمی کوره مدل 240 واریان در محل آزمایشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان سنجش شد.

یافته‌ها: میانگین غلظت سرب در پساب $0.105 \pm 0.006 \text{ mg/L}$ بوده که این مقدار برای کادمیم 0.0089 ± 0.008 ، نیکل 0.095 ± 0.0108 و برای کروم $0.102 \pm 0.0175 \text{ mg/L}$ میلی گرم در لیتر اندازه گیری شده است. در لجن برگشتی فاضلاب شهری میزان غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیم، نیکل و کروم به ترتیب $388/53 \pm 252/59$ ، $354/14 \pm 322/79$ ، $2/44 \pm 3/3$ ، $323/48 \pm 217/65$ میلی گرم بر کیلو گرم وزن خشک سنجش شد. همچنین در لجن خشک شده دفعی نیز میانگین غلظت سرب $0.58 \pm 0.48 \text{ mg/L}$ ، نیکل $0.30 \pm 0.31 \text{ mg/L}$ ، کادمیم $0.198 \pm 0.198 \text{ mg/L}$ و کروم $0.25 \pm 0.256 \text{ mg/L}$ میلی گرم بر کیلو گرم وزن خشک به دست آمده است.

استنتاج: غلظت فلزات سنگین در پساب و لجن خشک شده، به استثناء لجن برگشتی، در زیر حد استاندارد بود. با توجه به مصرف طولانی، لزوم ثبت سایر پارامترها و اثر تجمع یزدیری فلزات در لجن، باید در کاربرد آن‌ها برای مصارف کشاورزی دقت و احتیاط لازم به عمل آید. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت حضور این نوع از آلاینده‌ها در خاک و محصولات غذایی، پایش مستمر آن‌ها توسط شرکت‌های آب و فاضلاب ضروری است.

واژه‌های کلیدی: پساب، فلزات سنگین، لجن، گرگان

مقدمه

در طول سی سال گذشته، هدف از تصفیه فاضلاب بهبود کیفیت پساب تصفیه شده، با توجه به تحولات نظارتی و افزایش حساسیت به مسائل زیست‌محیطی و حفاظت از منابع آب بوده است. آبیاری با فاضلاب بهبود کیفیت پساب تصفیه شده، با توجه به تحولات

Email: nsarin.sb@gmail

مؤلف مسئول: نسرین سنگبری - گرگان: موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی لامعی گرگانی، گروه مهندسی عمران

1. استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2. کارشناس ارشد مهندسی عمران - آب و فاضلاب، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی لامعی گرگانی، گرگان، ایران

3. کارشناس ارشد شیمی تجزیه، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

** تاریخ دریافت: 1395/10/20 تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: 1395/10/26 تاریخ تصویب: 1396/2/4

است(12). در حال حاضر آلودگی به این آلاینده‌ها رو به افزایش بوده و در نتیجه تجمع این فلزات در گیاهان و حیوانات علاوه بر آسیب‌های جدی بر این موجودات، مصرف فرآورده‌های آن‌ها برای سلامت مصرف کنندگان نهایی یعنی انسان را بسیار مخاطره آمیز کرده است(13). یکی از راه‌های اصلی مواجهه انسان به فلزات سنگین، مسیر خاک- سبزیجات- موادغذایی است؛ در نتیجه حضور فلزات سنگین در پساب و لجن فاضلاب تصفیه خانه‌ها همواره به عنوان یک منبع قابل توجه از آلاینده‌های آب و خاک مطرح می‌باشد(14). به طور کلی روش‌های مختلفی برای دفع نهایی لجن وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها سوزاندن، دفع در محل‌های دفن بهداشتی و استفاده به عنوان کود در زمین‌های کشاورزی است. با وجود این، استفاده در زمین، هم‌چنان یکی از متداول‌ترین روش‌های موجود دفع لجن در بسیاری از کشورها محسوب می‌شود. بر این اساس برای به کارگیری لجن تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری در کشاورزی، عوامل آلاینده موجود در آن‌ها باید به دقت مورد مطالعه دقیق قرار بگیرد، تا حتی الامکان از بروز مسایل بهداشتی و زیست‌محیطی جلوگیری شود(15).

هم‌چنان در ک جامع از منابع این نوع از آلودگی‌ها و روند تغییرات و حذف آن‌ها در تصفیه خانه‌های فاضلاب جهت به حداقل رساندن اثر آن‌ها بر محیط زیست آبی و خاکی و استفاده مجدد ضروری است. با این حال، ارزیابی و شناسایی منابع فلزات سنگین در فاضلاب شهری به دلیل تغییرات زمانی کیفیت فاضلاب، پراکنده‌گی جمعیت و مکان منابع و رود آلاینده‌ها، کار پیچیده‌ای است و نیاز به پایش مستمر دارد(14). به طوری که فقدان نظارت کافی بر کیفیت پساب و لجن‌های دفعی از تصفیه خانه‌های کشور موجب شده که در بیش تر موارد این مواد به صورت تجمع یافته به محیط راه پیدا نموده و خسارات زیادی را بر منابع طبیعی وارد نمایند و آلودگی آب، خاک و محصولات کشاورزی و

تصوفیه شده یکی از جایگزین‌های عملده برای حفظ منابع آب موجود و بهبود منابع آب شهری در بسیاری از شهر است(1). در استفاده مجدد از پساب، اگر به کیفیت میکروبی پساب و جنبه‌های بهداشتی آن توجهی نشود، خطر جدی برای بهداشت و سلامتی انسان و محیط زیست به همراه خواهد داشت، این موضوع زمانی با اهمیت‌تر خواهد بود که از پساب برای آبیاری فضای سبز عمومی و پارک‌ها و محصولات خوراکی از جمله صیفی‌جات و سبزیجات استفاده شود(2). به علاوه، فاضلاب‌ها دارای مقدار زیادی از عناصر مغذی شامل فسفر و نیتروژن، مواد آلی و سایر مواد ضروری گیاه است(3). با این حال ممکن است فاضلاب حاوی مقادیر قابل توجهی از فلزات سنگین و دیگر مواد آلی سمی صنعتی باشد که می‌تواند تهدید جدی زیست محیطی برای کیفیت شیمیایی خاک و محصولات کشاورزی و هم‌چنین بهداشتی باشد(5)، به طوری که تجمع بیش از حد فلزات سنگین در خاک سبب کاهش کیفیت مواد غذایی، سلامت و بهداشت گردد(7). پساب و لجن فاضلاب شهری شامل فلزات سنگین، مواد مغذی اصلی و ریز مغذی‌ها و آلاینده‌های آلی بوده(8) و انواع میکروارگانیسم‌ها و تخم انگل‌ها، که در برابر مقادیر مرسوم گذارده مقاومت می‌کنند، در آن وجود دارند(9). به طور کلی، فلزات سنگین، مانند کادمیوم (Cd)، کروم (Zn)، جیوه (Hg)، سرب (Pb)، مس (Cu)، روی (Cr) و نیکل (Ni) به فلزات با چگالی بیش تر از 5 g/cm³ اشاره دارد. این مواد و ترکیبات آن‌ها به طور طبیعی در سراسر محیط خاک و در همه جا یافت می‌شوند(10). حضور و پایداری فلزات سنگین در محیط، خاصیت تجمعی آن‌ها در بدن موجودات و عدم تجزیه آن‌ها مانند سایر ترکیبات آلی، مشکلات قابل ملاحظه زیست محیطی و بهداشتی را ایجاد می‌نماید(11).

این در حالی است که سمتی این آلاینده‌ها و خطر تجمع بیولوژیکی آن‌ها در زنجیره غذایی، اهمیت بهداشتی آن‌ها را در جوامع امروزی بیش تر کرده

در صد درصد هضم اسیدی تر شدند. جهت هضم نمونه‌های لجن، ۵ میلی لیتر از نمونه لجن را برداشته در یک بشر ۵۰ میلی لیتری ریخته، سپس ۵ میلی لیتر اسید نیتریک ۶۵ درصد به نمونه اضافه شده و به مدت ۲۴ ساعت زیر هود قرار داده شد. بعد از ۲۴ ساعت، نمونه به مدت حدود ۳ ساعت در بن‌ماری در دمای ۹۵ درجه سانتی گراد قرار گرفت تا حجم آن به ۱۰ تا ۱۵ میلی لیتر کاهش یابد. برای جلوگیری از تبخیر و نیز افزایش pH، به طور متوالی به نمونه آب مقطر اضافه می‌شد. پس از سپری شدن این زمان و خنک شدن، نمونه توسط کاغذ صافی واتمن شماره ۴۲ صاف شده و با آب مقطر در بالن ژوژه ۵۰ میلی لیتری به حجم رسانده شد و در نهایت آماده سنجش توسط دستگاه شد، سپس برای محاسبه غلظت فلزات سنگین از معادله ۱ استفاده شد(۱۸):

یافته‌ها

نتایج جدول شماره ۱ نشان داد میزان میانگین غلظت فلزات سنگین سرب در پساب برابر $0/105 \pm 0/06$ mg/L بوده که این مقدار برای کادمیم برابر $0/0089 \pm 0/008$ mg/L، نیکل برابر $0/095 \pm 0/108$ mg/L و برای کروم برابر $0/102 \pm 0/175$ mg/L اندازه گیری شد.

N.D = غیر قابل تشخیص

میزان غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیم، نیکل و کروم در لجن برگشتی فاضلاب شهری با توجه به جدول شماره ۲ به ترتیب $323/48 \pm 217/65$ mg/kg، $35/14 \pm 322/79$ mg/kg و $2/44 \pm 3/3$ mg/kg $388/45 \pm 252/59$ mg/kg سنجش شد. همچنین میزان غلظت سرب، کادمیم، نیکل و کروم در لجن خشک شده به ترتیب برابر $58/48 \pm 2/67$ ، غیر قابل تشخیص، $30/31 \pm 1/98$ و $506/25 \pm 813/81$ میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک سنجش شده که این مقدار از استانداردهای EPA DWAF guidelines آمریکا و

شیوع بیماری‌های مزمن را به وجود آورند(۱۶). لذا این تحقیق با هدف ارزیابی غلظت فلزات سنگین مهم در پساب دفعی، لجن برگشتی و لجن خشک شده دفعی و مقایسه آن‌ها با مقدار استاندارد در تصفیه خانه فاضلاب شهر گرگان انجام شد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه از نوع مطالعه توصیفی - تحلیلی می‌باشد که در آن غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیم، نیکل و کروم در پساب و لجن فاضلاب تصفیه خانه شهری گرگان به مدت ۶ ماه و با سه تکرار در ماه، در سال ۱۳۹۵ سنجش شد. سیستم تصفیه فاضلاب گرگان از نوع لجن فعال هواده‌ی گسترده می‌باشد که شامل ۴ مرحله تصفیه مقدماتی آشغالگیری، دانه‌گیری، تصفیه بیولوژیکی، تهنشینی و ضد عفونی می‌باشد. در کل ۶ مراحل تحقیق، تعداد ۱۷۶ نمونه فلز سنگین در طی ۳ ماه، به صورت ماهیانه ۳ نمونه از هر فلز، در دو دوره معرف فصل پرآبی و کم‌آبی از فروردین تا شهریور ماه سال ۱۳۹۵ مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفت؛ برای سنجش حدود استاندارد پساب مورد استفاده برای آبیاری مناطق کشاورزی پائین دست، نمونه‌های پساب از محل پساب کلرزنی شده خروجی و برای سنجش تغليظ این فلزات در لجن در گردش و لجن دفعی مورد استفاده به عنوان کود در زمین‌های کشاورزی، نمونه لجن برگشتی از حوض لجن برگشتی و لجن خشک شده نیز از بسترها لجن خشک کن مطابق روش استاندارد برداشت شده و به آزمایشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان منتقل شد. جهت آنالیز فلزات سنگین از دستگاه‌های دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی مدل ۲۴۰ FS ساخت کمپانی واریان و پلازوگراف مدل ۷۹۷ متروم سوئیس به روش ولتا مترا استفاده شد(۱۵، ۱۷). دستگاه‌ها بهداشت با محلول‌های استوک ۴ فلز کالیبره شد و سپس نمونه‌ها بر اساس روش کتاب استاندارد متده توسط اسید نیتریک ۶۵

جدول شماره 1: غلظت فلزات سنگین در پساب تصفیه خانه فاضلاب و استانداردهای داخلی و خارجی

pH	EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	کروم (mg/L)	نیکل (mg/L)	کادمیوم (mg/L)	سرب (mg/L)	تاریخ نمونه برداشته / پارامتر مورد بررسی
7/42	1205	0/0102	0/0973	0/0082	0/0412	95/01/16
7/77	1260	0/00825	0/0441	N.D	0/0652	95/01/24
7/53	1082	0/0068	0/0585	N.D	0/0753	95/01/30
7/69	1211	0/0068	0/0495	0/0111	0/0934	95/02/05
7/69	1195	0/0102	0/0364	0/0037	0/0703	95/02/13
7/81	1227	0/00495	0/0357	0/0026	0/0715	95/02/25
7/89	1232	0/00825	0/0966	0/0203	0/1367	95/03/04
8	1275	0/00825	0/1021	0/0218	0/1383	95/03/16
7/9	1293	0/216	0/0134 [±]	0/0048	0/09705	95/03/31
7/99	1261	0/216	0/0972	0/004	0/0294	95/04/02
7/73	1252	0/104	0/5117	0/0096	0/1089	95/04/12
7/88	1263	0/088	0/1159	0/0112	0/0415	95/04/27
7/91	1307	0/754	0/042	0/0269	0/1271	95/05/04
7/98	1234	0/08	0/0659	0/0195	0/1172	95/05/16
8/11	1237	0/1066	0/0473	0/0092	0/0614	95/05/23
7/85	1265	0/1054	0/1316	0/0082	0/1277	95/06/01
7/87	1317	0/052	0/0871	N.D	0/358	95/06/24
7/96	1322	0/063	0/0875	N.D	0/2585	95/06/30
7/83	1242	0/102706	0/095544	0/00895	0/105	میانگین غلظت
-	-	1	2	0/05	1	استاندارد حفاظت محیط زیست ایران - آبیاری (19)
-	-	0/1	0/2	0/01	5	استاندارد سازمان جهانی بهداشت (19)
-	-	0/1	0/2	0/01	5	استاندارد حفاظت محیط زیست آمریکا (19)
-	-	0/1	0/2	0/2	5	(20) FAO
-	-	0/1	0/2	0/01	0/1	Food and Agriculture Organization
-	-	0/1	0/2	0/01	0/1	(20) MVE Ministry of Waters and Electricity

جدول شماره 2: غلظت فلزات سنگین در لجن برگشتی تصفیه خانه فاضلاب (بر حسب mg/kg وزن خشک) و استانداردها

pH	EC $\mu\text{s}/\text{cm}$	TSS mg/L	Cr	Ni	Cd	Pb	تاریخ نمونه برداشته / پارامتر مورد بررسی
7/35	1229	10890	890/72	542/51	N.D	97/199	95/01/16
7/38	1225	6940	374/63	563/11	5/33	389/4	95/01/24
7/44 [±]	1041	6100	508/19	600	5/32	514/75	95/01/30
7/48	1175	2900	655/17	678/96	5/86	686/2	95/02/05
7/48	1137	6100	573/71	350/98	N.D	332/95	95/02/13
7/52	1198	5060	573/12	349/6	N.D	387/94	95/02/25
7/46	1292	6600	303/03	446/21	N.D	278/47	95/03/04
7/61	1222	5540	685/92	391/87	N.D	452/79	95/03/16
7/71	1246	4300	95/454	55/11	N.D	424/41	95/03/31
7/81	1228	3340	377/272	1307/48	N.D	817/81	95/04/02
7/73	1215	4210	172/727	464/84	N.D	505/93	95/04/12
7/81	1207	2740	768/1818	103/954	2/159	173/409	95/04/27
7/80	1244	3480	131/8181	81/409	7	199/613	95/05/04
7/90	1438	4300	131/8181	168/045	2/181	115/704	95/05/16
7/93	1273	2800	104/545	67/59	11/25	85/545	95/05/23
7/80	126	2700	259/0909	20/409	2/5454	97/181	95/06/01
7/69	1265	3240	209/0909	126/2272	N.D	66/3636	95/06/02
7/93	1297	2820	177/727	56/2272	N.D	196/3636	95/06/03
7/66	1167	4670	388/45	354/140	2/31	323/48	میانگین غلظت
-	-	-	1200	420	39	300	(15) EPA-503
-	-	-	450	200	5	150	(22) DWAF guidelines
-	-	-	1200	420	10	300	American (23)
-	-	-	1000	100	10	200	Canada(23)

شماره 3، در خصوص غلظت فلزات سنگین در لجن خشک شده تصفیه خانه فاضلاب، بیشترین غلظت مربوط به فلز کروم و کمترین مربوط به فلز کادمیوم مشاهده گردید.

کانادا پایین تر مشاهده شد. همبستگی درون گروهی فلزات سنگین با یکدیگر و پارامترهای فیزیکوشیمیابی EC، TSS و pH در پساب و لجن برگشتی نیز به ترتیب در جداول شماره 5 و 6 نشان داده شده اند. مطابق جدول

جدول شماره 4: مقایسه میانگین Ni, Cd, Pb و Cr در لجن خشک شده و لجن برگشتی بر اساس نرمال بودن داده ها

	نوع آزمون	P value	انحراف از میانگین	نوع لجن	متغیر
مستقل	>0/001*	58/48±2/67 323/48±21/65	لجن خشک شده لجن برگشتی	سرب	
من وابسته	0/066	N.D 2/44±3/3 30/31±1/98	لجن خشک شده لجن برگشتی	کادمیوم	
من وابسته	>0/001*	354/14±322/79 220/25±15/54	لجن خشک شده لجن برگشتی	نیکل	
من وابسته	0/357	388/45±252/59	لجن خشک شده لجن برگشتی	کروم	

*حد معنی داری در $p < 0/05$

بحث

مقادیر فلزات سنگین پس از حد مجاز سازمان حفاظت محیط زیست ایران و استانداردهای WHO، MVE و FAO بسیار پایین تر بود (5). هم چنین هیچ ارتباط آماری معنی داری بین فلزات نام برده در 18 نمونه پس از دیده نشده است ($p \geq 0/05$) (5).

میزان عناصر یاد شده با مطالعه Balkhair و Ashraf در مورد خطرات تجمع فلزات سنگین در خاک و آبیاری سبزیجات با پس از فاضلاب در منطقه غربی عربستان مطابقت دارد (5).

جدول شماره 3: غلظت فلزات سنگین در لجن خشک شده تصویب خانه فاضلاب (بر حسب میلی گرم بر کیلو گرم وزن خشک)

نام نمونه / پارامتر مورد بررسی	کروم	نیکل	کادمیوم	سرب	بررسی
پستر شماره 1	230	30/49	N.D	57/87	
پستر شماره 2	210	28/1	N.D	55/01	
پستر شماره 3	200	31/032	N.D	56/03	
پستر شماره 4	205	33/46	N.D	58/009	
پستر شماره 5	235	27/65	N.D	60/1	
پستر شماره 6	240	32/001	N.D	63/05	
پستر شماره 7	220	31/03	N.D	61/02	

در جدول شماره 4، مقایسه میانگین فلزات در لجن خشک شده و لجن برگشتی مقایسه گردید که معنی داری تفاوت فقط در غلظت نیکل مشاهده گردید. هم چنین مطابق جدول شماره 5 در خصوص همبستگی درون گروهی غلظت فلزات سنگین با یکدیگر و با پارامترهای فیزیکوشیمیایی در پس اب، این ارتباط در هیچ یک از فلزات معنی دار نیست. اگر چه روند افزایش pH و EC سبب افزایش غلظت سرب، کادمیوم، کروم و کاهش نیکل شده است، ولی در هیچ یک این ارتباط معنی دار نیست. در جدول شماره 6 نیز همبستگی درون گروهی فلزات سنگین با یکدیگر و پارامترهای فیزیکوشیمیایی در لجن برگشتی نشان داده شده است که ارتباط غلظت فلزات با یکدیگر، به استثناء سرب و نیکل، معنی دار نبود.

جدول شماره 5: همبستگی درون گروهی فلزات سنگین با یکدیگر و پارامترهای فیزیکوشیمیایی در پس اب

EC	Cr	Ni	Cd	Pb	pH	پارامترهای آزاد	پارامتر مورد بررسی
-	-	-	-	-	1	ضریب پیرسون	
-	-	-	-	-	-	Sig	pH
-	-	-	-	-	18	تعداد نمونه	
-	-	-	-	1	0/263	ضریب پیرسون	
-	-	-	-	-	0/291	Sig	Pb
-	-	-	-	18	18	تعداد نمونه	
-	-	-	1	0/268	0/308	ضریب پیرسون	
-	-	-	-	0/283	0/213	Sig	Cd
-	-	-	18	18	18	تعداد نمونه	
-	-	1	0/063	0/092	-0/121	ضریب پیرسون	
-	-	-	0/805	0/716	0/633	Sig	Ni
-	-	18	18	18	18	تعداد نمونه	
-	-	-0/059	0/467	0/109	0/285	ضریب پیرسون	
-	-	0/817	0/051	0/667	0/251	Sig	Cr
-	18	18	18	18	18	تعداد نمونه	
1	0/405	0/071	0/168	0/262	0/627*	ضریب پیرسون	
-	0/096	0/780	0/505	0/294	0/005	Sig	EC
18	18	18	18	18	18	تعداد نمونه	

*حد معنی داری در $p < 0/05$

جدول شماره ۶: همبستگی درون گروهی فلزات سنگین با یکدیگر و پارامترهای فیزیکوشیمیایی در لجن برگشتی

Cr	Ni	Cd	Pb	EC	Tss	pH	پارامتر آماری	پارامتر مورد بررسی
-	-	-	-	-	-	1	ضریب پیرسون	
-	-	-	-	-	-		Sig	pH
-	-	-	-	-	-	18	تعداد نمونه	
-	-	-	-	-	1	-0/774*	ضریب پیرسون	
-	-	-	-	-	-	0/000	Sig	Tss
-	-	-	-	-	18	18	تعداد نمونه	
-	-	-	-	1	0/169	-0/018	ضریب پیرسون	
-	-	-	-	-	0/503	0/942	Sig	EC
-	-	-	-	18	18	18	تعداد نمونه	
-	-	-	1	0/114	-0/043	-0/277	ضریب پیرسون	
-	-	-	-	0/652	0/866	0/266	Sig	Pb
-	-	-	18	18	18	18	تعداد نمونه	
-	-	1	-0/114	-0/044	-0/252	0/148	ضریب پیرسون	
-	-	-	0/651	0/862	0/312	0/559	Sig	Cd
-	-	18	18	18	18	18	تعداد نمونه	
-	1	-0/143	0/793**	0/150	0/290	-0/416	ضریب پیرسون	
-	-	0/570	0/000	0/554	0/243	0/086	Sig	Ni
-	18	18	18	18	18	18	تعداد نمونه	
1	0/371	-0/206	0/197	-0/022	0/501*	-0/612*	ضریب پیرسون	
	0/130	0/411	0/433	0/932	0/034	0/007	Sig	Cr
18	18	18	18	18	18	18	تعداد نمونه	

* حد معنی داری در $< 0/05$

و کروم لجن برگشتی در این تحقیق از تسامی استانداردهای ارائه شده در جدول شماره ۷ به جز استاندارد کشور هلند کمتر بود، اما میزان فلز نیکل از همه استانداردها به استثنای کشور آمریکا بیشتر مشاهده شده است. این در حالی است که غلظت تمام این فلزات در لجن خشک شده در محدوده همه استانداردهای ارائه شده است. از طرف دیگر تحقیقات نشان داده است که منبع آلودگی کادمیوم بعضی از خاکهای کشاورزی کودهای فسفاته شیمیایی بوده است(27).

نتایج تحقیق از نتایج به دست آمده توسط رحمنی و همکارانش برای غلظت‌های سرب، کادمیوم، نیکل و کروم لجن خشک شده تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر اصفهان، که به ترتیب ۰/۵۵، ۷/۵۴، ۰/۶۹ و ۰/۴۸ میلی‌گرم در کیلوگرم وزن خشک به دست آمد، بیشتر بوده است(15). در حالی که نتایج این مطالعه با نتایج بینا و همکارانش که کیفیت لجن خشک شده تصفیه خانه فاضلاب اصفهان و کاربرد آن برای مصارف مختلف را مورد بررسی قرار دادند، کمتر بوده است(34).

همچین میزان میانگین فلز سرب کمتر و مقدار فلز کروم بیشتر از نتایج Cherfi و همکاران در ارزیابی خطرات بهداشتی فلزات سنگین از طریق مصرف سبزیجات آبیاری شده با پساب اصلاح شده شهری در الجزایر بوده است(22). میزان عناصر یاد شده در مطالعه Cecchini و همکارانش با بررسی فلزات موجود در تصفیه خانه فاضلاب شهری شهر رم کمتر از مقادیر سنجش شده در این گزارش مشاهده شده است(23). در لجن برگشتی، میزان میانگین فلز سرب از میزان استانداردهای DWAF، EPA، آمریکا و کانادا بالاتر بوده، ولی میانگین کادمیم و کروم پایین‌تر از حد استانداردهای مذکور می‌باشد. همچنین میانگین غلظت فلز نیکل از استانداردهای EPA و آمریکا پایین‌تر و از سایر استانداردهای مذکور بالاتر است(24). همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد، غلظت همه فلزات سنگین در پساب به مراتب بیشتر از غلظت آنها در لجن می‌باشد که نشان‌دهنده اثر تجمعی این آلاینده‌ها در توده زیستی لجن می‌باشد(26). غلظت سرب، کادمیم

فضاصلاب اشاره نمود(38). مطابق نتایج جدول شماره ۵، همبستگی غلظت فلزات سنگین پساب با یکدیگر برای هیچ یک از فلزات معنی دار نیست. هم چنین اگرچه روند افزایش pH و EC سبب افزایش غلظت سرب، کادمیوم، کروم و کاهش نیکل پساب شده است، ولی در هیچ یک این ارتباط معنی دار نیست. در جدول شماره ۶ نیز همبستگی درون گروهی غلظت فلزات سنگین با یکدیگر در لجن بر گشته نشان داده شده است که ارتباط غلظت فلزات با یکدیگر، به استثناء سرب و نیکل، معنی دار نبود. اگرچه روند افزایش pH سبب کاهش سرب، نیکل و کروم و افزایش کادمیوم در لجن بر گشته گردید، ولی این ارتباط فقط در کروم معنی دار بود. هم چنین افزایش TSS لجن بر گشته سبب افزایش EC، نیکل و کروم و کاهش سرب و کادمیوم گردید که این ارتباط فقط در کروم معنی دار بود.

البته این نتایج با یافته های Lucienne برای افزایش محلول سازی کروم در بیولوژیک توسط باکتری ها در pH پایین مطابقت دارد؛ به طوری که pH پایین سبب انحلال کروم موجود در بافت لجن به داخل محلول پساب می گردد، ولی این تطابق با مقدار جامدات لجن مشاهده نشد(39). از طرف دیگر تحقیقات نشان داده است که با کاهش pH، میزان جذب کروم توسط توده بیولوژیکی لجن افزایش یافته و سبب جلوگیری از خروج آن توسط پساب تصفیه شده می گردد(40). اگر pH چه تحقیقات زیادی نشان داده است که افزایش pH سبب افزایش جذب بیولوژیکی غیرفعال فلزات سنگین از جمله کروم توسط لجن می گردد(26)، به طوری که با افزایش pH به بالای ۵/۵، کروم (III) به علت افزایش غلظت یون هیدروکسیل، رسوب می نماید(41). به طور کلی، نتایج نشان دادند غلظت میانگین فلزات سرب، کادمیوم، نیکل و کروم در پساب و لجن خشک شده از حد استاندارهای داخلی و خارجی پایین تر است و استفاده از آن در جهت آبیاری مشکلی ندارد. اما در رابطه با لجن بر گشته با توجه به بالا بودن میزان سرب و

جدول شماره ۷: حد مجاز غلظت فلزات سنگین در لجن فضایلاب

برای زمین های کشاورزی (بر حسب mg/kg وزن خشک)

استان/لند کشوری/جهی مختلف	میان	کروم	کادمیوم	پتکل	سرب
مطالعه حاضر لجن برگشته	-	388	281	354	323
مطالعه حاضر لجن خشک شده	-	230	ND	30/49	57/87
پیمان	(28)	-	40-20	300-400	750-1200
اوسترا	(29)	250	3	100	250
پرتغال	(29)	200	5	100	1000
دانمارک	(29)	-	0/4	30	120
آلن	(28)	900	10	200	900
فرانسه	(28)	1000	20	200	800
هند	(30)	50	1	30	100
آسیا	(29)	400	10	120	300
ایران	(31)	600	10	200	500
ملوکی	(32)	500	5	80	500
آمریکا	(33)	3000	85	420	840
EA					

این در حالی است که نتایج نصر آزادانی و هودجی در ارزیابی تاثیر یک نمونه پساب صنعتی بر آلودگی خاک با فلزات سنگین در جنوب غربی اصفهان از نتایج به دست آمده در این تحقیق، به استثنای سرب، بیشتر گزارش شده است(35). مطابق نتایج آماری به دست آمده از جدول شماره ۴، اختلاف میانگین غلظت فلزات سرب و نیکل بین لجن خشک بستر های لجن خشک کن و لجن بر گشته معنی دار بود و اختلاف برای فلزات کادمیوم و کروم معنی دار نبود؛ اگرچه غلظت همه عناصر موجود در لجن خشک شده بیشتر از لجن بر گشته بود. به طور کلی لجن دفعی پس از ورود به بستر های لجن خشک کن حجم زیادی از رطوبت خود را به توسط زهکش کف بستر از دست می دهد که همراه آن مقداری از فلزات از سیستم خارج می گردد. هم چنین به واسطه فعالیت های بیولوژیکی میکرو ارگانیسم ها مانند اکسید اسیون، احیاء و متابولیسم لجن و بیولوژیکی که در لجن بستر اتفاق می افتد، مقدار دیگری از فلزات سنگین توده لجن محلول شده و توسط بارش ها و نزولات جوی صورت گرفته از سیستم زهکش بستر خارج می شوند(36). از سایر عوامل این امر را می توان به تاثیر گیاه پالایی توسط علف های رشد کرده بر روی بستر های لجن خشک کن(37) و هم چنین توانایی بالای کرم های موجود در خاک و لجن های برای حذف فعل و موثر فلزات سنگین و مواد آلی از لجن

طرح پژوهشی با عنوان "بررسی غلظت فلزات سنگین و تخم انگل در پساب و لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری گرگان، سال 1395" و کد 950214041 است که با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان اجرا شده است که نویسنده‌گان از همکاری آن معاونت کمال تشکر و قدردانی را دارند. همچنین از همه افرادی که در سازمان آب و فاضلاب استان گلستان جهت انجام این طرح مرا یاری نموده‌اند، سپاسگزاری می‌گردد.

نیکل، نیاز به پایش مستمر و دائمی سیستم تصفیه و لجن برگشتی می‌باشد. هم‌چنین تدوین یک استاندارد داخلی به منظور استفاده از لجن فاضلاب برای کاربردهای مختلف با رعایت کلی اصول بهداشتی و شیمیایی، مناسب با شرایط آب و هوایی کشور ضروری است.

سپاسگزاری

این مقاله برگرفته از نتایج پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی لامعی گرگانی، خانم نسرین سنگبری و حاصل بخشی از

References

1. Biggs TW, Jiang B. Soil salinity and exchangeable cations in a wastewater irrigated area. India. *J Environ Qual.* 2009;38(3):887-889.
2. Palese A, Pasquale V, Celano G, Figliuolo G, Masi S, Xiloyannis C. Irrigation of olive groves in Southern Italy with treated municipal wastewater: effects on microbiological quality of soil and fruits. *Agric, Ecosyst Environ.* 2009;129(1-3):43-51.
3. Duncan RR, Carrow RN, Huck MT. Turfgrass and Landscape Irrigation Water Quality: Assessment and Management. Boca Raton: CRC Press, 2008.
4. Martinez CJ, Clark MW, Toor GS, Hochmuth GJ, Parsons LR. Accounting for the Nutrients in Reclaimed Water for Landscape Irrigation¹. Florida : Institute of Food and Agricultural Sciences. 2011.
5. Balkhair KS, Ashraf MA. Field accumulation risks of heavy metals in soil and vegetable crop irrigated with sewage water in western region of Saudi Arabia. *Saudi J Biol Sci.* 2016;23(1):32-44.
6. Dadban Shahamat Y, Zazouli MA, Asgharnia H, Dehghanifard E. Evaluation of Rapid Purification of High Concentrations of 2, 4-Dinitrophenol in Wastewater Using Catalytic Ozonation with Carboneus Nanocomposite. *Mazandaran Univ Med Sci.* 2016;25(133):138-149 (Persian).
7. Muchuweti M, Birkett J, Chinyanga E, Zvauya R, Scrimshaw MD, Lester J. Heavy metal content of vegetables irrigated with mixtures of wastewater and sewage sludge in Zimbabwe: implications for human health. *Agric, Ecosyst Environ.* 2006;112(1):41-48.
8. Filipović J, Grčić I, Bermanec V, Kniewald G. Monitoring of total metal concentration in sludge samples: Case study for the mechanical–biological wastewater treatment plant in Velika Gorica, Croatia. *Sci Total Environ.* 2013;447:17-24.
9. Dadban Shahamat Y, Rezaei Kalantary R, Zazouli MA, Bakhshi A, Zeynalzadeh D. Disinfection of Effluent Using

- Catalytic Ozonation Process and Economical Comparison with Chlorination. *J Mazand Univ Med Sci.* 2016;26(140):103-114 (Persian).
10. Chen H, Teng Y, Lu S, Wang Y, Wang J. Contamination features and health risk of soil heavy metals in China. *Sci Total Environ.* 2015;512-513:143-153.
 11. Zazouli M, Yousefi Z. Removal of heavy metals from solid wastes leachates coagulation-flocculation process. *J Appl Sci.* 2008;8(11):2142-2147.
 12. Zazouli MA, Asgharnia H, Yazdani Cherati J, Ziae Hezarjeribi H, Ahmadnezhad A. Evaluation of Cow Manure Effect as Bulking Agent on Concentration of Heavy Metals in Municipal Sewage Sludge Vermicomposting. *Mazandaran Univ Med Sci.* 2015;25(124):152-169 (Persian).
 13. Zafarzadeh A , Mehdinejad M, Amanidaz N. Accumulation of Heavy Metals in Agricultural Soil Irrigated by Sewage Sludge and Industrial Effluent (Case Study: Agh ghallah Industrial Estate). *J Mazandaran Univ Med Sci.* 2015;24(121):217-226.
 14. Martin O, Voulvoulis N. Sustainable risk management of emerging contaminants in municipal wastewaters. *Philos Trans A Math Phys Eng Sci.* 2009;367(1904):3895-3922.
 15. Rahmani HR, Moayyeri M, Mazaheri Kouhanestani Z, Khodabakhsh N, Sharifi H. Studying some of the qualitative properties and concentration of heavy metals in dried sewage sludge from Shahin-Shahr WWTP in Isfahan. *Journal of Environmental Science and Technology.* 2014;16(2):55-66 (Persian).
 16. Farzadkia M, Jaafarzadeh N ,Loveimi Asl L. Optimization of bacteriological quality of biosolids by lime addition. *Iranian Journal of Environmental Health, Science and Engineering.* 2009;6(1):29-34.(persian).
 17. Shahryari A, Shehamat Y. An investigation on the lead and cadmium content in vegetables and irrigating water in some farms in Gorgan, Iran. *Int J Env Health Eng.* 2012;1(1):63-66.
 18. American Public Health Association. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21th ed. Washington DC: APHA, AWWA, WEF.2005.
 19. Pourang N, Noori A. Heavy metals contamination in soil, surface water and groundwater of an agricultural area adjacent to Tehran oil refinery, Iran. *International Journal of Environmental Research* 2014;8(4):871-886.
 20. Balkhair KS, Ashraf MA. Field accumulation risks of heavy metals in soil and vegetable crop irrigated with sewage water in western region of Saudi Arabia. *Saudi J Biol Sci* 2016;23(1):32-44.
 21. Pourang N, Noori A. Heavy metals contamination in soil, surface water and groundwater of an agricultural area adjacent to Tehran oil refinery, Iran. *International Journal of Environmental Research.* 2014;8(4):871-886.
 22. Cherfi A, Achour M, Cherfi M, Otmani S, Morsli A. Health risk assessment of heavy metals through consumption of vegetables irrigated with reclaimed urban

- wastewater in Algeria. *Process Saf Environ Prot.* 2015;98:245-252.
23. Cecchini G, Cirello P, Eramo B. Partitioning dynamics and fate of metals in an urban wastewater treatment plant. *Environ Eng Manag J.* 2015;14(7):1511-1520.
24. Shamuyarira KK, Gumbo JR. Assessment of heavy metals in municipal sewage sludge: a case study of Limpopo Province, South Africa. *Int J Env Res Public Health.* 2014;11(3):2569-2579.
25. Liu JY, Sun Sh Y. Total concentrations and different fractions of heavy metals in sewage sludge from Guangzhou, China. *Trans Nonferrous Met.* 2013;23(8):2397-2407.
26. AjayKumar AV, Darwish NA, Hilal N. Study of various parameters in the biosorption of heavy metals on activated sludge. *World Appl Sci J.* 2009;5(5):32-40.
27. Zazouli MA, Bandpei AM, Maleki A, Saberian M, Izanloo H. Determination of cadmium and lead contents in black tea and tea liquor from Iran. *Asian J Chem* 2010;22(2):1387-1393.
28. Karvelas M, Katsoyiannis A, Samara C. Occurrence and fate of heavy metals in the wastewater treatment process. *Chemosphere.* 2003;53(10):1201-1210.
29. Voutsas D, Zaxariadis G, Gaantidis N, Samara C, Kouimtzis Th. Evaluation of municipal and industrial wastewater sludges for agricultural purposes. *Fresenius Environ Bull* 1996;5:1-6.
30. Cornu S, Neal C, Ambrosi J-P, Whitehead P, Neal M, Sigolo J, et al. The environmental impact of heavy metals from sewage sludge in ferralsols (Sao Paulo, Brazil). *Sci Total Environ.* 2001;271(1):27-48.
31. Lazzari L, Sperni L, Bertin P, Pavoni B. Correlation between inorganic (heavy metals) and organic (PCBs and PAHs) micropollutant concentrations during sewage sludge composting processes. *Chemosphere.* 2000;41(3):427-435.
32. Šćančar J, Milačić R, Stražar M, Burica O. Total metal concentrations and partitioning of Cd, Cr, Cu, Fe, Ni and Zn in sewage sludge. *Sci Total Environ.* 2000;250(1-3):9-19.
33. EPA. Land application of sewage sludge. A guide for land applies on the requirement of the Federal standards for the use or disposal of sewage sludge, 40 CFR 503. Washington, DC:EPA. 1994.
34. Bina B, Movahedian H, Amini AA. Evaluation of Potentially Harmful Substances in Dried Sludge of Isfahan Wastewater Treatment Plants. *Water and Wastewater.* 2004;15(1):34-42 (Persian).
35. Nasrazadani A, Hoodaji M. Evaluation of the Effect of an Industrial Wastewater Sample on Heavy Metals Contaminated Soil. *Journal of Environmental Science and Technology* 2014;16(1):437-450 (Persian).
36. Deng X, Chai L, Yang Z, Tang C, Wang Y, Shi Y. Bioleaching mechanism of heavy metals in the mixture of contaminated soil and slag by using indigenous *Penicillium chrysogenum* strain F1. *J Hazard Mater.* 2013;248-249:107-114.
37. Sun Y, Zhou Q, Xu Y, Wang L, Liang X. Phytoremediation for co-contaminated soils of benzo [a] pyrene (B [a] P) and heavy metals using ornamental plant

- Tagetes patula. *J Hazard Mater.* 2011;186(2):2075-2082.
38. Asgharnia H, Jafari AJ, Kalantary RR, Nasseri S, Mahvi A, Yaghmaeian K, et al. Influence of bioaugmentation on biodegradation of phenanthrene-contaminated soil by earthworm in lab scale. *J Environ Health Sci Eng.* 2014;12(1):150.
39. Villar LD, Garcia O. Solubilization profiles of metal ions from bioleaching of sewage sludge as a function of pH. *Biotechnol Lett.* 2002;24(8):611-614.
40. Ozdemir G, Ozturk T, Ceyhan N, Isler R, Cosar T. Heavy metal biosorption by biomass of *Ochrobactrum anthropi* producing exopolysaccharide in activated sludge. *Bioresour Technol.* 2003;90(1):71-74.
41. Witek-Krowiak A, Szafran RG, Modelska S. Biosorption of heavy metals from aqueous solutions onto peanut shell as a low-cost biosorbent. *Desalination.* 2011;265(1-3):126-134.