

# ORIGINAL ARTICLE

## ***Phenotypic Study of Urinary Tract Infection Producing Bacteria and Antibiotic Resistance Pattern in Diabetic Patients***

Fatemeh Hejazi<sup>1</sup>,  
Mohammad Ahanjan<sup>2</sup>,  
Ozra Akha<sup>3</sup>,  
Maryam Salehiyan<sup>4</sup>

<sup>1</sup> MSc Student Microbiology, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>2</sup> Associate Professor, Department of Microbiology, Pediatric Infectious Diseases Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>3</sup> Associate Professor, Department of Endocrinology, Diabetes Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

<sup>4</sup> MSc in Microbiology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

(Received October 31, 2017 ; Accepted June 25, 2018)

### **Abstract**

**Background and purpose:** Urinary tract infections (UTI) are one of the most common complications of diabetes. Asymptomatic bacteriuria or frequent symptomatic urinary tract infection are common in diabetic patients. Study of bacterial factors of UTI in these patients and the antibiotic resistance pattern and resistant strains are necessary.

**Materials and methods:** In this descriptive cross-sectional study, 302 urine samples of diabetic patients attending Sari diabetes clinic (in 2015) were used. The specimens were cultured in Blood agar and McConkey and incubated at 37° C for 24 hours. Biochemical tests were done to identify the pathogenic bacteria and antibiotic susceptibility test was carried out by Kirby-Bauer disk diffusion.

**Results:** Among the samples, 22.5% were positive for urinary tract infections including 76.4% of the females' samples and 32.6% of males' samples. The most prevalent bacteria isolated were group B Streptococcus (25%). According to antibiogram testing, the most sensitive antibiotic was chloramphenicol (70%) while cefotaxime, ceftazidime, and ciprofloxacin were found to be highly resistant.

**Conclusion:** The study showed that the third generations of cephalosporins commonly used in treatment of UTI are not appropriate in diabetic patients. So, Chloramphenicol is recommended for treatment of these patients.

**Keywords:** urinary tract infection, diabetes, Mazandaran

**J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 28 (163): 38-46 (Persian).**

\* Corresponding Author: Mohammad Ahanjan - Pediatric Infectious Diseases Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran (E-mail: ahanjan2007@gmail.com)

## بررسی فنوتیپی باکتری‌های مولد UTI و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در افراد دیابتی

فاطمه حجازی<sup>۱</sup>

محمد آهنجان<sup>۲</sup>

عذرا اخی<sup>۳</sup>

مریم صالحیان<sup>۴</sup>

### چکیده

**سابقه و هدف:** عفونت ادراری یکی از شایع‌ترین عوارض دیابت است. باکتریوری بدون علامت یا عفونت مجاری ادرار علامت دار مکرر در افراد دیابتی رایج است. بررسی عوامل باکتریایی این عفونت در این بیماران و مقاومت آنتی‌بیوتیکی و گونه‌های مقاوم لازم است.

**مواد و روش‌ها:** در این مطالعه توصیفی مقطعی ۳۰۲ نمونه ادراری از بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت شهرستان ساری در سال ۱۳۹۴ جمع‌آوری شد. نمونه‌ها در محیط Blood agar و McConkey کشت و در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شد. با انجام تست‌های بیوشیمیایی باکتری‌های عامل عفونت تشخیص و تست حساسیت به روش کربی با انجام گرفت.

**یافته‌ها:** از ۳۰۲ نمونه جمع‌آوری شده از بیماران دیابتی ۲۲/۵ درصد از نظر عفونت ادراری مثبت بودند، که این تعداد شامل ۷۶/۴ درصد زن و ۳۲/۶ درصد مرد بود. بیشترین باکتری جدا شده از این افراد *Streptococcus B group* با شیوع ۲۵ درصد بود. براساس تست آنتی‌بیوگرام مناسب‌ترین آنتی‌بیوتیک برای درمان در این بیماران کلرامفینیکل (با حساسیت ۷۰ درصد) می‌باشد و بیشترین مقاومت مربوط به سفووتاکسیم و سفتازیدیم و سپروفلاتکساسین بوده است.

**استنتاج:** نتایج در این مطالعه نشان می‌دهد نسل سوم سفالوسپورین‌ها که به صورت رایج در درمان این عفونت استفاده می‌شود گزینه مناسبی برای بیماران دیابتی نیست و با در نظر گرفتن شرایط بیمار آنتی‌بیوتیک کلرامفینیکل برای درمان این نوع بیماران پیشنهاد می‌گردد.

**واژه‌های کلیدی:** عفونت ادراری، دیابت، مازندران

### مقدمه

شده و بیشترین میزان رشد مربوط به کشورهای در حال توسعه خواهد بود(۱). امروزه به علت فراهم آمدن امکان دسترسی به انسولین و درمان‌های نوین دیابت، احتمال زنده ماندن بیماران و ابتلا به عوارض دیابت

یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام سلامتی، افزایش بروز بیماری‌های غیر واگیر از جمله دیابت است. بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان مبتلا به دیابت

E-mail: ahanjan2007@gmail.com

مؤلف مسئول: محمد آهنجان: ساری- کیلومتر ۱۷ جاده فرح آباد، مجتمع داشگاهی پیامبر اعظم (ص)، دانشکده پزشکی

۱. دانشجویی کارشناسی ارشد میکروبیشناسی، کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۲. دانشیار، گروه میکروبیشناسی، مرکز تحقیقات عفونی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۳. دانشیار، گروه غدد، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۴. کارشناس ارشد میکروبیشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

۵. تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۸/۹ تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۹/۲۱

تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۷/۴/۴

در دو هفته اخیر آنتی بیوتیک مصرف کرده بودند نیز از جامعه مورد نظر برای نمونه گیری حذف شدند. نمونه گیری به روش "نمونه میانی ادرار" انجام گرفت و پس از انتقال به آزمایشگاه تمامی نمونه ها سانتریفیوژ شده و رسوب ادرار برای شمارش گلbulous سفید به روش میکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها در محیط McConkey ۵ sheep blood agar درصد و ۲۴ ساعت در درمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه شد و نمونه هایی که با اساس استانداردهای آزمایشگاهی و شرایط بیمار مطابقت داشت مثبت در نظر گرفته شد. پس از انجام تست های بیوشیمیایی افتراقی بسته به گرم مثبت بودن و یا گرم منفی بودن باکتری ها، نظیر: TSI، اکسیداز، سایمون سیترات، اوره آز، لایزین آیرون آگار، MR/VP، SIM و سایر تست های تکمیلی براساس جداول استاندارد؛ عامل پاتوژن تشخیص داده شد. شایان ذکر است که در این مطالعه باکتریوئی زمانی که تعداد باکتری بیشتر از  $10^5$  CFU/mL بود بدون توجه به اینکه بیمار علامت دارد یا نه مثبت در نظر گرفته می شد و در صورت کمتر بودن این میزان حدود  $10^3$  CFU/mL با در نظر گرفتن این که بیمار علامت دارد مثبت گزارش شد.(۳۳).

مقاومت آنتی بیوتیکی از طریق روش استاندارد دیسک دیفیوژن (Baur-kirby) و طبق استاندارد (Clinical and Laboratory standards institute) CLSI بر روی نمونه ها با استفاده از دیسک آنتی بیوتیکی انجام گرفت. بدین منظور سوسپانسیونی با غلظت نیم مک فارلند از نمونه ها تهیه شده و توسط سوآپ استریل در محیط مولر هیلتون آگار به صورت چمنی کشت داده شد و پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون در درجه سانتی گراد نتایج با توجه قطر هاله عدم رشد به صورت مقاوم، حساس و حد واسطه بر اساس جدول استاندارد CLSI در سال ۲۰۱۵ گزارش شد(۳۵،۳۶).

دیسک های آنتی بیوتیک استاندارد مورد استفاده برای گرم منفی ها شامل: جنتامایسین، امپین، تری متیپریم

افزایش یافته است(۲). یکی از شایع ترین عوارض دیابت که اغلب نادیده هم گرفته می شود عفونت مجاری ادرار در این بیماران می باشد(۳). باکتریوئی بودن علامت و یا UTI علامت دار مکرر در بیماران مبتلا به دیابت در مقایسه با جمعیت عمومی گزارش شده است(۴) در جمعیت عمومی بیش ترین عامل عفونت دستگاه ادراری، اشرشیا کلی و به مراتب کمتر کلبیسیلا می باشد. افزایش مقاومت دارویی در عوامل ایجاد کننده عفونت های دستگاه ادراری معضل بزرگی است و علت اصلی پیدایش مقاومت، مصرف نامناسب و بی رویه آنتی بیوتیک ها می باشد(۵). مطالعات نشان می دهد صرف نظر از الگوی مصرف آنتی بیوتیک ها، ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی می توانند در بین جمعیت های باکتریایی منتقل شوند(۶). چند مکانیزم متفاوت می تواند به بالا رفتن فرکانس ایجاد UTI در بیماران دیابتی دخالت داشته باشد از جمله اختلالات عملکرد سیستم ایمنی، تخلیه ناکارآمد مثانه و سطح گلوکز بالاتر در ادرار که ممکن است باعث تسهیل رشد باکتری در این افراد شود.

UTI بار اقتصادی قابل توجهی را در نظام سلامت تحمیل می کند(۷). فرم های غیر تیپیک و مقاوم این عفونت در افراد دیابتی رایج است(۸) ظهور مقاومت به آنتی بیوتیک در درمان UTI یکی از موضوعات مهم در سلامت اجتماعی است(۹) پروتوکل تجربی برای درمان UTI تجویز نسل اول و دوم سفالسپورین ها می باشد(۱۰). هدف از این مطالعه بررسی عوامل پاتوژن در عفونت ادراری این بیماران و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در کمک به درمان مناسب تر و جلوگیری از مصرف آنتی بیوتیک نامناسب و ایجاد مقاومت در جامعه می باشد.

## مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد ۳۰۲ نمونه ادراری از بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام ساری جمع آوری شد که سن بیماران از ۲۰ سال به بالا در نظر گرفته شد و افرادی که

درصد) می شد. بیشترین باکتری جدا شده از این افراد streptococcus B group(streptococcus β hemolytic) با شیوع ۲۵ درصد بود و سایر باکتری ها به ترتیب *E.coli* (۱۷/۶ درصد)، *Staphylococcus aureus* (۱۶ درصد)، *Klebsiella sp.* (۸/۸ درصد)، *Streptococcus viridians* (۸/۸ درصد)، *Staphylococcus saprophyticus* (۴/۴ درصد)، *Diphtheroid* (۴/۴ درصد)، *Entrococcus* (۳/۳) *Psudomonas aurogenosia* (۱/۴ درصد)، *Entrobacter gergovia* (۲/۸ درصد)، *Edwardsiella* (۱/۴) *Acinetobacter bumanii* (۱/۴) *Burkholderia capacia* (۱/۴ درصد)، *Entobacter aerogenes* (۱/۴ درصد) ۲ نمونه غیر روتین گرم منفی (۴/۸ درصد) بودند.

نتایج حاصل از آنتی بیوگرام بر روی ایزووله های موجود در جدول شماره ۱ نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که باکتری های جدا شده از این بیماران کمترین میزان حساسیت آنتی بیوتیکی را به صورت کلی و بدون توجه به گونه ای باکتریایی به ترتیب به آنتی بیوتیک های سفتازیدیم (۳۸ درصد) و سفو تاکسیم (۴۷ درصد) و سپروفلاکساسین (۵۰ درصد) نشان می دهند و بیشترین حساسیت را به آنتی بیوتیک کلرامفینیکل (۷۵ درصد) دارند.

## بحث

در مطالعه حاضر از ۳۰۲ نمونه ادرار جمع آوری

سولفاماتاکسازول، نیتروفورانتوئین، سپروفلاکساسین، سفو تاکسیم، سفکسیم، سفتازیدیم، کلرامفینیکل (پادتن طب - ایران)، سفو کسیتین، آمپیسیلین سولبالکدام، آموکسی کلاؤنیک اسید، پیراسیلین تازو بالکدام، نورفلکساسین (Rosco-spain) و آنتی بیوتیک های مورد استفاده برای گرم مثبت ها شامل موارد فوق به علاوه اگراسیلین، ونکومایسین (پادتن طب - ایران) و لینوزولید (Rosco-spain) بود. بنا بر شرایط بیماران دیابتی که دارای سیستم ایمنی ضعیف تری نسبت به افراد غیر دیابتی هستند باکتری هایی نظیر *Streptococcus β hemolytic* و *Diphtheroid* نیز مورد توجه قرار گرفت و نیاز به تغییر آنتی بیوتیک های مصرفی نیز قابل توجه به نظر می رسید.

در نتیجه آنتی بیوتیک های مصرفی برای استرپتوکوکوس ها شامل:

اریترومایسین، کلیندامایسین، پنیسیلین، کلرامفینیکل، ونکومایسین، سفو تاکسیم، آمپیسیلین، سفتریاکسون و برای دیفترویید ها شامل: نیتروفورانتوئین، کلاریترومایسین، اریترومایسین، نایلکیسیک اسید، سپروفلاکساسین، سفو تاکسیم، تریمتوپریم سولفاماتاکسازول، نورفلکساسین، ونکوماسین، آمپیسیلین، سفتریاکسون و جنتامایسین بود.

## یافته ها

از ۳۰۲ نمونه جمع آوری شده از بیماران دیابتی ۶۸ مورد (۲۲/۵ درصد) از نظر عفونت ادراری مثبت بودند، که این تعداد شامل ۵۲ زن (۷۶/۴ درصد) و ۱۶ مرد (۳۲/۶

جدول شماره ۱: درصد حساسیت آنتی بیوتیکی بر اساس میکرووارگانیسم

LINZ	CF	E	AMP	Pen	CRO	CTX	CC	C	OX	V	SXT	میکروارگانیسم
-	۷۱/۴	-	-	-	-	۷۸/۵	-	۸۱/۱	-	۴۲/۸۵	Gram (-) s	
-	-	۴۵/۴	۷۷/۲	۷۷/۲	۷۷/۲	۷۷/۲	۵۴/۵	۵۰	-	۷۷/۷	Streptococcus sp.	
۸۶/۶	۳۳/۳	-	-	-	-	۷۶/۶	-	۹۳/۳	۴۰	۶۰	۸۶/۶	Gram (+)s *
CFM	CP	NORF	Fm	IMP	Gen	AMC	SAM	Pi-Tz	CAz		میکروارگانیسم	
۳۵/۷	۳۲/۱	۷۱/۴	۴۲/۸	۷۸/۵	۷۸/۵	۶۴/۲	۶۴/۲	۸۵/۷	۵۷/۱	Gram (-) s		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Streptococcus spp.		
-	۷۳/۳	۹۳/۳	۸۰	۶۶/۶	۸۶/۶	۴۰	۸۶/۶	۸۰	۲۰	Gram (+)s *		

\*همه گرم مثبت ها به غیر از دیفتروییدها و استرپتوکوکوس ها

SXT:trimetoprim-sulfametaxazole. V:vancamycin. OX:oxacillin. C:chloromphenicol. CC:clindamycin. CRO:clirtromycine. Pen:penicillin. Amp:ampicillin. E:erythromycin. CF:cefepim. Linz:linozolid. CFM:cefixime. Pi-Tz: pipracillin tazobactam. SAM:ampicillin sulbactam. AMC:amoxi-clavuincacid. Gen:gentamycin. Fm:nitrofurantoin. Norf:norflaxacin. CP:ciprofloxacin. CAZ:ceftazidim .

توجه به منطقه جغرافیایی مختلف و شرایط مصرف داروها قابل توجیه است.

در مطالعاتی که در سال ۲۰۱۵ در کشور سودان انجام شد از ۲۰۰ بیمار دیابتی حدود ۲۰ درصد از جمعیت مبتلا به UTI گزارش شد که در میان آنها *Escherichia coli* با ۵۶ درصد و *Klebsiella pneumoniae* با ۲۳ درصد بالاترین میزان شیوع را در این جمعیت به خود اختصاص داده بودند. در این مطالعه تمام *E.coli* های جدا شده ۱۰۰ درصد به آنتیبیوتیک های جنتامايسین و سفالکسین حساس بودند و گونه *K.pneumonia* ۱۰۰ درصد به جنتامايسین و ۸۸/۸ درصد به سفالکسین حساسیت نشان داد<sup>[۱۳]</sup>. که در مقایسه با مطالعه حاضر میزان شیوع حدوداً نزدیک بود ولی شیوع سویه های جدا شده بسیار متفاوت است. کنترل ضعیف دیابت در جامعه و تفاوت ها در رعایت بهداشت فردی در این افراد ممکن است دلیل تفاوت میزان شیوع دیابت در جوامع مختلف باشد<sup>(۱۴)</sup>.

در مطالعه ای که در سال ۲۰۱۴ در کشور رومانی به عمل آمد از *E.coli* های جدا شده از ۹۷ بیمار دیابتی مقاومت آنها به آنتیبیوتیک های مختلف سنجیده شد که در این میان مقاومت چند دارویی (بین ۲ تا ۷ آنتیبیوتیک) قابل توجه بود که مقاومت به سپروفلاکساسین از بقیه موارد بیشتر بود<sup>(۱۵)</sup> و در مطالعه حاضر مقاومت یه سپروفلاکساسین بالاخص در گرم مثبت ها چشم گیر است.

در مطالعه دیگری که بر روی الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در تهران از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ انجام شد از ۱۳/۳۳۳ نمونه گرفته شده *E.coli* ۶۸/۸ درصد و به *K.pneumonia* ۱۲/۴ *Proteus spp.* درصد و *E.coli* ۹ درصد موارد را تشکیل دادند. در این میان بیشترین حساسیت را به نیتروفورانتوئین ۷۱/۳ درصد و سپس سپروفلاکساسین ۶۸/۱ درصد نشان داد<sup>(۱۶)</sup> که در مقایسه با مطالعه حاضر می تواند نشان دهنده بروز روز افزون مقاومت به آنتیبیوتیک های مصرفی باشد. از

شده از افراد دیابتی ۶۸ نمونه مثبت (۲۲/۵ درصد) گزارش شد که از این تعداد ۵۲ زن (۷۶/۴ درصد) و ۱۶ مرد (۳۲/۶ درصد) بودند.

در مطالعه مشابه ای که توسط عیسی پور و همکاران در ساری انجام شد از ۳۴۹ مورد نمونه ای ادرار جمع آوری شده ۵۹ مورد (۱۶/۹ درصد) را مثبت گزارش نمودند که از این میان ۴۷ زن (۷۹/۶ درصد) و ۱۲ مرد (۲۰/۳ درصد) گزارش شد که سویه شایع در این مطالعه *E.coli* (۹۴/۱ درصد) و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس ۵/۹ درصد بودند<sup>(۱۱)</sup>. نتایج به دست آمده در مطالعه آنها در مقایسه با مطالعه حاضر از نظر میزان شیوع بیشتر بوده ولی از نظر نزدیکی میزان شیوع عفونت در زنان و مردان تقریباً یکسان است. اما شیوع باکتری های ایجاد کننده عفونت در این دو مطالعه با هم متفاوت است و شیوع باکتری *E.coli* حدود ۷۶ درصد کمتر از نتایج به دست آمده توسط آن هاست. در مطالعه INDU SHARMA که در سال ۲۰۱۲ در هند توسط انجام شد ۲۶ نفر (۶۵ درصد) از بیماران مبتلا به عفونت ادراری تشخیص داده شدند که از این میان ۱۹ زن (۷۳/۰۷) و ۷ مرد (۲۶/۹۲) بودند. باکتری های *Staphylococcus aureus* با درصد شیوع ۳۳/۳ درصد و *coagulase negative Staphylococcus* باکتری ها شامل *Proteus* sp. (۷/۴ درصد) و *Psudomonas* sp. (۷/۴ درصد) و *myxofaciens* (۳/۷ درصد) وغیره بودند<sup>(۱۲)</sup> که در مقایسه با نتایج به دست آمده از مطالعه اخیر مقایسه، میزان شیوع در مطالعه آنها بسیار بالاتر بوده و شیوع *E.coli* نیز بالاتر است اما از نظر تنوع باکتری های جدا شده از این بیماران نتایج به این مطالعه نزدیک به نظر می رسند. در این مطالعه موثر ترین آنتیبیوتیک با توجه به تست آنتیبیوگرام ایمپین در گرم منفی ها و آمپی سیلین در گرم مثبت ها بوده که در مطالعه حاضر موثر ترین آنتیبیوتیک برای هم گرم مثبت ها و هم گرم منفی ها کلامفینیکل است که این تفاوت با

انحراف از معیار  $10/69$  سال و در گروه با عفونت ادراری برابر با  $54/46$  سال و انحراف از معیار  $11/26$  سال است که با توجه به مقدار آمار  $t$  و مقدار  $\text{sig}$  پیشتر از  $0/05$  اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود ندارد که با نتایج به دست آمده از مطالعات انجام شده در سودان و در عربستان سعودی مطابقت دارد (۲۲، ۱۳) هرچند در مطالعات دیگری که در سال  $1997$  و  $2010$  انجام شد ارتباط معنی داری بین عفونت ادراری و سن بیمار گزارش شده بود (۲۴، ۲۳).

جدول شماره ۲: مقایسه میانگین سن در دو گروه بدون عفونت

ادراری فعلی و با عفونت						
متغیر	عداد	انحراف معیار $\pm$ میانگین	درجه آماره $t$	Sig.	نتیجه	عفونت ادراری
معنی دار	۳۰۰	$55/6 \pm 10/69$	۲۳۴	.۰۷۷	.۰۳۸	خیر
سن بیمار نیست.	۶۸	$54/46 \pm 11/16$	۶۸			بلی

در مورد *Streptococcus group B* و شیوع بالای آن در مطالعه‌ی اخیر موردي در مطالعات مشابه پيدا نشد هرچند که در مقالات مختلفی اهميت تشخيص اين باكتري در زنان جوان و باردار و افراد مسن و اشخاصى باكتري زمينه‌اي که سيسitem ايمني ضعيف تری نسبت به افراد غير بيمار دارند مورد توجه قرار گرفته است (۲۶، ۲۵) فرایند ايجاد عفونت ادراري توسيط اين گونه‌ي باكتيرياي و تعاملات آن با مثانه هنوز كاملاً مشخص نیست اما مشخصاً ديبات و بيماري‌های زمينه‌اي به عنوان فاكتور مستعد کننده عفونت حاصل از اين باكتري به حساب می‌آيند که می‌تواند باعث عفونت بدون علامت ادراري و سيسitem شود (۲۶-۲۹). اما همچنان شیوع واقعی اين باكتري در عفونت ادراري به صورت روشن مشخص نیست (۳۰). در مطالعه‌اي که در سال  $1998$  انجام شد  $40$  درصد كل عفونت‌های ادراري بيمارستانی در افراد بالاي  $70$  سال مربوط به استرپتوکوكوس گروه *B* بود (۳۱) در مطالعه‌اي که در سال  $2006$  در یونان انجام شد اين باكتري از ادرار  $19$  نفر از  $34$  نفری ( $56$  درصد) که بيماري زمينه‌اي داشتند جدا شد که درصد بالاتری از

آن جايی که معمولاً برای عفونت‌هایي نظير عفونت ادراري که به صورت پيش فرض شایع ترين باكتري مولد آن را *E.coli* در نظر می‌گيرند معمولاً از سفالوسپورين‌های وسیع الطیف و کارباپن‌ها استفاده می‌شود (۱۷). در مطالعه‌اي که در منطقه مشابه تحقیق حاضر انجام شد شیوع باكتري *E.coli* تولید کننده ESBL (که غالباً به نسل سوم سفالوسپورین‌ها مقاومند) مورد بررسی قرار گرفت که در نتایج به دست آمده  $55$  درصد *Ecoli* های جدا شده  $100$  درصد به سفوتاکسیم و سفتازیدیم مقاوم بوده و پیش ترين حساسیت را به مروپن داشتند که اگر نسبت‌ها را مد نظر قرار دهیم در مطالعه حاضر مقاومت به سفوتاکسیم  $66/6$  درصد و به سفتازیدیم  $25$  درصد بوده است. علت تفاوت میزان مقاومت‌ها می‌تواند به تفاوت در جامعه‌ی مورد مطالعه مربوط باشد (۱۸).

در مطالعاتی که بر روی الگوی مقاومت *E.coli* های مولد عفونت ادراري انجام شد میزان درصد مقاومت بسته به جامعه مورد مطالعه و منطقه جغرافیایی بسیار متغیر گزارش شده است اما مورد مشترک در میان آن‌ها و مطالعه حاضر بالا بودن میزان مقاومت به سفالوسپورین‌های نسل سوم از قبیل (سفتازیدیم و سفوکسیم و سفوتاکسیم) می‌باشد (۲۱، ۲۰، ۹) که دلیل آن می‌تواند عفونت‌های مکرر ادراري، مصرف بی رویه و درمان نامناسب با اين دست از آنتی‌بيوتیک‌ها و غيرطبیعی بودن کارکرد دستگاه ادراري را بیان کرد.

در مطالعه پيش رو سن بيماران مراجعه کننده به عنوان ريسك فاكتور مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تاثير سن در عفونت ادراري از آزمون  $t$  مستقل استفاده می‌شود در اين آزمون میانگین سن افراد در دو گروه بدون عفونت و با عفونت مقایسه می‌شود و هرگاه مقدار  $t$  بزرگ یا مقدار  $\text{sig}$  کمتر از  $0/05$  باشد فرضیه برآوري میانگین در دو گروه رد می‌شود. جدول شماره ۲ زير نتایج آزمون  $t$  را نشان می‌دهد: همان‌طور که در جدول شماره ۲ ملاحظه می‌گردد میانگین سن در گروه افراد بدون عفونت ادراري فعلی برابر با  $55/6$  سال،

و شیوع عفونت ادراری در افراد دیابتی و تاثیر این بیماری زمینه ای در مستعد کردن این افراد به بروز عفونت توسط باکتری هایی که بعضاً در آزمایشگاه های تشخیص طبی نادیده گرفته می شد و همین طور بروز مکرر عفونت و شیوع عفونت بدون علامت در آنها (۲۷) نفر از ۶۸ مورد در این مطالعه) لزوم آزمایش کشت ادرار در کنار آنالیز ادرار در بررسی های ماهیانه این بیماران و انجام تست آنتی بیوگرام در افراد دارای عفونت و تجویز مناسب ترین دارو برای آنها برای پیشگیری از بروز مقاومت روز افزون به آنتی بیوتیک ها لازم و ضروری به نظر می رسد. کاربرد بالینی این مطالعه می تواند در اعلام نتایج به پزشکان بیمارستان های منطقه مورد مطالعه برای تجویز آنتی بیوتیک موثر تر و تغییر در پرتوکل مصرف آنتی بیوتیک مفید باشد.

## سپاسگزاری

این مقاله تحقیقاتی حاصل پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد میکروب شناسی می باشد. نویسنده این مقاله از معاونت محترم پژوهشی و مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مازندران به خاطر تأمین هزینه ها و همکاری نهایت تشکر را دارند.

## References

1. World Health Organization: Eastern Mediterranean Regional (WHO) Emro. data on NCD and NCD risk factors. Available from <http://www.emro.who.int/ncd/Risk Factors-Regional.htm>, 2005.
2. Singh D. Diabetic foot: It's time to share the burden. Calicut Med J. 2006; 4(3):e4
3. Shah BR, Hux JE. Quantifying the risk of infectious diseases for people with diabetes. Diabetes Care 2003; 26(2): 510–513.
4. Hoepelman AI, Meiland R, Geerlings SE. Int J Antimicrob Agents 2003; 22(Suppl 2): 35-43.
5. World Health Organization. WHO Global Straegy for Containment of Antimicrobial Resistance. Geneva, Switzerland: WHO; 2001. p. 1-105.
6. O'Brien TF. Emergence, spread, and environmental effect of antimicrobial resistance: how use of an antimicrobial anywhere can increase resistance to any antimicrobial anywhere else. Clin Infect Dis 2002; 34(suppl 3): S78–S84.
7. Truzzi JC, Almeida FM, Nunes EC, Sadi MV. Residual urinary volume and urinary

آن به زنان اختصاصی داشت و در تست مقاومتی که انجام شد ۱۰۰ درصد حساسیت به پنیسیلین، سفو تاکسیم و ونکومایسین گزارش شد و حدوداً ۲۰ درصد مقاومت به اریترومایسین و ۸ درصد مقاومت به کلیندامایسین گزارش شد (۲۹) که در مقایسه با مطالعه حاضر شیوع بالاتری داشته و از نظر الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی که در مطالعه حاضر شاهد ۳۵ درصد مقاومت به اریترومایسین و ۵۰ درصد به کلیندامایسین و ۱۱/۷ درصد به پنی سیلین و سفو تاکسیم و ۲۳ درصد به ونکومایسین بودیم، تفاوت قابل توجه ای دارد که ممکن است نشان دهنده روند صعودی در مقاومت این دست از باکتری ها به آنتی بیوتیک ها باشد. مطالعه دیگری بر روی ۵۸ فرد که بیماری زمینه ای داشتند و Streptococcus group B در آنها شناسایی شده بود، ۳۲/۸ درصد مربوط به عفونت ادراری در این افراد بوده است (۳۲).

این مطالعه و مطالعات مشابه ای که ذکر شد نشان می دهد که بیماری های زمینه ای در بروز عفونت های استرپتوکوکی تاثیر گذار است و علت تفاوت نتایج در این مطالعه با سایر مطالعات مشابه بر روی بیماران دیابتی می تواند مربوط به عدم توجه و آگاهی نسبت به اهمیت آن در افراد غیر باردار باشد. با توجه به مطالعه انجام شده

- tract infection –when are they linked? *J Urol* 2008; 180(1):182–185.
8. Stapleton A. Urinary tract infections in patients with diabetes. *Am J Med* 2002; 113(Suppl 1): 80S–84S.
  9. Abubakar EM. Antimicrobial susceptibility pattern of pathogenic bacteria causing urinary tract infections at the Specialist Hospital, Yola, Adamawa State, Nigeria. *J Clin Med Res* 2009; 1(1): 001-008.
  10. Robbins SC, Tucker AW. The cause of death in diabetes. *N Engl J Med* 1994; 231: 865-868.
  11. Isapour A, Asadian I, Akha O. Prevelence of Asymptomatic urinary infection in diabetic patients. *J Mazandaran Univ Med Sci* 2015; 25(125): 95-101 (Persian).
  12. Sharma I, Paul D. Prevalence of community acquired urinary tract infections in silchar medical college, Assam, India and its antimicrobial susceptibility profile. *Indian J Med Sci* 2012; 66(11-12): 273-239.
  13. Hamdan Z Hamdan, Eman Kubbara, Amar M Adam, Onab S Hassan, Sarah O Suliman, Ishag Adam. Urinary tract infections and antimicrobial sensitivity among diabetic patients at Khartoum, Sudan. *Ann Clin Microb Antimicrob* 2015, 14: 26.
  14. Hirji I, Guo Z, Andersson SW, Hammar N, Gomez-Caminero A. Incidence of urinary tract infection among patients with type 2 diabetes in the UK General Practice Research Database (GPRD). *J Diabetes Complications* 2012; 26(6): 513-516.
  15. Ionete OM, Avramesiu C, Balasoiu M, Dobjanschi C. Multidrug resistance of uropathogenic Escherichia coli strains isolated from diabetic patients. *BMC Infectious Diseases* 2014; 14(Suppl 7): P44.
  16. Kashef N, Djavid GE, Shahbazi S. Antimicrobial susceptibility patterns of community-acquired uropathogens in Tehran, Iran. *J Infect Dev Ctries* 2010; 4(4): 202-206.
  17. Paterson DL, Bonomo RA. Extended-spectrum beta-lactamases: a clinical update. *Clin Microbiol Rev* 2005; 18(4): 657-686.
  18. Manouchehri M, Ahanjan M. Detection of CTX beta-lactamase Gene in Escherichia Coli Isolated from Urinary Tract Infection Using Polymerase Chain Reaction. *J Mazandaran Univ Med Sci* 2015; 25(129): 36-45 (Persian).
  19. Sabir S, Ahmad Anjum A, Ijaz T, Asad Ali M, Ur Rehman Khan M, Nawaz M. Isolation and antibiotic susceptibility of Ecoli from urinary tract infections in tertiary care hospital. *Pak J Med Sci* 2014; 30(2): 389-392.
  20. Park H, Oh WS, Kim ES, Park SW, Hur JA, Kim YK, et al. Factor assoasiated wigt ciprofloxacin-and cefotaxim-resistant Escherichia coli in women with acute pyelonephritis in emergency department. *Int J infect Dis* 2014; 23: 8-13.
  21. Pourakbari B, Ferdosian F, Mahmoudi S, Teymuri M, Sabouri F, Heydari H, et al. Increase resistant rates and ESBL roduction between E.coli isolates causing urinary tract infectionin young patiets form iran. *Braz J Microbial* 2012; 43(2): 766-769.
  22. Al-Rubeaan KA, Moharram O, Al-Naqeb D, Hassan A, Rafiullah MR. Prevalence of urinary tract infection and risk factors among Saudi patients with diabetes. *World J Urol* 2013; 31(3): 573–578.
  23. Patterson JE, Andriole VT. Bacterial urinary tract infections in diabetes. *Infect Dis Clin North Am* 1997; 11(3): 735–750.
  24. Hammar N, Farahmand B, Gran M, Joelsson S, Andersson SW. Incidence of urinary tract infection in patients with type 2 diabetes. Experience from adverse event reporting in

- clinical trials. *Pharmacoepidemiol Drug Saf* 2010; 19(12): 1287–1292.
25. Woods CJ. Streptococcus Group B infections (GBS). *Medscape E-journal*. 2015 Oct.
  26. Muller AE, Ostvogel PM, Steegers EA, Dorr PJ. Morbidity related to maternal group B streptococcal infections. *Acta Obstet Gyencol Scand* 2006; 85:1027-1037.
  27. Munoz P, Coque T. Group B Streptococcus agalactiae infections in non-pregnant adults: Single center experience og a growing clinical problem. *Med Sci Monit* 2006; 12(11): 447-451.
  28. Edwards MS, Baker CJ. Group B streptococcal infections in elderly adults. *Clin Infect Dis* 2005; 41(15): 839–847.
  29. Falagas ME, Rosmarakis ES, Avramopoulos I, Vakalis N. Streptococcus agalactiae infections in non-pregnant adults: single center experience of a growing clinical problem. *Med Sci Monit* 2006; 12: CR447–CR451.
  30. Ulett KB, Benjamin WH Jr, Zhuo F, Xiao M, Kong F, Gilbert GL, et al. Diversity of Group B Streptococcus Serotypes Causing Urinary Tract Infection in Adults. *J Clin Microbiol* 2009; 47(7): 2055–2060.
  31. Trivalle C, Martin E, Martel P, Jacque B, Menard JF, Lemeland JF. Group B streptococcal bacteraemia in the elderly. *J Med Microbiol* 1998; 47(7): 649–652.
  32. Lefebvre N, Forestier E, Mohseni-Zadeh M, Remy V, Lesens O, Kuhnert C, et al. Invasive Streptococcus agalactiae infections in non-pregnant adults. *Med Mal Infect* 2007; 37(12): 796–801.