

Recent advances of the egg's freezing: An overview

Faranak Aghaz¹,
Mozafar Khazaei²

¹ PhD Student in Molecular Cell Biology, Fertility and Infertility Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

² Professor, Fertility and Infertility Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

(Received November 6, 2017 ; Accepted February 12, 2018)

Abstract

It is now more than three decades since the first live birth from oocyte cryopreservation. At present, oocyte cryopreservation has become a major component of Assisted Reproductive technologies (ART). Across the world, there is an increasing demand, especially for so-called 'social egg freezing' that allows women to preserve their fertility in anticipation of age-related fertility decline. The purpose of this review article was to investigate the current status of oocyte cryopreservation, common techniques, success rate, clinical applications, the rise of elective oocyte cryopreservation, and future implications. A systematic search was performed using Web of Science and PubMed databases for articles published between January 1980 and December 2015. Keywords used included 'egg freezing', 'oocyte freezing', 'oocyte cryopreservation', 'oocyte vitrification', and 'fertility preservation'. Recently, due to many reasons, including resolving age-related infertility in women the success rate of oocyte cryopreservation by vitrification has risen and IVF pregnancy rates are now similar to those achieved by fresh oocytes, therefore a remarkable increase is seen in oocyte cryopreservation cycles around the world. Oocyte cryopreservation (vitrification), especially social egg freezing is one of the best choices in women and girls with cancer who are at risk of losing fertility due to chemotherapy and radiation therapy, reproductive problems, premature ovaries, and also in women with chronic illnesses.

Keywords: Oocyte, Cryopreservation, Vitrification, Fertility Preservation

J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 28 (164): 192-213 (Persian).

* Corresponding Author: Mozafar Khazaei - Fertility and Infertility Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran (E-mail: mkhazaei1345@yahoo.com)

پیشرفت‌های اخیر در انجماد تخمک: یک مطالعه مژوری

فرانک آغاز^۱

مصطفیر خزاعی^۲

چکیده

بیش از سه دهه از اولین تولد حاصل از لقاح تخمک منجمد شده می‌گذرد. در حال حاضر انجماد تخمک یک تکنیک تکمیلی مهم در مراکز ناباروری محسوب می‌شود. در سراسر جهان تقاضا برای انجماد تخمک، به ویژه انجماد تخمک اجتماعی "Social egg freezing" برای حفظ باروری در محدوده خارج از سن باروری، افزایش یافته است. بنابراین هدف از انجام این مقاله مژوری، بررسی وضعیت اخیر انجماد تخمک، تکنیک‌های رایج، میزان موفقیت، کاربردهای بالینی، معرفی انجماد تخمک انتخابی و پیامدهای آینده آن است. یک جستجوی سیستماتیک در نشریات علمی Web of Science و PubMed از ژانویه سال ۱۹۸۰ تا دسامبر ۲۰۱۶ انجام شد. کلمات کلیدی مورد استفاده در این جستجوی منظم شامل "fertility preservation", "oocyte cryopreservation", "oocyte freezing", "egg freezing" بود. اخیراً در سراسر جهان و به دلایل متنوع از جمله حذف ناباروری وابسته به سن در زنان، افزایش میزان موفقیت نسبی حاصل از انجماد تخمک با استفاده از روش انجماد شیشه‌ای و یکسان بودن نرخ بارداری حاصل از لقاح آزمایشگاهی تخمک منجمد شده و تازه، تقاضا برای انجماد تخمک در اکثر مراکز ناباروری افزایش قابل توجهی یافته است. یکی از بهترین گرینه‌ها، برای حفظ باروری در زنان و دختران مبتلا به سرطان که در معرض خطر از دست دادن باروری به دلایل شیمی درمانی و اشعه درمانی، مشکلات تولید مثلی، تخدمان‌های نارس و هم‌چنین زنانی که به بیماری‌های مزمن مبتلا هستند، انجماد تخمک به روش شیشه‌ای، به ویژه "انجماد تخمک اجتماعی" است.

واژه‌های کلیدی: تخمک، انجماد، انجماد شیشه‌ای، حفظ باروری

مقدمه

باروری دارند اما به هر دلیلی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند بچه‌دار شوند و نگران آن هستند که در آینده، هنگامی که شرایط مناسب برایشان فراهم شد، قدرت باروری‌شان را از دست میدهند یا نه. با توجه به پیشرفت‌های شگرفی که در علم کرایبیولوژی صورت گرفته، بشر توانسته از روش‌های متنوع آن در نگهداری گامت‌ها و جنین در جهت حفظ باروری بهره بگیرد. اگر چه در مراکز

در سالیان اخیر، حفظ باروری زنان به خصوص در مواردی که بافت‌های تولید مثلی و قدرت باروری فرد در معرض خطر قرار می‌گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل بیماران سرطانی پیش از آن که در طی مراحل شیمی درمانی و پرتو درمانی لگنی دچار نازایی یا کاهش قدرت باروری شوند، جوانانی که هنوز ازدواج نکرده‌اند و فرزندی ندارند و تمامی افرادی که قدرت

E-mail: mkhazaei1345@yahoo.com

مولف مسئول: مظفر خزاعی

- کرمانشاه: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

۱. دانشجوی دکتری سلوی مولکولی، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

۲. استاد، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱۵ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۶/۸/۷

تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

پیشرفته و میزان موفقیت پایین، باعث ایجاد یکسری نگرانی‌ها در این رشته شد. مقالات اولیه، دلیل اصلی موفقیت پایین انجماد تخمک را، ویژگی‌های نفوذپذیری غشاء تخمک انسان همراه با دیگر پارامترهای بیوفیزیکی و همچنین اثرات منفی انجماد بر ثبات میکروتوبول و میکروفیلامنت‌ها در تخمک پستانداران (که برای تفکیک کروموزومی طبیعی حیاتی‌اند) بیان کردند.^(۴) سخت بودن ناحیه شفاف تخمک (zona pellucida) و نرخ لقاح آزمایشگاهی پایین پس از ذوب، از دیگر مشکلات مرتبط با انجماد تخمک بود. بعد از پیشرفت‌های چشمگیر در این زمینه، متون علمی پیشنهاد دادند که تخمک انسان به‌طور بالقوه پتانسیل حفظ مورفولوژی و یکپارچگی کروموزومی بعد از انجماد را دارد. با این حال، هنوز پروتکل ثابت برای انجماد تخمک وجود ندارد. تحقیقات در زمینه انجماد تخمک به دلیل وجود محدودیت‌های قانونی پیرامون ذخیره‌سازی جنین، به ویژه در زمان تشدید مخالفت با انجماد جنین در ایتالیا^(۴) شتاب گرفت. با معرفی تکنیک انجماد شیشه‌ای به عنوان یک جایگزین مناسب برای انجماد آهسته، آسیب وارد شده به ساختار داخلی تخمک در طی پروسه انجماد کاهش یافت. این امر منجر به افزایش میزان موفقیت حاصل از لقاح آزمایشگاهی تخمک منجمد_ذوب شد. علاوه بر این، معرفی تریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI: Intracytoplasmic sperm injection) باعث برطرف شدن مشکلات لقاح به دلیل سختی ناحیه شفاف شد.^(۵) در پی این نتایج امیدوار کننده، در سال ۲۰۰۰، سازمان لقاح و جنین شناسی انسانی (HFEA: Human Fertilisation and Embryology Authority) در انگلستان، اجازه استفاده از تخمک منجمد برای درمان ناباروری را صادر کرد.^(۶) سپس در سال ۲۰۱۱، انجمن آمریکایی پزشکی تولید مثل (ASRM: American Society for Reproductive Medicine) در پی چهار کارآزمایی بالینی تصادفی (RCT: Randomized controlled trials) ثابت کرد که نرخ

مراکز ناباروری، تکنیک انجماد جنین و اسپرم به خوبی ثبیت شده است، اما هنوز پروتکل ثابت برای انجماد تخمک وجود ندارد. با این حال، انجماد تخمک به طور قابل توجهی نگرانی‌های اخلاقی، قانونی و شرعاً مربوط به انجماد جنین را برطرف می‌کند، به همین دلیل این روش در بسیاری از جوامع به انجماد جنین ترجیح داده می‌شود^(۱). از زمان تولد نخستین فرزند حاصل از تخمک منجمد در استرالیا در سال ۱۹۸۶^(۲)، پیشرفت‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. در حال حاضر، روش‌های انجماد تخمک، بهبود یافته و میزان موفقیت حاصل از این تکنیک به عنوان گزینه مناسب برای درمان بیماران با علایم متنوع پزشکی و اجتماعی، به ویژه برای حذف ناکاروری وابسته به سن، استفاده می‌شود.

مواد و روش‌ها

در این مقاله مروری به بررسی وضعیت اخیر انجماد تخمک، تاریخچه آن، تکنیک‌های رایج، کاربردهای کلینیکی و فواید بهره‌گیری از آن پرداخته شده است. یک جستجوی سیستماتیک در نشریات علمی Web of Science و PubMed از ژانویه سال ۱۹۸۰ تا دسامبر ۲۰۱۶ انجام شد. کلمات کلیدی مورد استفاده در این جستجوی شامل *oocyte cryopreservation*, *oocyte freezing*, *egg freezing*, *fertility preservation*, *oocyte vitrification* از بازیابی عنوانین مرتبط، خلاصه مقالات منتخب توسط تیم تحقیق بررسی و سپس مقالات نهایی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.

تاریخچه انجماد تخمک

اولین بار داری موفق در پی انجماد تخمک با استفاده از تکنیک‌های انجماد آهسته و سریع، در اوخر دهه ۱۹۸۰ به دست آمد^(۳). در سال‌های اولیه معرفی انجماد تخمک، برخی ویژگی‌های تخمک از جمله نسبت پایین سطح به حجم و حساسیت بالا به شکل گیری کریستال‌های بخ داخل سلولی و همچنین عدم وجود تکنیک‌های

تکنیک انجماد شیشه‌ای (vitrification)، برای تخمک انسان معرفی شده است. در طی فرایند انجماد آهسته، سلول‌ها در معرض غلظت کمی از مواد محافظ سرما قرار می‌گیرند و کاهش دمای به آهستگی رخ می‌دهد. در این روش تخمک ابتدا تا دمای -۵-۷ درجه سانتی گراد خنک می‌شود که در این مرحله تعادل سازی و تشکیل کریستال پخت رخ می‌دهد. سپس به آرامی و با سرعت $0/3^{\circ}\text{C}/\text{min}$ درجه سانتی گراد بر دقيقه سرد می‌شود، تازمانی که به دمای -30°C - -60°C درجه سانتی گراد برسد. پس از آن با سرعت $-10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ درجه سانتی گراد در دقیقه در دمای -150°C سردتر شده و در نهایت در نیتروژن مایع -196°C ذخیره می‌شوند. امروزه در مراکز ناباروری متعدد از پروتکل‌های متفاوتی برای تکنیک انجماد آهسته تخمک استفاده می‌شود که یکی از معترضترین آن‌ها پروتکل Fabbri و همکاران می‌باشد⁽¹¹⁾. در این روش، تخمک‌ها به مدت 10°C در محیط انجمادی مکمل شده با 30°C درصد سرم و $1/5$ مولار $\text{DMSO}-\text{H}_2\text{O}$ قرار گرفته و سپس به قطرات بعدی محیط انجمادی حاوی 30°C درصد سرم، $1/5$ مولار $\text{DMSO}-\text{H}_2\text{O}$ و $1/3$ مولار ساکاروز منتقل می‌شوند. پس از گذشت 10°C درجه سانتی گراد، با سرعت $-2^{\circ}\text{C}/\text{min}$ درجه سانتی گراد دقیقه، روی هر نی انجمامی، دو تا سه تخمک قرار می‌گیرد و پس از سیلید شدن آن‌ها، وارد پروسه انجماد آهسته می‌شود. بدین صورت که تخمک ابتدا تا دمای -5°C - -7°C درجه سانتی گراد، با سرعت $-2^{\circ}\text{C}/\text{min}$ درجه سانتی گراد در دقیقه خنک می‌شوند و پس از قرار گرفتن نی‌های انجمامی به مدت 10°C دقیقه در دمای -7°C درجه سانتی گراد، خنک‌سازی با سرعت $0/3^{\circ}\text{C}/\text{min}$ درجه سانتی گراد بر دقيقه تا دمای -33°C درجه سانتی گراد ادامه می‌یابد. در نهایت تخمک‌ها به ازت مایع منتقل شده و برای چندین سال در دمای -196°C درجه سانتی گراد قابل نگهداری می‌باشند. پخت گشایی نیز با قرار دادن نی‌های انجمامی حاوی تخمک‌های منجمد شده در دمای اتاق به مدت 40°C ثانیه و سپس غوطه ور نمودن آن‌ها در دمای 31°C درجه سانتی گراد به مدت 60°C ثانیه انجام می‌شود. سپس

لچا و بارداری حاصل از لچا آزمایشگاهی تخمک منجمد شده به وسیله انجماد شیشه‌ای و تخمک تازه بسیار مشابه است⁽⁷⁾. این گزارشات مقدمه‌ای برای استفاده از انجماد تخمک در مراکز ناباروری سراسر جهان شد.

مواد محافظ سرما

انجماد شامل حفظ سلول و بافت برای مدت زمان طولانی در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد است. مواد محافظ سرما (Cryoprotectant) ترکیباتی هستند که با جلوگیری از تشکیل پخت باعث کاهش تخریب‌های انجماد می‌شوند. این ترکیبات را می‌توان بر اساس توانایی آن‌ها در عبور از غشای سلول به دو گروه نفوذپذیر و نفوذناپذیر تقسیم‌بندی کرد. مواد محافظ سرما نفوذپذیر شامل [دی متیل سولفوکساید (DMSO)، گلیسرول، اتیلن گلیکول (EG)، ۱، ۲ پروپانیدیول (PROH)] و مواد محافظ سرما نفوذناپذیر مثل ساکاروز، گلوکز، فروکتوز و ترهالوز می‌باشند. مواد محافظ سرما متنوعی از جمله دی متیل سولفوکسید، اتیلن گلیکول و ساکاروز در پروتکل انجماد تخمک مورد استفاده قرار می‌گیرند⁽⁸⁾ که در دهه اخیر از میان این مواد، اتیلن گلیکول، به دلیل نفوذپذیری بالا و سمیت متوسط، به عنوان یک ماده محافظ سرمای استاندارد برای انجماد تخمک کاربرد فراوانی داشته است⁽⁹⁾. اما بر اساس نتایج مطالعات اخیر، مخلوط حاوی نسبت مساوی از دی متیل سولفوکسید و اتیلن گلیکول، بیشترین اثربخشی را به عنوان یک مخلوط محافظ سرمای مناسب در پروتکل‌های انجماد تخمک انسان نشان می‌دهد. زیرا دی متیل سولفوکسید باعث افزایش نفوذپذیری اتیلن گلیکول می‌شود⁽¹⁰⁾. به همین دلیل امروزه این مخلوط، پرکاربردترین ماده محافظ سرما، برای انجماد تخمک، در مراکز ناباروری می‌باشد.

تکنیک‌های انجماد تخمک

تاکنون دو تکنیک اساسی، تکنیک انجماد آهسته (slow-freezing) یا پروتکل اولیه انجماد تخمک و

مولار ساکارز برای ۴۵ تا ۶۰ ثانیه منتقل می شوند(۱۳). سپس تخمک ها روی کرایوتاپ قرار گرفته و بلا فاصله به نیتروژن مایع منتقل می شوند. برای انجام یخ گشایی، براساس دستورالعمل های کیت، کرایوتاپ حاوی تخمک منجمد شده پس از قرار گیری در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد برای مدت ۱ دقیقه، به طور مستقیم به محیط یخ گشایی حاوی ۱ مولار ساکارز، محیط های رقیق کننده حاوی ۰/۵ مولار ساکاروز، محیط رقیق کننده حاوی ۰/۲۵ مولار ساکارز و سپس محیط شستشو منتقل می شود. در نهایت پس از انکوبه شدن تخمک های فریز-ذوب به مدت ۲ تا ۳ ساعت، میزان زنده مانی تخمک ها بر اساس مورفولوژی کامل بودن غشای تخمک مورد بررسی قرار می گیرد. روش انجماد شیشه ای به سرعت به عنوان یک روش مهم جهت جایگزینی روش های سنتی انجماد مورد توجه قرار گرفت. این روش امروزه در مراکز ناباروری برای انجماد جنین، تخمک و بافت قشری تخدمان بیشتر مورد توجه است زیرا روش انجماد شیشه ای به سلول ها یا بافت انجمادی آسیب کمتری وارد کرده و تأثیرات مخرب کمتری بر بقا و توانایی تکوین این سلول ها دارد. دو سیستم اصلی برای انجام تکنیک انجماد شیشه ای وجود دارد: انجماد شیشه ای باز و بسته. تکنیک انجماد شیشه ای باز شامل تماس مستقیم بین تخمک و نیتروژن مایع، با استفاده از دستگاه های حامل باز مانند لوله های موئینه (cooper device)، دستگاه کوپر (capillary glasses) استراوهای کشیده (pulled straws)، کرایوتاپ (Cryotop) و لوبها (loops) می باشد تا حجم محلول انجمادی کاهش یافته و تشکیل کریستال یخ به صورت چشمگیری کاهش یابد(۸). با این حال اگر نیتروژن مایع به طور تصادفی آلوود شود این سیستم ها نمی توانند خطر آلودگی با میکروارگانیسم ها را کاهش دهند. در مقابل در تکنیک انجماد شیشه ای بسته (Straw-in-Straw)، سیستم های حامل بسته شامل کرایوتیپ (Cryotip) و کرایوپیت (Cryopette) وجود دارد که با طراحی خاص

تخمک ها به صورت متواالی به شش قطره متوسط محیط کشت مکمل شده با غلظت نزولی ۱-۲ پروپانیدیول و ساکاروز (۵ دقیقه در هر قطره) برای حذف این مواد محافظ سرما، شستشو داده می شوند. به گونه ای که قطره ششم حاوی محیط کشت به تنها یکی می باشد. در نهایت تخمک ها در انکوباتور با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد برای ۲ تا ۳ ساعت کشت قبل از ICSI قرار داده می شود. اگرچه تغییرات متعددی روی پروتکل های اولیه انجماد آهسته انجام گرفت تا به میزان موفقیت بالاتری منجر شود، اما هنوز هم نگرانی های در استفاده بالینی از این روش وجود دارد. بر اساس مطالعات، میزان موفقیت حاصل از لقادیر تخمک منجمد شده به روش انجماد آهسته به طور معنی داری کمتر از تخمک تازه است(۸). انجماد شیشه ای به معنای انجماد سریع یک محلول در دمای بسیار پایین (۱۹۶- درجه سانتی گراد) و بدون ایجاد هیچ گونه کریستال یخ درون سلولی است. در تکنیک انجماد شیشه ای، سلول ها در معرض غلظت بالای از مواد محافظ سرما قرار می گیرند. بنابراین خطر تشکیل کریستال های یخ درون سلولی در این تکنیک به حداقل می رسد(۱۲). در انجماد شیشه ای تخمک، اتیلن گلیکول به دلیل سمیت پایین و قدرت عبور بالا از ناحیه شفاف و غشای سلولی تخمک، بیشتر از همه به عنوان ماده محافظ سرما استفاده می شود. برخلاف تکنیک انجماد آهسته، نرخ خنک سازی در این تکنیک ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ درجه سانتی گراد در هر دقیقه، قبل از غوطه ور شدن در نیتروژن مایع می باشد. اگرچه در مراکز ناباروری، تکنیک انجماد شیشه ای تخمک به وسیله کیت های انجماد شیشه ای و بر اساس دستورالعمل های شرکت های سازنده انجام می گیرد، اما پایه و اساس انجماد شیشه ای به طور خلاصه در این بخش ذکر می شود. در تکنیک انجماد شیشه ای، تخمک ها پس از قرار گیری در محیط تعادل حاوی ۷/۵ درصد اتیلن گلیکول و ۷/۵ درصد پروپانیدیول به مدت ۵ دقیقه، به محیط انجمادی حاوی ۱۵ درصد اتیلن گلیکول و ۱۵ درصد پروپانیدیول و

تکنیک سریع و مقرن به صرفه است که در مقایسه با انجماد آهسته، نیاز به وسایل گران قیمت ندارد، اما هنوز مشکلاتی مثل سمیت مواد محافظ سرما و خطر آلودگی آلودگی‌ها باقی است^(۱۶). هرچند اکثر مطالعات نشان می‌دهد که میزان بقای تخمک‌های منجمد شده به روش انجماد شیشه‌ای نسبت به تخمک‌هایی که پروتکل‌های انجماد آهسته را تجربه کرده‌اند بیشتر است، اما مطالعات محدودی در مورد مقایسه هر دو روش به طور مستقیم^(۱۷،۱۸) وجود دارد. بر اساس جستجوی منابع علمی، تنها یک مطالعه کلینیکی میزان بارداری حاصل از لقاد تخمک منجمد شده به روش انجماد آهسته را با انجماد شیشه‌ای مقایسه کرده است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، انجماد شیشه‌ای باعث افزایش زندگی ماندنی تخمک^(۱۹) درصد در مقابل ۶۷ درصد) و میزان لقاد تخمک درصد در مقابل ۶۷ درصد) در مقایسه با انجماد آهسته می‌شود^(۲۰). به طور مشابه، مطالعه دیگری نشان داد که میزان بقای، تسهیم و توسعه بلاستوسیست در لقاد تخمک منجمد شده به روش انجماد شیشه‌ای بهبود می‌آید، اما میزان بارداری، به عنوان پیامد حاصل از انتقال این جنین‌ها را، ارزیابی نمی‌کند^(۲۱). با این وجود، امروزه برخی از کلینیک‌ها میزان موفقیت در لقاد تخمک منجمد شده به هر دو روش انجماد شیشه‌ای و آهسته را یکسان گزارش می‌کنند^(۲۲)، بنابراین این احتمال وجود دارد استفاده از پروتکل‌های مختلف، دلیل اصلی اختلاف در میزان موفقیت‌های گزارش شده در کلینیک‌های مختلف است. براساس مطالعات، انجماد تخمک به روش شیشه‌ای برخلاف انجماد آهسته، منجر به بهبود میزان زندگی ماندن تخمک پس از یخ‌گشایی، لقاد، رشد و توسعه اولیه جنینی می‌شود. زیرا روش انجماد آهسته در مقایسه با انجماد شیشه‌ای، باعث آزاد شدن گرانول‌های قشری، شکستن کروموزوم‌ها و در نهایت سفتی ناحیه شفاف و کاهش باروری تخمک می‌شود^(۲۳). بنابراین تکنیک انجماد شیشه‌ای برای تخمک، برتر از روش انجماد آهسته است.

خود از تماس مستقیم سلول و بافت با نیتروژن مایع جلوگیری می‌کند. این سیستم‌ها می‌توانند خطر آلودگی با میکرووارگانیسم‌ها را کاهش دهند، اما سبب کاهش سرعت سرد شدن می‌شود^(۲۴). کراپوتیپ یک لوله مویینی بسیار باریک است که می‌تواند پس از قرارگیری حداقل محلول حاوی تخمک مهر و موم شود؛ بر این اساس، هیچ‌گونه تماس مستقیم بین تخمک با نیتروژن مایع وجود ندارد. این روش برای انجماد جنین‌های انسان به طور موقت آمیزی مورد استفاده قرار گرفته است، اما میزان توسعه اولیه جنینی در تخمک منجمد شده با این روش در مقایسه با روش کراپوتاپ کاهش می‌یابد^(۲۵). یکی دیگر از مزایای روش کراپوتاپ، امکان جداسازی فازهای خنک‌کننده و ذخیره است. به عبارت دیگر در روش کراپوتاپ می‌توان مرحله خنک‌کننده‌گی را در حجم کمی از نیتروژن مایع استریل انجام داد و پس از سیلد کردن انتهای کراپوتاپ، آن را در تانک ازت نگهداری کرد. به همین دلیل مطالعات بیشتری برای اثبات برتری تکنیک‌های مذکور برای انجماد تخمک مورد نیاز است.

مقایسه تکنیک انجماد آهسته و شیشه‌ای در تکنیک انجماد آهسته یا پروتکل اولیه انجماد تخمک، تغییر حالت مایع به جامد به آرامی و با کاهش دمای کترل شده صورت می‌گیرد، در حالی که در تکنیک انجماد شیشه‌ای، کاهش دما سریع و سیتوپلاسم سلول از حالت مایع به شکل جامد بی‌نظم غیرکریستالی در می‌آید. با وجود این که در انجماد آهسته و شیشه‌ای از مواد محافظ سرما مشابه استفاده می‌شود، اما در غلظت این مواد محافظ سرما تفاوت زیادی وجود دارد. به گونه‌ای که، برای انجماد آهسته، غلظت مواد محافظ سرما به ۱ تا ۲ مول محدود می‌شود؛ اما در انجماد شیشه‌ای این مقدار تا ۵ مول نیز افزایش می‌یابد. انجماد آهسته، یک روش زمانبر است و نیازمند تجهیزات گران قیمت می‌باشد، در حالی که انجماد شیشه‌ای، یک

انجماد شیشه‌ای به میزان زیادی، به نرخ گرم شدن تخمک بستگی دارد (۲۸، ۲۹). بر این اساس، تاثیر نرخ گرم شدن تخمک بر زنده مانی تخمک، در حقیقت پر اهمیت تر از نرخ خنک‌سازی است و نتایج مطلوب به احتمال زیاد، زمانی به دست می‌آید که انجماد شیشه‌ای و گرم شدن تخمک در یک کلینیک و با پروتکل یکسان انجام گیرد.

پیشرفت های اخیر در انجماد شیشه‌ای تخمک اگرچه در حال حاضر هر دو روش انجماد شیشه‌ای و آهسته در بسیاری از مراکز ناباروری انجام می‌شود، اما مطالعات اخیر نشان می‌دهد که روش انجماد شیشه‌ای، به طور قابل توجهی میزان بقای تخمک و حاملگی بعد از انتقال جنین را بهبود می‌بخشد. در سال ۲۰۰۶، یک متأنالیز پیشنهاد کرد که میزان بارداری حاصل از تخمک منجمد شده به وسیله روش انجماد شیشه‌ای بهبود می‌یابد، هر چند هنوز تعداد بارداری کمی گزارش شده است (۱۷). به طور مشابه، مقایسه نتایج لقادح آزمایشگاهی از تخمک منجمد شده با استفاده از تکنیک انجماد آهسته و انجماد شیشه‌ای نشان داد که انجماد شیشه‌ای منجر به نرخ بهتر زنده مانی، لقادح و بارداری می‌شود اگرچه تنها افزایش میزان بارداری به طور معنی دار گزارش شده است (۱۸/۲) درصد در مقابل ۷/۶ درصد (۳۰، ۵).

نتایج مطالعات موجود در مورد پیامدهای لقادح آزمایشگاهی تخمک منجمد شده با روش انجماد شیشه‌ای پیشنهاد می‌کند که میزان موقیت حاصل از لقادح آزمایشگاهی هر دو تخمک تازه و منجمد شده با روش انجماد شیشه‌ای یکسان است و نرخ زنده مانی تخمک منجمد شده با روش انجماد شیشه‌ای بیش از ۸۴ درصد می‌باشد (۳۱). اگرچه در سال ۱۹۹۹، نزدیک به ۱۰۰ تخمک منجمد برای رسیدن به یک بارداری موفق نیاز بود (۳۲)، اما در حال حاضر تنها با ۲۰ تخمک منجمد شده با روش انجماد شیشه‌ای می‌توان بارداری موفق داشت، هر چند میزان بارداری به شدت وابسته به سن تخمک

مقایسه انجماد شیشه‌ای بسته و باز مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی (RCT)، نرخ موافقیت مشابه‌ای بین لقادح آزمایشگاهی تخمک منجمد شده با تکنیک انجماد شیشه‌ای باز و تخمک تازه گزارش کرده‌اند (۲۱). هم‌چنین نگرانی‌هایی با توجه به پتانسیل آلودگی متقاطع بین تخمک و نیتروژن مایع در مورد سیستم انجماد شیشه‌ای باز مطرح شده است. برای جلوگیری از خطر بالقوه آلودگی با میکرووارگانیسم‌ها، استریلیزاسیون نیتروژن مایع با استفاده از نور ماوراء بنفش و یا ذخیره‌سازی تخمک در بخار نیتروژن مایع، با چگالی کمتر از آلاینده‌های هوای محیط پیرامون و ظروف ذخیره‌سازی قبل از روند انجماد شیشه‌ای، توصیه می‌گردد (۲۲). پژوهشگران به عنوان یک راه حل قوی تر برای از بین بردن نگرانی آلودگی‌ها، روش انجماد شیشه‌ای بسته را ارائه کرده‌اند (۲۳). سپس با قراردادن وسایل مورد استفاده در هر دو روش باز و بسته در معرض نیتروژن مایع آلوده، دریافتند که وسایل مورد استفاده در روش بسته عاری از آلودگی باکتریایی بود، درحالی که در ۴۵ درصد از وسایل مورد استفاده در سیستم باز، آلودگی باکتریایی وجود داشت. با این وجود، در سال ۲۰۱۱، نگرانی‌های جدیدی در مورد اثربخشی انجماد شیشه‌ای با سیستم بسته مطرح شد. براساس مطالعه Bonetti و همکاران (۲۴) در استفاده از روش انجماد شیشه‌ای بسته، حفظ فراساختار تخمک به خوبی سیستم‌های باز نیست. هم‌چنین نتایج مطالعه دیگری نشان داد که نرخ لقادح، تسهیم و میزان بارداری کلینیکی در انجماد شیشه‌ای بسته کاهش می‌یابد (۲۵). در مقابل، مطالعات دیگر ثابت کرده‌اند که روش انجماد شیشه‌ای بسته می‌تواند علاوه بر جلوگیری از انتقال آلودگی، به نتایج کلینیکی بسیار عالی‌تری نسبت به سیستم انجماد شیشه‌ای باز دست یابد (۲۶). هم‌چنین نتایج حاصل از یک مطالعه مقطعی در بریتانیا (۲۰۱۱) نشان داد که ۷۵ درصد از مراکز ناباروری از روش انجماد شیشه‌ای بسته استفاده می‌کنند (۲۷). هر چند مطالعات دیگر اعلام کرده‌اند که برتری پروتکل‌های

همکاران (۳۷) گزارش کردند که روش انجاماد شیشه‌ای، عوارض جانبی زایمان و پس از تولد را افزایش نمی‌دهد. در مقابل بر اساس نتایج Kushnir و همکاران (۳۸)، نرخ تولد زنده به ازای هر چرخه اهدای تخمک منجمد شده در مقایسه با تخمک تازه، به طور قابل توجهی پایین‌تر است (۴۰/۳ درصد در مقابل ۴۹/۶ درصد). هرچند در این مطالعه عوامل مهم مخدوشگر مثل سن گیرنده و اهدا کننده یا پروتکل‌های انجاماد بررسی نشده بود. بنابراین با وجود اطمینان از اثرات سود بخشی و ایمن بودن انجاماد تخمک، افزایش پژوهش‌ها در مورد پیامدهای طولانی مدت انجاماد تخمک در سراسر جهان ضروری است.

کاربردهای کلینیکی انجاماد تخمک

اگر چه تکنیک انجاماد تخمک در ابتدا برای زنان با عالیم پزشکی و بدون هیچ گزینه درمانی برای باروری (۳۹) اجرا شد، اما در حال حاضر انجاماد تخمک نقش مهمی در درمان بیمارانی با شرایط مختلف ناباروری ایفا می‌کند. شاید قابل توجه ترین تعریف از انجاماد تخمک، انجاماد تخمک اجتماعی است که به عنوان وسیله‌ای برای حفظ باروری و حذف ناباروری وابسته به سن در زنان مطرح می‌باشد (۴۰). کاربردهای دیگر انجاماد تخمک شامل برنامه‌های اهدا و ذخیره‌سازی تخمک است. بر اساس گزارش HFEA تا سال ۲۰۱۲، حدود ۱۸۰۰۰ تخمک برای استفاده بعدی خود بیمار منجمد شد که تنها ۱۶۰ چرخه ذوب/گرم شدن انجام و در نهایت ۲۰ تولد زنده ثبت شد. به طور معمول تخمک برای ۱۰ سال منجمد و ذخیره می‌شود، اما تاکنون گزارشات اندکی درباره این که زنی بتواند پس از چند سال از تخمک منجمد خود استفاده کند وجود دارد و به همین دلیل از این روش بیشتر برای درمان نازایی زنان دیگر استفاده می‌شد. از این رو تعداد زیادی از مراکز ناباروری در سراسر جهان "انجاماد تخمک اجتماعی" را پیشنهاد می‌دهند.

است (۳۳). در سال ۲۰۱۱، آزمایشات کنترل شده تصادفی، میزان بارداری کلینیکی را به ازای هر بار انتقال جنین بین ۳۵/۵ درصد و ۶۵/۲ درصد گزارش کردند (۲۱). یافه‌های متا-آنالیز اخیر روی پنج مطالعه نشان داد که نرخ لقاح، تسهیم، کیفیت بالای جنین و بارداری حاصل از تخمک تازه و منجمد شده با روش انجاماد شیشه‌ای متفاوت نیست (۱۳). بنابراین در انسان، اکثر مطالعات نشان می‌دهد که میزان بقای پس از زایمان در نوزادان حاصل از لقاح تخمک‌های منجمد شده به روش انجاماد شیشه‌ای نسبت به انجاماد آهسته (۳۴، ۲۶۸) بالاتر است. علاوه بر این، در یک مطالعه گزارش شده است که بهبودی دوک‌های تقسیم میوزی در تخمک‌های که به روش انجاماد آهسته (۱) است. منجمد شده‌اند، سریع‌تر از روش انجاماد آهسته (۱۳) است. براین اساس در حال حاضر در بسیاری از مراکز ناباروری، روش انجاماد شیشه‌ای به عنوان اصلی ترین تکنیک برای انجاماد تخمک کاربرد دارد و موسسه ملی بهداشت و National Institute for Health and Care (NICE/Excellence) در ۲۰۱۳ گزارش کرد که «اگر تجهیزات و تخصص ضروری در دسترس است، در انجاماد تخمک و جنین، روش انجاماد شیشه‌ای جایگزین انجاماد آهسته شود» (۱۳).

نتایج انجاماد تخمک

مطالعات زیادی، پیامدهای طولانی مدت زایمان و قبل و بعد از تولد فرزند حاصل از لقاح آزمایشگاهی تخمک منجمد شده با انجاماد شیشه‌ای را مورد بررسی قرار داده‌اند. تجزیه و تحلیل ۱۶۵ بارداری و ۲۰۰ نوزاد متولد شده نشان داد که متوسط وزن هنگام تولد و بروز ناهنجاری‌های مادرزادی، در نوزادان متولد شد حاصل از لقاح تخمک تازه یا منجمد شده با روش انجاماد شیشه‌ای مشابه است (۳۵). بر اساس نتایج مقاله مروری دیگر بر روی ۹۳۶ نوزاد متولد شده، میزان ناهنجاری‌های ژنتیکی حاصل از لقاح تخمک منجمد شده با روش انجاماد شیشه‌ای و آهسته یکسان گزارش شد (۳۶). به طور مشابه Cobo و

آن نسبت به تخریب‌های حاصل از ایجاد کریستال‌های یخ در زمان انجاماد، پایین بوده است(۱۷). اما اخیراً پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در بهبود تکنیک‌های انجاماد تهمک صورت گرفته و نتیجه آن حاملگی و تولید زنده بوده است. هم‌چنین ضرورت انجاماد تهمک به دلایلی مانند سندروم تحریک بیش از حد تخدمانی (هیپراستیمولاسیون تخدمان)، ابتلاء فرد به سرطان به خصوص در سنین جوانی، نبود موفقیت مرحله اول انتقال جنین در رحم و تقاضای والدین برای فرزند دیگر در سال‌های آتی برکسی پوشیده نیست و کم و بیش نیاز آن احساس می‌شود(۸). به علاوه نتایج نشان داده است که غشای تهمک‌های بالغ دارای یک ترکیب لبییدی متفاوت در مقایسه با تهمک‌های نابالغ بوده و نسبت به کاهش درجه حرارت و آسیب‌های ناشی از سرما در مقاومت کمتری هستند. بنابراین با انجاماد تهمک‌های نابالغ می‌توان برای مشکلات غلبه نمود(۴۲). بر اساس مطالعه مذکور، انجاماد تهمک و جنین دو تکنیک اساسی و پر اهمیت برای درمان ناباروری با دلایل متعدد می‌باشد.

روش‌های انجامادی و پیشرفت‌های اخیر در تکنیک انجاماد جنین

تمام روش‌های انجامادی در انجاماد جنین، همانند آن چه که در انجاماد تهمک گفته شد، به دو روش انجاماد آهسته و شیشه‌ای تقسیم می‌شود که پایه و اساس این روش‌ها دقیقاً همانند آن چه است که در مورد انجاماد تهمک در بخش‌های بالا ذکر گردید، با این تفاوت که در روش انجاماد آهسته جنین، معمولاً مواد محافظ سرما نفوذپذیر (مثل گلیسرول، اتیلن گلیکول، ۱ و ۲ پروپاندیول) با غلظتی در حدود ۱/۵ مول استفاده می‌شوند، در حالی که در تکنیک انجاماد آهسته تهمک، می‌توان از مواد محافظ سرما نفوذپذیر یا نفوذناپذیر استفاده کرد. بنابراین، لازم است سرعت انجاماد به گونه‌ای تنظیم شود که فرصت لازم برای خروج آب از سلول در اختیار آن قرار گیرد. این روش، برای اولین بار به وسیله

انجاماد تهمک در مقایسه با انجاماد جنین امروزه، انجاماد جنین به عنوان یک تکنیک مهم کمک باروری، مزیت‌های بسیاری دارد. توانایی ذخیره جنین‌های مازاد ایجاد شده در طی روش‌های درمان ناباروری، می‌تواند به کاهش تعداد جنین‌ها در چرخه انتقال جنین تازه و در نتیجه به حداقل رساندن خطر بارداری‌های چند قلویی، کاهش نیاز به تکرار چرخه تحریک تخدمان و افزایش میزان باروری اجتماعی منجر شود. با این وجود، به دلیل اعتراضات مذهبی، محدودیت‌های اخلاقی شخصی و قانونی در برخی کشورها، انجاماد جنین یک گزینه مناسب برای تمام زوج‌ها نیست. تصمیم گیری در مورد سرنوشت جنین ذخیره شده نیز می‌تواند به اختلافات حقوقی به ویژه در صورت طلاق یا جدایی، منجر شود(۱). بنابراین اهداء تهمک منجمد شده می‌تواند یک جایگزین مناسب برای انجاماد جنین در بسیاری از زوج‌های تحت درمان فرآیند لقاح آزمایشگاهی باشد و بدون شک کمک موثری برای تکنولوژی‌های تولید مثل است. از آن‌جا که در اهداء تهمک برخلاف اهداء جنین، مواد ژنتیکی فرزند حاصل سرچشمه از یک والد (پدر) دارد و حداقل ۵۰ درصد ژن فرزندی که حاصل می‌شود، متعلق به همان خانواده است، حساسیت اخلاقی و حواشی کمتری در ذخیره‌سازی و انجاماد آن به وجود می‌آید(۷). هم‌چنین افزایش چشمگیر تقاضا برای انجاماد تهمک در سال‌های اخیر، حاکی از ارجحیت انجاماد تهمک نسبت به جنین است(۴۱).

تهمک بالغ یکی از بزرگ‌ترین سلول‌های بدن به اندازه تقریبی ۱۳۰ میکرومتر است و نسبت پایین سطح به حجم تهمک سبب کارآیی کمتر تبادل آب و مواد محافظ سرما می‌شود و نتیجه اجتناب ناپذیر این است که تهمک در مقایسه با جنین، بیش تر مستعد نگهداری آب و در نتیجه تخریب به دلیل ایجاد کریستال‌های یخ در زمان انجاماد است. بهمین دلیل برخلاف جنین، انجاماد تهمک بالغ سخت است و موفقیت در انجاماد تهمک با توجه به شرایط خاص سلول و حساسیت بیش از حد

از تکنیک‌های کمک باروری تبدیل شده است. در ابتدا تخمک اهدایی تازه، در درمان زنان مبتلا به نارسایی (POF: premature ovarian failure) تخدمانی زودرس (premature ovarian failure) استفاده شد. در سال‌های اخیر تقاضا برای اهداء تخمک افزایش یافته، به گونه‌ای که آن را به یک گزینه درمانی مناسب برای تعداد زیادی از زنان با ناباروری وابسته به سن تبدیل کرده است.^(۴۶) در این تکنیک توجه به جوان و سالم بودن اهدا کنندگان تخمک تازه، ضروری است. به عبارت دیگر، اهداء کننده تخمک باید دارای شرایط سنی خاصی باشد؛ ترجیحاً باروری وی قبلًا ثابت شده باشد و تیم درمانی با بررسی‌های لازم، از سلامت وی اطمینان حاصل کرده باشند. دلیل شرط سنی اهداء کننده تخمک این است که زنان جوان به داروهای هورمونی تجویز شده در طول درمان پاسخ بهتری می‌دهند و تخمک‌های سالم و بیشتری دارند. هم‌چنین امکان بروز اختلالات ژنتیکی، کمتر و درصد موفقیت بارداری آن‌ها بیشتر است، اما چرخه سنتی اهدای تخمک تازه در حال حاضر دارای برخی مشکلات می‌باشد. یکی از این مشکلات نیاز به شرایط لازم برای هماهنگ سازی چرخه قاعدگی بین دهنده و گیرنده است. در حالی که تخمک می‌تواند جمع‌آوری، منجمد، ذخیره و در نهایت در یک چارچوب زمانی خاص منتقل شود. دیگر نگرانی، عدم وجود اقدامات قرنطینه مناسب در طول اهدای اسپرم و ذخیره آن در صورت لزوم، است. امروزه تقاضا برای تخمک و در پی آن انتظار طولانی مدت برای دریافت آن افزایش یافته است. هم‌چنین این واقعیت وجود دارد که در طی اهداء تخمک تازه، همه دریافت‌کننده‌ها تمایل به دریافت تخمک اهدایی از یک اهدا کننده خاص را داشته باشند.^(۴۷, ۱۳) ساده ترین راه حل مقابله با این چالش‌ها، معرفی تکنیک انجام دادن تخمک به مراکز ناباروری، جهت ذخیرسازی تخمک‌های اهدایی است. با کمک این روش، دیگر نیازی به هماهنگ‌سازی چرخه قاعدگی بین دهنده و گیرنده در سیکل‌های کمک باروری نیست. هم‌چنین امکان انجام

Trounson و همکارانش در سال ۱۹۸۴ مطرح شد. آنان، اولین تولد زنده حاصل از انتقال جنین انسان منجمد شده به روش انجاماد آهسته گزارش کردند.^(۴۴, ۴۳) اگرچه در دهه گذشته، انجاماد آهسته جنین پروتکل غالب در مراکز ناباروری بود، اما در سال‌های اخیر تغییرات مهمی در بهبود پروتکل‌های انجاماد شیشه‌ای دیده شد و نتایج به دست آمده از روش انجاماد شیشه‌ای مشخص کرد که روش مناسب‌تری در مقایسه با روش آهسته برای انجاماد جنین است. در روش انجاماد شیشه‌ای، به علت استفاده از غلظت بالای مواد محافظ سرما (حدود ۴۰ درصد) و کوتاهی زمان آب‌گیری (زمان تعادل)، آب به سرعت از سلول خارج شده و در حین انجاماد، محیط اطراف سلول به یکباره تبدیل به شیشه می‌شود. محلول‌های انجاماد شیشه‌ای معمولاً حاوی مواد محافظ سرما و نفوذپذیر (مثل گلیسرول، اتیلن گلیکول، ۱ و ۲ بروپاندیول)، دی‌ساکاریدهای کوچک (مثل ساکارز، تری‌هالز، گلوکز) و ماکرومولکول‌ها (مثل پروپاندیول گلیکول، آلبومین سرم گاوی) می‌باشند. امروزه، مقالات متعددی در مورد افزایش میزان زنده ماندن پس از یخ‌گشایی جنین‌های منجمد شده به هر دو روش انجامادی^(۴۵) گزارش شده است. بر اساس مطالعات در دهه اخیر، تعداد نوزادان سالم متولد شده پس از لقاح تخمک منجمد شده و انتقال جنین‌های فریز-ذوب به روش کرایوتاپ افزایش چشمگیری داشته است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که روش کرایوتاپ یک تکنیک کارآمد برای هر دو انجاماد جنین و تخمک است.^(۴۵, ۸) اگرچه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر انتقال آلودگی با استفاده از روش کرایوتاپ گزارش نشده است، با این وجود مطالعات بیشتری در جهت جلوگیری از احتمال آلودگی متقابل و ارائه سطح ایمنی بالاتر که مطابق با الزامات قانونی در سراسر جهان باشد، ضروری است.

اهداء تخمک

امروزه اهداء تخمک به یک بخش جدایی ناپذیر

حفظ باروری در بیماران مبتلا به سرطان در حال حاضر سرطان پستان شایع‌ترین نوع سرطان سینه باروری در زنان است و این سرطان در ۱۵ درصد موارد در سن زیر چهل سال رخ می‌دهد^(۱۶). در بسیاری از موارد انتخاب روش‌های کمورادیوتروابی تنها راه علاج و بهترین استراتژی درمان سرطان است و موجب افزایش جمعیت بازمانده از بیماری‌های بد خیم گشته است، اما از سوی دیگر برنامه‌های درمانی بیماران سرطان به دلیل برداشتن اندام‌های تناسلی و یا استفاده از رادیوتروابی و انواع داروها و مواد سمی می‌تواند اثر زیان باری بر باروری زنان داشته باشد و در نهایت منجر به نارسایی زودرس تخدمدان و کاهش ذخیره فولیکولی تخدمدان شود. البته میزان آسیب به ذخیره فولیکولی به سن بیمار، نوع یا دوز داروی شیمی درمانی، همراه بودن دارو با مواد آلکیله کننده به ویژه گنادوتوكسین‌ها، بستگی دارد^(۵۲). این مسئله باعث گردیده تا افراد تحت درمان تا پایان عمر از ناباروری رنج برد و امید زیادی در ارتباط با شانس باروری خود بعد از درمان سرطان نداشته باشند. چون تقاضا برای حفظ باروری در میان این بیماران با بهبود درمان و نجات آن‌ها از سرطان، افزایش می‌یابد، بنابراین ضرورت حفظ توان تولید مثلی این افراد بیش از پیش احساس می‌شود. در این راستا، تکنیک‌های مختلف روش‌های کمک باروری از جمله انجماد تهمک، انجماد جنین و انجماد بافت تخدمدان، به حفظ توان باروری این افراد کمک بسیاری کرده و در برخی مواقع انجماد جنین یک گزینه درمانی برای این بیماران است، اما همان طور که در متون فوق اشاره شد، انجماد جنین دارای معایب مختلفی از جمله ایجاد اختلافات بزرگ در زمان طلاق می‌باشد. هم‌چنین انجماد جنین برای زنان مجرد و یا بیماران جوان بدون یک شرایط زندگی ثابت، گزینه مناسبی نیست. هنگامی که شرایط لازم جهت انجماد جنین برای بیمار به دلایل مختلف وجود نداشته باشد، انجماد تهمک می‌تواند گزینه مناسبی باشد. هم‌چنین بر اساس مطالعه Filippi و همکاران^(۵۳)،

تست بیماری‌های عفونی از اهداء کنندگان وجود دارد که به طور بالقوه باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود. هم‌چنین انجماد تهمک و ایجاد بانک‌های تهمک به گیرنده‌ها این اجازه را می‌دهد تا لیست اهداء کننده‌ها را از لحاظ سالم و جوان بودن بررسی کنند، بنابراین زمان انتظار برای یافتن یک اهداء کننده مناسب را به حداقل می‌رساند^(۴۸). شایان ذکر است که می‌توان با کمک این تکنیک، تهمک یک اهداء کننده خاص و یا تهمک‌های مازاد زوج‌های نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری را منجمد و پس از آن اهداء کرد. به همین دلیل امروزه در سراسر جهان بخش رو به رشدی از مراکز ناباروری از تهمک‌های منجمد اهدایی استفاده می‌کنند. در آمریکا (در سال ۲۰۱۳)، ۳۱۳۰ تهمک از ۲۹۴ اهداء کننده در بانک تهمک ذخیره شده است^(۴۸). در حال حاضر از هر هفت بانک تهمک، شش بانک از تکنیک انجماد شیشه‌ای به جای انجماد آهسته استفاده می‌کنند. فرآیند انجماد تهمک اثر مستقیم بر میزان موقیت حاصل از لفاح تهمک اهدایی دارد. یک بانک اهداء کننده تهمک که از تکنیک انجماد آهسته استفاده می‌کند، میزان بارداری را ۵۰ درصد گزارش کرد^(۴۹). اما بر اساس تایج Nagy و همکاران^(۵۰)، پیامد حاصل از لفاح آزمایشگاهی تهمک اهدایی منجمد شده با روش انجماد شیشه‌ای و استفاده از تهمک تازه، از ۲۰ اهداء کننده یکسان، مشابه بود. هم‌چنین Sole و همکاران^(۵۱) اختلاف معنی‌داری بین میزان تولد زنده حاصل از لفاح تهمک اهدایی منجمد و تهمک تازه گزارش نکردند. به طور خلاصه، مقایسه پیامدهای لفاح تهمک اهدایی تازه و منجمد، ایجاد بانک‌های تهمک منجمد با تأکید بر روش انجماد شیشه‌ای را ثابت می‌کنند. البته، امروزه نگرانی‌های اخلاقی جدیدی از جمله سهولت انتقال تهمک، به دلیل تجاری شدن بانک‌های تهمک، بین دو کشور با مقررات، اخلاق و مذهب‌های مختلف را مطرح ساخته است^(۴۸). با این حال با مدیریت دقیق، می‌توان بانک‌های تهمک را توسعه داد.

بزرگ و حساس به دما بوده و حاوی مقادیر زیادی آب می‌باشد. بنابراین نسبت سطح به حجم آن‌ها کم است که باعث می‌شود در حین فرآیند انجماد، رشته‌های دوک آسیب دیده و یخ درون سلولی تشکیل گردد(۵۷). اگرچه بخشی از این مشکلات را می‌توان با معرفی پروتکل‌های با قابلیت شروع در هر زمان و استفاده از هورمون آنتی استروژن برای تحریک تخدمان در زنان مبتلا به سرطان سینه کاهش داد، اما هنوز نگرانی‌هایی پیرامون انجماد تخمک بالغ وجود دارد(۵۸). یکی از راه حل‌های جایگزین انجماد تخمک بالغ برای جلوگیری از به تأخیر افتادن درمان سرطان عبارتند از انجماد تخمک در مرحله وزیکول ژرمینال (GV) و یا استخراج تخمک نابالغ و سپس بالغ شدن در پروسه بلوغ آزمایشگاهی (In vitro maturation : IVM) روش دیگر نیازی به تحریک تخدمان نیست(۶۱-۵۹). چون تخمک‌های نابالغ به علت فقدان دوک متافازی و اندازه کوچک، به آسیب‌های ناشی از فرآیند انجماد، مقاوم‌تر هستند، انجماد تخمک‌ها در مرحله ژرمینال بهتر از مرحله متافاز II می‌باشد(۶۳) هم‌چنین بر اساس نتایج مطالعات، بارداری‌هایی که با کمک انجماد تخمک نابالغ صورت گرفته، افزایش خطر سختی زایمان و یا ناهنجاری‌های مادرزادی را نشان نمی‌دهند و هیچ گونه افزایشی در تعداد غیر طبیعی کروموزوم‌ها و یا از دست رفتن آن‌ها مشاهده نشده است(۶۳). از طرفی، اختلال در کاریوتایپ و شکل‌گیری اندام‌ها، اختلال ذهنی و یا کمبود رشد در بچه‌های متولد شده از تخمک‌های منجمد نیز گزارش نشده است(۳۵). هر چند میزان تولد زنده با استفاده از این تکنیک هنوز پایین است. علاوه بر انجماد تخمک، یکی دیگر از راه حل‌های مناسب برای جلوگیری از به تأخیر افتادن درمان سرطان، استفاده از بانک بافت تخدمان می‌باشد. در این روش، قطعاتی از بافت تخدمان به وسیله روش‌های لاپاروسکوپی، لاپاروتومی یا اووفورکتومی یک طرفه یا دو طرفه از بدن بیمار خارج شده و پس از تشریح نمونه و جداسازی

انجماد تخمک یک روش جایگزین مناسب برای حفظ باروری در دختران نوجوان و جوان با ذخیره تخدمانی کم یا متوسط می‌باشد، که در دوران کودکی قبل از انجماد قشر تخدمان، تحت شیمی درمانی قرار گرفته‌اند. پیشرفت‌های زیادی که در روش‌های انجماد تخمک ایجاد شده، بدین معنی است که امروزه این تکنیک می‌تواند به طور معمول برای حفظ باروری در زنان مبتلا به سرطان ارائه شود. بر اساس نتایج یک مطالعه، از ۱۰۸ بیمار مبتلا به سرطان سینه تحت درمان حفظ باروری بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰، ۱۶/۷ درصد برای انجماد تخمک اقدام کردند(۵۴). در حالی که در سال ۲۰۱۳، ۷۱/۶ درصد از بیماران مبتلا به سرطان سینه، متقاضی انجماد تخمک برای حفظ باروری بودند(۵۵). اگرچه تولد زنده موفق حاصل از لقاح آزمایشگاهی تخمک اهدایی بیماران مبتلا به سرطان گزارش شده است، اما تعداد کمی از بیماران مبتلا به سرطان بعد از درمان بیماری خود از تخمک اهدایی استفاده می‌کنند. برای بیماران مبتلا به سرطان، انجماد تخمک در هر دو مرحله بالغ و نابالغ صورت می‌گیرد، امروزه تخمک‌های بالغ به آسانی در مراکز ناباروری با روش‌های مختلف منجمد می‌شوند و نتایج خوب و قابل قبولی پس از انجماد آن‌ها به دست آمده است، به گونه‌ای که تا به امروز بیش از ۵۰۰ تولد زنده از این روش گزارش شده است. از معایب اصلی منجمد کردن تخمک‌های بالغ یا متافاز II (MII) در بیماران مبتلا به سرطان، نیاز به تحریک تخدمان است که این موضوع باعث به تأخیر افتادن حداقل چند هفته‌ای درمان سرطان این بیماران می‌شود و ممکن است تحریک هورمونی تخدمان خود خطر بیشتری را برای بیمارانی مبتلا به سرطان حساس به هورمون ایجاد کند(۵۶،۴۰). به علاوه انجماد تخمک بالغ، تشکیل دوک تقسیم را در طی تکمیل میوز به خطر می‌اندازد که در نتیجه این تحریب و یا فقدان رشته‌های دوک، توانایی تخمک برای لقاح و تکوین طبیعی جنین کاهش می‌یابد. هم‌چنین تخمک‌های بالغ که در متافاز میوز II قرار دارند، از نظر اندازه،

جنین) سودمند است و به طور بالقوه منجر به نرخ موقفيت بيش تر می شود.

انجماد تخمک انتخابی

تقریباً در همه کشورها، تعداد فزاینده ای از زنان وجود دارند که به هر دلیل نمی توانند یا نمی خواهند در اوایل جوانی بچه دار شوند و مادر شدن را به تعویق می اندازنند (۶۷). امروزه به دلیل پیشسرفت های چشمگیر در تکنیک های انجماد تخمک، ناباروری وابسته به سن کاهش یافته است. به گونه ای که "انجماد تخمک اجتماعی"، به یک موضوع محظوظ در رسانه ها تبدیل شده و تقاضا برای انجماد تخمک سرعت گرفته است (۵۵). اگر چه این روش نسبتاً جدید است، اما در حال حاضر نگرانی های پیرامون آن در حال رشد است. استفاده از تخمک جوان می تواند خطرات سقط های ناشی از ناهنجاری های آنولپلوئیدی مرتبط با پیری تخمک را کاهش دهد (۶۸). استفاده از انجماد تخمک منجمد شده خود فرد، اجازه وجود یک رابطه ژنتیکی بین مادر و کودک را می دهد که از طریق تخمک اهدا یی نمی توان به دست آید. هم چنین شانس بالاتری از بارداری در مقایسه با لقادح آزمایشگاهی از تخمک پیر را ایجاد می کند. بر اساس نتایج مطالعه اخیر، ۱۴۶۸ زن به دلایلی غیر از سرطان، تحت انجماد تخمک انتخابی قرار گرفتند یا به عبارت دیگر متقاضی انجماد تخمک و ذخیره آن در بانک تخمک بودند که از این تعداد فقط ۱۳۷ نفر از تخمک منجمد شده خود، استفاده کردند (۶۹).

ناباروری وابسته به سن

تجربه کاهش باروری توسط زنان، که تا حد زیادی به کاهش تعداد فولیکول و کیفیت تخمک وابسته است، بعد از سن ۳۵ سالگی شتاب می گیرد که به این پدیده یائسگی گویند (۷۰). به همین دلیل خطر ابتلا به اختلالات کروموزومی در جنین و از دست دادن جنین در بارداری با سنین بالا به شدت افزایش می یابد (۷۱). امروزه

مدولای تخدمان، بخش قشری به قطعات کوچکی تقسیم شده که این قطعات بافتی طی روش های مختلف (آهسته و یا شیشه ای و با پروتکل های مختلف) منجمد و در بانک های تخدمان ذخیره می شود. پس از تکمیل فرآیند درمان سرطان، بیمار می تواند مجدداً از ذخایر بافتی خود استفاده نماید. انجماد تخدمان، تعداد فراوانی فولیکول در مراحل مختلف بلوغ را بدون هیچگونه تاخیری در درمان سرطان، حفظ می نماید، اما از جمله معایب این روش آماده شدن بیمار برای انجام عمل جراحی، پیوند متوالی بافت تخدمانی، با خطر بالقوه سلول های بد خیم می باشد (۶۴). با این حال، تعداد نسبتاً اندکی تولد زنده پس از پیوند بافت تخدمان منجمد شده گزارش شده است (۶۵). با توجه به نکات گفته شده، در بیماران مبتلا به سرطان، استفاده از ترمیبی از هر دو روش انجماد تخمک همراه با استفاده از بانک بافت تخدمان می تواند راه حل مناسبی برای حفظ باروری باشد (۳۳). از آن جا که انجماد تخمک به عنوان یک راه حل اساسی برای بیماران مبتلا به سرطان توصیه می شود، باید "پیش از شروع رادیوتراپی و شیمی درمانی" هرچه سریع تر ارزیابی های اولیه برای آنها انجام شده و روشنی مناسب به منظور اعطای حداکثر شانس بارداری برای این افراد انتخاب گردد. از جمله موارد و ضروریات این امر، برقراری ارتباط صحیح و به موقع پزشک انکولوژیست با متخصص زنان و زایمان و مراکز درمان ناباروری است (۶۶). بر اساس یافته های Lee و همکاران (۶۶)، هر دو فرآیند حفظ باروری و شیمی درمانی می تواند خیلی زود و قبل از عمل جراحی سینه در بیماران مبتلا به سرطان شروع شود. بر اساس مطالعات، ۹ نفر از ۳۵ بیماری که قبل از عمل جراحی خود به مراکز ناباروری مراجعه کردند، قادر به تحمل دو چرخه حفظ باروری بودند، در مقابل تنها ۱ مورد از ۵۸ بیمار مراجعه کننده بعد از عمل جراحی توانست یک چرخه حفظ باروری را تحمل کند (۵۴). این در حالی است که انجام چرخه متعدد کمک باروری برای انجماد تعداد بیش تر تخمک (یا

دلیل بررسی‌های اخیر از ۱۸۳ زن نشان داد که ۱۵ درصد از زنان نابارور ترجیح می‌دهند که بدون فرزند باشند تا این که از تخمک اهدایی استفاده کنند(۷۵).

انجماد تخمک "اجتماعی": محدودیت‌های اخلاقی و اجتماعی انجماد تخمک به خانم‌ها اجازه کنترل بهتری بر باروری خود را می‌دهد و به عنوان یک «آزادی بیولوژیکی» برای زنان تعریف شده است. به عبارت دیگر، انجماد تخمک فرصتی را فراهم می‌آورد تا زنان بتوانند بدون دغدغه از ناباروری وابسته به سن به نقش اجتماعی خود پردازند(۷۶). در اینجا یک اختلاف جنسیتی آشکار وجود دارد، به گونه‌ای که مردان قادر به تکثیر سلول تولید مثلی خود، حتی در سنین بسیار بالاتر از زنان هستند، در حالی که در زنان، ناباروری وابسته به سن وجود دارد(۷۷). با این حال، زنان به دلایل اجتماعی متنوع از جمله داشتن مجال بیشتر برای ادامه تحصیل، تمرکز بر حرفه خود و پیشرفت شغلی، نبود یک شریک زندگی مناسب یا این که هنوز احساس آمادگی برای ازدواج را پیدا نکرده‌اند، یا حتی امکان ابتلا به سرطان، نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در اوایل جوانی بچه‌دار شوند(۷۸). تکنیک‌های انجماد تخمک به زنان اجازه انتخاب زمان مناسب برای باردار شدن را می‌دهد. هر چند هنوز تعداد زنانی که تخمک خود را منجمد می‌کنند زیاد نیست، اما این روش به زنان اجازه می‌دهد، دیرتر بچه‌دار شوند و از موقعیت‌های شغلی خود استفاده کنند و نیز از اضطراب ناشی از ناباروری وابسته به سن کم می‌کند. هم‌چنین، بیشتر مطالعات بر انجماد تخمک، به عنوان روش اصلی حفظ باروری، به ویژه در گروه سنی بالا تأکید دارند(۴۱).

اخیراً برخی نگرانی‌های مرتبط با انجماد تخمک، مثل خطرات موجود در روند تحریک تحمدان و بازیابی تخمک مطرح شده است(۷۸). در جهان واقعی، زنان تا وقتی احساس نکنند سن باروری آن‌ها در حال گذر است، تخمک خود را منجمد نمی‌کنند. بنابراین هنگامی

ناباروری وابسته به سن به دلایل مختلف دیده می‌شود. بسیاری از خانم‌ها ازدواج خود را تا حدود ۲۵ تا ۳۰ سالگی به تأخیر می‌اندازند، این مساله همراه با تأخیر در تولد اولین فرزند، موجب کاهش در تعداد فرزندان در هر خانواده می‌شود، بنابراین تعداد فرزندان دلخواه یک خانواده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. براساس نتایج حاصل از یک مطالعه اخیر که به بررسی رابطه ناباروری وابسته به سن و شانس تحقق یک خانواده با اندازه مطلوب پرداخته است، نرخ باروری طبیعی و حاصل از لقاح آزمایشگاهی با استفاده از یک سیستم کامپیوتربی ثبت و نتایج حاصل نشان داد که اگر بارداری در سنین بالای ۳۵ سالگی اتفاق بیفتد، احتمال تک فرزند بودن خانواده ۹۰ درصد است، اما اگر بارداری در سن ۲۸ سالگی اتفاق بیفتد، احتمال ایجاد خانواده با سه فرزند، ۹۰ درصد می‌باشد. در غیاب درمان (لقاح آزمایشگاهی)، این سنین به ترتیب به ۳۲ و ۲۳ کاهش می‌یابد(۷۹). نتایج مطالعات مختلف نشان داد که بسیاری از زنان از اثر سن باروری بی اطلاع هستند(۷۳) و از آن‌جا که تأخیر در فرزندآوری با عوارض بارداری و زایمان همراه است، خانواده‌هایی که در سنین بالا اقدام به فرزندآوری می‌کنند، باید به این مسائل دقت داشته باشند و هر فردی که در سنین باروری است، بایستی در زمینه عوارض بارداری ناشی از بالا رفتن سن آگاه باشد تا آگاهانه تصمیم بگیرد. امروزه پتانسیل باروری در سنین بالا را می‌توان با استفاده از تخمک اهدایی زنان جوان، افزایش کمک باروری در زنان مسن پایین است، به همین دلیل در صورت استفاده از تخمک خود آن‌ها، تحت دوره‌های متعددی از برنامه‌های کمک باروری قرار می‌گیرند(۷۴). اما با استفاده از تخمک اهدایی جوان می‌توان میزان موفقیت باروری حاصل از لقاح آزمایشگاهی در افراد مسن تر را افزایش داد. فرزندان حاصل از تخمک اهدایی، ژنتیک خود را از مادر نمی‌گیرند و این قضیه به لحاظ روحی و احساسی، تاثیر منفی بر مادر دارد. به همین

توجه به نکات گفته شده می توان استدلال کرد که زنان باید به داشتن فرزند در اوایل دوره تولید مثلی خود، به جای سرمایه گذاری در یک تکنیک گران با هیچ تضمینی از بارداری موفق، تشویق شوند.

نگرش های پیرامون انجماد "اجتماعی" تهمک امروزه خیلی از زنان می توانند تهمک خود را به طور انتخابی منجمد کنند، اما اطلاعات و آگاهی آن ها از ناباروری وابسته به سن پایین است(۸۲). پژوهشگران در بررسی ۱۰۴۹ زن بلژیکی دریافتند که ۷۷/۶ درصد افراد قبلاً از تکنیک های انجماد تهمک آگاه بوده اند، در حالی که ۳۱/۵ درصد از زنان به طور بالقوه تهمک خود را منجمد کرده اند. نتایج مطالعه‌ی دیگر نشان داد که فقط ۳۶/۴ درصد از ۱۲۹ نفر دانشجوی پزشکی در سنگاپور که تهمک خود را منجمد کردند، از تکنیک های انجماد تهمک اطلاع داشتند(۸۳). هم چنین براساس مطالعه Hodes (۲۰۱۳) در آمریکا (۷۵)، دلیل اصلی برای به تاخیر اندختن زایمان (۸۸ درصد)، عدم وجود یک شریک زندگی ثابت است. شایان ذکر است که ۸۴ درصد از افراد مورد بررسی، سن بالای ۳۵ سال داشتند و این به طور قابل توجهی پیشنهاد می دهد که سن، اصلی ترین عامل تاثیر گذار بر پیامدهای انجماد تهمک است. پس از انجماد تهمک، ۵۳ درصد از زنان اظهار داشت که آن ها احساس امنیت بیشتری در مورد آینده باروری خود دارند. نتایج یک مطالعه گروهی از ۶۵ زن نشان داد که ۶۵ درصد از آن ها تمایل به انجماد تهمک خود به عنوان یک بیمه برای باروری خود دارند اما ۴۹ درصد خواهان یافتن همسر بودند.(۴۲).

پیگیری انجماد تهمک اجتماعی اطلاعات زیادی در مورد نتایج انجماد تهمک انتخابی در دسترس نیست، مثلاً اطلاعات کمی در مورد زنانی که از تهمک منجمد شده خود استفاده کرده اند، وجود دارد(۸۳). بر اساس مطالعه Hodes و همکاران (۷۵)،

که زنان مسن تر تصمیم به استفاده از تهمک منجمد خود دارند، توجه به این نکته ضروریست که به دلیل افزایش سن با احتمال بیشتری دچار عوارض بارداری مانند پره‌اکلامپسی، فشارخون بالا، دیابت بارداری و اجبار استفاده از عمل سزارین رو به رو می شوند(۷۹)، اگرچه، این خطرات در زنان مسن که با استفاده از روش لقادح آزمایشگاهی نیز باردار می شوند نیز وجود دارد(۶۸). در دسترس بودن تهمک منجمد شده، زنان را به سمت به تعویق اندختن مادر شدن تشویق می کند. بنابراین دادن اطلاعات صحیح در مورد انجماد تهمک به زنان و میزان موفقیت های حاصل از این تکنیک بسیار اهمیت دارد. امروزه شرکت های مانند Apple و فیس بوک، در مورد "انجماد تهمک اجتماعی" به مخاطبان خود اطلاعات مفید و دقیقی ارائه داده اند. هم چنین این شرکت ها به کارمندان زن خود به عنوان مزایای شغلی، کمک هزینه انجماد و نگهداری تهمک می پردازند. هر چند این مزایا ممکن است احساس به تاخیر اندختن زایمان تا سنین ۵۰ تا ۶۰ سالگی را افزایش دهد(۷۷) با وجود نگرانی های موجود در مورد هزینه های بالای انجماد تهمک، در مطالعه‌ای Hirshfeld (۸۰) مشخص شد که اگر زنان تهمک خود را در سن ۲۵ سالگی منجمد و در سن ۴۰ سالگی تصمیم به استفاده از آن بگیرند، این امر می تواند هزینه استراتژی کم تری نسبت به یک تکنیک ساده کمک باروری داشته باشد. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۵، انجماد تهمک در سنین کمتر از ۳۸ سالگی، هزینه های دستیابی به یک تولد زنده را نسبت به سنین بالای ۴۰ کاهش می دهد(۸۱). در مطالعه مشابه دیگر ثابت شد که انجماد تهمک یک استراتژی مقرون به صرفه تر از لقادح آزمایشگاهی است(۳۴). در پاسخ به هزینه های بالا و کمبود اهدا کننده تهمک، در برخی از کلینیک های ناباروری در حال حاضر یک برنامه «انجماد و به اشتراک گذاشتن تهمک» ارائه شده است که در آن زنان می توانند تعدادی از تهمک های منجمد خود را به منظور درمان رایگان و یا با تخفیف، اهدا کند. با

پیشگیری از ابتلای کودک، از تخمک اهدایی استفاده نمود. هم‌چنین استفاده از تخمک اهدایی امکان درمان ناباروری را در بسیاری از زوج‌هایی که به هر دلیل از داشتن فرزند محروم بوده‌اند فراهم نموده است. استفاده از این روش برای زنانی توصیه می‌شود که دارای رحم سالم با قابلیت نگهداری جنین هستند، اما تخدمان‌های ایشان تخمک مناسی تولید نمی‌کند. انجاماد تخمک هم‌چنین می‌تواند یک گزینه مناسب برای حفظ باروری در عمل جراحی تغییر جنسیت را فراهم کند. هم‌چنین بعد از این که اقدامات ارزیابی ذخیره تخدمان با استفاده از تجهیزات بیوفیزیکی (تعداد فولیکول آنترال) و بیوشیمیابی (هورمون ضد مولر، هورمون تحریک‌کننده فولیکولی) صورت گرفت، بسیاری از زنان بدون علائم، به عنوان افراد در معرض خطر یائسگی زودرس شناسایی می‌شوند. اگر چه اندازه گیری ذخیره تخدمان نمی‌تواند یک وسیله برای پیش‌بینی بارداری طبیعی باشد، اما یک استراتژی معقول برای این بیماران، در نظر گرفتن انجاماد تخمک انتخابی است. یکی دیگر از کاربردهای مفید انجاماد تخمک، در وضعیتی که همسر قادر به تولید نمونه اسپرم در روز لقادح آزمایشگاهی نباشد، بنابراین تخمک به سرعت باید منجمد شود یا به عبارتی انجاماد اورژانسی تخمک انجام می‌گیرد.^(۸۸) بنابراین انجاماد شیشه‌ای به عنوان یک استراتژی کارآمد برای ذخیره‌سازی و اباست تخمک‌های مازاد از چند چرخه تحریک تخدمان قبل از لقادح آزمایشگاهی و انتقال جنین پیشنهاد می‌شود.^(۶۴)

به چه کسانی توصیه می‌شود تخمک خود را منجمد کنند؟
۱- دختران بالغ و زنان جوانی که دچار سرطان یا بیماری‌هایی می‌شوند که نیاز به جراحی هر دو تخدمان، شیمی درمانی یا رادیوتراپی لگنی دارند و مسلماً این درمان‌ها، قدرت باروری آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

۲- زنانی که سابقه خانوادگی یائسگی پیش از موعد دارند.

تنها ۶ درصد از زنان (۱۱ نفر) تخمک منجمد شده خود را در طول زمان ۶ سال بعد از انجاماد استفاده کرده‌اند. از این تعداد، ۳ نفر گزارش یک بارداری موفق پس از ذوب دادند، در حالی که ۵ بارداری ناموفق بود و ۳ نفر دیگر وضعیت خود را اعلام نکردند. Stoop و همکاران^(۴۲) گزارش کردند که تنها ۵۰/۸ درصد از زنان که تخمک خود را منجمد می‌کنند، احتمالاً در آینده از آن استفاده می‌کنند. جالب است که وقتی مقایسه بین رابطه این زنان و انتخاب باروری پس از انجاماد تخمک، با کسانی که تخمک خود را منجمد نکردند، صورت گرفت، هیچ تفاوت قابل توجهی پیدا نشد. بر اساس مطالعه Baldwin و همکاران، در پیشگیری ۲۳ زنی که تخمک آن‌ها منجمد شده بود، ۲ نفر به استفاده از آن روی آوردند که یکی از آن‌ها بارداری موفق را گزارش کرد.^(۸۴)

دلایل دیگر انجاماد تخمک

علاوه بر مباحث اهداء تخمک، حفظ باروری برای بیماران مبتلا به سرطان و انجاماد تخمک اجتماعی، در اینجا تعداد فزاینده‌ای از دیگر دلایل برای انجاماد تخمک وجود دارد. انجاماد تخمک می‌تواند گزینه درمانی مناسب برای حفظ باروری در زنان بیمار با طیف وسیعی از دلایل پزشکی به جز سرطان باشد^(۱۶)، مانند مواردی که تخدمان‌ها بر اثر معالجه آندومتریوز یا عفونت لگنی، توانایی خود را در تولید تخمک سالم از دست می‌دهند و ذخایر تخدمانی آن‌ها پس از جراحی کاهش می‌یابد^(۸۵)، زنانی با بیماری‌های خود اینمی^(۸۶)، زنان نیازمند به درمان با گنادو توکسین‌ها و ناهنجاری‌های ژنتیکی که در معرض کاهش باروری و یا خطر یائسگی زودرس هستند^(۸۷). اهدای تخمک یکی از روش‌های درمانی برای زنانی است که دارای تخدمان‌های نابالغ یا دچار بیماری‌های ژنتیکی جدی وابسته به جنس و اتوزومی می‌باشند. شایان ذکر است که در صورت ابتلای مادر به بیماری ژنتیکی، احتمال انتقال بیماری به کودک وجود دارد و در این گونه موارد نیز می‌توان به منظور

جنین را به همراه نخواهد داشت. به علاوه ذخیره سازی تخمک منجمد، می تواند در اهدای تخمک و تأسیس بانک تخمک مؤثر باشد. گرچه این تکنولوژی بیش از سه دهه قدمت دارد، اما هنوز در تحقیقات مختلف نتایج متغیری نشان داده می شود. اگرچه گزارشی از ایجاد ناهنجاری در فرزندان حاصل از روش های انجمادی کمک باروری گزارش نشده و با وجود نتایج امیدوار کننده، هنوز نگرانی هایی در مورد امکان آن پلولئیدی و یا اختلالات کاریوتیپیک، ناهنجاری های اندامی و دیگر مسائل تکوینی وجود دارد، بنابراین هنوز تحقیقات بیشتری در مورد انتخاب بهترین تکنیک انجماد تخمک در بیماران سرتانی و افراد نابارور، انتخاب بهترین روش انجماد مورد استفاده و میزان موقیت حاصل از آنها، انتخاب بهترین مرحله تکوینی برای انجماد تخمک و همچنین اصلاح روش های انجمادی موجود و در حالت ایده آل نظارت بر انجام تکنیک های انجماد تخمک باید شامل بررسی بلند مدت نوزادان متولد شده از تخمک های منجمد باشد. به علاوه همانند تمام تکنیک های کمک باروری، توجه به مسائل اخلاقی در تکنیک انجماد تخمک، به ویژه در مورد «انجماد تخمک اجتماعی» بسیار ضروری است. در پایان شایان ذکر است که انجماد تخمک یک روش هیجان انگیز و سودمند برای بسیاری از بیماران در حال و آینده خواهد بود.

۳- زنانی که به هر دلیل نمی توانند یا نمی خواهند در اوایل جوانی بچه دار شوند. با توجه به این که سن در کیفیت تخمک ها موثر است، باید زنان جوان تر تخمک خود را منجمد کنند تا در سال های بعد از آن استفاده کنند. بانک تخمک علاوه بر حفظ قدرت باروری زنان، می تواند منبع قابل اطمینان و در دسترسی به محققین بدهد که از آن برای تحقیقات و تولید سلول های بنیادی استفاده شود تا به پیشرفت دانش بشری در زمینه بیولوژی تولید مثل کمک شایانی کند. همچنین این تکنولوژی به محققین اجازه می دهد که بیماری های مختلف را در تخمک بررسی کنند و چه بسا در آینده بتوان تخمک ها را از نظر بیماری های ژنتیکی نیز غربالگری کرد.

در پایان می توان نتیجه گرفت که با توجه به افزایش سن اولین بارداری در بسیاری از کشورها آن هم به دلیل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و همچنین افزایش درصد ناباروری زنان در سال های آتی، حفظ باروری در سنین جوانی و پیش از شروع درمان سرطان از اهمیت خاصی برخوردار است. بهترین گزینه، برای حفظ باروری در زنان و دختران مبتلا به سرطان که در معرض خطر از دست دادن باروری به دلایل متنوع از جمله شیمی درمانی و اشعه درمانی، مشکلات ارگان های تولید میثی، تخدمان های نارس و همچنین زنانی که به بیماری های مزمن مبتلا هستند، یا به دلایل شخصی بارداری را به تعویق انداخته اند، انجماد تخمک است. این روش نگرانی های مذهبی، اخلاقی و حقوقی ذخیره سازی

References

- Lee SJ, Schover LR, Partridge AH, Patrizio P, Wallace WH, Hagerty K, et al. American Society of Clinical Oncology recommendations on fertility preservation in cancer patients. *J Clin Oncol* 2006; 24(18): 2917-2931.
- Chen C. Pregnancy after human oocyte cryopreservation. *Lancet*. 1986; 327(8486): 884-886.
- Van Uem J, Siebzehnrübl E, Schuh B, Koch R, Trotnow S, Lang N. Birth after cryopreservation of unfertilised oocytes. *Lancet* 1987; 329 (8535): 752-753.
- Hunter J, Bernard A, Fuller B, McGrath J, Shaw R. Plasma membrane water permeabilities of human oocytes: the temperature dependence of water movement in individual cells. *J Cell Physiol* 1992; 150(1): 175-179.

5. Smith GD, Serafini PC, Fioravanti J, Yadid I, Coslovsky M, Hassun P, et al. Prospective randomized comparison of human oocyte cryopreservation with slow-rate freezing or vitrification. *Fertil Steril* 2010; 94(6): 2088-2095.
6. Wise J. UK lifts ban on frozen eggs. *BMJ* 2000; 320(7231): 334.
7. American Society for Reproductive Medicine. Assisted Reproductive Technology, National Summary Report. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention. 2014.
8. Argyle CE, Harper JC, Davies MC. Oocyte cryopreservation: where are we now? *Hum Reprod Update* 2016; 22(4): 440-449.
9. Kasai M, Mukaida T. Cryopreservation of animal and human embryos by vitrification. *Reprod Biomed Online* 2004; 9(2): 164-170.
10. Vicente J, Garcia-Ximenez F. Osmotic and cryoprotective effects of a mixture of DMSO and ethylene glycol on rabbit morulae. *Theriogenology* 1994; 42(7): 1205-1215.
11. Fabbri R, Porcu E, Marsella T, Rocchetta G, Venturoli S, Flamigni C. Human oocyte cryopreservation: new perspectives regarding oocyte survival. *Hum Reprod* 2001; 16(3): 411-416.
12. Saragusty J, Arav A. Current progress in oocyte and embryo cryopreservation by slow freezing and vitrification. *Reproduction* 2011; 141(1): 1-19.
13. Cobo A, Diaz C. Clinical application of oocyte vitrification: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Fertil Steril* 2011; 96(2): 277-285.
14. Kuwayama M, Vajta G, Kato O, Leibo SP. Highly efficient vitrification method for cryopreservation of human oocytes. *Reprod Biomed Online* 2005; 11(3): 300-308.
15. Kuwayama M. Highly efficient vitrification for cryopreservation of human oocytes and embryos: the Cryotop method. *Theriogenology* 2007; 67(1): 73-80.
16. Donnez J, Dolmans M-M. Fertility preservation in women. *Nat Rev Endocrinol* 2013; 9(12): 735-749.
17. Oktay K, Cil AP, Bang H. Efficiency of oocyte cryopreservation: a meta-analysis. *Fertil Steril* 2006; 86(1): 70-80.
18. Cao YX, Chian RC, editors. Fertility preservation with immature and in vitro matured oocytes. *Semin Reprod Med* 2009; 27(6): 456-464.
19. Oehninger S, Duru NK, Srisombut C, Morshed M. Assessment of sperm cryodamage and strategies to improve outcome. *Mol Cell Endocrinol* 2000; 169(1): 3-10.
20. Prentice J, Singh J, Doch O, Anzar M. Factors affecting nuclear maturation, cleavage and embryo development of vitrified bovine cumulus-oocyte complexes. *Theriogenology* 2011; 75(4): 602-609.
21. Parmegiani L, Cognigni G, Bernardi S, Cuomo S, Ciampaglia W, Infante F, et al. Efficiency of aseptic open vitrification and hermetical cryostorage of human oocytes. *Reprod Biomed Online* 2011; 3(4): 505-512.
22. Parmegiani L, Accorsi A, Cognigni GE, Bernardi S, Troilo E, Filicori M. Sterilization of liquid nitrogen with ultraviolet irradiation for safe vitrification of human oocytes or embryos. *Fertil Steril* 2010; 94(4): 1525-1528.
23. Criado E, Moalli F, Polentarutti N, Albani E, Morreale G, Menduni F, et al. Experimental contamination assessment of a novel closed ultravitrification device. *Fertil Steril* 2011; 95(5): 1777-1779.
24. Bonetti A, Cervi M, Tomei F, Marchini M, Ortolani F, Manno M. Ultrastructural evaluation

- of human metaphase II oocytes after vitrification: closed versus open devices. *Fertil Steril* 2011; 95(3): 928-935.
25. Paffoni A, Guarneri C, Ferrari S, Restelli L, Nicolosi AE, Scarduelli C, et al. Effects of two vitrification protocols on the developmental potential of human mature oocytes. *Reprod Biomed Online* 2011; 22(3): 292-298.
 26. Papatheodourou A, Vanderzwalmen P, Panagiotidis Y, Kasapi L, Goudakou M, Pasadaki T, et al. Open versus closed oocyte vitrification system: a prospective randomized sibling-oocyte study. *Reprod Biomed Online* 2013; 26(6): 595-602.
 27. Brison D, Cutting R, Clarke H, Wood M. ACE consensus meeting report: oocyte and embryo cryopreservation Sheffield 17.05. 11. *Human Fertil* 2012; 15(2): 69-74.
 28. Seki S, Mazur P. The dominance of warming rate over cooling rate in the survival of mouse oocytes subjected to a vitrification procedure. *Cryobiology* 2009; 59(1): 75-82.
 29. Mazur P, Seki S. Survival of mouse oocytes after being cooled in a vitrification solution to -196 C at 95 to 70,000 C/min and warmed at 610 to 118,000 C/min: A new paradigm for cryopreservation by vitrification. *Cryobiology* 2011; 62(1): 1-7.
 30. Cao Y-X, Xing Q, Li L, Cong L, Zhang Z-G, Wei Z-L, et al. Comparison of survival and embryonic development in human oocytes cryopreserved by slow-freezing and vitrification. *Fertil Steril* 2009; 92(4): 1306-1311.
 31. Rienzi L, Cobo A, Paffoni A, Scarduelli C, Capalbo A, Vajta G, et al. Consistent and predictable delivery rates after oocyte vitrification: an observational longitudinal cohort multicentric study. *Human Reprod* 2012; 27(6): 1606-1612.
 32. Porcu E, Fabbri R, Ciotti P, Marsella T, Balicchia B, Damiano G, et al. Cycles of human oocyte cryopreservation and intracytoplasmic sperm injection: results of 112 cycles. *Fertil Steril* 1999; 72(Suppl 1): S2.
 33. Donnez J, Dolmans M-M. Ovarian cortex transplantation: 60 reported live births brings the success and worldwide expansion of the technique towards routine clinical practice. *J Assist Reprod Genet* 2015; 32(8): 1167-1170.
 34. van Loendersloot LL, Moolenaar LM, Mol BWJ, Repping S, van der Veen F, Goddijn M. Expanding reproductive lifespan: a cost-effectiveness study on oocyte freezing. *Hum Reprod* 2011; 26(11): 3054-3060.
 35. Chian R-C, Huang JY, Tan SL, Lucena E, Saa A, Rojas A, et al. Obstetric and perinatal outcome in 200 infants conceived from vitrified oocytes. *Reprod Biomed Online* 2008; 16(5): 608-610.
 36. Noyes N, Porcu E, Borini A. Over 900 oocyte cryopreservation babies born with no apparent increase in congenital anomalies. *Reprod Biomed Online* 2009; 18(6): 769-776.
 37. Cobo A, Serra V, Garrido N, Olmo I, Pellicer A, Remohí J. Obstetric and perinatal outcome of babies born from vitrified oocytes. *Fertil Steril* 2014; 102(4): 1006-1015.
 38. Kushnir VA, Barad DH, Albertini DF, Darmon SK, Gleicher N. Outcomes of fresh and cryopreserved oocyte donation. *JAMA* 2015; 314(6): 623-624.
 39. Dondorp W, de Wert G, Pennings G, Shenfield F, Devroey P, Tarlatzis B, et al. Oocyte cryopreservation for age-related fertility loss. *Hum Reprod* 2012; 27(5): 1231-1237.
 40. Baldwin K, Culley L, Hudson N, Mitchell H. Reproductive technology and the life course:

- current debates and research in social egg freezing. *Hum Fertil* 2014; 17(3): 170-179.
41. Ho J, Woo I, Bendikson K, Paulson R, Chung K. Is oocyte cryopreservation as effective as embryo cryopreservation in freezing eggs as effective as freezing embryos to achieve live births? *Fertil Steril* 2016; 105(2): e21-e22.
 42. Stoop D, Maes E, Polyzos N, Verheyen G, Tournaye H, Nekkebroeck J. Does oocyte banking for anticipated gamete exhaustion influence future relational and reproductive choices? A follow-up of bankers and non-bankers. *Human Reprod* 2015; 30(2): 338-344.
 43. Fabbri R, Porcu E, Marsella T, Primavera M, Seracchioli R, Ciotti P, et al. Oocyte cryopreservation. *Human Reprod* 1998; 13(suppl_4): 98-108.
 44. Trounson A, Mohr L. Human pregnancy following cryopreservation, thawing and transfer of an eight-cell embryo. *Nature* 1983; 305(5936): 707-709.
 45. Rienzi L, Gracia C, Maggiulli R, LaBarbera AR, Kaser DJ, Ubaldi FM, et al. Oocyte, embryo and blastocyst cryopreservation in ART: systematic review and meta-analysis comparing slow-freezing versus vitrification to produce evidence for the development of global guidance. *Hum Reprod Update* 2017; 23(2): 139-155.
 46. Kawwass JF, Monsour M, Crawford S, Kissin DM, Session DR, Kulkarni AD, et al. Trends and outcomes for donor oocyte cycles in the United States, 2000-2010. *JAMA* 2013; 310(22): 2426-2434.
 47. Cobo A, Remohí J, Chang C-C, Nagy ZP. Oocyte cryopreservation for donor egg banking. *Reproductive Biomedicine Online* 2011; 23(3): 341-346.
 48. Quaas AM, Melamed A, Chung K, Bendikson KA, Paulson RJ. Egg banking in the United States: current status of commercially available cryopreserved oocytes. *Fertil Steril* 2013; 99(3): 827-831.
 49. Akin JW, Bell KA, Thomas D, Boldt J. Initial experience with a donor egg bank. *Fertil Steril* 2007; 88(2): 497.
 50. Nagy ZP, Chang C-C, Shapiro DB, Bernal DP, Elsner CW, Mitchell-Leef D, et al. Clinical evaluation of the efficiency of an oocyte donation program using egg cryobanking. *Fertil Steril* 2009; 92(2): 520-526.
 51. Solé M, Santaló J, Boada M, Clua E, Rodríguez I, Martínez F, et al. How does vitrification affect oocyte viability in oocyte donation cycles? A prospective study to compare outcomes achieved with fresh versus vitrified sibling oocytes. *Human Reprod* 2013; 28(8): 2087-2092.
 52. Fleischer RT, Vollenhoven BJ, Weston GC. The effects of chemotherapy and radiotherapy on fertility in premenopausal women. *Obstet Gynecol Surv* 2011; 66(4): 248-254.
 53. Filippi F, Meazza C, Paffoni A, Raspagliosi F, Terenziani M, Somigliana E. Egg freezing in childhood and young adult cancer survivors. *Pediatrics* 2016; 138(4): e20160291.
 54. Kim J, Oktay K, Gracia C, Lee S, Morse C, Mersereau JE. Which patients pursue fertility preservation treatments? A multicenter analysis of the predictors of fertility preservation in women with breast cancer. *Fertil Steril* 2012; 97(3): 671-676.
 55. Garcia-Velasco JA, Domingo J, Cobo A, Martínez M, Carmona L, Pellicer A. Five years' experience using oocyte vitrification to preserve fertility for medical and nonmedical indications. *Fertil Steril* 2013; 99(7): 1994-1999.

56. Kim SS, Klemp J, Fabian C. Breast cancer and fertility preservation. *Fertility and Sterility* 2011; 95(5): 1535-1543.
57. Wunder D. Social freezing in Switzerland and worldwide—a blessing for women today. *Swiss Med Wkly.* 2013; 143: w13746.
58. Cakmak H, Katz A, Cedars MI, Rosen MP. Effective method for emergency fertility preservation: random-start controlled ovarian stimulation. *Fertil Steril* 2013; 100(6): 1673-1680.
59. Aghaz F, Khazaei M. Reactive oxygen species generation and use of antioxidants during in vitro maturation of oocytes: a Review. *Int J Fertil Steril* 2017; 11(2): 63-70.
60. Aghaz F, Hajarian H, Shabankareh HK, Abdolmohammadi A. Effect of sericin supplementation in maturation medium on cumulus cell expansion, oocyte nuclear maturation, and subsequent embryo development in Sanjabi ewes during the breeding season. *Theriogenology* 2015; 84(9): 1631-1635.
61. Aghaz F, Hajarian H, Shabankareh HK. Enhanced in vitro developmental competence of sheep embryos following sericin supplementation of the in vitro maturation and in vitro culture media. *Small Ruminant Res* 2016; 136: 257-260.
62. Oktay K, Buyuk E, Rodriguez-Wallberg K, Sahin G. In vitro maturation improves oocyte or embryo cryopreservation outcome in breast cancer patients undergoing ovarian stimulation for fertility preservation. *Reprod Biomed Online* 2010; 20(5): 634-638.
63. Yang H, Lee HH, Lee HC, Ko DS, Kim SS. Assessment of vascular endothelial growth factor expression and apoptosis in the ovarian graft: can exogenous gonadotropin promote angiogenesis after ovarian transplantation? *Fertil Steril* 2008; 90(4): 1550-1558.
64. Hoekman EJ, Smit VT, Fleming TP, Louwe LA, Fleuren GJ, Hilders CG. Searching for metastases in ovarian tissue before autotransplantation: a tailor-made approach. *Fertil Steril* 2015; 103(2): 469-477.
65. Kim MK, Lee DR, Han JE, Kim YS, Lee WS, Won HJ, et al. Live birth with vitrified-warmed oocytes of a chronic myeloid leukemia patient nine years after allogenic bone marrow transplantation. *J Assist Reprod Genet* 2011; 28(12): 1167-1170.
66. Lee S, Heytens E, Moy F, Ozkavukcu S, Oktay K. Determinants of access to fertility preservation in women with breast cancer. *Fertil Steril* 2011; 95(6): 1932-1936.
67. Kneale D, Joshi H. Postponement and childlessness: evidence from two British cohorts. *Demogr Res* 2008; 19: 1935-1968.
68. Goold I, Savulescu J. In favour of freezing eggs for non medical reasons. *Bioethics* 2009; 23(1): 47-58.
69. Cobo A, Garrido N, Pellicer A, Remohí J. Six years' experience in ovum donation using vitrified oocytes: report of cumulative outcomes, impact of storage time, and development of a predictive model for oocyte survival rate. *Fertil Steril* 2015; 104(6): 1426-1434.
70. Sozou PD, Hartshorne GM. Time to pregnancy: a computational method for using the duration of non-conception for predicting conception. *PLoS One* 2012; 7(10): 46544.
71. Andersen A-MN, Wohlfahrt J, Christens P, Olsen J, Melbye M. Maternal age and fetal loss: population based register linkage study. *BMJ* 2000; 320(7251): 1708-1712.
72. Habbema JDF, Eijkemans MJ, Leridon H, te Velde ER. Realizing a desired family size: when should couples start? *Hum Reprod* 2015; 30(9): 2215-2221.

73. Daniluk JC, Koert E, Cheung A. Childless women's knowledge of fertility and assisted human reproduction: identifying the gaps. *Fertil Steril* 2012; 97(2): 420-426.
74. Leridon H. Can assisted reproduction technology compensate for the natural decline in fertility with age? A model assessment. *Hum Reprod* 2004; 19(7): 1548-1553.
75. Hodes-Wertz B, Druckenmiller S, Smith M, Noyes N. What do reproductive-age women who undergo oocyte cryopreservation think about the process as a means to preserve fertility? *Fertil Steril* 2013; 100(5): 1343-1349.
76. Homburg R, van der Veen F, Silber SJ. Oocyte vitrification—women's emancipation set in stone. *Fertil Steril* 2009; 91(4): 1319-1320.
77. Dondorp WJ, De Wert GM. Fertility preservation for healthy women: ethical aspects. *Human Reprod* 2009; 24(8): 1779-1785.
78. Baylis F. Left out in the cold: arguments against non-medical oocyte cryopreservation. *J Obstet Gynaecol Can* 2015; 37(1): 64-67.
79. Joseph KS, Allen AC, Dodds L, Turner LA, Scott H, Liston R. The perinatal effects of delayed childbearing. *Obstet Gynecol* 2005; 105(6): 1410-1418.
80. Hirshfeld-Cytron J, Grobman WA, Milad MP. Fertility preservation for social indications: a cost-based decision analysis. *Fertil Steril* 2012; 97(3): 665-670.
81. Devine K, Mumford SL, Goldman KN, Hodes-Wertz B, Druckenmiller S, Propst AM, et al. Baby budgeting: oocyte cryopreservation in women delaying reproduction can reduce cost per live birth. *Fertil Steril* 2015; 103(6): 1446-1453.
82. Stoop D, Cobo A, Silber S. Fertility preservation for age-related fertility decline. *Lancet* 2014; 384(9950): 1311-1319.
83. Stoop D, Nekkebroeck J, Devroey P. A survey on the intentions and attitudes towards oocyte cryopreservation for non-medical reasons among women of reproductive age. *Hum Reprod* 2011; 26(3): 655-661.
84. Baldwin K, Culley L, Hudson N, Mitchell H, Lavery S. Oocyte cryopreservation for social reasons: demographic profile and disposal intentions of UK users. *Reprod Biomed Online* 2015; 31(2): 239-245.
85. Elizur SE, Chian R-C, Holzer HE, Gidoni Y, Tulandi T, Tan SL. Cryopreservation of oocytes in a young woman with severe and symptomatic endometriosis: a new indication for fertility preservation. *Fertil Steril* 2009; 91(1): 293.
86. Elizur S, Chian R, Pineau C, Son W, Holzer H, Huang J, et al. Fertility preservation treatment for young women with autoimmune diseases facing treatment with gonadotoxic agents. *Rheumatology* 2008; 47(10): 1506-1509.
87. Goswami D, Conway GS. Premature ovarian failure. *Hum Reprod Update* 2007; 68(4): 196-202.
88. Song WY, Sun YP, Jin HX, Xin ZM, Su YC, Chian RC. Clinical outcome of emergency egg vitrification for women when sperm extraction from the testicular tissues of the male partner is not successful. *Syst Biol Reprod Med* 2011; 57(4): 210-213.