



## نخجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی و منابع طبیعی (سال پنجم / شماره سوم) پاییز ۱۳۹۳

نمایه شده در سایت: پایگاه استادی علوم جهان اسلام، جهاد دانشگاهی، مگ ایران، نورمگز

آدرس وب سایت: <http://girs.iaubushehr.ac.ir>



# ارزیابی توان اکولوژیک اراضی با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: اراضی حاشیه شهر تبریز)

فریده نقדי<sup>\*</sup>، سید محسن حسینی<sup>۲</sup>، شقایق صدر<sup>۳</sup>

۱. دکتری دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

۲. دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

۳. دانش آموخته کارشناسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

### مشخصات مقاله

### چکیده

برای رسیدن به توسعه پایدار داشتن برنامه‌ریزی با تکیه بر ارزیابی همه جانبه محیط طبیعی امری ضروری است. با توجه به اینکه محیط زیست طبیعی توان اکولوژیکی محدودی را برای استفاده‌های انسان داراست، ارزیابی توان اکولوژیکی به عنوان هسته مطالعات زیست محیطی با پیشگیری بحران‌های موجود، بستر مناسبی برای برنامه‌ریزی زیست محیطی فراهم می‌آورد. تحلیل قابلیت اراضی برای توسعه شهری یکی از اصلی‌ترین مقولاتی است که برنامه‌ریزان شهری با آن سروکار دارند. در این مقاله طی رویکرد ارزیابی چند معیاره با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process) و روش مقایسه زوجی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، ارزیابی توان اکولوژیکی حاشیه شهر تبریز برای توسعه کالبدی بر پایه مشاهدات محیطی (دوازده معیار طبیعی و انسانی) صورت گرفته و نقشه نهایی در محدوده مذکور تهیه شد. این نقشه توافقی مناسب برای توسعه کالبدی شهر را نشان می‌دهد. نتایج این پژوهش می‌توانند مورد استفاده برنامه‌ریزان شهری قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی:  
ارزیابی توان اکولوژیک  
ارزیابی چند معیاره  
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  
سیستم اطلاعات جغرافیایی

\*: پست الکترونیکی مسئول مکاتبات: naghdi\_1171@yahoo.com

**مقدمه**

با استفاده از داده‌های ماهواره لنست و تصاویر IRS اقدام به تهیه نقشه کاربری اراضی و تغییرات کاربری اراضی در معدن زغال سنگ در ناحیه جهاریای (Jharia) هند کردند. آن‌ها با استفاده از داده‌های سنجش از دور کلاس‌های کاربری را تفکیک نموده و سپس انواع کاربری‌های بهینه را مشخص نمودند.

پريرا و تیلانتا دراجان (۱۶) به مطالعه کاربری اراضی سریلانکا با استفاده از GIS پرداخته و تناسب اراضی را برای کشت محصولات کشاورزی تعیین نمودند. آن‌ها بر اساس عوامل شبیب، سری خاک و قابلیت زمین و چگونگی آبیاری، منطقه مورد مطالعه خود را به چهار واحد تقسیم کرده، سپس با استفاده از تحلیل نقشه‌ها و اطلاعات مربوطه در محیط GIS به ارزیابی تناسب اراضی برای هر واحد پرداختند.

جهانی (۳) با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی و با بهره‌گیری از روش ارزیابی چند عامله، قابلیت اراضی منطقه طالقان را ارزیابی کرد. احمدی زاده و همکاران (۱) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل‌های اکولوژیک، برنامه جامع کاربری استان خراسان را انجام داده‌اند. آن‌ها با استفاده از تحلیل همپوشانی سیستم با توجه به مدل‌های آمایش سرزمین، طبقات نقشه‌های مختلف را کد گذاری کرده و سپس به ارزیابی توان اکولوژیک استان خراسان پرداختند. در منطقه خرمآباد مهاجر شجاعی (۹) نقشه قابلیت اراضی استان لرستان را با بهره‌گیری از داده‌های زمینی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ تهیه کرد.

جعفری و کریمی (۴) در تحقیقی مکانیابی عرصه‌های مناسب احداث صنعت در استان قم را انجام داد. وی برای این کار از روش سیستمی در محیط GIS استفاده کرد. پس از آن ارزیابی توان سرزمین بر اساس هدف مورد نظر، مدل سه طبقه‌ای تدوین شد. به منظور ارزیابی توان اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی، پس از تهیه مدل توصیفی مربوطه، برای تبدیل آن به مدل ریاضی از ترکیب مدل رگرسیون و مدل برنامه نویسی خطی استفاده شد. وی پس از انجام این تحقیق نوعی مدل در زمینه مکانیابی استقرار صنایع تدوین کرد که برای مکانیابی دیگر کاربری‌ها نیز کاربرد فراوان دارد. نیرآبادی (۱۰) در تحقیقی مکانیابی دفن زباله شهرستان تبریز را انجام داد. وی با استفاده از لایه‌های اطلاعاتی مؤثر در مکانیابی دفن زباله و با استفاده از روش‌های مختلف ارزیابی چند معیاری نظیر روش بولین، فرآیند تحلیل سلسه

ازیابی توان اکولوژیکی برآورد استفاده ممکن انسان از سرزمین برای کاربردهای کشاورزی، مرتعداری، جنگلداری، پارکداری (حفظاً و توریسم)، آبزی پروری، امور نظامی مهندسی، توسعه شهری، صنعتی و غیره در چهار چوب استفاده‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و بازرگانی است. استفاده ممکن انسان از سرزمین، در واقع بهره‌جویی از تک تک منابع یاد شده می‌باشد اما استفاده انسان از منابع اکولوژیکی تنها به یک منع مستگی ندارد، بلکه شامل تداخل این منابع با یکدیگر و به صورت ترکیبی از همه می‌شود. انواع استفاده از سرزمین را استعداد طبیعی یا توان اکولوژیکی معلوم می‌دارد. توان اقتصادی هم به صورت مکمل توان اکولوژیکی عمل نموده و این دو هدف، استفاده از سرزمین را مشخص می‌سازد (۷).


در ارزیابی توان اکولوژیکی، انتخاب فاکتورهای متعدد و در نتیجه تعدد لایه‌های اطلاعاتی، تصمیم‌گیران را به طور آگاهانه به سمت روش‌های منطقی سوق می‌دهد که علاوه بر دقت بالا از نظر سرعت عمل و سهولت انجام عملیات، در حد بالایی قرار داشته باشد. با توجه به قابلیت سیستم اطلاعات جغرافیایی در زمینه گردآوری، ذخیره، ویرایش، تحلیل داده‌ها و مدلسازی این ابزار برای برنامه‌ریزان فضایی در زمینه ارزیابی تناسب زمین بسیار مفید محسوب می‌شوند (۶). از این رو در این مقاله، از تکنیک‌های GIS و سنجش از دور استفاده شده است.

برای شناسایی توان و همچنین تحلیل سازگاری انواع کاربری‌ها با توان مناطق، استفاده از تکنیک‌ها و علوم سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی به منظور تولید و تحلیل داده‌ها توجه زیادی را به خود جلب کرده است استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای تهیه نقشه‌های کاربری اراضی از ساقه زیادی MSS برخوردار است. لئو (۱۲) با استفاده از داده‌های سنجنده GIS ندست نقشه کاربری اراضی شمال کشور چین را با مقیاس ۱:۶۰۰۰۰۰ تهیه کرد. مولر و همکاران (۱۴) اقدام به بررسی GIS و نگرش سیستمی در برنامه‌ریزی محیط زیست در ناحیه کیل (Kill) آلمان نمودند. اهداف این طرح شامل تعیین ارتباط بین تنوع، تولید، پایداری و فشارهای موجود و مدل اکوسیستم‌های آبی و خاکی و در نهایت به کارگیری نتایج این نوع نگرش در مناطق بزرگ‌تر و مقیاس مختلف منطقه بود. پراکاش و گوپتا (۱۷)

و موقعیت و همچنین نوع و ماهیت تغیرات را نیز نشان می‌دهد.<sup>(۸)</sup>

روش تحقیق

به منظور انجام تحقیق مرز محدوده مورد مطالعه بر روی نقشه‌های توپوگرافی مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ تعیین و با روی هم اندازی (Overlay) کردن مرز محدود بر روی تصاویر ماهواره‌ای مشخص گردید. نقشه طبقه‌بندی شیب، جهت شیب و ارتفاع از سطح دریا، گسل‌ها، نقشه‌های فاصله از راه‌های اصلی، خطوط انتقال نیرو و آب‌های سطحی با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی موجود تهیه شد. نقشه کاربری اراضی نیز در محیط نرم‌افزار Envi 4.3 با استفاده از تصویر ماهواره‌ای اسپات ۲۰۰۵ تهیه شد. جهت وزن دهی معیارها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط نرم‌افزار Expert choice 2000 استفاده شد. در شکل ۱ مراحل انجام تحقیق آورده شده است.



## شكل 1. مراحل مختلف انجام تحقیق

با توجه به میزان توسعه در پانزده سال گذشته، میزان احتمال توسعه در پانزده سال آینده پیش بینی و محدوده مورد نظر وسعتی در حدود  $367294.64$  کیلومترمربع یعنی به طور تقریبی حاشیه شهر تبریز به شعاع  $10$  کیلومتری در نظر گرفته شد. زیرا توسعه پیرامونی و حاشیه نشینی یکی از نمودهای چشمگیر توسعه سریع و بسیاری به

مراتبی (AHP)، وزن دهی افزودنی ساده (Simple additive)، وزن دار (Weighted liner) و ترکیب خطی وزن دار (weighting: SAW) اقدام به تلفیق نقشه های موجود نمود. (combination: WLC) سپس روش های مذکور را با یکدیگر مقایسه نموده و مکان پیشنهادی توسط روش SAW را دارای مطابقت بیشتری با معیار های لازم برای سایت دفن زباله دانسته و به عنوان بهترین روش برای تعیین سایت دفن زباله معرفی کرده است.

در این مطالعه جهت تلفیق لایه‌ها از آنالیز تصمیم‌گیری چند معیاره استفاده گردید. هدف آنالیز تصمیم‌گیری چند معیاره انتخاب بهترین یا ارجح ترین گزینه، منظم نمودن گزینه‌هایی که به نظر خوب می‌رسند و یا مرتب نمودن گزینه‌ها به صورت درجه نزولی ارجحیت می‌باشد. قواعد تصمیم‌گیری متعددی در این زمینه وجود دارند که شناخته شده‌ترین آن‌ها عبارتند از: روش وزن دهی افروزنی ساده، روش‌های تابع مقدار و سودمندی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، روش‌های نقطه ایده‌آل و روش‌های مطابقت. این روش‌ها در موقعیت‌های تصمیم‌گیری قطعی، احتمالی و فازی، همچنین تصمیم‌گیری گروهی و انفرادی قابل استفاده می‌باشند (۲). در این پژوهش از روش فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) ساعتی برای تعیین وزن نسبی هر معیار استفاده گردید (۱۸). این روش ابزاری قدرتمند و انعطاف پذیر برای بررسی کمی و کیفی مسائل چند معیاره است که مبنای آن بر اساس مقایسات دو به دو لایه‌ها می‌باشد (۱۵).

هدف این تحقیق، ارزیابی توان اکولوژیکی حاشیه شهر تبریز برای توسعه بر اساس ۱۲ معیار در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش مقایسه زوجی است.


مواد و روش‌ها

منطقة مورد مطالعه


شهر تبریز با وسعتی حدود ۱۳۱ کیلومتر مربع در موقعیت جغرافیایی  $۴۶^{\circ}۱۱'$  و  $۳۸^{\circ}۹'$  طول شرقی و  $۴۶^{\circ}۲۳'$  عرض شمالی با ارتفاع متوسط ۱۴۳۰ متر از سطح دریا قرار دارد. برای تعیین محدوده مطالعاتی و تعیین تغییرات از تصاویر ماهواره‌ای جهت مقایسه نتایج حاصل از طبقه‌بندی تصاویر استفاده شد. استفاده از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای این مزیت را دارد که مکان

تصاویر ماهواره‌ای حاشیه شهر تبریز در سال‌های ۱۹۸۹ و ۲۰۰۵ و شکل ۴ نقشه محدوده مطالعه‌ی را نشان می‌دهد.

این کلان شهر می‌باشد که زمینه ساز بسیاری از مسائل و مشکلات زیست محیطی گردیده است. شکل‌های ۲ و ۳




شکل ۲. تصویر ماهواره‌ای لندست منطقه مورد مطالعه در سال ۱۹۸۹



شکل ۳. تصویر ماهواره‌ای اسپات منطقه مورد مطالعه در سال ۲۰۰۵

## روش تجزیه و تحلیل




شکل ۴. محدوده منطقه مورد مطالعه

در پژوهش حاضر برای تلفیق لایه‌ها و تصمیم‌گیری چند معیاره از روش مقایسه زوجی استفاده شد. به همین منظور یک سری مقایسه دو به دویی از اهمیت نسبی معیارها برای ارزیابی مورد نظر انجام شد. از این مقایسه‌های دو به دویی سپس برای ایجاد یکسری وزن‌ها (که جمع جبری آن‌ها برابر یک است)، استفاده شد (۵). معیارها و وزن‌های نسبی به دست آمده برای هر یک از معیارها، داده‌های ورودی برای تحلیل ارزیابی چندمعیاری درمحیط GIS را تشکیل دادند. برای تعیین درجه دقت و صحت وزن دهی از شاخص سازگاری استفاده شد (۱۸). چنانچه شاخص سازگاری معادل ۰/۱ یا کمتر از آن باشد وزن دهی صحیح بوده، در غیر این صورت وزن‌های نسبی داده شده به معیارها بایستی تغییر یابند و وزن دهی مجددًا باید انجام شود.

پس از تعیین وزن هر معیارها، ارزیابی چند معیاری در محیط GIS با استفاده از عملیات همپوشانی و تابع اجتماع انجام شده و نقشه نهایی توان اراضی برای توسعه شهری به دست آمده است. در روش فرآیند Raster calculated عملیات ارزیابی توان اکولوژیکی اراضی انجام گردید. در شکل ۵ مراحل مختلف فرآیند تحلیل سلسله مرتبی در ارزیابی توان اکولوژیکی آورده شده است.

## نتایج


نتایج وزن دهی معیارها در جدول ۱ آورده شده است؛ شاخص سازگاری به دست آمده برای وزن دهی به معیارهای نیز معادل ۰/۰۱ می‌باشد. در شکل ۶ نقشه نهایی توان اکولوژیکی اراضی حاشیه شهر تبریز جهت توسعه پایدار شهری در ۶ طبقه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مرتبی آورده شده است.



شکل ۵. نمای کلی ارزیابی توان اکولوژیکی

جدول ۱. وزن دهی به معیارها با استفاده از روش مقایسه دوتایی

	خطوط انتقال نیرو	فرودگاه	ارتفاع	کاربری اراضی	جهت	راه	قابلیت زمین	گسل	زمین شناسی	شیب	چاهها	آب‌های سطحی	وزن کل
خطوط انتقال نیرو	۱	۱	۱	۱	۲	۳	۵	۵	۵	۸	۸	۹	۰/۱۷۲۱
فرودگاه	۱	۱	۱	۱	۲	۳	۵	۵	۵	۸	۸	۹	۰/۰۳۱۶
ارتفاع	۱	۱	۱	۱	۱	۳	۴	۵	۵	۷	۸	۸	۰/۰۹۶۹
کاربری اراضی	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۳	۴	۴	۶	۷	۸	۰/۰۵۷۱
جهت	۰/۵	۰/۵	۱	۱	۱	۱	۳	۳	۳	۵	۶	۷	۰/۱۴۳۵
راه	۰/۳۳	۰/۳۳	۰/۳۳	۰/۵	۱	۱	۱	۲	۲	۴	۵	۶	۰/۱۰۸۳
قابلیت زمین	۰/۲	۰/۲	۰/۲۵	۰/۳۳	۰/۳۳	۱	۱	۱	۱	۳	۳	۴	۰/۰۳۱۶
گسل	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲۵	۰/۳۳	۰/۵	۱	۱	۱	۲	۳	۳	۰/۰۱۴۱
زمین شناسی	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲۵	۰/۳۳	۰/۵	۱	۱	۱	۲	۳	۳	۰/۰۳۶۲
شیب	۰/۱۲۵	۰/۱۲۵	۰/۱۴۲۹	۰/۱۶	۰/۲	۰/۲۵	۰/۳۳	۰/۵	۰/۵	۱	۱	۱	۰/۱۷۲۱
چاهها	۰/۱۲۵	۰/۱۲۵	۰/۱۲۵	۰/۱۴۲۹	۰/۱۶	۰/۲	۰/۳۳	۰/۳۳	۰/۳۳	۱	۱	۱	۰/۰۱۴۱
آب‌های سطحی	۰/۱۱	۰/۱۱	۰/۱۲۵	۰/۱۲۵	۰/۱۴۲۹	۰/۱۶	۰/۲۵	۰/۳۳	۰/۳۳	۱	۱	۱	۰/۱۰۸۳



شکل ۶. نقشه توان اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه

## نتیجه‌گیری

تبریز- صوفیان به دلیل دارا بودن اراضی با شیب مناسب و رو به آفتاب اصلی‌ترین و طبیعی‌ترین امکان برای توسعه تبریز است، معهذا در مورد استفاده از اراضی شمال غربی چند نکته حائز اهمیت است. اول آنکه به دلیل عبور ارتباطات اصلی زمینی کشوری و ترانزیت از این قسمت‌ها، لازم است به ظرفیت بالای آن برای استقرار یک بارانداز ملی توجه داشت. همچنین نزدیکی نسبی آن با کارخانجات بزرگ، امکان استقرار واحدهای تولیدی غیر آلوده را فراهم می‌سازد که بخش‌های جنوب جاده تبریز- صوفیان را می‌توان به آنها اختصاص داد. دوم آنکه به دلیل عبور گسل بزرگ شمال تبریز از این اراضی، لازم است تمهیدات لازم برای اعمال حریم مناسب و رعایت آئین‌نامه‌های ساختمانی با بالاترین استاندارد اندیشه‌شده شود و سوم آنکه به دلیل وجود فرودگاه تبریز ضروریست تا حریم‌های لازم برای جلوگیری از انتقال آلودگی و خطرات احتمالی استقرار اجتناب ناپذیر آن، تعیین و حفظ گردد.

از سوی دیگر بررسی‌های قبلی انجام گرفته، نیز بر توسعه شهر تبریز در جهت شمال غرب شهر تأکید داشته که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد. براساس طرح جامع شهر تبریز محورهای زیر برای توسعه فیزیکی شهر در نظر گرفته شده است. شهرک واقع در محدوده روستای امند در شمال غرب شهر تبریز واقع در مسیر جاده تبریز- مرند، شهرک اندیشه در جنوب غرب شهر تبریز واقع در مسیر جاده تبریز- خسروشهر. بر اساس بررسی انجام گرفته در طرح مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز، و بر اساس مشاهدات میدانی، مناطق شمال شهر و بخش‌هایی از جنوب و جنوب غربی، محلات عمده حاشیه نشینی شهر تبریز هستند که محور شمال غرب شهر به دلیل زمین‌های مسطح و جهت شیب مناسب، برای توسعه کالبدی شهر تبریز از جمله مکان‌های مناسب توسعه در نظر گرفته شده است.

نکته حائز اهمیت در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گرینش صحیح وزن‌ها و استفاده بهینه از لایه‌های اطلاعاتی می‌باشد. به طوری که عدم لحاظ نمودن وزن‌های مناسب در تصمیم‌گیری علی‌رغم استفاده از لایه‌های اطلاعاتی متعدد، منجر به ارائه نتایج نامناسبی می‌شود. به طور کلی آنچه که می‌توان از این تحقیق استنتاج نمود این است که سیستم‌های

نتایج نشان می‌دهد که با اجرای مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مناطقی برای توسعه استخراج می‌شود که بر پایه شواهد میدانی و مقایسه نتایج حاصله با واقعیت‌های موجود مطابقت می‌کند. بر اساس جهات توسعه‌ای در مدل تحلیل سلسله مراتبی، مشخص شد که بهترین معیار در این مدل بر مبنای رتبه‌بندی آن‌ها می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهند که، سمت شمال شهر توسط ارتفاعات پرشیب احاطه شده و در حال حاضر بخشی از دامنه این ارتفاعات که خود دارای شیب قابل ملاحظه‌ای هستند توسط حاشیه نشینان اشغال شده است. این بخش از شهر نه تنها فاقد قابلیت توسعه است، بلکه بخشی از جمعیت آن در صورت انجام عملیات بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، جابجا خواهد شد. ظرفیت توسعه سمت شرق جهت استقرار کارکردهای کلان شهری و مراکز اشتغال به خصوص در طول محور تبریز- بستان آباد - اهر بسیار محدود می‌باشد. پیچیدگی توپوگرافیک سبب می‌شود که این سمت از شهر در ملاحظات توسعه و جمعیت پذیری فاقد نقش تعیین کننده باشد.

симت جنوب عمده‌تاً توسط دامنه ارتفاعات محدود می‌شود که به نسبت ارتفاعات شمالی شیب بسیار کمتری دارد. لذا این سمت از شهر به دلیل منفی بودن شیب اراضی و مغایرت جدی آن با ضرورت‌های اقلیمی فاقد ظرفیت جمعیت پذیری است، بنابراین قابل ذکر است که اراضی دارای شیب کمتر را می‌توان به کاربری‌های کلان و بزرگ همچون آموزش عالی، مجتمع‌های پژوهشی، ورزشگاه و امثال آنها اختصاص داد. سمت غرب توسط صنایع بزرگ اشغال شده و به دلیل سمت بادهای غالب به هیچ وجه قابلیت توسعه و استقرار جمعیت را ندارد. توسعه در این سمت و همچنین سمت جنوب غربی، به دلیل آن که فاصله شهر جدید سهند را هر چه کمتر کرده و یکپارچگی آن را با تبریز تسریع می‌کند، از این جنبه نیز جای تأمل داشته و قابلیت توسعه ندارد.

اراضی شمال شرقی شهر، در مجاورت و اطراف روستای آرپادره سی باقیمانده امکانات توسعه کالبدی تبریز است که خود چه به دلیل موقعیت چه به لحاظ شکل زمین دارای محدودیت‌هایی نسبی است. سمت شمال غرب، شمال جاده

۷. مخدوم، م. ۱۳۸۰. شالوده آمایش سرزمین، چاپ چهارم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۸. مسگری، س. ۱۳۸۱. بررسی روند تغییر سطوح جنگل‌ها با استفاده از GIS و سنجش از دور. طرح پژوهشی دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی.
۹. مهاجر شجاعی، م. ح. ۱۳۶۱. ارزیابی منابع و قابلیت منطقه خرم آباد، بروجرد، ازنا، استان لرستان. مؤسسه تحقیقات آب و خاک، نشریه شماره ۶۰۸.
۱۰. نیرآبادی، ه. ۱۳۸۶. کاربرد تکنیک‌های GIS در مکانیابی دفن زباله (مطالعه موردنی: شهر تبریز). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

11. Burrough, P. A. 1990. Methods of spatial analysis in GIS. International Journal of Geographic Information Systems. 4:221-223.
12. Eastman, J. R. 2006. IDRISI for Windows users guide. Clark labs for cartographic technology and geographic analysis, Clarc University.
13. Leo, S. H. 1995. Integration of Remote Sensing and GIS technologies for large area Land cover mapping. Asian-Pacific Remote Sensing Journal. 30 (2): 146-147.
14. Moller, R., Z. Heinrich and M. Nachbav. 1997. The use of geographical information and ecosystems approach in environmental planning in part of northern Karanataka.
15. Ngai, E., T. and W., C. Chan. 2005. Evaluation of knowledge management tools using AHP expert systems with application. 29: 889-899.
16. Perera, A and V. Thillanadarajan. 1991. GIS for land use planning. Asia-Pacific Remote Sensing. 3 (2): 238-252.
17. Prakash, A. and R.P.Gupta. 1998. Land-use mapping and change detection in a coal mining area - a case study of the Jharia coalfield, India. International Journal of Remote Sensing. 19: 391-410.
18. Satty, T. 1980. The Analytical Hierarchical Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. New York: McGraw-Hill.

اطلاعات جغرافیایی با توانایی در کاربرد توابع مختلف و امکان تغییر و دستکاری داده‌ها و توانایی وسیع در ترکیب لایه‌های اطلاعاتی مختلف و همچنین امکان استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و نتایج حاصل از تفسیر این تصاویر، ابزار منحصر به فردی در انجام عملیات ارزیابی بوده و بدون استفاده از GIS، شاید امکان انجام این مطالعات با سرعت و دقیق مناسب غیر ممکن می‌بود. بدین ترتیب GIS با استفاده از قابلیت‌های متنوع خود ما را در کاهش هزینه‌ها و رسیدن سریع‌تر به هدف مورد نظر رهنمون خواهد ساخت.

### منابع مورد استفاده

۱. احمدی زاده، س. ع. ر. زارع، م. ر. داوری و م. قوامی. ۱۳۷۷. برنامه‌ریزی استان خراسان با استفاده از مدل‌های اکولوژیک و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی. مجموعه مقالات همایش ژئوتکنیک ۷۸. انتشارات سازمان نقشه برداری کشور، ۴۳-۳۵.
۲. پرهیزگار، ا. و ع. غفاری گیلاندره. ۱۳۸۵. سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری. انتشارات سمت.
۳. جهانی، ع. ۱۳۷۶. ارزیابی چند منظوره تناسب اراضی با استفاده از روش کمی و منطق فازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور، دانشگاه تربیت مدرس.
۴. جعفری، ح. ر. و س. کریمی. ۱۳۸۴. مکانیابی عرصه‌های مناسب احداث صنعت در استان قم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. مجله محیط سیاستی. شماره ۳۷، ۵۲-۴۵.
۵. غفاری، س. ر. ۱۳۸۲. اولویت‌بندی در سکونتگاه‌های روستایی با روش AHP (مطالعه موردنی: دهستان بازفت). فصلنامه مهندس مشاور، شماره ۱۲ (زمستان ۱۳۸۲). ۱۰۷-۱۰۰.
۶. کرم، ع. ال. ۱۳۸۴. تحلیل تناسب زمین برای توسعه کالبدی در محور شمال غرب شیراز با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاری (MCE) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، مجله پژوهش‌های جغرافیایی. ۳۷ (۵۴): ۹۳-۱۰۶.



## RS & GIS for Natural Resources (Vol. 5/ Issue 3) Autumn 2014

Indexed by ISC, SID, Magiran and Noormags

<http://girs.iaubushehr.ac.ir>



### **Ecological capability assessment by using GIS and analytic hierarchy process (Case study: Tabriz Suburb)**

**F. Naghdi<sup>1\*</sup>, S. M. Hosseini<sup>2</sup>, Sh. Sadr<sup>3</sup>**

1. Ph.D. of Environmental, Islamic Azad University Tabriz Branch

2. Assoc. Prof. College of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modarres University

3. Graduated BSc. of Environmental Sciences, College of Environmental, Islamic Azad University Tabriz Branch

#### ARTICLE INFO

##### **Article history:**

Received 25 August 2013

Accepted 26 May 2014

Available online 15 November 2014

##### **Keywords:**

Ecological capability assessment

Multi criteria evaluation (MCE)

Analytic hierarchy process (AHP)

Geographic Information System (GIS)

#### ABSTRACT

In order to achieve sustainable development, it is necessary to obtain and adopt planning procedures based on Multi Criteria Evaluation of natural environment. Since biophysical (natural) environment has limited ecological capabilities for human use, ecological capability assessment, as an essence for environmental studies and with the aim of preventing existing crises, yields proper grounds for environmental planning. The analysis of land capability and sufficiency for urban development is one of the main categories with which urban planners deal. In this paper, by Analytic Hierarchy Process (AHP) through the perspective of Multi Criteria Evaluation (MCE) Approach and within the Geographic Information Systems (GIS), ecological capability of the suburbs surrounding Tabriz city was assessed (natural and human in terms of 12 criteria) to examine the physical development of Tabriz city and final mapping of the region was provided. This mapping shows regions suitable for physical urban development of the city. The results and finding of this research were applied by urban planners.

\* Corresponding author e-mail address: naghdi\_1171@yahoo.com