

## بیان ژن Neurogenin-3 در بافت پانکراس انسان بالغ

آناهیتا شاعر<sup>1</sup>، نگاراذریپرا<sup>2</sup>، اکبروحدتی<sup>1</sup>، محمدحسین کریمی<sup>2</sup>، مهردادشریعتی<sup>1</sup>

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، فارس-ایران. anahita.shaer@yahoo.com

2- مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا، دانشگاه علوم پزشکی، شیراز، فارس، ایران.

تاریخ دریافت: 92/6/30 تاریخ پذیرش: 92/9/15

### چکیده

زمینه و هدف: NGN3 پروتئینی است که در انسان توسط ژن Neuro3 رمزگذاری و در سلول‌های پروجنیاتور اندوکرین بیان می‌شود. برای تکامل سلول‌های اندوکرین در پانکراس و روده این ژن مورد نیاز است. هدف از این پژوهش بررسی نحوه بیان ژن NGN3 در بافت پانکراس انسان بالغ است. روش کار: بافت پانکراس بالغ انسان با رعایت ضوابط قانونی از نمونه‌های پانکراس که جهت پیوند به بیماران دیابتی فراهم شده‌اند، تهیه شد. بعد از استخراج RNA و سنتز DNA، بیان ژن NGN3 با استفاده از تکنیک‌های PCR (Polymerase Chain Reaction) مورد مطالعه قرار گرفت.

**یافته‌ها:** نتایج ارزیابی نشان داد که در بافت پانکراس بالغ انسان ژن NGN3 بیان می‌شود.

نتیجه‌گیری: طبق بررسی‌هایی که تا کنون انجام شده است بیان NGN3 مربوط به دوره کوتاهی در زمان تکامل پانکراس و تولید سلول‌های اندوکرین به خصوص سلول‌های بتا می‌باشد و نتایج این تحقیق می‌تواند بیانگر این نکته باشد که احتمالاً در پانکراس بالغ جمعیتی از سلول‌های زاینده اندوکرین وجود دارد. واژه‌های کلیدی: پانکراس، سلول‌های زاینده اندوکرین، NGN3.

### مقدمه

باشد که تولید و انتقال آنزیم‌های گوارشی به دئودنوم بر عهده دارند. بخش اندوکرین شامل جزایر لانگرهانس می‌شود که مهم‌ترین هورمون‌هایش در رابطه با متابولیسم گلوکز است. هورمون‌ها شامل گلوکاگون، انسولین، سوماتواستاتین و پلی‌پپتید پانکر اتیک است (4). تکامل پانکراس در انسان از هفته هفتم بارداری شروع می‌گردد (19). در تکامل این غده تعدادی از فاکتور نسخه‌برداری دخیل هستند که یکی از مهم‌ترین این فاکتورها (NGN3) Neurogenin-3 می‌باشد. NGN3 یک پروتئین است که در انسان به- وسیله ژن Neuro3 رمزگذاری می‌شود (17). در NGN3 در سلول‌های پروجنیاتور اندوکرین بیان می‌شود و برای تکامل سلول‌های اندوکرین در پانکراس و روده مورد نیاز است (30). NGN3 به خانواده فاکتورهای

پانکراس عضوی بزرگ با اندازه تقریبی حدود شش اینچ و جایگاه اصلی هضم غذا و ترشحات داخلی در بدن به شمار می‌آید (18). این عضو در بخش بالای شکم و در پشت معده قرار گرفته است (24). پانکراس از اطراف توسط معده، روده کوچک، کبد احاطه شده و با این اعضاء در ارتباط می‌باشد (18). این عضو شبیه گلایی است، در یک انتها باریک و در انتهای دیگر پهن است، شامل سه بخش اصلی و دو دسته سلول اختصاصی می‌باشد (24). بخش پهن آن سر، بخش میانه بدنه و قسمت باریک دم نامیده می‌شوند (18). پانکراس نقش اساسی در تنظیم و هموستازی غذایی در بدن دارد. پانکراس یک غده بزرگ مختلط در بدن می‌باشد که دارای دو بخش اگزوکرین و اندوکرین است. بخش اگزوکرین شامل آسینی‌ها و مجاری می-

در مقایسه با پروتئین NGN3 پخش می‌شوند که نشان-دهنده‌ی تنظیم پس ترجمه‌ای توسط نسخه‌های NGN3 است که نقش مهمی در تکامل پانکراس دارند (15). هدف از این پژوهش بررسی نحوه‌ی بیان ژن NGN3 در بافت پانکراس انسان بالغ است.


### مواد و روش‌ها

در این بررسی نمونه‌های بافت پانکراس انسان بالغ و سالم با رعایت کامل نکات اخلاقی از نمونه‌های مرگ مغزی که جهت پیوند به بیماران دیابتی در بخش تحقیقات پیوند بیمارستان نمازی تهیه شد. نمونه‌های دریافت شده برای جلوگیری از تخریب و نابودی RNA توسط آنزیم‌های بخش اگزوکرین که در فاصله کوتاهی بعد از خارج شدن پانکراس از بدن آزاد می‌شود در مایع (شرکت سیگما، امریکا) RNAlater قرار گرفتند. RNAlater یک ترکیب مایع و غیر سمی برای نگه‌داری بافت است که در زمان استفاده به داخل بافت نفوذ می‌کند و کار محافظت از RNA سلولی را بر عهده دارد بدون آن که کیفیت RNA سلولی به خطر بیفتد. پانکراس در شرایط کاملاً استریل در زیر هود به تکه‌هایی در ابعاد 40mm-50mm برش زده (شکل 1) و در شرایط کاملاً استریل چند بار در محلول بافر PBS (Phosphate Buffer Saline) شسته شد. کل RNA از تکه‌های کوچک بافت در اون چینی اتوکلاو شده هم‌زمان با ریختن آنزیم RNAase مربوط به کیت استخراج RNA (شرکت سیناژن، ایران) مطابق پروتکل کیت استخراج شد. سنتز DNA با استفاده از آنزیم نسخه برداری معکوس MMULV (شرکت سیناژن، ایران) در دستگاه ترموسایکلر با برنامه 42 درجه سانتی-گراد به مدت 9 دقیقه و در 85 درجه سانتی-گراد به مدت 5 دقیقه سنتز شد. توالی، طول و شرایط هر کدام از پرایمرها در جدول 1 خلاصه شده است. واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (Polymerase Chain Reaction)،

نسخه‌برداری (basic helix-loop-helix (bHLH) تعلق دارد که در تعیین سلول‌های پیش‌ساز عصبی در اکتودرم عصبی مؤثر هستند (7). قابل توجه است که موش‌های فاقد NGN3 فاقد 4 سلول اندوکرین پانکراس می‌باشند و تولید انسولین، گلوکاگون، سوماتواستاتین و تولید پلی‌پپتید پانکراتیک در آن‌ها دیده نمی‌شود (13). بررسی‌ها در زمان تکامل جنین موش نشان داده است که همه‌ی تیپ‌های سلول‌های اندوکرینی در دوره کوتاهی به‌طور موقت NGN3 را بیان می‌کنند. NGN3 در روز E 13/5 در جنین موش بیان می‌شود و اوج بیان آن در روز 15/5 می‌باشد و بعد از آن بیان NGN3 متوقف شده و هیچ سلول NGN3 مثبتی بعد از تولد و در پانکراس بالغ دیده نمی‌شود. در واقع موش‌های فاقد NGN3 فقط به سمت سلول‌های غیر اندوکرین پیش می‌روند (8، 14). ژن تارگت NGN3، Neuro D<sub>1</sub> است که فوراً در پایین دست NGN3 بیان می‌شود. این ژن در موش‌های فاقد NGN3 بیان نمی‌شود و بیان ژن (Pancreatic and duodenal homeobox1) Pdx<sub>1</sub> در موش فاقد Neuro D<sub>1</sub> تأثیر نمی‌پذیرد. بیان ژن Neuro D<sub>1</sub> در سلول‌های اندوکرین پانکراس و دیگر بافت‌های غیر پانکراتیک مثل روده و مغز یافت می‌شود. عملکرد ژن Neuro D<sub>1</sub>، فعال کردن ژن انسولین و پیش بردن بیشتر تمایز به سمت سلول‌های islet عملکردی می‌باشد. در واقع تکامل سلول‌های islet در یک مرحله پیش‌بلوغی در موش‌های فاقد Neuro D<sub>1</sub> متوقف می‌شود. این مسأله نشان‌دهنده نقش اهمیت این ژن در تشکیل اولیه islet می‌باشد (27). در رابطه با NGN3 تولید نسخه‌های NGN3 و پروتئین NGN3 در دو مرحله رخ می‌دهد. ابتدا در حدود روز E 8/5 تا E 11 اتفاق می‌افتد و شروع ثانویه در حدود روز E 12 به‌طور قابل توجهی می‌باشد. نسخه‌های NGN3 به میزان بیشتری در ایتلیوم پانکراس

Extention نهایی به مدت 10 دقیقه در 72 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد. برای بررسی محصولات PCR تولید شده از روش الکتروفورز بر روی ژل آگارز 2/5% استفاده گردید. غلظت ژل آگارز به طول قطعه DNA تکثیر شونده بستگی دارد. سپس با قراردادن ژل در اتاقک دستگاه UV illuminator و تاباندن اشعه ماورابنفش موقعیت و کیفیت قطعات تکثیر شده قابل مشاهده و بررسی گردید و توسط دستگاه عکس برداری از ژل انجام شد.

یکی از بهترین روش های افزایش و تکثیر مولکول هدف می باشد. این روش از نظر اصول عملی، تشابه زیادی به همانند سازی DNA داشته و در واقع بر گرفته از آن است. واکنش زنجیره ای پلیمرز در حجم نهایی 20 $\mu$ l با استفاده از آنزیم Tag (شرکت سیناژن، ایران) در دستگاه ترمو سایکلر با شرایط *Denaturation* 10 دقیقه در دمای 95 درجه سانتی-گراد، *Annealing* 1 دقیقه در دمای 95 درجه سانتی-گراد و *Extention* 1 دقیقه در دمای 67 درجه سانتی-گراد انجام گرفت. تعداد سیکل 40 و یک سیکل



شکل 1- بافت پانکراس انسان

جدول 1- اسامی ژن ها و توالی مربوط به پرایمرهای بالادست (F) و پایین دست (R)

اندازه bp	توالی پرایمر		نام ژن
254	CAATCGAATGCACAACCTCA	F	NGN3
	GGGAGACTGGGGAGTAGAGG	R	
74	GATCGGCGGCTCCATCCTG	F	$\beta$ - Actin
	GACTCGTCATACTCCTGCTTBC	R	

## نتایج


### بحث و نتیجه گیری

فاکتورهای نسخه برداری میانجی های کلیدی در کنترل فعالیت های سلول هستند. بیان ژن های اختصاصی سلول در سطح نسخه برداری و از طریق بر هم کنش تعدادی از فاکتور های نسخه برداری با نواحی

به منظور ارزیابی بیان ژن NGN3 در بافت پانکراس انسان بالغ محصول PCR روی ژل آگارز الکتروفورز و سطوح بیان ژن مورد نظر به صورت درصدی از بیان  $\beta$ -Actin تعیین و بیان ژن NGN در بافت پانکراس بالغ دیده شد (شکل 2).

از روش‌های کاهش و افزایش ژن‌های تارگت شناسایی شده اند (7، 12، 16، 25).

پروموتور ژن‌ها کنترل می‌شود. مهم‌ترین فاکتورهای نسخه برداری که در تکامل پانکراس نقش دارند از طریق موش‌های knockout و transgenic با استفاده



- شکل ۲ بیان ژن‌های NGN3:254bp و β-Actin:74bp

چند در زمان تکامل پانکراس هم بیان می‌شود. بیان Arx در پایین دست بیان ژن NGN3 است و در موش‌های فاقد بیان ژن، NGN3 ژن Arx بیان نمی‌شود (6). در موش‌های فاقد ژن Arx مرگ قبل از بلوغ به خاطر هیپوگلیسمی شدید که دال بر نقش احتمالی ژن Arx در تکامل سلول‌های آلفا است دیده می‌شود (6). (Brain4(Brm4) یک فاکتور نسخه برداری دومین pou است که فقط در سلول‌های گلوکاگون مثبت و پانکراس رت بالغ بیان شده و در سلول‌های آلفا نقش دارد (11، 10). ناحیه پروموتور ژن انسولین دارای جایگاه‌های اتصال برای فاکتورهای هموباکس Nkx6.1 و Nkx2.2 است. این فاکتورها باعث تمایز مستقیم سلول‌های تولیدکننده انسولین می‌شوند. در موش‌های فاقد Nkx6.1 سلول‌های بتا مترشحه انسولین دیده نمی‌شود ولی سایر سلول‌های اندوکرین پانکراس تشکیل می‌شود و این مساله نشان می‌دهد این فاکتور نقش مستقیم در تکامل سلول‌های بتا دارد (21).

تعدادی از فاکتورهای نسخه برداری که در تکامل پانکراس بخصوص سلول‌های بتا نقش دارند به این شرح می‌باشند: یکی از مهم‌ترین فاکتورهای نسخه برداری pdx1 که یک I.P.F.1 می‌باشد در تکامل پانکراس شناسایی شده است (33، 1). بیان pdx1 در دوران بزرگسالی فقط در سلول‌های بتا محدود می‌شود. ولی در طی مرحله تکامل بیان می‌شود. و برای اثبات این مسئله مشاهده شده که موش‌هایی که فاقد pdx1 می‌باشند، فاقد پانکراس هستند (16، 12). دو فاکتور مهم دیگر که در تکامل پانکراس نقش دارند pax4 و pax6 هستند. موش‌های فاقد pax4 فاقد سلول‌های بتا و دلتا می‌باشند و موش‌های فاقد pax6 سلول‌های مترشحه گلوکاگون در پانکراس آن‌ها دیده نمی‌شود. Pax6 در تمایز سلول‌ها به سمت سلول‌های آلفا اثر دارد (23). فاکتور Arx محدود به islet‌ها و آن‌هم در مراحل بلوغ می‌شود. هر

بررسی های زیادی در رابطه با نقش احتمالی NGN3 برای درمان بیماران دیابتی و ترمیم و باز سازی سلول ها در پانکراس صورت گرفته است (31، 20). 3 تا از مهم ترین تارگت های پایین دست NGN3 که در رابطه با تمایز بخش اندوکرین پانکراس و سلول های بتا می باشند شامل: (NeuroD1) neurogenic differentiation factor 1 می باشد. این ژن همراه با ژن NGN3 در زمان تمایز سلول ها بیان می شود. تارگت مهم دیگر (Pax4) paired box gene 4 است که نقش مهمی در تمایز سلول های بتا و تا دارد. NGN3 همراه با ژن HNF1 $\alpha$  پروموتور ژن Pax4 را فعال می کند و باعث القای تمایز سلولی خاص می شود. فاکتور نسخه برداری دیگری که ممکن است تارگت پایین دست NGN3 باشد Nkx2.2 است زیرا همراه با این ژن بیان می شود. بررسی ها نشان داده است اختلال در بیان ژن Nkx2.2 باعث ایجاد مشکل در تمایز سلول های الفا و بتا می شود (3). برخی از بررسی ها که در رابطه با تعیین بیان ژن NGN3 در پانکراس صورت گرفته است به این شرح می باشد. بررسی های Gu و همکاران در سال 2002 و هم چنین بررسی های Xu در سال 2008 نشان داده است که همه سلول های اندوکرین بیان موقتی از NGN3 در مدت کوتاهی، زمانی که جنین موش تکامل می یابد را نشان می دهند. در روز 13/5 تکامل جنین ظاهر می شود و یک پیک بیان در روز 15/5 جنینی دارد و بعد به طور کامل ناپدید می شود و هیچ سلولی که بیان ژن NGN3 را داشته باشد بعد از تولد و در پانکراس بالغ دیده نمی شود (32، 8). Vetere و همکاران در سال 2003 با بکارگیری یک سیستم الفاگر Cre-ER<sup>TM</sup>-LoxP نشان دادند که سلول های بیان کننده NGN3 اجداد سلول های اندوکرین جزایر پانکراس هستند و هیچ ارتباطی با سلول های اجدادی آگزوکرین در طی رشد جنین و دوران بزرگسالی در موش ها ندارند. NGN3 برای تحریک

برخلاف ژن Nkx6.1 Nkx2.2، در سلول های الفا، سلول های پلی پپتید پانکراتیک و سلول های بتا بیان می شود. موش های فاقد Nkx2.2 کاهش در تعداد سلول های بتا، الفا، پلی پپتید پانکراتیک را دارند که اشاره بر نقش این فاکتور در تمایز و تکامل این سه رده سلولی دارد (28). نسخه هایی از انسولین و گلوکاگون به ترتیب به وسیله Mafa و Mafb تنظیم می شوند (35، 2). فاکتورهای نسخه برداری Neuro D1، Hes1، NGN3، bHLH، تمایز سلول های بتا نیز نقش دارند. NGN3 فاکتور اختصاصی سلول های اندوکرین است که برای تکامل همه سلول های اندوکرین ضرورت دارد (32، 15). همه سلول های اندوکرین به طور گذرا در یک دوره کوتاه ژن NGN3 را بیان می کنند و NGN3 در جنین موش دارای یک پیک در روز E12.5 و پیک دیگر در روز E15.5 است و بعد از آن دیگر ناپدید می شود و هیچ سلول NGN3 مثبتی در مغز و یا در پانکراس در دوران بزرگسالی یافت نمی شود که اشاره بر این دارد که NGN3 نقش در یک مرحله ویژه در تکامل پانکراس دارد. در واقع موش های فاقد NGN3 به سمت سلول های غیر اندوکرین پیش می روند، بنابراین NGN3 نقش مرکزی در تمایز سلول های زاینده اندوکرین دارد (32، 15). یک ژن تارگت Neuro D1، NGN3 است که در پایین دست NGN3 فوراً بیان می شود. هیچ سلول مثبت Neuro D1 در سلول های موش فاقد NGN3 بیان نمی شود. بیان Neuro D1 در سلول های اندوکرین پانکراس، بافت های غیر اندوکرین مثل روده و مغز دیده شده است (15). تکامل پانکراس در 3 فاز انجام می شود. NGN3 در فاز اول و دوم بیان می شود و فعال است. در فاز اول در تمایز سلول های الفا نقش دارد و در فاز دوم در تمایز سلول های بتا، سلول های پلی پپتید پانکراتیک و سلول های بتا نقش دارد. تمایز به طور مشخص بعد از فاز دوم تکمیل می شود (3).

NGN3 در بیوپسی‌های پاتولوژیک پانکراس مشاهده گردیده است (5).

### نتیجه‌گیری

در مجموع نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که بیان ژن NGN3 در بافت پانکراس بالغ انسان برخلاف سایر تحقیقاتی که تا کنون در برخی از حیوانات و انسان صورت گرفته است بیان می‌شود. که احتمالاً می‌تواند دال بر حضور جمعیتی از سلول‌های زاینده اندوکرین در پانکراس بالغ باشد. این نکته می‌تواند زمینه را برای تحقیقات آینده در زمینه حضور جمعیتی از سلول‌های زاینده اندوکرین در بافت پانکراس بالغ انسان که بتواند به سلول‌های بتا تبدیل شود و در درمان بیماران دیابتی کمک کند.

تمایز در سلول‌های اندوکرین پانکراس لازم است. در گزارش دیگر دیده شده بیان اکتوپیک از NGN3 در جنین‌های جوجه تبدیل سلول‌های اندودرم در هر ناحیه به تیپ  $\alpha$  ولی نه تیپ  $\beta$  را باعث می‌شود (29). نتایج این پژوهش از آن نظر حائز اهمیت است که برای اولین بار بیان ژن NGN3 در بافت پانکراس انسان بالغ سالم نشان داده شده است. NGN3 فاکتور اختصاصی سلول‌های اندوکرین است که برای تکامل سلول‌های اندوکرین ضرورت دارد (14، 13) و هرگز همراه با هورمون‌های اندوکرین در جزایر پانکراتیک بیان نمی‌شود (36). با این حال حضور جمعیتی از سلول‌های زاینده تمایز نیافته در پانکراس بالغ جای بحث دارد (22). هر چند جمعیت سلول‌های زاینده در ایتلیوم اطراف مجاری پانکراس مشاهده شده است (34، 23). هم‌چنین بیان

### منابع

- Alipio, Z., Liao, W., Roemer, EJ., Waner, M., Fink, LM., Ward, DC. (2010). Reversal of hyperglycemia in diabetic mouse models using induced-pluripotent stem (iPS)-derived pancreatic beta-like cells. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 107(30);13426-31.
- Artner, I., Bianchi, B., Raum, JC., Guo, M., Kaneko, T., Cordes, S. (2007). MafB is required for islet beta cell maturation. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 104(10); 3853-8.
- Bramswig, NC., Kaestner, KH. (2011). Transcriptional regulation of  $\alpha$ -cell differentiation. *Diabetes Obes Metab*, 1; 13-20.
- Cabrera, O., Berman, DM., Kenyon, NS., Ricordi, C., Berggren, PO., Caicedo, A. (2006). The unique cytoarchitecture of human pancreatic islets has implications for islet cell function. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 103(7); 2334-9.
- Chavali, S., Mahajan, A., Tabassum, R., Dwivedi, OP., Chauhan, G., Ghosh, S. (2011). Association of variants in genes involved in pancreatic  $\beta$ -cell development and function with type 2 diabetes in North Indians. *J Hum Genet*, 56(10); 695-700.
- Collombat, P., Mansouri, A., Hecksher-Sorensen, J., Serup, P., Krull, J., Gradwohl, G. (2003). Opposing actions of Arx and Pax4 in endocrine pancreas development. *Genes Dev*, 17(20); 2591-603.
- Gradwohl, G., Dierich, A., LeMeur, M., Guillemot, F. (2000). Neurogenin3 is required for the development of the four endocrine cell lineages of the pancreas. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 97(4);1607-11.
- Gu, G., Dubauskaite, J., Melton, DA. (2002). Direct evidence for the pancreatic lineage: NGN3+ cells are islet progenitors and are distinct from duct progenitors. *Development*, 129(10); 2447-57.
- Hussain, MA., Miller, CP., Habener, JF. (2002). Brn-4 transcription factor expression targeted to the early developing mouse pancreas induces ectopic glucagon gene expression in insulin-producing beta cells. *J Biol Chem*, 277(18); 16028-32.
- Heller, RS., Stoffers, DA., Liu, A., Schedl, A., Crenshaw, EB., Madsen, OD., Serup, P. (2004). The role of Brn4/Pou3f4 and Pax6 in forming the pancreatic glucagon cell identity. *Dev Biol*, 268(1); 123-34.
- Jonsson, J., Carlsson, L., Edlund, T., Edlund, H. (1994). Insulin-promoter-factor 1 is required for pancreas development in mice. *Nature*, 371(6498); 606-9.
- Kanadia, RN., Cepko, CL. (2010). Alternative splicing produces high levels of noncoding isoforms of bHLH transcription factors during development. *Genes Dev*, 24(3); 229-34.

14. Karumbayaram, S., Novitch, BG., Patterson, M., Umbach, JA., Richter, L., Lindgren, A. (2009). Directed differentiation of human-induced pluripotent stem cells generates active motor neurons. *Stem Cells*, 27(4); 806-11.
15. Naya, FJ., Huang, HP., Qiu, Y., Mutoh, H., DeMayo, FJ., Leiter, AB. (1997). Diabetes, defective pancreatic morphogenesis, and abnormal enteroendocrine differentiation in BETA2/neuroD-deficient mice. *Genes Dev*, 11(18); 2323-34.
16. Offield, MF., Jetton, TL., Labosky, PA., Ray, M., Stein, RW., Magnuson, MA. (1996). PDX-1 is required for pancreatic outgrowth and differentiation of the rostral duodenum. *Development*, 122(3); 983-95.
17. Oropez, D., Horb, M. (2012). Transient expression of NGN3 in *Xenopus* endoderm promotes early and ectopic development of pancreatic beta and delta cells. *Genesis*, 50(3); 271-85.
18. Pansky, B. (1990). Anatomy of the pancreas. Emphasis on blood supply and lymphatic drainage. *Int J Pancreatol*, 7(1-3); 101-8.
19. Polak, M., Bouchareb-Banaei, L., Scharfmann, R., Czernichow, P. (2000). Early pattern of differentiation in the human pancreas. *Diabetes*, 49(2); 225-32.
20. Rukstalis JM, Habener JF. 2009. Neurogenin3: a master regulator of pancreatic islet differentiation and regeneration. *Islets*. 1(3):177-84.
21. Sander M, Sussel L, Connors J, Scheel D, Kalamaras J, Dela Cruz F, et al. 2000. Homeobox gene *Nkx6.1* lies downstream of *Nkx2.2* in the major pathway of beta-cell formation in the pancreas. *Development*. 127(24):5533-40.
22. Seaberg, RM., Smukler, SR., Kieffer, TJ., Enikolopov, G., Asghar, Z., Wheeler, MB. (2004). Clonal identification of multipotent precursors from adult mouse pancreas that generate neural and pancreatic lineages. *Nat Biotechnol*, 22(9); 1115-24.
23. Solar, M., Cardalda, C., Houbracken, I., Martín, M., Maestro, MA., De Medts, N. (2009). Pancreatic exocrine duct cells give rise to insulin-producing beta cells during embryogenesis but not after birth. *Dev Cell*, 17(6); 849-60.
24. Sosa-Pineda, B., Chowdhury, K., Torres, M., Oliver, G., Gruss, P. (1997). The *Pax4* gene is essential for differentiation of insulin-producing beta cells in the mammalian pancreas. *Nature*, 386(6623); 399-402.
25. Stoffers, DA., Ferrer, J., Clarke, WL., Habener, JF. (1997). Early-onset type-II diabetes mellitus (MODY4) linked to *IPF1*. *Nat Genet*, 17(2); 138-9.
26. Stömmer, P., Kraus, J., Stolte, M., Giedl, J. (1991). Solid and cystic pancreatic tumors. Clinical histochemical and electron microscopic features in ten cases. *Cancer*, 67(6); 1635-41.
27. Swales, N., Martens, GA., Bonné, S., Heremans, Y., Borup, R., Van, De. (2012). Plasticity of adult human pancreatic duct cells by neurogenin3-mediated reprogramming. *PLoS One*, 7(5); e37055.
28. Sussel, L., Kalamaras, J., Hartigan-O'Connor, DJ., Meneses, JJ., Pedersen, RA., Rubenstein, JL. (1998). Mice lacking the homeodomain transcription factor *Nkx2.2* have diabetes due to arrested differentiation of pancreatic beta cells. *Development*, 125(12); 2213-21.
29. Vetere, A., Marsich, E., Di Piazza, M., Končan, R., Micali, F., Paoletti, S. (2003). Neurogenin3 triggers beta-cell differentiation of retinoic acid-derived endoderm cells. *Biochem J*, 371(Pt 3); 831-41.
30. Wang, J., Cortina, G., Wu, SV., Tran, R., Cho, JH., Tsai, MJ. (2006). Mutant neurogenin-3 in congenital malabsorptive diarrhea. *N Engl J Med*, 355(3); 270-80.
31. Watada, H. (2004). Neurogenin 3 is a key transcription factor for differentiation of the endocrine pancreas. *Endocr J*, 51(3); 255-64.
32. Xu, X., D'Hoker, J., Stangé, G, Bonné, S., De Leu, N., Xiao, X. (2008). Beta cells can be generated from endogenous progenitors in injured adult mouse pancreas. *Cell*, 132(2); 197-207.
33. Yang, L., Li, S., Hatch, H., Ahrens, K., Cornelius, JG., Petersen, BE. (2002). In vitro trans-differentiation of adult hepatic stem cells into pancreatic endocrine hormone-producing cells. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 99(12); 8078-83..
34. WC, Li., Rukstalis, JM., Nishimura, W., Tchipashvili, V., Habener, JF., Sharma, A. (2010). Activation of pancreatic-duct-derived progenitor cells during pancreas regeneration in adult rats. *J Cell Sci*, 123(Pt 16); 2792-802.
35. Zhang, C., Moriguchi, T., Kajihara, M., Esaki, R., Harada, A., Shimohata, H. (2005). *MafA* is a key regulator of glucose-stimulated insulin secretion. *Mol Cell Biol*, 25(12); 4969-76.
36. Zhou, Q., Law, AC., Rajagopal, J., Anderson, WJ., Gray, PA., Melton, DA. (2007).

A multipotent progenitor domain guides pancreatic organogenesis. Dev Cell, 13(1); 103-114.

.

