

بررسی اثر محافظتی ویتامین B12 بر روی میزان ابتلای رت‌های لویس آنسفالومیلیت آرژیک تجربی در بیماری MS

مریم موسوی^۱، اکبر کریمی^۲، مجید گوروئی^۳

۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، گروه بیوشیمی، تهران، ایران.

۲- استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. karimiakbar38@yahoo.com

۳- گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

تاریخ دریافت: ۹۳/۶/۱۵ تاریخ پذیرش: ۹۳/۶/۲۴

چکیده

مقدمه و هدف: مالتیپل اسکلروزیز بیماری پیشرفته خود اینمنی سیستم عصب مرکزی است و آنسفالومیلیت آرژیک تجربی (EAE) به عنوان یک مدل حیوانی با ارزش برای این بیماری در نظر گرفته می‌شود. از آن جایی که ویتامین B12 در تعديل کردن پاسخ‌های التهابی و در تشکیل صفات میلین و تعديل پاسخ‌های استرس اکسیداتیو شرکت دارد، هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات آن بر روی رت‌های مبتلا به EAE است.

روش کار: با استفاده از ترکیب هموژنه نخاع خوکجه هندی، EAE در رت‌های لویس القاء شد. از روز بعد از القاء بیماری، درمان‌ها استفاده از ویتامین B12 شروع و به مدت ۱۰ روز به طول انجامید. از روش الیزا برای بررسی میزان سطح سرمی α-TNF استفاده شد.

تمام تست‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش Mann Whitney U-test مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: در این مطالعه مشاهده شد که میزان شرایط کلینیکی بد و میزان α-TNF در رت‌های مبتلا به EAE با افزایش میزان B12 کاهش پیدا نموده است.

نتیجه گیری: ویتامین B12 دارای اثر حفاظتی در کاهش شرایط ناشی از EAE بوده و می‌توان از آن در درمان مکمل بیماری MS استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: ویتامین B12، آنسفالومیلیت آرژیک تجربی، بیماری MS

مقدمه
عصب مرکزی و یا برخی از پروتئین‌های ویژه میلین گونه جانوری دیگر مثل Myelin Basic Protein (MBP) یا اولیگو دنروسیت گلیکو پروتئین (MOG) (Oligo Denrocyte Glycol Protein) همراه با ادجوانات ایجاد می‌شود. در EAE نشانه‌هایی مثل فلچ، التهاب، نواحی میلین زادی شده در ماده سفید سیستم عصب مرکزی، آسیب به سد خونی - مغزی، نفوذ سلول‌های T و ماکروفازها به سیستم عصب مرکزی دیده می‌شود (۷).

ویتامین B12 که به کوبالامین معروف است یک ترکیب ارگانیک فلزی است که اتم کابت در آن درون یک حلقه کورین قرار گرفته و ساختاری شبیه به پورفرین هم (Heme) از آن شکل می‌گیرد را به وجود می‌آورد.

بیماری MS یکی از بیماری‌های التهابی است که عامل ایجاد آن حمله سلول‌های فعال شده به سیستم عصب مرکزی و از بین رفتن اعمال نورولوژیک می‌باشد (۴). درمان بیماری MS به دلیل پیچیدگی نا شناخته باقی مانده است و با وجود تلاش‌های گسترده تحقیقاتی، درمان‌های خاص و موثر هنوز ابداع نشده است (۹). برای درمان بیماری از داروهای اینترفرون بتا و گلاتیرامراستات استفاده می‌گردد، با این حال تاثیرات این داروها در پیشرفت بیماری رضایت بخش نمی‌باشد (۱۷، ۱۳، ۱۰). آنسفالومیلیت آرژیک تجربی (EAE) مدل حیوانی با ارزش در کارهای تحقیقاتی بر روی بیماری MS می‌باشد (۸). در حیوانات توسط تزریق بافت سیستم

یک عامل محافظتی در جهت کاهش اثرات ناشی از بیماری زایی آنسفالومیلیت می باشد.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی جهت مدل آنسفالومیلیت آلرژیک تجربی از روش Schnider و همکارانش استفاده شد(۱۸). برای این منظور پس از بیهوش کردن خوکچه های هندی نخاع آنها خارج شد. سپس با استفاده از یک میلی لیتر نرمال سالین و یک گرم نخاع تازه ترکیب هموژنه به دست آمد(۱۸). ترکیب هموژنه نخاع خوکچه هندی به نسبت یک به یک با ادجوانات کامل فرونت مخلوط شد تا یک ترکیب امولوسیون ایجاد شد. در نهایت ۲۵۰ میکرولیتر امولوسیون به دست آمده را به رت های لویس (۲۰۰-۱۸۰ گرم) به صورت زیرجلدی تزریق گردید. رت های لویس استفاده شده خالص بوده و در مرکز حیوان خانه دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان نگهداری می شدند. این حیوانات نژادی از رت ها می باشند که در آزمایش های خودایمنی کاربرد فراوانی دارند. حیوانات در شرایط ۱۲ ساعت نور و ۱۲ ساعت تاریکی قرار داده شدند. آنها دسترسی آزادانه به آب و غذا داشتند و کلیه شرایط نگهداری استاندارد برای آنها اعمال شد.

دارو درمانی

در ۴۰ رت بیماری القاء و به صورت تصادفی در چهار گروه قرار داده شدند:

گروه یک: یک روز در میان نرمال سالین دریافت می کردند.

گروه دو: گروهی که به صورت یک روز در میان mg/kg ویتامین B12 را دریافت می کردند.

گروه سوم: گروهی که به صورت یک روز در میان mg/kg ویتامین B12 را دریافت می کردند.

گروه چهارم: گروهی که به صورت یک روز در میان $15 mg/kg$ ویتامین B12 را دریافت می کردند(۱۰).

ارزیابی کلینیکی

کوبالامین بر خلاف هم نمی تواند در بدن انسان تولید شده و از رژیم غذایی تهیه می گردد(۱). کوبالامین برای دو آنزیم در سلول های انسانی به عنوان کوفاکتور نقش اساسی دارد:

۱- میتونین سنتاز که هموسیستئین را به میتونین تبدیل می کند.

۲- متیل مالونیل کوانزیم A سنتاز که باعث تبدیل متیل مالونیل کوانزیم A به سوکسینیل کوانزیم A می شود(۱). اولین گزارشات درباره نقش ویتامین B12 در پاتوژنر بیماری MS بیش از سه دهه قبل صورت گرفته است ولی بیشتر این تحقیقات به دلیل مشکلات روش شناسی ضعیف باقی مانده است(۱۲). Misra و همکارانش در سال ۲۰۰۳ ضمن بررسی های صورت گرفته با MRI بر روی بیماران با کاهش ویتامین B12 و بیماران MS اعلام کردند که نواحی فاقد میلین در سیستم عصبی مرکزی هر دو گروه دارای تشابهات زیادی می باشند(۱۱). اختلالات عصبی ناشی از کمبود ویتامین B12 دارای نشانه هایی مثل میلین زدایی و مرگ اکسونی می باشد(۲۰). التهاب مزمن در بیشتر موارد با استرس های اکسیداتیو همراه بوده و این امر زمینه ساز بسیاری از بیماری های وابسته به سن مثل سرطان، آترواسکلروزیس، بیماری هایی همراه با تخریب سیستم عصب مرکزی و آرتریت می باشد(۳). Birch و همکارانش در سال ۲۰۰۹ گزارش کردند که مشتقات ویتامین B12 پاسخ های استرس اکسیداتیو را تعدیل نموده و بیماری های التهابی با افزایش سطح ترانس کوبال آمین ها همراه می باشد. آنها پیشنهاد کردند که مشتقات ویتامین B12 می تواند به عنوان مکمل در پاسخ های سلوالی به التهاب مورد استفاده قرار گیرد(۳). با توجه به نقش های احتمالی B12 در تعديل فرآیندهای التهابی - استرس اکسیداتیو و نقش آن در احیای میلین هدف از این مطالعه بررسی اثر استفاده از ویتامین B12 به عنوان

صورت روزانه مورد بررسی قرار می گرفتند و مطابق جدول یک به آنها امتیاز دهی شد(۱۸).

زمان تیمار ساعت ۱۰ صبح و به صورت یک روز در میان بود. روز تزریق ترکیب امولوسیونه به عنوان روز صفر بعد از تزریق (odpi) در نظر گرفته شد. حیوانات به

جدول ۱- امتیازات مربوط به شرایط کلینیکی رت‌ها

امتیاز	علائم و نشانه‌ها
۰	بدون نشانه و علامت
۱	دم فاقد کشیدگی طبیعی
۲	فلج دم
۳	فلج جزیی در اندام حرکتی عقبی
۴	فلج کامل پاها و فلچ جزیی دست‌ها
۵	فلج کامل پاها و فلچ کامل دست‌ها
۶	مرگ و میر

۱۵ mg از روز ۱۳ بود. افزایش بروز نشان‌ها به تدریج بیشتر گردیده و بروز کامل فلچ پاها در روز ۱۵ در گروه نرمال سالین مشهود بود و میانگین شدت بیماری در گروه‌های تحت درمان نسبت به گروه نرمال سالین به طور معنی داری کاهش پیدا کرده به طوری که این کاهش در گروه ۴ با دوز ۱۵mg/kg ویتامین B12 کاملاً معنی دار می‌باشد (نمودار ۱).

TNF-α نتایج مربوط به برسی سطوح سرمی TNF-α میزان TNF-α در سرم خون رت‌ها در گروه‌های مختلف با روش الیزا اندازه گیری و نتایج به دست آمده مشخص نمود که تیمار B12 موجب کاهش معنی دار میزان α TNF در گروه‌های تحت درمان می‌شود. این کاهش در دوز های ۱۰mg/kg و ۱۵mg/kg ویتامین B12 معنی دار ترمی باشد ($P \leq 0.05$) (نمودار ۲).

اندازه گیری میزان TNF-α


در روز ۱۴ بعد از تزریق امولوسیون، از حیوانات نمونه خون گرفته و پس از جدا سازی سرم‌ها میزان TNF-α آن‌ها با روش الیزا و با استفاده از کیت مخصوص تعیین TNF-α ساخت شرکت (Abcam) و مطابق با دستورالعمل کیت به شماره ab46070 اندازه گیری شد.

روش‌های آماری


تمام تست‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش Mann Whitney U- test قرار گرفت. $P \leq 0.05$ به عنوان سطح معنی دار بودن داده‌ها در نظر گرفته شده است.

نتایج

تأثیر ویتامین B12 روی شرایط کلینیکی رت‌های القا شده بعد از تزریق امولوسیون مورد نظر به رت‌ها در گروه‌های مختلف نشانه‌هایی مثل کاهش رفتارهای تغذیه‌ای و کاهش وزن بدن مشاهده گردید. از روز ۱۱ به بعد علایمی مثل فلچ دم، فلچ جزیی دست و پاها در گروه نرمال سالین دیده شد، در حالی که این نشانه هادر گروه با دوز



نمودار ۱- بررسی اثر ویتامین B12 بر روی شرایط کلینیکی گروه های مختلف مورد آزمایش



نمودار ۲- بررسی اثر B12 بر میانگین و انحراف از معیار میزان TNF-α در سرم گروه های مختلف

زمینه تحقیقات بر روی MS در این تحقیق ما جهت ارزیابی تاثیر حفاظتی B12 روی MS از مدل EAE استفاده گردید. یکی از موارد مهمی که در تحقیقات بر روی مدل های حیوانی MS مورد ارزیابی قرار می گیرد، مشاهده شرایط کلینیکی می باشد. هرچه شدت بیماری بیشتر شود، میزان بروز اختلالات حرکتی از جمله فلج کامل پاها و فلج کامل دستها هم در حیوانات تحت آزمایش، نمود بیشتری پیدا می کند. در این مطالعه هم افزایش شرایط بد کلینیکی در گروه نرمال سالین و کاهش شرایط یاد شده در گروه دریافت کننده ویتامین

بحث و نتیجه گیری

بیماری MS یک بیماری خود ایمنی سیستم عصب مرکزی است که نشانه های پاتولوژی آن شامل نفوذ ماکروفازها و لنفوسيت ها به سیستم عصب مرکزی، میلين زدایی، آسیب اکسونی می باشد(۵). در EAE و MS دیده شده است که میکرو گلیاهها و استروسيت ها در پاتولوژی بیماری دخالت دارند و تاثیرات خود را با ترشح مولکول هایی به عنوان واسطه های تخریب کننده بافتی نشان می دهند(۱۹). با توجه به شباهت و نزدیکی بین EAE و MS، همین طور کاربردهای فراوان در

همراه می باشد (۱۲). تأثیرات تنظیم کنندگی ایمنی ویتامین B12 بر تعديل فعالیت سیتوکین های TNF- α گزارش شده است. ناکارآیی کوبالامین در موازات این مکانیزم ها، می تواند بیماری MS را با بدتر کردن فرآیندهای التهابی، میلین زدایی، کند کردن دوباره روند میلین سازی و ترمیم آن، تشدید کند. از سوی دیگر فعال سازی و گسترش نابه جای سلول های ایمنی رقیب که تقاضای فرازینده ای از ویتامین B12 دارند و فرآیندهای میلین زدایی و التهابی مدام است که تکراری، تلاش برای دوباره میلین سازی و احیای مجدد آن مصرف ویتامین B12 را افزایش می دهد و ممکن است به نا کارآیی ویتامین B12 منجر شود (۸، ۱۷). در این مطالعه مشاهده گردید که در طی افزایش سطح B12 شرایط نامساعد کلینیکی در رت های EAE کاهش می یابد و خود نشان از اثر محافظتی B12 دارد. همه این موارد می تواند به خاطر خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی B12 باشد. خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی B12 احتمالاً نتیجه ای از ترکیب اثرات مستقیم و غیر مستقیم می باشد. این تأثیرات شامل تحریک فعالیت متیونین ستتاژ، واکنش مستقیم با اکسیژن Reactive Oxygen و نیتریک اکساید، تاثیر در ذخیره جزئی گلوتاتیون و تعديل کردن مولکول های پیام رسان می باشد و بدین جهت B12 دارای فعالیت آنتی اکسیدانی شاخص در جایگاه های فارماکولوژی بوده و موجب حفاظت های سلولی مهم علیه استرس های اکسیداتیو و التهاب می شود (۳). در پایان می توان بیان نمود که مصرف ویتامین B12 در بیماران ام اس می توان به عنوان یک درمان مکمل در کنار سایر درمان های لحاظ کرد.

B12 مشاهده گردید (۱۸، ۱۹). سیتوکین های TNF- α و ایتر فرون گاما از جمله سیتوکین های پس التهابی هستند که به وسیله سلول های T خود ایمنی ترشح شده و مستقیماً سد خونی مغزی را تخریب کرده و عاملی در جهت میلین زدایی محسوب می شود (۲). سطوح پلاسمایی TNF- α با شدت و سختی EAE و بیماری ام اس مرتبط بوده و بیان گر حالات ایمنی می باشد و افزایش TNF- α نمایان گر گسترش بیماری است (۱۶). با توجه به نقش TNF- α در گسترش بیماری و هدف درمانی آن در این مطالعه میزان آن در سرم رت های B12 گروه های مختلف بررسی شد. گروهی که ویتامین B12 را با دوز ۱۵ mg/kg ۱۵ کاهش معناداری نشان داده است. این نتایج در راستای مطالعاتی است که اعلام کرده اند B12 داری تأثیرات تنظیم کنندگی ایمنی می باشد و این تأثیرات شامل تعديل فعالیت سیتوکین های TNF- α است (۱۰، ۱۵). ناکارآیی و کمبود ویتامین B12 منجر به شکل گیری ناقص پوشش میلین شده و میزان متیلاسیون پروتئین MBP که جزء اصلی میلین سیستم عصب مرکزی می باشد به صورت ناقص انجام می شود. همین امر می تواند باعث شروع فرآیند خود ایمنی شده و ساختار میلین مورد هدف دستگاه ایمنی قرار گیرد (۶، ۱). گزارش گردیده که بیماری MS باعث گسترش نا به جای سلول های ایمنی می شود که همین امر افزایش نیاز به B12 را به وجود می آورد. فرآیند های میلین زدایی و در پی آن تلاش مجدد برای بازسازی میلین مصنف B12 افزایش می دهد که همه این موارد منجر به کاهش سطح سرمی آن در بیماران MS می شود (۱۴، ۱۱، ۶). وهمکارانش در سال ۲۰۰۹ نشان دادند که در طی روند بیماری ام اس احیای مجدد میلین با افزایش مصرف B12

منابع

1.Babior, B.M., Bunn, H.F., Braunwald, E., Fauci, A.S., Kasper, D.L., Hauser, S.L. (2001).

Harrison's principles of internal medicine, 15th ed. New-York: McGraw-Hill, 674-80.

- 2.**Bielekova, B., Martin, R. (2004). Development of biomarkers in multiple sclerosis. *Brain*, 127; 1463- 1478.
- 3.**Birch, C.S., Brasch, N.E., McCaddin, A., Williams, J.H.H. (2009). A novel role for vitamin B12; Cobalamins are intracellular antioxidant in vitro. *Biology and Medicine*, 47; 184-188.
- 4.**Blakemore, W.F. (2007). Regeneration review repair in MS: the view of experimental pathology. *J Neurological Sci*, 125 ;1-4.
- 5.**Chen, G.Q., Chen, Y.Y., Wang, X.S., Wu, S.Z., Yang, H.M., Xu, H.Q. (2010). Chronic caffeine treatment attenuates experimental autoimmune encephalomyelitis induced by guinea pig spinal cord homogenates in Wistar rats. *Brain Res*, 1309; 116 -124.
- 6.**Crellin, R.F, Bottiglieri, T., Reynolds, E.H. (1990). Multiple sclerosis and macrocytosis. *Acta Neurol Scand*, 81; 388-91.
- 7.**Ferguson, C., Sarlieve, L.I., Vincendon, G. (1990). Multiple sclerosis; review of main experimental data and pathogenic hypotheses. *Rev Med Intern*, 11; 201- 208.
- 8.**Hedrue, M.T., Gillett, A., Olsson, T., Jagodic, M. (2009). Characterization of multiple sclerosis candidate gene expression kinetics in rat experimental autoimmune encephalomyelitis. *Journal of Neuroimmunol*, 210; 30-39.
- 9.**Markelov, V., Ttushin, M. (2006). Bee venom therapy and low dose Naltrexone for treatment of MS. *Nepal Journal of Neuro Sci*, 3;71-77.
- 10.**Mastronardi, F.G., Min, W., Wang, H., Winer, S., Dosch, M., Boggs, J.M. (2004). Attenuation of experimental autoimmune encephalomyelitis and nonimmune demyelination by IFN-beta plus vitamin B12: treatment to modify notch-1/sonic hedgehog balance. *J Immunol*, 172; 6418-26.
- 11.**Misra, U.K., Kalita, J., Das, A. (2003). Vitamin B12 deficiency neurological syndromes: a clinical MRI and electrodiagnostic study. *Clin Neurophysiol*, 43; 57-64.
- 12.**Miller, J.W. (2002). Vitamin B12 deficiency, tumor necrosis factor-alpha, and epidermal growth factor: a novel function for vitamin B12?. *Nutr Rev*, 60;142-4.
- 13.**Najim, A. D., Khojali, M., Habbash, H., Farah, S. (1999). Macrocytosis in multiple sclerosis: a study in 82 de novo Arab patients. *J Neurol Neuro Surg Psychiatry*, 54; 415-6.
- 14.**Oh, R., Brown, D.L. (2003). Vitamin B12 deficiency. *Am Fam Physician*, 67; 979-86.
- 15.**Pitt, D., Nagel Meier, I. E., Wilson, H. C., Raine, C. (2003). Glutamate uptake by oligodendrocytes : Implications for excitotoxicity in MS. *Neurology*, 61; 1113-1120.
- 16.**Pollak, Y., Ovadia, H., Orion, E., Weidenfeld, J., Yirmiya, R. (2003). The EAE-associated behavioral syndrome: I Temporal correlation with inflammatory mediators. *J of Neuroimmunol*, 137; 94-99.
- 17.**Scherer, K. (2003). Neurologic manifestations of Vitamin B12 deficiency. *NEJM*, 348; 2208-2214.
- 18.**Schnider, C., Shuetz, G., Zollner, T.M. (2009). Acute neuro inflammation in Lewis rats. A model for acute multiple sclerosis relapses. *J of Neuroimmunol*, 213; 84 – 90.
- 19.**Smith, T., Groom, A., Zhu, B., Turski, L. (2000). Auto immune encephalomyelitis ameliorated by AMPA antagonists. *Nat Med*, 6; 62-66.
- 20.**Son, D.J., Lee, J.W., Lee, Y.H., Song, H.S., Lee, C.K., Hong, J.T. (2007). The therapeutic application of anti arthritis, pain -releasing, and anti cancer effects of bee venom and its constituent compounds. *Pharmacol & Therap*, 115; 246-270.