

تأثیر ویتامین ریبووفلاوین(B2) بر رشد و شاخص های ایمنی بچه ماهی شیپ (*Acipenser nudiventris*)

علیرضا عاشوری^۱، میرحامد سید حسنی^۲، اسماعیل حسین نیا^۱

۱- کارشناس ارشد شیلات، ایستگاه تحقیقات تاسماهیان دریای خزر چابکسر، گیلان، ایران.

۲- کارشناس ارشد شیلات، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، بخش آبریز پروری، گیلان، رشت، ایران.

تاریخ دریافت: ۹۴/۱۰/۴ تاریخ پذیرش: ۹۴/۱۲/۵

چکیده

مقدمه و هدف: در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف ویتامین ریبووفلاوین بر شاخص های رشد، هماتولوژی و ایمنی بچه ماهی شیپ مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار: تعداد ۱۲۰ عدد بچه ماهی شیپ با وزن ابتدایی ($30/6 \pm 1/28$ گرم) با ۴ جیره غذایی (پروتئین: ۴۹ درصد، چربی: ۱۴ درصد و انرژی: ۲۱/۱ مگاژول در هر کیلوگرم) با الحاق ریبووفلاوین در سطوح ۰، ۱۵ و ۲۰، ۲۵ میلی گرم / کیلوگرم (RB_{20} , RB_{15} , RB_0) به مدت ۸ هفته تا حد سیری مورد تغذیه قرار گرفتند. بیومتری در فواصل ۱۵ روز انجام گرفت. در پایان دوره تغذیه از ماهیان نمونه خون گرفته و جهت سنجش شاخص های ایمنی به آزمایشگاه ارسال شد.

یافته ها: الحاق ریبووفلاوین به جیره موجب افزایش معنی دار وزن نهایی در مقایسه با تیمار شاهد گردید ($0/05$ p). درصد افزایش وزن و ضریب رشد و پیله در ماهیان تغذیه شده با جیره ۲۰ میلی گرم ریبووفلاوین در کیلوگرم (RB_{20}) به طور معنی داری بیش از ماهیان تیمار شاهد و ماهیان این گروه آزمایشی بیشترین نسبت بازده پروتئین و کمترین ضریب تبدیل غذا را دارا بودند ($0/05$ p). هم چنین نتایج بیان گر این نتکته می باشد که ریبووفلاوین اضافه شده به جیره بر سیستم ایمنی ماهیان تأثیر گذارد است، به نحوی که تعداد گلوبول سفید و فعالیت کامپلایمنت CH_{50} در ماهیان تغذیه شده از جیره الحاقی ریبووفلاوین به میزان ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم (RB_{20}) به طور معنی داری بر ماهیان تیمار شاهد برتیری دارد ($0/05$ p).

نتیجه گیری: نتایج این آزمایش نشان می دهد که افزودن ریبووفلاوین به جیره فرموله شده تاسماهی شیپ اثرات سودمندی بر شاخص های رشد و سیستم ایمنی این گونه دارد.

واژه های کلیدی: تاسماهی شیپ، ریبووفلاوین، شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذا، سیستم ایمنی.

مقدمه

گونه عده پرورشی در این مزارع عمدتاً فیلماهی، تاسماهی سیری و در کنار آن ها تاسماهی شیپ است (۱). یکی از اهداف تولید کنندگان ماهیان پرورشی جهت رسیدن به صرفه اقتصادی، کاهش مرگ و میر و تلفات بچه ماهیان، بالا بردن سرعت رشد و تولید بیشتر در واحد سطح است (۲۵)، که رشد بهینه ارتباط نزدیکی به نوع غذا و کیفیت مواد غذایی مورد استفاده آن دارد (۱۸). متأسفانه در پرورش ماهیان سرداری و ماهیان خاویاری، بیشترین توجه بر مواد کلان غذایی (ماکرونوترینت ها) متمرکز و توجهی به عناصر خرد

صنعت پرورش ماهیان خاویاری در کشور ما صنعتی جوان، اما به سرعت در حال توسعه است، تا قبل از سال ۱۳۸۸ پرورش تاسماهیان در مقیاس تجاری صورت نمی گرفت. در این سال تنها ۲۰ تن گوشت تولید گردید، اما با افزایش صدور پروانه های بهره برداری و استقبال عمومی، میزان تولید گوشت و خاویار به ترتیب از سال ۹۱ به ۹۲ از ۴۵۶ به ۶۰۰ تن و از ۴۰۰ به ۱۲۰۰ کیلوگرم افزایش یافت، در حال حاضر تعداد ۴۵ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور مشغول به کار بوده و قادر به تولید ۳۴۷۸ تن گوشت و بیش از ۱۵ تن خاویار می باشند.

های مختلف ماهیان می توان به بیماری های چشمی، رنگ غیرعادی پوست، کم خونی، کوتاه شدن سرپوش آبششی و خوردگی باله^(۱۶)، تجمع چربی و دژنره شدن لوزالمعده با رسوب ملاتین در سیم دریابی^(Aurata Sparus)^(۳۶) اشاره نمود، در صورتی که در ماهی کپور معمولی این عوارض شامل خون ریزی در لوزالمعده می باشد^(۵). هم چنین گزارشاتی در دست است که به دلیل خاصیت انرژی زایی ریبوفلاوین، الحاق این ویتامین به جیره غذایی کپور معمولی^(۴۱)، گربه ماهی کاناال^(۴۵) و ماهی باس طلایی^(۱۰) موجب بهبود شاخص های رشد، کارایی غذا و نسبت بازده پروتئین در این ماهیان شده است. علاوه بر نقش کوآنزیمی ویتامین ریبوفلاوین، مطالعات انجام شده در آزاد ماهی اقیانوسی^(Salmo salar L) بر این نکته دلالت داشت که با کاهش غلظت ویتامین های گروه B کارکرد سیستم ایمنی در این گونه به شدت به خطر می افتد^(۴۹،۴۴). بنابراین از آن جایی که درصد تلفات ماهی شیپ تغذیه شده با جیره تجاری متداول در مقایسه با سایر گونه های پرورش داخل کشور (تاسماهی سیری و فیلماهی) بالاتر بوده و پرورش دهنده کان از این گونه جهت پرورش کمتر استقبال می کنند، این آزمایش به منظور بررسی تاثیر افزودن مکمل ریبوفلاوین^(۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ میلی گرم / کیلو گرم) بر شاخص های رشد و سیستم ایمنی این گونه در یک دوره ۸ هفتگی به مرحله اجرا درآمد.

مواد و روش ها

تهیه ریبوفلاوین و اجزای اولیه غذایی

ریبوفلاوین از شرکت پدیده کالای باستان تهران (هر کیلو گرم رومیت حاوی ۴۰۰۰ میلی گرم ریبوفلاوین)، پودر ماهی، پودر گوشت و روغن ماهی از شرکت پودر ماهی خزر - کیا شهر، پرمیکس ویتامینی و پرمیکس معدنی از شرکت سیانس - قزوین، لستین سویا

غذایی نظیر ویتامین ها نگردیده و تصور بر این است که وجود آن ها در غذا اضافه و به طور طبیعی از مواد خام به کار رفته در غذا تامین می گردد^(۷، ۱۹)، اما وجود ویتامین ها به میزان کافی در پرورش متراکم ضروری بوده و در تراکم های بالای پرورش که مواد غذایی طبیعی فقط برای حفظ حیات جمعیت کفایت می کنند و یا به طور کل موجود نمی باشد، افزودن ویتامین به جیره از اهمیت خاصی برخوردار است^(۱۵، ۴۳)، اما مدارک مستندی در دست است که سطوح میکرونوترینت ها در مواد خام به کار رفته در جیره غذایی (آرد ماهی، آرد گوشت و کنجاله های گیاهی) متغیر و از اندازه ماهی، سن، روند رشد و سلامتی، فاکتورهای محیطی و فعل و اتفاعات غذایی تاثیر می پذیرد^(۱۱، ۳۱). از سوی دیگر چند سالی است که به منظور کاهش هزینه غذاء، از جیره های پرانرژی (حاوی ۲۵ تا ۲۸ درصد لیپید) در تغذیه ماهیان سردابی^(۱۶) و ماهیان خاویاری^(۳۴) استفاده می شود، بنابراین، با اعمال تغییرات عمدی در جیره غذایی ماهیان خاویاری در سالیان اخیر (معرفی غذاهای پرانرژی) ضرورت تعیین نیازمندی ویتامین ها و تاثیر الحاق آن ها بر روند رشد و شاخص های فیزیولوژیک این ماهیان را پیش از پیش گوش زد می نماید. ریبوفلاوین مولکولی با رنگدانه زرد است که به عنوان بخشی از گروه آنزیمی به نام فلاوپروتئین ها عمل می کند. فلاوین مونو نوکلئوتید(FMN) و فلاوین آدنین دی نوکلئوتید(FAD) دو کوآنزیم مهم از ریبوفلاوین ها هستند که در واکنش های اکسیداسیون - احیای موثر در آزادسازی انرژی از سلول^(۳)، تجزیه پیروات، اسیدهای چرب و آمینواسیدها و در فرآیند انتقال الکترون ها شرکت داشته^(۵۲) و به تبع آن نقش مهمی در متابولیسم اسیدهای چرب، کربوهیدرات و پروتئین دارند^(۱۰). عارضه های کمبود ریبوفلاوین در ماهیان شامل کم خونی و رشد ضعیف است^(۳۱). از دیگر عوارض کمبود ریبوفلاوین در گونه

تعداد ۱۴۰ عدد ماهی شیپ با وزن اولیه ۲۵ ± 2 گرم از موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر به سایت چابکسر انتقال و در وان های فایبر گلاس ذخیره و به منظور سازگاری با شرایط جدید با جیره بیومار فرانسه به مدت ۲ هفته تغذیه شدند. پس از طی این دوره تعداد ۱۲۰ عدد ماهی با متوسط وزن $۳۰/۶\pm ۱/۲۸$ گرم انتخاب و به صورت تصادفی بدون دارا بودن اختلاف معنی دار آماری در شاخص وزن در ۱۲ وان فایبر گلاس دوتنی آبگیری شده با مخلوطی از آب چاه و رودخانه، مجهز به سیستم هوادهی و ریتم فتوپریود ۱۲ ساعت روشنایی و تاریکی رهاسازی ($۰/۰۵$ P) و به مدت ۸ هفته روزانه به میزان ۳ تا ۵ درصد وزن بدن (تا حدسیری) در سه نوبت (ساعات ۸، ۱۶ و ۲۱) با جیره غذایی (ارائه شده در جدول ۱) تغذیه شدند. هم چنین در فواصل ۱۵ روزه با محلول گل میخک بیهوش و با استفاده از یک خط کش چوبی و ترازوی دیجیتال با دقیقه ۱/۰ گرم مورد زیست سنجه قرار گرفتند و بر اساس وزن به دست آمده میزان غذای داده شده برای ۱۵ روز بعد تنظیم گردید. در پایان دوره تغذیه پس از گذشت ۲۴ ساعت، از ۳۰ درصد جمعیت ماهیان با استفاده از سرنگ های ۲ سی سی از باله دمی خون گیری به عمل آمد و نمونه های خون به تیوب های اپندروف آغشته به ماده ضد انعقاد خون (هپارین) ریخته، به آزمایشگاه فیزیولوژی مؤسسه Heraeus Labofuge 12 sepatach آلمان، با دور ۳۰۰۰ در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ (مدل B₂) در دستگاه AOAC، ۱۹۹۵ حاصل به آزمایشگاه دکتر فدایی رشت جهت بررسی شاخص های هماتولوژیک و ایمنی منتقل شدند.

آالیز شیمیایی و آماری

آنالیز بیوشیمیایی جیره و مواد غذایی با استفاده از دستورالعمل کتابچه Analytical Chemists, AOAC, 1995 تعیین گردید،

از شرکت ارس بازار و نشاسته گندم و ذرت از قنادی های محلی خریداری شد.

فرمولاسیون و ساخت غذا

براساس انرژی آزاد شده از اجزای اولیه غذایی (پروتئین: ۵/۶۵، چربی: ۹/۵ و کربوهیدرات: ۴/۱) کیلوکالری بر گرم) و با استفاده از برنامه ریزی خطی در Excel، ۴ جیره غذایی با سطوح پروتئین و انرژی یکسان (۴۹ درصد پروتئین و ۱۷/۵ مگاژول انرژی در کیلو گرم) ساخته شد، پودر ماهی، پودر گوشت و پودرخون به عنوان منبع پروتئین، روغن ماهی و روغن ذرت به عنوان منبع چربی و نشاسته ذرت و گندم به عنوان منبع کربوهیدرات به کار رفت (۵۱). پرمیکس ویتامینی دارای مقادیر ناچیزی ریبوفلاوین به عنوان منبع تامین کننده ویتامین کننده ویتامین و پرمیکس معدنی تامین کننده نیازهای معدنی ماهی بود. جهت ساخت غذا ابتدا اجزای درشت (پودر ماهی، پودر گوشت، پودرخون، نشاسته ذرت و گندم) در دستگاه آسیاب (Damicar Co., Tehran, Iran)، آسیاب و سپس با اجزای تر (شامل روغن ماهی و روغن گیاهی) مخلوط و به خوبی میکس شدند (۲۲). سپس اجزای خرد غذا (پرمیکس ویتامینی و معدنی، لستین سویا و سلوزلز) با یک همزن بر قی مخلوط (Pooya Nootash Machinery Co, Mashhad) و به مخلوط قبلی اضافه و آسیاب گردید. سپس ریبوفلاوین در مقادیر مورد نظر (۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ میلی گرم در کیلو گرم) براساس تحقیقات انجام شده در مورد تعیین حد بهینه ویتامین B₂ (۵) در یک لیتر آب مقطر محلول و به مخلوط قبلی اضافه و به خوبی با یک همزن مکانیکی هم زده و سپس با استفاده از دستگاه پلت زن (California Pellet Mill Co Sanfranciso, CA) با توجه به اندازه دهان ماهی به قطر ۲ میلی متر تبدیل شد. یک ساعت پیش از توزیع غذا در وان ها جیره های ساخته شده از فریزر خارج و در دمای اتاق نگهداری و به ماهیان داده شد.

تهیه بچه ماهیان و شرایط پرورش

جیره پایه با استفاده از دستگاه CECIL-HPLC(مدل 1100 SERES) به روش اسپکتروفوتومتری تعیین شد(۹).

تجزیه و تحلیل آماری

به منظور بررسی توزیع نرمال داده ها در گروه ها و تکرارها جهت تشکیل تیمارها از آزمون Kolmogorov-Smirnov استفاده شد. به منظور مقایسه آماری داده های حاصل از شاخص های رشد، و شاخص های سیستم ایمنی، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (One-way Anova) و جهت مقایسه گروه ها با یک دیگر از آزمون دانکن استفاده گردید، کلیه آنالیز های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ صورت گرفت. با انجام زیست سنجی های یک ماهه و با توجه به اطلاعات به دست آمده از طول و وزن ماهیان، شاخص های رشد و ضربیت تبدیل غذای ماهیان براساس فرمول های زیر محاسبه شد. (Ronyai et al., 1990; Xue et al., 2006 ; Hung et al., 1989)

$$K = (BWF / TL^3) \times 100$$

K: درصدشاخص وضعیت، BWF : متوسط وزن نهایی(گرم)، TL: طول کل (سانتی متر)

$$BWI = (BWf - BWi) / BWi \times 100$$

BWI: درصد افزایش وزن بدن، BWF: متوسط وزن

نهایی (گرم)، BWi: متوسط وزن اولیه (گرم)

$$F.C.R = F / (Wt - W0)$$

F.C.R: ضربیت تبدیل غذاء، F: مقدار غذای مصرف شده توسط ماهی، W0 : میانگین بیوماس اولیه (گرم)،

Wt: میانگین بیوماس نهایی (گرم)

$$S.G.R = (\ln Wt - \ln W0) / t \times 100$$

T: دوره زمانی(روز)، Wt: میانگین بیوماس نهایی (گرم)، W0: میانگین بیوماس اولیه (گرم)

$$PER = (Bwf - Bwi) / protein intake$$

BWF: متوسط وزن اولیه (گرم)، BWi: متوسط وزن

نهایی)، Protein intake: کل پروتئین مصرفی هر ماهی(گرم)

بر این اساس ماده خشک با سوزاندن در دمای ۱۰۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت (AOAC Official Method 930.15 ، 1995) پروتئین خام با استفاده از روش کجلدا ل درسه مرحله هضم، تقطیر، تیتراسیون و ضرب نمودن ازت به دست آمده از هر گرم ماده خشک (AOAC Official Method 975.05 ، ۶/۲۵) (1995)، خاکستر مواد با سوزانده شدن در کوره الکتریکی مدل (P1 Model, Made in England Muffle Furances, RHF 16/3/3216 در دمای ۵۵۰ درجه سانتی گراد (AOAC Official Method 942.05, 1995)، چربی خام با استخراج چربی بروش سوکسله با استفاده از حلال اتر با رسیدن به نقطه جوش ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴ تا ۶ ساعت (AOAC Official Method 932.02 ، 1995) در استخراج کننده (Gerhart soxhoterm Made in Germany) سوکسله SOX ، Model، اندازه گیری و انرژی کل با استفاده از بمب کالری متر (Bak model, Made in USA) به دست آمد(۴). نمونه های خون به آزمایشگاه فیزیولوژی موسسه Montcell و توسط سانتریفیوژ (Heraeus sepatch company, Lebofuge model, Made in Germany) در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ گردید تا سرم خون جدا گردد، شمارش گلوبول های سفید (WBC) با استفاده از لام هموسیتو مترا نوبار با استفاده از لنز ۴۰ و با لنز ۲۰ نیکون میکروسکوپ نوری نیکون مدل E600 شمارش شد(۲۳). لیزوژیم ها، کمپلامنت، CH₅₀ و توتال ایمونو گلوبین پلاسمای با استفاده از دستگاه Auto Analyzer ,Technicon Made in USA) (Technicon R.A.1000) و کیت های پارس آزمون نوع ILT و ISC مورد سنجش قرار گرفت و مقدار ویتامین در

جدول ۱- اجزا و ترکیب شیمیایی جیره های غذایی (n=۳)

اجزای غذایی	شماره جیره (%)	RB ₂₅	RB ₂₀	RB ₁₅	RB ₀
آرد ماهی ^۱	۴۹/۸	۴۹/۸	۴۹/۸	۴۹/۸	۴۹/۸
پودر گوشت ^۲	۸	۸	۸	۸	۸
پودر خون ^۳	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۳/۵
نشاسته ذرت	۱۱/۰	۱۱/۰	۱۱/۰	۱۱/۰	۱۱/۰
نشاسته گندم	۱۱/۰	۱۱/۰	۱۱/۰	۱۱/۰	۱۱/۰
مخمر	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰
روغن ماهی	۳/۰	۳/۰	۳/۰	۳/۰	۳/۰
روغن ذرت	۳/۰	۳/۰	۳/۰	۳/۰	۳/۰
لستین	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰
پتافین	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰
پرمیکس ویتامینی	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰
پرمیکس معدنی	۱	۱	۱	۱	۱
سلولز	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷
ربیوفلاوین	۲۰	۲۰	۱۵	۰	۰
جمع کل	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
ترکیب شیمیایی (%)		۹۴/۸	۹۴/۵	۹۴/۱	۹۳/۶
ماده خشک		۴۸/۰	۴۹/۰۸	۴۸/۸۵	۴۹/۰۶
پروتئین		۱۲/۲۰	۱۲/۲	۱۲/۶۸	۱۲/۳۵
چربی		۱۰/۶	۱۰/۴	۱۰/۵	۱۰/۶
خاکستر		۳/۰	۳/۰۶	۳/۰۰	۳/۱۵
فیبر		۱۹/۰۱	۱۸/۸۳	۱۸/۵	۱۸/۵
کربوهیدرات		۱۸/۵۸	۱۸/۵۴	۱۸/۴۸	۱۸/۶۳
انرژی کل (مگاژول بروکیلوگرم)	۱۸/۵۸	۱۸/۵۴	۱۸/۴۸	۱۸/۶۳	۱۸/۶۳

- آرد ماهی: ۶۱٪ درصد پروتئین، ۲- پودر گوشت: ۴۸٪ درصد پروتئین، ۳- پروتئین کنسانتره سویا: ۶۸٪ درصد پروتئین، ۴- نشاسته ذرت ۱۳٪ پروتئین، ۵- نشاسته گندم: ۱۱٪ پروتئین، ۶- ویتامین پرمیکس (بر حسب IU یا میلی گرم در کیلوگرم): د- ال- آلفا توکوفول استات ۶۰ ای. بو- ال - کولکلیسفورول ۳۰۰۰ ای. بو. تیامین ۱۵ میلی گرم در کیلوگرم، ریبو فلافاوین ۵ میلی گرم در کیلوگرم، پیرو دوکسین ۱۵ میلی گرم در کیلوگرم، ویتامین B12 ۰/۰۵ میلی گرم در کیلوگرم، نیکوتینیک اسید ۱۷۵ میلی گرم در کیلوگرم، اسید فلیک ۵ میلی گرم در کیلوگرم، اسید فلیک ۵۰۰ میلی گرم در کیلوگرم، اینوزیتول ۱۰۰۰ میلی گرم در کیلوگرم، بیوتین ۰/۵ میلی گرم در کیلوگرم، کلسیم پنتوئات ۵۰ میلی گرم در کیلوگرم، کولین کلرايد ۲۰۰۰ میلی گرم در کیلوگرم.

نتایج

ربیوفلاوین در جیره، شاخص های وزن نهایی و ضریب چاقی ماهیان در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی داری روند صعودی را نشان داد، به طوری که تاسماهیان شیپ تغذیه شده از جیره ۲۰٪ میلی گرم در کیلوگرم

الف: تاثیر مکمل های ربیوفلاوین بر شاخص های رشد و ضریب تبدیل غذای تاسماهی شیپ نتایج حاصل از تاثیر مکمل های ربیوفلاوین بر شاخص های رشد و ضریب تبدیل غذای ماهیان در جدول ۲ آورده شده است. با افزایش سطوح مکمل

بود($P < 0.05$). هم چنین افزودن مکمل ریبوفلاوین به میزان ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم موجب گردید که ضریب تبدیل غذا در ماهیان این تیمار(20.36 ± 0.017) به طور معنی داری در مقایسه با تیمار شاهد بهبود یابد($P < 0.05$). مطلوب ترین نسبت بازده پروتئین به میزان(0.86 ± 0.006) در ماهیانی مشاهده شد که از جیره ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم مکمل ریبوفلاوین) تغذیه نموده بود که دارای اختلاف معنی دار آماری با تیمارهای دیگر بود($P < 0.05$). نتایج حاصل از تاثیر مکمل های ریبوفلاوین بر شاخص های رشد و ضریب تبدیل غذای ماهیان در جدول ۳ آورده شده است.

جدول ۲- تأثیر مکمل های ریبوفلاوین بر شاخص های رشد و ضریب تبدیل غذای تاسماهیان شیپ در یک دوره ۸ هفته ای

شاخص ها	جیره ۱ (RB ₀)	جیره ۲ (RB ₁₅)	جیره ۳ (RB ₂₀)	جیره ۴ (RB ₂₅)
وزن اولیه (W ₁) (گرم)	۲۹.۳۷ $\pm ۲.۶۵^a$	۳۰.۸۵ $\pm ۰.۲۱^a$	۳۰.۸۵ $\pm ۰.۰۷^a$	۳۱.۳۵ $\pm ۰.۴۲^a$
وزن نهایی (W ₂) (گرم)	۵۱.۲ $\pm ۰.۲۸^c$	۶۰.۶۵ $\pm ۰.۲۱^b$	۷۲.۵ $\pm ۰.۱۴^a$	۶۰.۸۵ $\pm ۰.۸۷^b$
(سانتی مترا) (TL ₁)	۲۱.۵ $\pm ۰.۴۲^a$	۲۱.۳۲ $\pm ۰.۴۲^a$	۲۱.۴۷ $\pm ۰.۱۷^a$	۲۱.۳۶ $\pm ۰.۴۱^a$
(سانتی مترا) (TL ₂)	۲۴.۳ $\pm ۰.۰۵^d$	۲۵.۲ $\pm ۰.۰۷^b$	۲۹.۷۵ $\pm ۰.۱۴^a$	۲۴.۸۷ $\pm ۰.۰۵^d$
(K)	۰.۳۵ $\pm ۰.۰۰۵^d$	۰.۳۷ $\pm ۰.۰۰۱^c$	۰.۳۳ $\pm ۰.۰۰۵^d$	۰.۴۰ $\pm ۰.۰۰۵^b$
(WG)	۷۵.۰۵ $\pm ۱۶.۷۶^b$	۹۶.۵۸ $\pm ۰.۶۶^b$	۱۳۵.۰۲ $\pm ۰.۸^a$	۹۴.۰۹ $\pm ۰.۱۴^b$
(SGR)	۰.۹۲ $\pm ۰.۱۵^b$	۱.۱ $\pm ۰.۰۹^b$	۱.۴۲ $\pm ۰.۱^a$	۱.۱ $\pm ۰.۰۱۲^a$
(FCR)	۳.۷۸ $\pm ۰.۶۰^a$	۳.۰۵ $\pm ۰.۱۲^{ab}$	۲.۷۶ $\pm ۰.۰۱۷^b$	۳.۱ $\pm ۰.۰۲^{ab}$
(PER)	۰.۵۵ $\pm ۰.۰۰۸^b$	۰.۶۶ $\pm ۰.۰۰۱^b$	۰.۸۶ $\pm ۰.۰۰۶^a$	۰.۶۳ $\pm ۰.۰۰۶^b$

اعداد با حروف مشابه دارای اختلاف معنی دار آماری نیستند($P > 0.05$).

ب: تأثیر مکمل های ریبوفلاوین بر شاخص های سیستم ایمنی بچه تاسماهی شیپ

مکمل های ریبوفلاوین به طور معنی داری موجب بهبود شاخص های ایمنی در این گونه گردیدند. به طوری که تعداد گلbul سفید در تاسماهیان شیپ تغذیه شده از جیره RB₂₀ ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم ریبوفلاوین) در مقایسه با تعداد گلbul های سفید ماهیان تغذیه شده با جیره فاقد مکمل به طور معنی داری افزایش یافت($P < 0.05$). هم چنین غلظت لیزورزیم پلاسمای ماهیان تغذیه شده با جیره RB₂₀ ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم ریبوفلاوین) به طور معنی داری بر تیمارهای

دیگر برتری داشت($P < 0.05$). فعالیت کامپلایمنت CH₅₀ پلاسمای ماهیان تحت تاثیر مکمل های ریبو فلاوین بود. بیشترین مقدار آن در ماهیان تیمار RB₂₀ ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم ریبوفلاوین) ثبت گردید که دارای برتری معنی دار آماری با تیمارهای دیگر بود($P < 0.05$), هرچند که با افزودن مکمل ریبوفلاوین به جیره مقادیر عددی ایمونو گلوبین کل افزایش یافت، اما اختلاف معنی داری در تیمارهای آزمایشی مشاهده نگردید($P > 0.05$)(جدول ۳).

جدول ۳- تأثیر مکمل های ریبو فلاوین بر شاخص های سیستم ایمنی بچه تاسماهی شیب در یک دوره ۸ هفته ای

(RB ₂₅)	(RB ₂₀)	(RB ₁₅)	(RB ₀)	شاخص ها
۶/۶۶±۲/۹۱ ^b	۸/۰۶±۲/۵۱ ^a	۶/۴۶±۲/۵۵ ^a	۷/۷۲±۲/۷ ^a	گلبول سفید (میلی گرم/دسی لیتر)
۶۰/۰۰±۱۶/۲۸ ^a	۴۷/۰۰±۱۴/۴۲ ^a	۵۷/۰۰±۲۱/۷ ^a	۴۲/۰۰±۱۱/۷ ^a	ایمونو گلوبین کل (میلی گرم/دسی لیتر)
۸/۱±۱/۵ ^c	۴۹/۳۳±۱۰/۲۹ ^a	۱۴/۲۳±۳/۶۶ ^c	۳۲/۱±۴/۰ ^b	لیزوژنیم (U/ML/MIN)
۸/۱±۱/۵ ^c	۴۹/۳۳±۱۰/۲۹ ^a	۱۴/۲۳±۳/۶۶ ^c	۳۲/۱±۴/۰ ^b	کمپلایمنت (%) ACH ₅₀

اعداد با حروف مشابه دارای اختلاف معنی دار آماری نیستند (P > 0.05).

ریبو فلاوین به ۴/۲۲ میلی گرم در کیلو گرم، شاخص های درصد افزایش وزن و ضریب رشد ویژه در این گونه به طور معنی داری بهبود یافت. در آزمایش حاضر نیز با افزایش سطوح ریبو فلاوین تا سطح ۲۰ میلی گرم در کیلو گرم در جیره، علاوه بر آن که میزان ضریب تبدیل خذا کاهش یافته، شاخص های ضریب رشد ویژه و درصد افزایش وزن به طور معنی داری بهبود یافت که احتمالاً به دلیل تاثیر گذاری ریبو فلاوین الحقی بر میزان فعالیت آنزیم های گوارشی است که وظیفه هضم و جذب مواد غذایی را بر عهده دارد(۲۹). نتایج Li و همکاران (۲۷)(۲۰۱۰) بر این نکته دلالت داشت که فعالیت تریپسین، لیپاز و آلفا آمیلاز در دستگاه گوارش با افزایش مکمل ریبو فلاوین در جیره Jian carp (Cyprinus carpio Var. Jian) افزایش یافته و افزایش فعالیت تریپسین، لیپاز و آلفا آمیلاز در دستگاه گوارش ماهیان منجر به افزایش روند رشد و بهبود شاخص های لوزالمعده ماهیان تغذیه شده با ریبو فلاوین خواهد گردید. اگرچه ماهیان خاویاری دارای سیستم گوارشی پیش رفته ای هستند(۸)، اما لوزالمعده در این ماهیان نقش مهمی در هضم و جذب غذا داشته و هایپرتروفی لوزالمعده و هایپرپلازی ممکن است بر فعالیت آنزیم های پروتئاز، لیپاز و فعالیت آمیلاز تاثیر و در نتیجه بر هضم پروتئین تاثیر منفی داشته باشد(۵۳). در گونه های دیگر نیز کاهش فعالیت آنزیم های هضم کننده غذا ارتباط مستقیمی با شاخص های رشد دارد و بنابراین می توان توضیح داد که چرا نتایج به دست آمده در مورد ماهی

بحث و نتیجه گیری
ویتامین A و سایر ویتامین های محلول در آب نظری ویتامین های گروه B نقشی مهم در متابولیسم سلولی داشته و در این میان ویتامین های گروه B به عنوان کواآنزیم عمل نسوده و نقش مهمی در متابولیسم کربوهیدرات، پروتئین و چربی ایفا می نمایند(۲۵). هم چنین ریبو فلاوین در کاهش فعل و انفعال های اکسیداسیون مشارکت داشته که برای همه جانوران ضروری است(۱۰). در این آزمایش با افزایش سطوح مکمل ریبو فلاوین در جیره، شاخص های وزن نهایی و ضریب چاقی ماهیان در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی داری روند صعودی را نشان داد، هم چنین افزودن مکمل ریبو فلاوین به میزان ۲۰ میلی گرم در کیلو گرم موجب گردید که ضریب تبدیل غذا در ماهیان این تیمار به طور معنی داری در مقایسه با تیمار شاهد بهبود یابد (P > 0.05). با افزایش ریبو فلاوین به میزان ۲۰ میلی گرم در کیلو گرم، شاخص های افزایش وزن (WG) و ضریب رشد ویژه (SGR) به طور معنی داری بهبود یافتند که همانگونه با نتایج به دست آمده در مورد تاثیر ریبو فلاوین بر بهبود این شاخص ها در کپور معمولی (۴۱)، ۵، ۵، ۴۵) گریه ماهی کاتال (۴۵) و ماهی باس طلایی (۱۰) می باشد، نتایج مشابهی نیز از Li و همکاران (۲۷)(۲۰۱۰) گزارش شده است که شاخص های رشد و اریته ای از کپور معمولی با نام Jian carp (Cyprinus Carpio Var. Jian) از جیره های ریبو فلاوین تاثیر پذیرفته و ارتباط نزدیکی میان میزان جذب غذا و درصد افزایش وزن و ضریب رشد ویژه داشته، به طوری که با افزایش

خونی و بخشی از دستگاه ایمنی بدن به شمار آمده و بدن را از بیماری‌های عفونی محافظت می‌کنند (۵۰)، مطالعات انجام شده در مورد لوکوسیت‌ها یا گلbulو های سفید در گونه قزل‌آلای رنگین کمان نشان داده که افزایش گلbulو های سفید در خون به عنوان شاخص فعالیت سیستم دفاعی در بدن ماهیان به شمار می‌آید (۴۲، ۵۰). پاره‌ای از مطالعات نشان داده که افزودن مکمل ویتامین E موجب افزایش معنی دار تعداد گلbulو های سفید در گونه تیلاپیای نیل (*Oeochromis niloticus*) گردیده و موجب تقویت و پایداری ماهی در شرایط پرورش متراکم همراه با بار باکتریایی و کیفیت نامناسب آب شده است (۲۱) که همانگ با نتایج به دست آمده در این آزمایش است. لیزوژیم یک آنزیم باکتری کش است که به طور گسترده‌ای در بدن و قسمتی از مکانیسم سیستم دفاعی غیراختصاصی در بسیاری از جانوران از جمله ماهیان وجود دارد. در آزاد ماهیان، لیزوژیم در سرم خون، ترشحات، لایه موکوس و بافت‌های غنی از لوکوسیت‌ها عمدتاً در کلیه و دستگاه گوارش یافت می‌شود (۱۳، ۲۷)، کارکرد باکتریایی این آنزیم در گیرشدن در هیتلرولیز پیتیلدو گلیکون‌های دیواره سلولی باکتری‌ها می‌باشد، اما اولین کارکرد ایمنی دفاع در مقابل باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی می‌باشد (۴۶)، کاهش لیزوژیم سرم خون ماهیان پرورش در محیط‌هایی با تراکم بالا موجب افزایش تلفات و مستعد شدن آن‌ها به بیماری می‌گردد (۳۲). سیستم کامپلیمنت در ماهیان استخوانی به خوبی مهره داران عمدتاً از طریق چسیدن به آتشی بادی‌ها در دیواره سلولی عمل می‌کند (۱۷). مطالعات زیادی نشان داده است که کامپلیمنت نقشی حیاتی در پاسخ‌های سیستم ایمنی ذاتی در ماهیان استخوانی داشته (۵۴) و فعالیت کامپلیمنت، مسئول سیستم ایمنی ماهیان استخوانی در گونه‌های متعددی نظیر کپور معمولی (۳۳)، گربه ماهی (۲۰) و آزاد ماهیان (۲۶)

کپور معمولی (۴۱)، ۵ ماهی باس طلایی (۱۰) و هم چنین آزمایش حاضر نشان‌دهنده این مطلب است که ماهیان موقعی که مقادیر ناکافی ریبوفلاوین دریافت می‌کنند دچار کاهش رشد می‌گردند. در آزمایش انجام شده نسبت بازده پروتئین نیز با افزایش سطوح ریبوفلاوین تا ۲۰ میلی گرم در کیلو گرم به طور معنی داری افزایش و سپس با افزایش ریبوفلاوین تا سطح ۲۵ میلی گرم بر کیلو گرم کاهش یافت، نتایج مشابه ای از *Cyprinus* (۲۷)، گربه ماهی کانال Jian carp *Carpio* Var. Jian) (۴۵) و ماهی باس طلایی (*Ictalurus punctatus*) sunshine bass (*Morone chrysops, Morone saxatilis*) به دست آمد که آن را به جذب بهینه غذا بدليل نقش کوآنزیمی ریبوفلاوین در متابولیسم پروتئین، کربوهیدرات و چربی نسبت داده پودند (۷). در این آزمایش مکمل ریبوفلاوین به طور معنی داری موجب بهبود شاخص‌های ایمنی در تاسماهی شیپ گردید، به طوری که تعداد گلbulو سفید در تاسماهیان شیپ تغذیه شده از جیره RB₂₀ ۲۰ میلی گرم در کیلو گرم ریبوفلاوین) در مقایسه با تعداد گلbulو های سفید ماهیان تغذیه شده با جیره فاقد مکمل به طور معنی داری افزایش و بیشترین فعالیت لیزوژیم و کامپلیمنت CH₅₀ در ماهیان تغذیه شده از تیمار RB₂₀ ۲۰ میلی گرم در کیلو گرم ریبوفلاوین) ثبت گردید. مطالعات دیگر در سالیان دور نیز بر این نکته اذعان داشت که ماهیان کپور انگشت قد تغذیه شده از جیره حاوی مقادیر ناکافی ریبوفلاوین دچار کم خونی، کمبود رشد، مرگ و میر بالا و خون ریزی پوست می‌شوند (۳۵) و هم چنین مواردی در قزل-آلای رنگین کمان (۴۱)، قزل‌آلای جویباری، قهوه‌ای و دریاچه‌ای (۳۸)، سالمون چینوک (۱۵)، ماهی آزاد اقیانوسی (۳۹)، گربه ماهی کانالی (۱۲)، کپور معمولی (۳۷)، قزل‌آلای رنگین کمان (۴۱، ۴۰، ۳۲)، مار ماهی ژاپنی (۶) و سیم قرمز دریایی (۵۵) گزارش شده است. گلbulو های سفید (لوکوسیت‌ها) جزء یاخته‌های

تحقیقاتی در مورد غلظت IgM در ماهیان خاویاری انجام نشده و باید مطالعات بیشتری این زمینه صورت گیرد. با توجه به اثرات مثبت مکمل ریبوфلافین بر شاخص‌های رشد و سیستم ایمنی بدن تاسماهی شیپ جوان به نظر می‌رسد که افروden ریبوفلافین در جیره تا حد ۲۰ میلی-گرم/کیلوگرم سودمند و موجب بازماندگی و افزایش بازده تولید این گونه در سیستم‌های متراکم پرورش می‌گردد.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان این مقاله مراتب سپاس گذاری خود را از جناب مهندس هوشنگ یگانه و آقای مهندس محمد پوردهقانی از موسسه تحقیقات بین‌المللی دریای خزر جهت پرورش ماهیان و تهیه نمونه‌های خونی و هم چنین آقای هوشتگ ملکی از آزمایشگاه ویرومد رشت که زحمت آنالیز نمونه‌های خونی را برعهده داشتند ابراز می‌دارند.

carp-I. Requirement for vitamin B2. Bulletin Japanese Society Science Fish, 33; 355-360.

6.Arai, S., Nose, T., Hashimoto, Y. (1972a). Qualitative requirements of young eels *Anguilla japonica* for water-soluble vitamins and their deficiency symptoms. Bulletin Tokyo Freshwater Fish Research Laboratory, 22; 69-83.

7.Bronstad, I., Bjerka, S., Waagbo, R. (2002). The need for riboflavin supplementation in high and lower energy diets for Atlantic salmon *Salmo salar* L. parr. Aquaculture Nutrition, 8; 209-220.

8.Chebanov, M.S., Galich, E.V. (2011). Sturgeon hatchery manual. FaO Fisheries And Aquaculture Technical Paper. 303 pp,

9.Chimezie, A., Ibukun,A., Teddy,E., Francis, O. (2008). HPLC analysis of nicotinamide, pyridoxine, riboflavin and thiamin in some selected food products in Nigeria. African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2; 29-036.

10.Deng, D.F., Wilson, R.P. (2003). Dietary riboflavin requirement of juvenile sunshine bass

است، به طور مثال آنتی‌بادی‌های آزاد ماهیان، در حضور پروتئین‌های کامپلیمنت قادر به خنثی‌سازی ویروس‌های هماتوپویتیک نکروز ویروس (IHNV) و ویرال هموراژی سپتی سمی ویروس (VHSV) می‌باشد(۳۰)، بنابراین می‌توان اذعان نمود که فعالیت لیزوژیم و کامپلیمنت دلالت بر سلامت عمومی و سیستم همورال در ماهی دارند(۲۸، ۴۷)، در این آزمایش با اضافه کردن مکمل ریبوفلافین به میزان ۲۰ میلی‌گرم در کیلوگرم، فعالیت لیزوژیم و کامپلیمنت در تاسماهی شیپ در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی داری افزایش یافت. نتایج این بررسی نشان داد که برغم افزایش میزان ایمونوگلوبولین در تیمارهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ میلی‌گرم/کیلوگرم ریبوفلافین اختلاف معنی داری با تیمار شاهد مشاهده نشد (۰/۰۵). ایمونوگلوبولین غالب در اکثر ماهیان IgM می‌باشد(۲)، البته میزان غلظت IgM در ماهیان استخوانی در سطوح پایین قرار دارد(۴۸) و از درجه حرارت آب(۴۴) و کیفیت آب(۳۲) تاثیر می‌پذیرد، البته تاکنون

منابع

- 1-یزدانی ساداتی، م.ر، پورکاظمی، م، شکوریان، م، بورعلی، ح.م، پیکران مانا ، ن، سیدحسنی، م.ح. ۱۳۹۰. ترویج و پرورش فیل ماهی به منظور تولید گوشت و خاویار. موسسه تحقیقات شیلات ایران. ۵۹ صفحه.
- 2.Acton, RT., Weinheimer, PF., Hall, SJ., Niedermeier, W., Shelton, E., Bennett, JC. (1971). Tetrameric immune macroglobulin in three orders of bony fishes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 68; 107-111.
- 3.Adelekan, DA., Thurnham, D.I. (1998). Glutathione peroxidase (EC 111.1.9) and superoxide dismutase (EC 1.15.1.1) activities in riboflavin-deficient rats infected with *Plasmodium berghei*. Malaria British Journal Nutrition, 79; 305-309.
- 4.AOAC. (1995). Official methods of analysis of the association of official analytical chemists. AOAC, Arlington.
- 5.Aoe, H., Masuda, I., Saito, T., Komo, A. (1967). Water-soluble vitamin requirement of

- (*Morone chrysops* \$ × *Morone saxatilis* #). Aquaculture, 218; 695–701.
- 11.**Doroshov, V.I. (1985). Biology and culture of sturgeon: *Acipenseriformes*. In: Advances in Aquaculture. Muir, J. F. and Roberts, R. J., Eds., Westview Press, Boulder, Co., 251-274.
- 12.**Dupree, H. K. (1966a). Vitamins essential for growth of channel catfish, *Ictalurus punctatus*. United State Bulletin Sport Fish Technical Paper, 7; 12 p.
- 13.**Grinde, B., Lie, O., Poppe, T., Salte, R. (1988). Species and individual variation in lysozyme activity in fish of interest in aquaculture. Aquaculture, 68; 299–304.
- 14.**Gumus , E., Ikiz, R. (2009). Effect of dietary levels of lipid and carbohydrate on growth performance, chemical contents and digestibility in rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*, 1792. Pakistan Vetrintry Journal, 29; 59-63.
- 15.**Halver, J. E. (1957). Nutrition of salmonoid fishes. III. Water-solublevitamin requirements of chinook Salmon. Journal of Nutrition, 62; 225-243. B.
- 16.**Halver, J.E. (1989). The vitamins. In: Fish Nutrition (Halver, J.E. ed.), 2nd edn, pp. 31–109. Academic Press, New York.
- 17.**Holland, M.C., Lambris, JD. (2002). The complement system of teleosts. Fish and Shellfish Immunology, 12; 399–420.
- 18.**Holt, G.J. (2011). Larval Fish Nutrition, (Editor: G. Joan Holt). John Wiley & Sons publication, 448 p.
- 19.**Hung S. S. O ., Aikins K. F., Lutes P. B., Xu,R . (1989). Ability of Juvenile white sturgeon (*Acipenser transmontanus*) to utilize different Carbohydrate source. Journal of Nutrition, 119; 272-733.
- 20.**Jenkins, JA, Ourth, D.D. (1993). Opsonic effect of the alternative complement pathway on channel catfish peripheral blood phagocytes. Veterinary Immunology Immunopathology, 39; 447–459
- 21.**Ispir, U., Yonar, M.E.and OZ, B. (2011). Effect of dietary vitamin supplementation on blood parameters of Nile Tilapia (*Orechromis Niloticus*). The Journal of Animal & Plant Sciences, 21; 566-569.
- 22.**Izquierdo, M.S. (1996). Essential fatty acid requirements of cultured marine fish larvae. Aquaculture Nutrition, 2; 183–191.
- 23.**Klontz, G.W. (1994). Fish Hematology. In: Techniques in Fish Immunology, Stolen, J.S., T.C.
- 24.**Kitamura, S.T., Suwa, T., Ohara, S. , Nakagawa, K. (1967a). Studies on vitamin requirements of rainbow trout-II. The deficiency symptoms of fourteen kinds of vitamin. [In Japanese English Abstract Bulletin of Japanese Society Science Fish], 33;1120-1125.
- 25.**Lall, S.P. (2000). Nutrition and health of fish. In: Cruz -Suárez, L.E., Ricque-Marie, D., Tapia-Salazar, M., Olvera-Novoa, M.A. y Civera-Cerecedo, R., (Eds.). Avances en Nutrición Acuícola V. Memorias del V Simposium Internacional de Nutrición Acuícola. 19-22.
- 26.**Lammens, M., Decostere, A., Haaesebrouck, F. (2000). Effects of *Flavobacterium psychrophilum* strains and their metabolites on the oxidative activity of rainbow trout *Oncorhynchus mykiss* phagocytes. Disease of Aquaculture Organism, 41; 173–179.
- 27.**Li, W., Zhou, X.Q., Feng, L., Liu, Y ., Jiang, J. (2010). Effect of riboflavin on growth , feed utilization, body composition and intestinal activities of juvenile Jian Carp (*Cyprinus Carpio* Var. Jian). Aquaculture Nutrition, 16; 137-143
- 28.**Lie, O., Evensen, O., Sorensen, A., Froysadal, E. (1989). Study on lysozyme activity in some fish species. Disease of Aquaculture Organism, 6; 1–5.
- 29.**Lin, Y., Zhou, X.Q. (2006). Dietary glutamine supplementation improves structure and function of intestine of juvenile Jian carp (*Cyprinus carpio* var Jian). Aquaculture, 256; 389–394.
- 30.**Lorenzen. N., LaPatra, SE. (1999). Immunity to rhabdovirus in rainbow trout: the antibody response. Fish and Shellfish Immunology, 9; 345–360.
- 31.**NRC. (1993). Nutrient requirements of fish (National Research Council, Committee on Animal Nutrition, Board on Agricultures.). pp. 1–115. National Academy Press, Washington, DC.
- 32.**Magnadottir, B., Jonsdottir, H., Helgason, S., Bjornsson, B., Jorgensen, TO., Pilstrom, L. (2001). Immune parameters of immunised cod (*Gadus morhua* L). Fish and Shellfish Immunology, 10; 75–8.
- 33.**Matsuyama, H., Yano, T., Yamakawa, T., Nakao, M. (1992). Opsonic effect of the third complement component (C3) of carp (*Cyprinus carpio*) on phagocytosis by neutrophils. Fish and Shellfish Immunology, 2; 69–78.
- 34.**Mohseni, M., Hassani, M. H., Pourali, F. H.,Pourkazemi, M., Bai, S. C. (2011). The optimum dietary carbohydrate/lipid ratio can spare protein in growing beluga, *Huso huso*. Journal of Applied Ichthyology, 27; 737-742.

- 35.**Millikin, M.R. (1982). Qualitative and quantitative nutrient requirement fishes: A review. *Fishery Bulletin*, 80; 4.
- 36.**Morris, P.C., Davies, S.J. and Lowe, D.M. (1995). Qualitative requirement for B vitamins in diets for the gilthead seabream (*Sparus aurata* L.). *Animal Science*, 61; 419–426.
- 37.**Ogino, C. (1967). B vitamins requirements of carp-II. Requirements for riboflavin and pantothenic acid. [In Japanese ., English. Abstract.] *Bullitine of Japanase Society Science Fish*, 33; 351-354.
- 38.**Phillips, A.M.J.R., Brockway, D.R. (1957). The nutrition of trout. IV. Vitamin requirements. *Progress Fish-Culture*, 19; 119-123.
- 39.**Phillips. A. M., JR. (1959a). Vitamin requirement of Atlantic salmon. StateN.Y. Conservative. Departement of Fish Research Bulletin, 22; 79-81.
- 40.**Postone, H.A., Rumsey, G.L ., Ketola, H.G. (1977). The effect of supplemental dietary amino acids. minerals and-vitamins on salmonids fed cataractogenicdiets. *Cornell Vetrinirty*, 67; 472-509.
- 41.**Takeuchi, L., Takeuchi, T., Ogino, C. (1980). Riboflavin requirements in carp and rainbow trout. *Bulltin Jpanase Society Science Fish*, 46; 733-737.
- 42.**Ronyai, A., Peteri, A., Radics, F. (1990). Cross breeding of sterlet and Lena River's sturgeon. *Aquacult Hungrica (Szarwas)*, 6; 13-18.
- 43.**Sahoo, P.K., Mukherjee, S.C. (2003). Immunomodulation by dietaryvitamin C in healthy and aflatoxin B₁-induced immune compromised rohu (*Labeo rohita*). *Comparative Immunology. Microbiology Infection Disease*, 26;65-76.
- 44.**Sanchez, C., Babin, M., Tomillo, J.,Ubeira,FM., Dominguez. J. (1993). Quantification of low levels of rainbow trout immunoglobulin by enzyme immunoassay using two monoclonal antibodies. *Veterinary Immunology and Immunopathology*, 36;65-74.
- 45.**Serrini, G., Zhang, Z., Wilson, R.P. (1996). Dietary riboflavin requirement of fingerling channel catfish (*Ictalurus punctatus*). *Aquaculture*, 139; 285–290.
- 46.**Sveinbjornsson, B., Olsen, R., Paulsen, S., (1996). Immuno cytochemical localization of lysozyme in intestinal eosinophilic granule cells (EGCs) of Atlantic salmon, *Salmo salar* L. *Journal of Fish Disease*, 19; 349–355.
- 47.**Tort, L., Balasch, S. and MacKenzie,S. (2003). Fish immune system. A crossroads between innate and adaptive responses. *Imnninoiogia*, 08. 9. Available online at:[<http://revista.inmunologia.org/> Upload /Articles/602.pdf] (Accessed: 11.09.08).
- 48.**Uribe, C., Folch., H., Enriquez, R., Moran, G. (2011). Innate and adaptive immunity in teleost fish: a review *Veterinarni Medicina*, 10; 486–503.
- 49.**Waagbo, R. (1997). The impact of nutritional factors on the immune system in Atlantic salmon, *Salmo salar* L. A review of *Aquaculture Fish Managing*, 25; 175-197.
- 50.**Wahl, T., Verlhac, V., Gabaudan, J., Schüep, W., Meier,W. (1998). Influence of combined vitamins C and E on non-specific immunity and disease resistance of rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss* (Walbaum). *Journal of Fish Disease*, 21; 127-134.
- 51.**Webster, C.D., C.E., Lim. (2002). Nutrient Requirement and Feeding of Finfish for Aquaculture. CAB International CABI publishing, 418.
- 52.**Xue, M., Wu, X., Ren, Z., Gao, P.,Yu, N., Pearl, G. (2006). Effects of six alternative lipid sources on growth and tissue fatty acid composition in Japanese sea bass (*Lateolabrax Japanicus*). *Aquaculture*, 206; 206-214.
- 53.**Xu, Q. Y., Wang, C. A., Zhao, Z. G., Luo, L. (2012). Effects of replacement of fish meal by soy protein isolate on the growth, digestive enzyme activity and serum biochemical parameters for Juvenile Amur Sturgeon (*Acipenser schrenckii*). *Asian-Australian Journal of Animal Science*, 11;1588-1594.
- 54.**Yano, T., Matsuyama, H., Mangindaan R.E.P. (1991). Polysaccharide induced protection of carp *Cyprinus carpio* against bacterial infection. *Journal of Fish Disease*, 14; 577–582.
- 55.**Yone, Y. (1975). Nutritional studies of red sea bream. Proceeding of First International Conference of Aquaculture Nutrition, 39-64.