

مطالعه بافتی، مولکولی و اثر سینرژیسم نانو ذرات گرافن اکسید و آنتی بیوتیک

بر اشریشیاکلی جدا شده از تومورهای سرطان کولورکتال

صدیقه مهرابیان^۱، آزاده بهزادی^۲، شهرلا محمد گنجی^۳

۱- استاد گروه میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

mehrabiants2012@yahoo.com

۲- کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشکده زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

۳- استادیار ژنتیک مولکولی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران ایران.

تاریخ دریافت: ۹۴/۲/۱۲ تاریخ پذیرش: ۹۵/۴/۱۵

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین فاکتورهای ایجاد سرطان کولورکتال عفونت باکتریایی است. عفونت با نوع خاصی از باکتری *E.coli* در افراد مبتلا به بیماری های التهابی روده، می تواند باعث شروع سرطان کولورکتال شود. این باکتری با تولید توکسین ترشحی کلی باکتین شرایط فلورمیکروبی روده را برای بیماری زائی خود فراهم نموده و با اختلال در سیکل سلولی باعث شروع پیشرفت و توسعه سرطان کولورکتال می گردد. لذا هدف از این مطالعه با توجه به مقاوم شدن باکتری بروسی اثر نانو آنتی بیوتیک بر عفونت و میزان بروز و پیشرفت سرطان کولورکتال است.

روش کار: ۶۰ بیوپسی از روده بزرگ مراجعة کنندگان به کلینیک گوارش (۳۰ نمونه از افراد مبتلا به سرطان کولورکتال و ۳۰ نمونه از افراد سالم) از نظر بیماری روده ای و سرطان کولون، ژن *clbN* و *clbB* به عنوان مارکر جزایر ژنومی *pks* بررسی شد. دو نمونه *E.coli pks* جدا شده از بیمار و فرد سالم تحت تأثیر آنتی بیوتیک های رایج درمان روده ای و نانو ذرات گرافن اکسید با روش سنجش قطر هاله عدم رشد قرار گرفتند و اثر سینرژیسم نانو آنتی بیوتیک بر باکتری های مزبور سنجش گردید.

یافته ها: در این مطالعه ارتباط معنی داری بین فراوانی باکتری های *E.coli* واجد ژن *clbN* و *clbB* و سرطان کولورکتال یافت نشد ($p=0.2$). باکتری جدا شده از سرطان کولورکتال نسبت به گروه شاهد مقاومت بیشتری نسبت به آنتی بیوتیک ها نشان داد. اثر سینرژیسم بین آنتی بیوتیک و نانو ذرات گرافن اکسید مشاهده گردید.

نتیجه گیری: نتایج بررسی این ژن ها در جامعه ایرانی در مقایسه با تحقیقات سایر جوامع فراوانی کمتری را نشان می دهد. باکتری *E.coli* جدا شده از سرطان کولورکتال مقاوم تر از نمونه کنترل است.

واژه های کلیدی: سینرژیسم، گرافن اکسید، اشریشیاکلی، سرطان کولورکتال.

مقدمه

فیلوژنیک *B2* حامل یک جزیره ی بیماری زای ۵۴kb پلی کتید سنتاز هستند(*pks*) که آنزیم مورد نیاز برای سنتز یک پپتید پلی کتید ژنوتوكسین به نام Colibactin کد می نماید(۱۱). چندین مطالعه نقش میکروبیوم روده در سرطان زایی وابسته به التهاب را در روده گزارش نموده اند. بیماری کرون(crohn) و کولیت زخم شونده اغلب با خطر سرطان کولورکتال مرتبط می شوند(۱). علاوه بر این عدم تعادل، میکروبیوم به نفع گسترش

سرطان کولورکتال سومین سرطان رایج و چهارمین دلیل مرگ و میر در جهان است. شیوع سرطان کولورکتال بیش تر از ۹٪ تمام انواع سرطان ها می باشد. این سرطان در ایران پس از سرطان معده، مثانه و پروستات در مردان چهارمین سرطان بوده و در زنان بعد از سرطان سینه دومین سرطان محسوب می شود(۴). از نظر فیلوژنی *E.coli A,B,B2,D* به چهار گروه تقسیم می شود. برخی از سوبیه های *E.coli* هم زیست، از گروه

تومورهای سرطانی رایج شده است. گرافن اکسید که با روش رسوب دهی شیمیائی فاز بخار تهیه و امکان کنترل ضخامت و تعداد لایه های سنتر شده به درجه سرد کردن و هیدروکربن وابسته می باشد، یک نانو ذره می باشد. با شناسایی غلظت و شکل نانو می توان از آن برای بازدارندگی رشد باکتری جدا شده از تومورهای سرطانی استفاده نمود. استفاده از آنتی بیوتیک رایج نیز به عنوان شاهد مثبت ضروری است(۱۴). محققان آمریکائی در تلاش هستند که با استفاده از نانو ذرات قابل انطباق شیوه ای کار آمد از آنتی بیوتیک ها را برای مبارزه با باکتری های بیماری زا ابداع کنند. مرکز تحقیقات ارتش آمریکا به تازگی اعلام کرده است که به جای هدر دادن سرمایه برای تولید آنتی بیوتیک نوین و جدید که تنها تا زمان مقاوم شدن باکتری کارائی دارند، باید بر روی ساخت نانو داروهای تمرکز کنند که می توانند به تاثیر گذاری بالاتر به مبارزه باکتری پردازند(۱۰). هدف از این تحقیق رابطه E.coli حاوی کلی باکتین با سرطان کولون و در مرحله بعد ایجاد نانو آنتی بیوتیک جهت درمان سریع و عدم مقاومت باکتری است.

مواد و روش ها

در این تحقیق ابتدا اطلاعات کاملی در مورد دمو گرافی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بخش گوارش بیمارستان و مورد کولونوسکوپی قرار گرفته به دست آمد. ۳۰ نمونه از بافت موکوسی تازه افراد مبتلا به سرطان کولون تهیه و در شرایط استریل و ازت مایع به فریزر -۸۰ درجه سانتی گراد منتقل گردید. ۳۳ نفر از افرادی که بعد از انجام کولونوسکوپی نتایج پاتولوژی حاکی از سلامت ایشان از نظر سرطان کولورکتال بوده، به عنوان شاهد نمونه موکوسی معرفی شد. پرسشنامه و رضایت نامه توسط بیماران پر و امضاء گردید. تهیه لام از بافت های سالم و سرطانی با استفاده از

پاتوژن فرصت طلب پیش التهابی مانند انتروباکتریاسه و کلستریدیوم دیفیسیل در پیشرفت تومور شناخته شده است(۳). هم چنین ارتباط مولکولی بین پاسخ ایمنی میزبان، میکروبیوم روده ای و رخدادهای ژنوتوكسیک در سرطان کولورکتال به صورت التهاب ظاهر می شود. توکسین ها به فرآیند های کلیدی یوکاریوتی مانند پیام رسانی حمله می نمایند و برخی مستقیماً به ژنوم آسیب می رسانند(۱۲). آسیب به DNA می تواند مستقیماً با حمله آنزیماتیک یا به طور غیر مستقیم به واسطه ای تحریک واکنش التهابی با تولید رادیکال های آزاد صورت پذیرد. هم چنین این رادیکال ها می توانند بر روی مکانیسم ترمیم DNA موثر باشند(۱۳). در ایران بعد از بیماری های قلبی-عروقی و سوانح سرطان سومین علت مرگ و میر می باشد(۹). در تحقیقی که در سال ۲۰۱۶ انجام شد مشخص گردید که عفونت کلبسیلا پنومونیه حاوی ژن های pks می تواند باعث شروع سرطان کولورکتال شود زیرا این باکتری از نمونه های سرطان کولورکتال و افراد شاهد ایزوله شد. کلبسیلا پنومونیه عامل بیماری عفونی با درمان سخت است. اثرات جانبی آنتی بیوتیک که برای درمان به کار می رود بسیار بالاست، در این تحقیق از آنتی بیوتیک رایج بر درمان عفونت های روده ای استفاده شد که اکثر آن ها مقاوم بودند، استفاده از نانو ذرات مس و آنتی بیوتیک ها که به تنها باکتری هردو به آن مقاوم بوده در نتیجه اثر هم افزائی یا سینرژیسم با نانو ذره مس بر باکتری کلبسیلا پنومونیه pks جدا شده از تومور های سرطانی خاصیت ضد میکروبی نشان داد(۸). در سال ۲۰۰۹ و Putze.J. همکاران ارتباط فیلوژنی و اپیدمیولوژی باکتری E.coli حاوی pks کد کننده ژنوتوكسین کلی باکتین را مورد بررسی قرار داده و دو ژن clbB و clbN را شناسائی نمودند، ۲۸ مورد از ۵۸ سویه دارای ۴۸٪ ژن ها بودند(۱۲). امروزه استفاده از نانو ذرات در درمان

Techno.UK در شرایط دمائی ۹۴ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه، سپس ۳۵ سیکل دمایی به صورت ۹۴ درجه سانتی گراد، ۵۶ و ۷۳ درجه سانتی گراد و هر یک به مدت ۳۰ ثانیه و در نهایت به مدت ۵ دقیقه در ۷۲ درجه سانتی گراد گذاشته شد. پس از انجام آزمایش PCR Duplex محصولات حاصله بر روی ژل آگارز در ۴٪ بررسی شد. نانو ذرات گرافن اکسید با روش اصلاح شده هامر تهیه شد. اندازه نانو ذرات ۲-۱۰ نانومتر درجه خلوص ۹۳ درصد می باشد. غلظت نانو ذرات گرافن اکسید ppm ۱۰۰ است. برای تعیین اثر ضد میکروبی گرافن اکسید غلظت های ppm ۱۰۰، ۵۰، ۲۵، ۱۲/۵، ۲۵، ۶/۲۵ در محیط مایع نوترین برات تهیه گردید. به هر لوله ۱ میلی لیتر، باکتری نیم مک فارلند تقریباً ۱۰^۸ عدد باکتری در هر سی سی اضافه و ورتکس شده و به مدت ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه سانتی گراد قرار داده شد. با دستگاه اسپکتروفوتومتر رشد باکتری ها سنجیده شد. کم ترین غلظتی که در آن رشد دیده نشد به عنوان حداقل غلظت بازدارندگی رشد باکتری محاسبه گردید. از محیط مایع به محیط جامد منتقل و کشت داده و کمترین غلظتی که در آن رشدی نبود حداقل غلظت کشنده MBC در نظر گرفته شد.

سنجهش قطره هاله عدم رشد

در این روش از آنتی بیوتیک های مختلف که اغلب در عفونت های دستگاه گوارش استفاده می شوند به E.coli صورت دیسک در محیط کشت حاوی باکتری قرار داده و قطره هاله عدم رشد سنجیده شد.

بررسی سینژئیسم نانو ذرات گرافن اکسید و آنتی بیوتیک

آنتی بیوتیک های مقاوم به باکتری را انتخاب نموده و میزان ۰/۰۵ میلی لیتر بالاترین غلظت نانو ذرات گرافن اکسید که اثر بازدارندگی نشان داد در روی دیسک آتشی بیوتیک قرار داده بعد از جذب کامل و خشک کردن با

روش های بافت شناسی و رنگ آمیزی اوزین - E.coli هماتوکسیلین انجام شد. برای جدا سازی باکتری از بافت روده بیماران مبتلا محیط های کشت مغذی از جمله L.B.broth و افتراقی برای باکتری های خانواده انتروباکتریاسه agar EMB و محیط های بیوشیمیائی از جمله TSI، IMVIC، Urea agar و بافر PBS جهت شستشو اولیه قسمتی از بافت مورد استفاده قرار گرفت. تمام محیط های کشت از شرکت MERCK خریداری شد. پس از رنگ آمیزی گرام کشت چهار مرحله ای باکتری ها بر روی محیط افتراقی EMB انجام و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد گرم گذاری گردید تا باکتری E.coli ایزوله شود. بعد از جدا سازی و خالص سازی باکتری تست های بیوشیمیائی IMVIC، TSI و اوره برای باکتری مورد نظر انجام شد. استخراج DNA از نمونه ها پس از تلقیح باکتری ها در ۵ ml BHI محیط مایع و پس از گرم گذاری به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد استخراج ژن باکتری ها بر اساس دستور العمل کیت سینا کلون انجام و کمیت توسط اسپکتروفوتومتری در طول موج ۲۶۰ و ۲۸۰ نانومتر بررسی شد. در نهایت DNA استخراج شده از باکتری در فریزر ۲۰- درجه سانتی گراد ذخیره گردید.

Duplex PCR واکنش مولکولی

پس از طراحی پرایمر اختصاصی برای ژن های clbB و clbN مطابق جدول ۱ آزمایش دوبلکس PCR برای DNA های استخراج شده از باکتری های بیماران انجام شد. تکثیر ژن با حجم نهائی μ l ۲۵ برای هر مخلوط واکنش بود. مقدار مورد نیاز از هر ماده برای انجام این واکنش به شرح زیر است.

μ l Deionized water ۹/۵ μ l master mix ۱۲/۵ μ l clbN ۱/۵ μ l از هر یک از پرایمرهای clb ، clb BR ، DNA1 clb NF ، clb NR ، BF آوران تهیه شد. میکروتیوب ها در ترموسیکلر

اولین قدم در راه تشخیص صحیح آزمایشگاهی نمونه‌گیری دقیق و درست در زمان بروز بیماری است.

جدول ۲ اطلاعات فرد مبتلا به سرطان کولون و فردی که به عنوان شاهد انتخاب شده است نشان می‌دهد.

روش سنجش قطرهاله عدم رشد، اثر نانو آنتی بیوتیک سنجیده شد.


تحلیل آماری

در این مطالعه از آزمون آماری SPSS استفاده و $P \leq 0.05$ معنا دار در نظر گرفته شد.

نتایج

جدول ۱ - توالی پرایمر های مورد استفاده برای انجام PCR

نام	سکانس
Primer ClbB F	GAT TTG GAT ACT GGC GAT AAC CG
Primer ClbB R	CCA TTT CCC GTT TGA GCA CAC
Primer ClbN F	GTT TTG CTC GCC AGA TAG TCA TTC
Primer ClbN R	CAG TTC GGG TAT GTG TGG AAG G



شکل ۱ - تصاویر SEM گرافن اکسید سنتز شده با روش اصلاح شده هامر (بزرگنمایی ۱۵۰۰۰)

جدول ۲ - مشخصات کلی از دو بیمار با نمونه باکتری *E.coli* CR-11 و *E.coli* N-31


CR-11	N-31	کد
۲۸	۵۱	سن
Femal	femal	جنس
مجرد	متاهل	وضعیت تأهل
بله	خیر	آیا پس از تشخیص بیماری کاهش وزن داشته است؟
۱۰ کیلو گرم	-	مقدار کاهش وزن
غیر سیگاری	غیر سیگاری	وضعیت استعمال دخانیات

میکروسکوپ مشاهده شد. نتایج تست های بیوشیمیائی نشان داد که باکتری *E.coli* برای MR, Motility, Indol

باکتری های ایزوله شده با رنگ آمیزی گرم به صورت کوکوباسیل های گرم منفی در زیر


clb N ۱۵٪ دارای ۳ باکتری گردید که ۲۳ نمونه اشريشياکلی در گروه کنترل ۳۳ نمونه بافت سالم روده بزرگ ۲۳ دارای ۸۶٪ ۲ باکتری دارای باند در منطقه مورد نظر (۵۰۰-۷۰۰ kb) مشاهده گردید

و TSI مثبت و برای تست های Citrat و Urea منفی می باشند. نتایج آزمایش Duplex PCR بر روی باکتری های اشريشياکلی ایزوله شده و شناسائی شده با روش کشت در محیط های انتخابی و افتراقی و پرایمر های اختصاصی برای ژن های clb N و clb B نشان داد که ۲۰ نمونه از اشريشياکلی از ۳۰ بیمار مبتلا به سرطان کولوركتال جدا



شکل ۲ - تصویر ژل آگاراز از محصولات PCR

نتایج آزمایش بافتی



در مورد آنتی بیوتیک های مقاوم مشاهده نشد، فقط قطرهاله عدم رشد در مورد دو آنتی بیوتیک جنتامايسین و کانا مايسین افزایش پیدا کرد. در مورد *E.coli* N-31 که از گروه کنترل ایزووله شده بود به همه آنتی بیوتیک ها حساسیت نشان داد اما با استفاده از نانو آنتی بیوتیک اثر سینرژیسم به صورت افزایش قطرهاله عدم رشد ظاهر گردید.

نتایج سنجش هاله عدم رشد نشان داد که CR-11 جدا شده از فرد مبتلا به سرطان کولون نسبت به آنتی بیوتیک های تتراسیکلین، نورفلوکساسین، نالیدیکسیک اسید، سفالوتین مقاوم و فقط به کانا مايسین و جنتامايسین حساس است این آنتی بیوتیک ها معمولاً برای عفونت دستگاه گوارش استفاده می شود. در مقابل نانو آنتی بیوتیک که شامل دیسک آنتی بیوتیک ۰.۵ میلی لیتر از نانو ذرات با غلظت های مختلف می باشد. اثر سینرژیسم

جدول ۳- الگوی مقاومت باکتری اشريشياکلی سویه CR-11 بر آنتی بیوتیک، نانو ذرات اکسید گرافن و اثر سینرژیسم آنتی بیوتیک و نانو ذرات اکسید گرافن

antibiotic شماره سویه	CR_11	TE 30ug	NOR 10ug	NA 30ug	K 30ug	GM 10ug	CF 30 ug
CR-11		R	R	R	12	18	R
NGo (50ppm)	growth	R	R	R	17±0.25	21.5±0.5	R
NGo (25ppm)	growth	R	R	R	16±0.25	20±0.5	R
NGo (12.5ppm)	growth	R	R	R	15±0.25	19±0.25	R
NGo (6.25ppm)	growth	R	R	R	15±0.25	19±0.25	R

جدول ۴- الگوی مقاومت باکتری اشريشيا کلی سویه N-31 بر آنتی بیوتیک، نانو ذرات اکسید گرافن و اثر سینرژیسم آنتی بیوتیک و نانو ذرات اکسید گرافن

antibiotic شماره سویه	N_31	TE 30ug	NOR 10ug	NA 30ug	K 30ug	GM 10ug	CF 30 ug
N-31		17	27	26	18	18	20
NGo (50ppm)	growth	31.5±0.5	35±0.25	31.5±0.5	24±0.25	22.5±0.5	28.5±0.5
NGo (25ppm)	growth	31±0	34±0	29.5±0.5	23.5±0.5	22±0	25±0
NGo (12.5ppm)	growth	28.5±0.5	32.5±0.5	28.5±1.5	21±0.75	21.5±0.25	22.5±0.5
NGo (6.25ppm)	growth	27±0.75	32±1	28±1	21±0.5	19.5±0	22±0.25

R:Resistant I:Intermediate S:Sensitive

TE = تتراسیکلین NOR = نوروفلاکسین NA = نالیدیکسیک اسید
K = کانا مايسين GM = جنتامايسين CF = سفالوتین
N-31 = سویه اشريشيا کلی Ngo = نانو اکسید گرافن Growth = باکتری رشد کرده

سرطان معده باشد(7). التهاب روده بزرگ موجب استقرار پاتوژن های روده ای مانند *E.coli* می شود اگر اپی تلیوم به عنوان اولین لایه دفاعی روده در مقابل آنتی ژن ها و باکتری ها درست کار نکند احتمال عفونت باکتریایی و التهاب روده افزایش می یابد بدین صورت

بحث و نتیجه گیری ارتباط باکتری ها با سرطان از مدت ها پیش مورد مطالعه بوده است. اما اخیراً حضور باکتری های مهاجم در سرطان کولون احتمالاً می تواند ناشی از نقش آن ها در ایجاد بیماری مشابه با نقش هلیکوباکتر پیلوری در

کاناما یسین و جنتاما یسین که حساسیت نشان داد افزایش قطر هاله عدم رشد اثر سینرژیستی را نشان داد اما باکتری *E.coli* N-31 که به همه آنتی بیوتیک ها حساس بود بعد از تهیه نانو آنتی بیوتیک این حساسیت افزایش پیدا کرد. تحقیق حاضر با مطالعاتی که در سال ۱۳۹۴ توسط سیده فاطمه شفیعی و همکاران انجام شده هم سوئی دارد، نانو ذرات اکسید مس میزان غلظت باکتریایی را تا ۹۹/۹٪ کاهش داده است و قطر هاله عدم رشد حاصل از ادغام نانو ذرات اکسید مس و آنتی بیوتیک تراسیکلین ۱۲ میلی متر به دست آمده که افزایش قابل توجهی در بازدارندگی داشته است(۱۵). در تحقیق دیگری مخلوط نانو ذرات اکسید مس در مقایسه با گرافن اکسید اثر بخشی بیشتر داشته و آنتی بیوتیک نواحی ممانعت کننده بزرگ تری را در مقایسه با اکسید مس و هم چنین آنتی بیوتیک مقاوم مورد استفاده به تنها ایجاد کرده است. این بیان گر افزایش اثر قدرت ضد میکروبی نانو آنتی بیوتیک می باشد. دلیل روشنی برای افزایش فعالیت به طور واضح در نوشتارها بیان نگردیده است اما گمان بر این است این حالت به علت افزایش مکانیسم های اثر دارو باعث هم افزایی اثر ضد میکروبی می شود که در برابر باکتری های مقاوم به دارو مانع سازگاری میکرواورگانیسم می گردد(۶).

تشکر و قدردانی

این پژوهش بر گرفته از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی میکروبی می باشد که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به تصویب رسیده و انجام شده است. بدین وسیله مراتب سپاس را از تمام کسانی که در این پژوهش ما را یاری نموده اند می نمائیم.

1.Cheung, DY., Kim, TH., Kim, CW., Kim, JI., Cho, SH. (2008). The anatomical distribution of colorectal cancer in Korea:

in vivo *E.coli* که در ناحیه ایلئوم می چسبد و در شرایط به سلول های اپی تیال حمله می کند. در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو یا بیماری کورون احتمال ابتلا به سرطان کولورکتال تا ۵ برابر افزایش می یابد(۲). بررسی حاضر به منظور جداسازی باکتری *E.coli* حاوی ژن pks از ایزووله های اشریشیاکلی جدا سازی شده از بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال و گروه کنترل انجام گرفت. در مطالعه حاضر از روش Duplex-PCR برای بررسی دو ژن clbN و clbB (تولید کننده) کلی باکتین در ایزووله Nissel *E.coli* استفاده شد و باکتری *E.coli* سویه Toulous فرانسه برای این مطالعه هدیه داده شده به عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شد. مطابق نتایج این مطالعه از نظر مولکولی از میان باکتری های *E.coli* جدا شده از مبتلایان به سرطان کولورکتال ۱۵٪ افراد مبتلا برای ژن clbN و clbB (از ژن های مهم محدوده ژنومی pks و تولید کننده کلی باکتین) در باکتری *E.coli* جدا شده مثبت بودند، در حالی که این فراوانی در افراد کنترل تنها ۸/۶٪ بود. بررسی حاضر در راستای مطالعات قبلی شکل گرفت. در سال ۲۰۱۵ در تحقیقی مشابه از مبتلا به سرطان کولورکتال، ۱۲/۲٪ *E.coli* جدا شده دارای ژن clbN و clbB بودند. فراوانی *E.coli* این ژن در *E.coli* جدا شده از افراد کنترل ۸/۵٪ گزارش شده که با تحقیق حاضر همسوئی دارد(۵). در تحقیق حاضر علاوه بر جداسازی و شناسائی اشریشیاکلی اثر هم افزایی ضد میکروبی نانو ذرات گرافن اکسید و آنتی بیوتیک بر علیه سویه های اشریشیاکلی حامل ژن pks نیز بررسی شد. هر دو سویه جدا شده اثر سینرژیستی نانو ذرات گرافن اکسید و آنتی بیوتیک های تراسیکلین، نوروفلوکسازین، نالیدیکسیک اسید، سفالوتین که باکتری *E.coli* CR-11 به آن ها مقاوم بود و فقط

منابع

evaluation of the incidence of proximal and distal lesions and synchronous adenomas. Intern Med., 47(19); 1649-54.

- 2.**Chiba, T., Marusawa, H., Ushijima, T. (2012). Inflammation associated cancer development in digestive orange: mechanisms and roles for genetic and epigenetic modulation. *Gastroenterology*, 143; 550-63.
- 3.**De Kok, IM., Wong, CS., Chia, KS., Sim, X., Tan, CS., Kiemeney, LA. (2008). Gender differences in the trend of colorectal cancer incidence in Singapore, 1968-2002. *Int J Colorectal Dis.*, 23(5); 461-7.
- 4.**Etemati, A., Sadjadi, A., Semnani, Sh., Nouraei, SM., Khademi, H., Bahadori, M. (2008). Cancer registry in Iran: a brief overview. *Arch Iranian Med*, 11(5); 577-80.
- 5.**Ganji Mohammad, Sh., Dastjani, F., Mojtaba Sohrabi. (2015). Study of relationship between a strain of *E.coli* and colorectal cancer. *Iranian Journal of medical microbiology .Iran. J. Med microbial*, 9;45-49.
- 6.**Geethalakshi, R., Sarada, DVL. (2012). Gold and silver nanoparticles from Trian the a decandra: synthesis, characterization , and antimicrobial properties. *Int J Nanomedicin*, 7; 53-75.
- 7.**Jemal, A., Center, MM., De Santis, C., Ward, M. (2010). Global patterns of cancer incidence and mortality rates and trends. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*, 19(8); 1893-907.
- 8.**Mehravian, S., Valadbigy, M., Mohammad Ganji, Sh. (2016). Tissue and molecule investigation and the effect of copper nano particles synergism wih antibiotic on colorectal cancer tumors infected to *Klebsiella pneumonia*. The Quarterly journal of Animal Physiology and Development, 33(2); 15-19.
- 9.**Mousavi, SM., Gouya, MM., Ramazani, R., Davanlou, M., Hajsadeghi, N., Seddighi Z. (2009). Cancer incidence and mortality in Iran. *Annals Oncol*, 20(3); 556-63.
- 10.**Nougayrede, JP., Homburg, S., Taieb, M., Boury, E. (2006). *E.coli* induces DNA doublestrand breaks in eukaryotic. *Science*, 313; 848-51.
- 11.**Pankhurst, QA., Connolly, J., Jones, SK., Dobson, J. (2003). Applications of magnetic Nano particles in biomedicine. *Jphs D: Appl Phys*, 36; 167-181.
- 12.**Putze, J., Hennequin, C., Nougayrede, JP., Zhang, W., Homburg, S., Karch, H. (2009). Genetic structure and distribution of the colibactin genomic island among members of the family Enterobacteriaceae. *Infect Immun*, 77; 4696-703.
- 13.**Rajilic-Stojanovic, M., Smidt, H., De Vos, WM. (2007). Diversity of the human gastro intestinal tract microbiota revisited. *Environ Microbiol*, 9; 2125-2136.
- 14.**Rai, VR., Bai, AJ. (2011). Nano particles and their potential application as antimicrobials. In: Mendez-Vilas A.ed Science against microbial pathogens: Communicating current research and technological advances. Formatec, Microbiology Series, 3(1); Badajoz, Spain. 197-209
- 15.**Shaffiey, S.F., Ahmad, M., Shaffiey, S.R., Shapoori, M., Varshoie, H., Azari, F. (2015). Synthesis of copper oxide(CuO) nanoparticles and surveying its bactericidal properties against aeromonas hydrophila bacteria. *Journal of Fasa University Of Medical Science*, 5(1);12-16.