




فصل نامه داروهای گیاهی

journal homepage: www.jhd.iaushk.ac.ir



اثر عصاره چند گیاه دارویی بر روی فعالیت کنه سخت هیالوما مارژیناتوم

امیرحسین مهدویان^۱، سید رضا حسینی^{۱*}، عبدالله قاسمی پیربلوطی^۲، رحمان عبدی زاده^۱

۱. گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران؛

*مسئول مکاتبات (E-mail: dr.s.reza@gmail.com)

۲. مرکز پژوهش های گیاهان دارویی و دامپزشکی سنتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران؛

چکیده	شناسه مقاله
مقدمه و هدف: کنه ها از مهم ترین انگل های خارجی هستند که باعث ایجاد خسارت های اقتصادی شدیدی در نشخوار کنندگان شده و همچنین در انتقال عوامل ویروسی، ریکتیزیایی، باکتریایی و پروتوزوآئی نقش دارند. با توجه به افزایش مصرف آفت کش ها و همچنین بروز سریع مقاومت کنه ها نسبت به سموم شیمیایی و اثرات مخرب آنها بر محیط زیست انسان در نقاط مختلف دنیا استفاده از ترکیبات جایگزین از داروهای گیاهی دارای اهمیت بسزایی می باشد.	تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۲/۰۸/۰۲
روش تحقیق: در این تحقیق اثرات ضدکنه ای عصاره ها و صمغ در مقایسه با سم آفت کش شیمیایی شامل عصاره های گیاهان ارس، گل مینای صخره زی، گل راعی دیهیمی و زرین گیاه و همچنین صمغ آقوزه و باریجه در مقایسه با سم سایپرمترین بر کنه هیالوما مارژیناتوم بررسی شده است. در این آزمایش غلظت های مختلف شامل ۰/۰۱، ۰/۰۰۱ و ۰/۰۰۰۱ درصد از هر کدام از عصاره ها و صمغ های گیاهی مذکور تهیه شدند و اثر آنها بر نوزاد کنه هیالوما مارژیناتوم مورد مطالعه قرار گرفت.	نوع مقاله: پژوهشی موضوع: اتنووتربیناری
نتایج و بحث: نتایج آزمایش نشان داد که در نهایت از بین ۶ گیاه مورد مطالعه، صمغ آقوزه در غلظت ۱/۰ درصد بالاترین تأثیر و عصاره ارس و گل مینای صخره زی در غلظت ۰/۱ درصد در درجه بعدی تأثیر گذاری قرار داشتند.	کلید واژگان:
توصیه کاربردی / صنعتی: با توجه به نتایج این تحقیق می توان جهت تولید سموم ارگانیک ضد انگل و ضد کنه از گیاهانی نظیر صمغ باریجه و عصاره های برگ درخت ارس و گل مینای صخره زی استفاده نمود.	✓ کنه ✓ ضدانگل ✓ گیاهان دارویی

Parola & Raoult, 2001; Hashemi-Fesharki, 1997;
Razmi et al., 2002; Razmi et al., 2003; Parola et al.,

۲۰۰۵). همچنین کنه های خون خوار اجباری خارجی می باشند که بدن حیوانات چسبانده و باعث اضطراب، ضایعات جلدی، لاغری ناشی از خون خواری، ضعف، ناتوانی، تزریق سم و فلنجی کنه ای گردیده و خسارات شدید اقتصادی به صنعت دامپروری وارد آورند. بنابراین آلودگی کنه های از نظر پزشکی، دامپزشکی و اقتصادی حائز

۱. مقدمه

کنه های مهم ترین انگل های خون خوار اجباری خارجی می باشند که نسبت به سایر بندپایان خون خوار طیف گسترده تری از بیماری های عفونی ناشی از میکروگانیسم هایی از قبیل عوامل ویروسی، ریکتیزیایی، باکتریایی و تک یاخته ای را به انسان و حیوانات در سراسر جهان منتقل می کنند (Samish & Rehacek, 1999).

دیلدرین در مناطق مختلف کشور می باشد (Enayati et al., 2010; Enayati et al., 2009; Eshghi et al., 2005). لذا مطالعات میزان حساسیت و یا مقاومت احتمالی در برابر سموم و ترکیبات گیاهی جایگزین به منظور جلوگیری از مقاومت سموم در کنه ها ضروری به نظر می رسد (Bagavan et al., 2009). بنابراین در این مطالعه سعی گردیده است اثر ضد کنه ای ۶ عصاره گیاهی شامل زرین گیاه (*Dracocephalam multicale*), گل مینای صخره زی (*Tanacetum polycephalum*), گل راعی دیهیمی (*Ferula assa-foetida*)، صمع آنقوزه (*Hypericum scabrum*)، باریجه (*Juniperus excelsa*) و ارس (*ferula gummosa*) با ضدانگل شیمیایی سایپرمترین مورد مقایسه قرار گرفتند.



شکل ۱. کنه هیالوما مارژیناتوم (*Hyalomma marginatum*)

۲. مواد و روش

۲-۱. جمع آوری گیاهان و شناسایی آنها

ابتدا گیاهان دارویی زرین گیاه (*Dracocephalam* *multicale*), گل مینای صخره زی (*Tanacetum* *polycephalum*) و گل راعی دیهیمی (*Hypericum scabrum*) از کوههای منطقه سبز کوه واقع در جنوب استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری گردیدند پس از شناسایی دقیق آنها به کمک متخصص گیاه شناسی و مطابقت با فلور ایران اقدام به خشکاندن گیاهان گردیده سپس ساقه و برگ های گل راعی و گل مینای صخره زی جدا شد و عصاره گیری از قسمت گل این دو گیاه انجام گردید در مورد ارس برگ های گیاه مورد استفاده قرار گرفتند.

اهمیت می باشدند (Hoogstraal, 1980). معمولاً کنترل کنه ها و پیشگیری از بیماری های ناشی از آن ها به طور گستره ای وابسته به استفاده از حشره کش های شیمیایی می باشد اما کاربرد متواالی و استفاده از دوز های نامناسب سموم شیمیایی به ویژه در مناطق مستعد رشد و تکثیر کنه ها، باعث اثرات جانبی مضری از قبیل بروز سریع مقاومت در کنه ها نسبت به آفت کش ها، آلودگی محیط زیست، مسمومیت و آسیب های پاتولوژیک در حیوانات، باقی ماندن سموم در گوشت و شیر نشخوار کنندگان خصوصاً در کشورهای در Brook et al., 2010; Sonenshine, 1993; Beugnet & Chardonnet, 1995; Yildirim et al., 2006).


نتایج مطالعات انجام شده توسط دفتر بین المللی بیماری های واگیر دام نشان می دهد که بالغ بر ۵۴/۵ درصد کشورها در یک گروه انگلی، ۲۲ درصد کشورها حداقل در دو گروه انگلی و در ۲۴/۴ درصد کشورها در بیش از سه گروه انگلی پدیده مقاومت بروز نموده است (Nari & Hansen, 1999a,b). لذا در سال های اخیر در بسیاری از مطالعات استفاده از برنامه های کنترلی چایگزین از قبیل کنترل های بیولوژیک، ترکیبات ضد کنه جدید مانند هورمون ها، فرمون ها و به خصوص ترکیبات گیاهی دارویی شامل عصاره ها و انسان های گیاهی می تواند به عنوان منابع جایگزین عوامل کنترل Hassanain et al., 1997; Zhioua et al., 1999; Onofre et al., 2001; Pirali Kheirabadi et al., 2007; Pirali Kheirabadi et al., 2009.

کنه ها در سراسر مناطق مختلف کشور ایران با میزان متفاوتی پراکنده هستند و هیالوما مارژیناتوم یکی از شایع ترین گونه های کنه سخت در بسیاری از نقاط ایران است که ناقل بیماری های انسان و حیوان می باشد (شکل ۱). هم چنین به دلیل بافت سنتی دامداری در ایران و خسارات ناشی از بندپایان خصوصاً کنه ها، واحد اهمیت مضاعف می باشد (Nabian & Rahbari, 2008; Rahbari et al., 2004) از طرفی برنامه کنترلی کنه در ایران غالباً براساس استفاده از حشره کش های شیمیایی است به گونه ای که سموم پریتروئید و ارگانوفسفره به طور گستردگی مبارزه با کنه های سخت استفاده می شود. اما مطالعات انجام گرفته بیانگر درجات متفاوتی از مقاومت گونه های مختلف هیالوما نسبت به سموم سایپرمترین، گاماسای هالوترين، مالاتيون، پروپکسور و

شده و هر پاکت آغشته به غلظت‌های مختلف عصاره‌ها گردید. لاروهای ۱۵-۲۱ روزه کنه‌ها در معرض عصاره‌ها و سم سایپرمترین قرار گرفتن و متعاقب آن پس از ۲۴ ساعت لاروهای زنده و مرده شمارش گردید (FAO, 2002).

۳. نتایج و بحث

جهت بررسی اثرات ضد کنه‌ای هر یک از گیاهان دارویی و مقایسه آن با سم شیمیایی سایپرمترین ۱۰۰ نوزادان ۱۵ تا ۲۰ روزه کنه‌های مارژیناتوم دو مرتبه در معرض پاکت‌های آغشته به غلظت‌های مختلف عصاره‌ها و سم موردنظر قرار گرفته سپس مرگ و میر کندها با مشاهده حرکت نوزادان کنه‌ها در زیر میکرواستروسکوپ به طور مداوم شمارش و ثبت گردیدند. نمودار ۱ اثر هر یک از عصاره‌های گیاهان دارویی در مقایسه با سم سایپرمترین بر میزان مرگ و میر نوزاد کنه‌ها بر حسب درصد بیان می‌دارد. براساس نتایج حاصله صمغ آنقوze در غلظت ۰/۱ بهترین تأثیر و مینای صخره زی و عصاره ارس در غلظت ۰/۱ درصد درجه بعدی تأثیر گذاری قرار داشتند. البته در مقایسه با سم سایپرمترین اثر کمتری داشته که جهت افزایش اثر این گیاهان باید از غلظت‌های بالاتری استفاده گردد.



نمودار ۱. اثر عصاره و صمغ گیاهان دارویی در مقایسه با سم سایپرمترین بر درصد مرگ و میر نوزاد کنه سخت هیالوما مارژیناتوم

در مطالعاتی در خصوص بررسی اثرات ضد کنه‌ای گیاهان باونه، شمعدانی عطری (ژرائیوم) و اکالیپتوس بر کنه سخت *Rhipicephalus annulatus* (Boophilus) انجام گرفته است

۲-۲. عصاره گیری

به منظور خشکاندن از روش خشکاندن در دمای ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد و در سایه با تهیه استفاده شد. پس از خشکاندن، اقدام به خرد کردن قسمت‌های خشک شده مورد نظر گیاهان نموده و عصاره گیری با استفاده از حلal اتانول ۷۰ درجه به کمک سوکسیله شد. سپس عصاره با دستگاه روتاری (تفطیر در خلا) اقدام به جداسازی حلal‌ها و تغليط عصاره شد. صمغ باریجه و آنقوze از بازار گیاهان دارویی کرمان تهیه شدند.

۲-۳. جمع آوری و پرورش کنه‌ها

کنه‌ها از دو رأس گاو بومی نر و ماده در یک منطقه مسکونی حومه شهر اصفهان طی سه مرحله به فاصله زمانی سه روز صید گردیده به گونه‌ای که اکثر کنه‌ها از اطراف مقعد بین ران‌ها و اطراف پستان گاو ماده جدا شده‌اند. جهت جداسازی کنه‌ها بعد از مقید کردن گاو و انتخاب کنه‌هایی که به اندازه کافی خون‌خواری کرده و بزرگ شده بودند، پس از آغشته کردن آن‌ها با کمی الکل به وسیله پنبه با پنس سرکچ اقدام به تکان دادن آنها به دام که در چپ و راست نموده بدین صورت کم کم اتصال آن‌ها به دام که در حال خون‌خواری از آن بودند، سست شد و آن‌ها به آرامی جدا گردیده به صورتی که سر و ضمایم دهانی آن‌ها بماند و به آزمایشگاه انگل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد منتقل گردید. سپس جنس و گونه کنه‌های نر به وسیله کلید شناسایی کنه‌ها مشخص گردیدند. در مجموع پس از سه بار جداسازی کنه‌ها ۷۴ کنه ماده از آن‌ها جدا شدند. به منظور پرورش کنه‌های ماده خون‌خواره را در الکل ۷۰ درجه شستشو داده و پس از خشک کردن، آن‌ها را در لوله‌های استریل به قطر ۱۰ میلی‌متر و طول ۱۵۰ میلی‌متر قرار داده و درب آن‌ها را با پنبه مسدود و در انکوباتور تحت رطوبت ۸۰-۸۵ درصد و دمای ۲۹-۲۹ درجه سانتی گراد تا تولید تخم نگهداری و سپس تخم‌های حاصل از هر کنه را در لوله‌های کشت تقسیم و مجددًا جهت تولید نوزاد به انکوباتور منتقل گردیدند.

۳-۲. بررسی تیمارها

جهت بررسی اثرات ضد کنه‌ای عصاره گیاهان فوق الذکر از روش آزمایش پاکتی لاروها (Larva Packet Test) با بهره گیری از کاغذ صافی و اتمن شماره ۴ استفاده شد. بدین منظور ابتدا کاغذ صافی به اندازه ۱۰×۸ سانتی‌متر بریده شدند و به صورت پاکت تهیه

- Abdel-Shafy, S. and Zayed, A. A., 2002. *In vitro* acaricidal effect of plant extract of neem seed oil (*Azadirachtaindica*) on egg, immature, and adult stages of *Hyalomma anatomicum excavatum* (Ixodoidea: Ixodidae). *Veterinary Parasitology*, 106: 89-96.
- Bagavan, A., Kamaraj, C., Elango, G., Abduz Zahir, A. and Abdul Rahman, A., 2009. Adulticidal and larvicidal efficacy of some medicinal plant extracts against tick, fluke and mosquitoes. *Veterinary Parasitology*, 166: 286-292.
- Beugnet, F. and Chardonnet, L. 1995. Tick resistance to pyrethroids in New Caledonia. *Veterinary Parasitology*, 56: 325-338.
- Brook, W., Bissinger. and Michael Roe, R. 2010. Tick repellents: past, present, and future. *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 96: 63-79.
- Cetin, H., Cilek, J.E., Oza, E., Aydin, L., Devecid, O. and Yanikoglu, A. 2010. Acaricidal activity of *Satureja thymbra* L. essential oil and its major components, carvacrol and γ-terpinene against adult *Hyalomma marginatum* (Acari: Ixodidae). *Veterinary Parasitology*, 170: 287-290.
- Chungsamarnyart, N. and Jansawan, W., 2001. Effect of *Tamarindus indicus* L. against the *Boophilus microplus*. *Kasetsart Journal* (Nat. Sci.), 35: 34-39.
- Enayati, A. A., Asgarian, F., Amouei, A., Sharif, M., Mortazavi, H., Boujhmehrani, H. and Hemingway, J., 2010. Pyrethroid insecticide resistance in *Rhipicephalus bursa* (Acari, Ixodidae). *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 97: 243-248.
- Enayati, A. A., Asgarian, F., Sharif, M., Boujhmehrani, H., Amouei, A., Vahedi, N., Boudaghi, B., Piazak, N. and Hemingway, J. 2009. Propetamphos resistance in *Rhipicephalus bursa* (Acari, Ixodidae). *Veterinary Parasitology*, 162: 135-141.
- Eshghi, M., Motevalli Emami, M. and Ahmadi, M. 2005. Susceptibility status of *Hyalomma* Spp. to acaricides propoxur, malathione and dieldrin. *J. Health Hyg*, 1: 11-15.
- FAO, 2002. *Guid lines for resistance management and integrated parasit control in ruminants*. FAO.
- Handule, I. M., Ketavan, Ch., Gebre, S., 2002. Toxic Effect of ethiopian neem oil on larvae of cattle tick, *Rhipicephalus Pulchellus* Gerstaeker. *Kasetsart Journal*, (Nat. sci.) 36: 18-22.

مشخص شد که گیاه شمعدانی عطری (ژرانیوم) و اکالیپتوس از خواص ضد کنهای خوبی برخوردارند و از آنها می‌توان در کنترل *Pirali Kheirabadi et al., 2007*; بیولوژیک کنه‌ها استفاده نمود (*Pirali Kheirabadi et al., 2009*

عبدل- شافی و هم‌کاران (*Abdel-Shafy et al., 2002*) در پژوهشی اعلام کردند که روغن زیتون تاخ اثر قابل توجهی در کنترل کنهای *Hyalomma anatomicum* دارد. همچنین در مطالعه‌ی *Rhipiceph* دیگری مشخص شد که روغن زیتون تاخ بر روی کنه *Handule et al., 2010* دارای اثرات کنه کشی دارد (*Iori et al., 2004*). سایر محققین (*Chungsamarnyart and Jansawan, 2011*) اثرات ضد کنهای وابسته به دوز روغن درختچه‌ای علیه نوزاد *Ixodesricinus* را گزارش نمودند.

در یک مطالعه‌ای (*Boophilus microplus* *Cetin et al., 2010*) اثر ضد کنهای تمبر هندی را علیه کنه *microplus* نشان دادند. سایر پژوهشگران اثرات ضد کنهای گیاه مرزه زوفایی با ترکیبات موثر کارواکرول و گاما-ترپینین در غلظت‌های ۵، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر را بر کنه بالغ *Hyalomma marziyanatum* را بررسی نمودند که با افزایش غلظت و زمان تماس انسان گیاه مورد نظر اثرات کشنیدگی افزایش می‌یابد.

۴. نتیجه گیری

با توجه به افزایش مصرف آفت‌کش‌ها از قبیل سموم ضد کنه همچنین بروز سریع مقاومت کنه‌ها نسبت به سموم شیمیایی در نقاط مختلف دنیا و اثرات مخرب آنها بر محیط زیست انسان، استفاده از ترکیبات جایگزین از اهمیت چندانی برخوردار است. از طرفی کم بودن عوارض جانبی، عدم مقاومت پاتوژنی در برابر داروهای گیاهی در مقایسه با سموم سنتزی یا شیمیایی، پایین بودن هزینه تولید آن‌ها، دسترسی آسان و عدم آلودگی محیط زیست از عوامل مهم استفاده از داروهای گیاهی در مبارزه با آفات می‌باشد گیاهان دارویی دارای اندام‌های هستند که حاوی ترکیبات طبیعی غیر سمی با فعالیت ضد کنه‌ای می‌باشند.

۵. منابع

- Rahbari, S., Nabian, S. and Shayan, P., 2007. Primary report on distribution of tick fauna in Iran. *Parasitology Research.*, 101: 175–177.
- Razmi, G.R., Hosseini, M. and Aslani, M. R., 2003. Identification of tick vectors of ovine theileriosis in an endemic region of Iran. *Vetertinay Parasitology.*, 116: 1–6.
- Razmi, G. R., Naghibi, A., Aslani, M. R., Fathivand, M. and Dastjerdi, K., 2002. An epidemiological study on ovine babesiosis in the Mashhad suburb area, province of Khorasan Iran, Iran. *Vetertinay Parasitology.*, 108: 109–115.
- Samish, M. and Rehacek, J. A., 1999. Pathogens and predators of tick and their potential in biological control. *Annual Review of Entomology.*, 44: 159–182.
- Sonenshine, D. E., 1993. *Biology of Ticks*. Vol. 2, Oxford University Press, New York.
- Telmadarrai, Z., Bahrami, A. and Vatandoost, H., 2004. A survey on fauna of ticks in West Azerbaijan Province Iran. *Iranian Journal of Public Health.*, 33: 65–69.
- Yildirim, M. Z., Benli, A. C. K., Selvi, M., Ozkul, A., Erkoc, F. and Kocak, O., 2006. Acute toxicity, behavioral changes, and histopathological effects of deltamethrin on tissues (gills, liver, brain, spleen, kidney, muscle, skin) of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus* L.) fingerlings. *Environmental Toxicology.*, 21: 614–620.
- Zhioua, E. Heyer, K. Browning, M. Ginsberg, H. S. and LeBrun, R. A., 1999. Pathogenicity of *Bacillus thuringiensis* variety kurstaki to *Ixodes scapularis* (Acari Ixodidae). *Journal of Medical Entomology.*, 36: 900–902.
- Hasheemi-Fesharki, R., 1997. Tick-borne diseases of sheep and goats and their related vectors in Iran. *Parassitologia.*, 39: 115–117.
- Hassanain, M. A. el-Garhy, M. F. Abdel-Ghaffar, F. A. el-Sharaby, A. Abdel Megged, K.N., 1997. Biological control studies of soft and hard ticks in Egypt: I. The effect of *Bacillus thuringiensis* varieties on soft and hard ticks (Ixodidae). *Parasitology Research.*, 83: 209–213.
- Hoogstraal, H., 1980. Ticks (Ixodoidea) from wild sheep and goats in Iran and medical and veterinary implications. *Fieldiana Zool.*, 12: 1-16.
- Iori, A., Grazioli, D., Gentile, E., Marano, G., Salvatore, G., 2005. Acaricidal properties of the essential oil of *Melaleuca alternifolia* Cheel (tea tree oil) against nymphs of *Ixodes ricinus*. *Veterinary Parasitology.*, 129: 173–176.
- Nabian, S. Rahbari, S., 2008. Occurrence of soft and hard ticks on ruminants in Zagros mountainous areas of Iran. *Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases.*, 2: 16–20.
- Nari, A. and Hansen J.W., 1999a. *Animal production and health division, food and agriculture organization of the United Nations*, Vialledelle di Caracalla – 00100 Rome, Italia.
- Nari, A. and Hansen J.W., 1999b. *Resistance of ecto- and endo-parasites: Current and future solutions*, 67th General Session. International Committee. OIE., Paris.
- Parola, P. and Raoult, D., 2001. Ticks and tick-borne bacterial human diseases, an emerging infectious threat. *Clinical Infectious Diseases.*, 32: 897–928.
- Parola, P., Paddock, C. D. and Raoult, D., 2005. Tick-borne rickettsioses around the world, emerging diseases challenging old concepts. *Clinical Microbiology Reviews.*, 18: 719–756.
- Pirali-Kheirabadi, K. H. and Razzaghi-Abyaneh, M., 2007. Biological activities of chamomile (*Matricaria chamomile*) flowers' extract against the survival and egg laying of the cattle fever tick (Acari Ixodidae). *Journal of Zhejiang University Science. B.* 8: 684–688.
- Pirali-Kheirabadi, K. H., Razzaghi-Abyaneh, M. and Halajian, A., 2009. Aricidal effect of Pelargonium roseum and Eucalyptus globules essential oils against adult stage of *Rhipicephalus* (*Boophilus*) *annulatus* in vitro. *Vetertinay Parasitology.*, 162: 346–349.