



فصل نامه داروهای گیاهی

journal homepage: www.jhd.iaushk.ac.ir



شناسایی ترکیبات اسانس برگ گونه بومادران زیر گونه البرزی *Achillea millefolium* subsp. *elbursensis*

منصوريه قوام*

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران؛

*مسئول مکاتبات (mghavam@kashanu.ac.ir)

عنوان مقاله	چکیده
تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۳/۰۱/۱۷	مقدمه و هدف: بومادران (<i>Achillea millefolium</i>) یکی از گونه‌های با ارزش دارویی و صنعتی موجود در مراتع ایران و متعلق به خانواده کاسنی Asteraceae است. این گیاه به طور خودرو در دشت‌ها، کنار جاده‌ها و نواحی کوهستانی می‌روید. از نظر درمانی التیام دهنده جراحت‌بوده و به عنت دارا بودن تانن و مواد تلخ و عطری بر روی سلسله اعصاب و قلب اثر می‌نماید. این گیاه در ایران دارای دو زیر گونه شامل <i>A. millefolium</i> subsp. <i>millefolium</i> (بومادران البرزی) و <i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>elbursensis</i> (بومادران هزاربرگ) می‌باشد که از نظر اختصاصات ظاهری بسیار شبیه به هم بوده و تنها از نظر ارتفاع، اندازه و رنگ گل آذین از هم متفاوت هستند. هدف از این تحقیق، استخراج و شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس برگ گونه بومادران زیر گونه البرزی (<i>A. millefolium</i> subsp. <i>elbursensis</i>) است.
تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۳/۰۴/۱۳	روش تحقیق: به منظور نمونه برداری از زیر گونه البرزی در هنگام گلدهی در اوایل تیرماه در رویشگاه دیزین (۳۳۵۰ متر) برگ‌های گیاه مورد نظر در طول یک ترانسکت ۱۰۰ متری از سه نقطه به طور تصادفی جمع آوری گردید. سپس از هر نمونه گیاهی خشک شده به مدت ۲ ساعت اسانس گیری و جهت شناسایی ترکیب‌های اسانس از دستگاه کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد.
نوع مقاله: علمی – پژوهشی کوتاه	نتایج و بحث: بازدهی اسانس برگ‌های گیاه ۰/۸۲٪ (حجمی اوزنی) به دست آمد. تعداد ۲۰ ترکیب اسانس شناسایی شد که دو ترکیب کامازولن ۰/۶۹٪، ای-کاربوفیلن ۰/۴٪ و او/۸ سینئول ۰/۴٪، ترکیبات اصلی و مهم در زیر گونه البرزی بودند.
موضوع: فیتوشیمی	توصیه کاربردی / صنعتی: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق زیر گونه البرزی منبع غنی و منحصر به فرد کامازولن است که به عنوان یک ذخیره ژنتیکی بومی باید در محیط طبیعی حفظ شود و تدبیری جهت کشت و انبوه سازی آن فراهم گردد.

شمالی پراکنده اند (Candan *et al.*, 2003). این گیاه در ایران

دارای دو زیر گونه شامل *Achillea millefolium* *elbursensis*

Achillea millefolium subsp. *elbursensis* (بومادران البرزی) و

Achillea millefolium subsp. *millefolium* (بومادران هزاربرگ) می‌باشد. این دو گیاه از نظر

اختصاصات ظاهری بسیار شبیه به هم بوده و تنها از نظر ارتفاع،

اندازه و رنگ گل آذین و گاهی رنگ گل‌ها از هم متفاوت هستند به

۱. مقدمه

گیاهان دارویی خانواده کاسنی Asteraceae به دلیل انعطاف

اکولوژیک بسیار زیاد نسبت به اقلیم‌های متنوع، ذخایر ژنتیکی

مهتمی محسوب می‌گردد. در این خانواده جنس *Achillea* دارای

۸۵ گونه است که بیشتر در اروپا و آسیا و قسمت‌هایی از آمریکای

از آنجا که زیرگونه البرزی بومادران یک گیاه بومی و در حال انقراض است و از سوی دیگر از نظر ترکیب انسانس ممتاز و غنی از کامازولن است؛ با هدف شناسایی دقیق ترکیبات انسانس برگ آن در شرایط رویشگاهی و انسانس‌گیری متفاوت از تحقیقات قبلی و جهت شناسایی بهترین شرایط رویشگاهی از نظر کمیت و کیفیت انسانس تحقیق حاضر طراحی و انجام گرفت.

۲. مواد و روش‌ها

۲-۱. جمع‌آوری گیاه و شناسایی آن

جهت نمونه‌برداری در هنگام گل‌دهی در اوایل تیرماه برگ‌ها از ارتفاع ۳۳۵۰ متری دیزین در طول یک ترانسکت ۱۰۰ متری به فواصل ۳۰ متر از سه نقطه به طور تصادفی از پایه‌های گیاهی مورد نظر جمع آوری گردید (جدول ۱). سپس نمونه‌های گیاه به هریاریوم موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع انتقال یافت و توسط دکتر مصطفی اسدی مورد شناسایی قرار گرفت.

جدول ۱. مشخصات جغرافیایی رویشگاه مورد مطالعه

رویشگاه	جهت	شیب (درصد)	ارتفاع (متر)	مختصات جغرافیایی
دیزین	شمالی	۴۰ درصد	۳۳۵۰	N ۳۶° ۱'۴۸/۳" E ۵۱° ۲۵' ۴۹/۸"

۲-۲. استخراج انسانس

پس از خشک شدن کامل نمونه‌های برگ هر نقطه برداشت توسط آسیاب برقی کوچک به ذرات ریز تبدیل شده سپس از هر نمونه گیاهی به مقدار ۸۰ گرم به روش تقطیر با آب (Clevenger) به مدت ۲ ساعت مورد انسانس گیری قرار گرفت. وزن انسانس جمع آوری شده پس از آب گیری به طور دقیق محاسبه گردید و با استفاده از وزن خشک گیاه در ۵ گرم، وزن خشک گیاه در ۸۰ گرم محاسبه و بر اساس وزن انسانس در ۱۰۰ گرم محاسبه و راندمان انسانس به دست آمد.

۲-۳. شناسایی ترکیب‌های تشکیل دهنده انسانس

جهت شناسایی ترکیب‌های انسانس از دستگاه کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد. دستگاه کروماتوگراف گازی الگوی Varian 3400 متعلق به طیف سنج

گونه‌ای که تشخیص آن‌ها از هم در نگاه اول تقریباً غیر ممکن می‌باشد. بومادران البرزی، گیاه کوتاه قد تا ارتفاع ۴۰ سانتی‌متر، گل آذین انبوه به قطر تا ۴ سانتی‌متر، برآکته‌های گل آذین در زیر گل آذین قهوه‌ای تا سیاه رنگ، گل‌های زبانه‌ای سفید یا ارغوانی دارند. از نظر خواص درمانی در قرون اولیه، از بومادران برای بند آوردن خون و علاج زخم‌هایی که با خونرودی همراه بوده استفاده به عمل می‌آمده است. این گیاه به علت دارا بودن تانن و مواد تلخ و عطری بر روی سلسله اعصاب و قلب اثر می‌نماید و در درمان بیماری‌های عصبی، هیستری، صرع، ضعف قلب و خستگی عمومی موثر است. همچنین نتایج بررسی‌های (Haidara *et al.*, 2003) در مورد این گیاه نشان داده است که خاصیت ضدتوموری و ضدسرطانی دارد. همچنین از انسانس این گیاه در صنایع بهداشتی و آرایشی در ساختن کرم‌ها و پمادها برای لطفات پوست و مداوای تورم‌های پوستی و نیز در صنایع عطرسازی استفاده به عمل می‌آید.

در بررسی فیتوشیمی انسانس گیاه Achillea millefolium در برگ و سرشاخه گل‌دار جمع آوری شده از کشور پرتغال، حضور ترکیب ۱،۸-سینئول (۷/۲۸٪) و سابینن (۴/۱۵٪) در گل و سابینن (۸/۱۴٪) در برگ و عدم حضور آزولن را گزارش شده است (Figueiredo *et al.*, 1992). ترکیبات انسانس Achillea millefolium در کانادا مورد مطالعه قرار گرفت و کامازولن (۷/۲۶٪) در گل و کامفور (۸/۱۶٪) و کامازولن (۱/۱۱٪) در برگ این گیاه تشخیص داده شد (Lorencio *et al.*, 1999). نمونه‌ای از بومادران Achillea millefolium subsp. elbursensis در برگ و گل به ترتیب ۰/۰۹ درصد و ۰/۰۵ درصد ارزیابی شده است. رنگ انسانس آبی پرنگ بود و نتایج حاصل از تجزیه انسانس نشان داد مقدار ترکیب کامازولن در گل ۵۴ درصد و در برگ ۳۵ درصد بود. سایر ترکیبات عمده در گل و برگ به ترتیب شامل پارا-سیمن (۴/۱٪ و ۸/۱۹٪)، کامفور (۸/۱٪ و ۸/۵٪) و ایزوبورنئول (۶/۷٪ و ۷/۵٪) بودند (Jaimand *et al.*, 2006).

راندمان انسانس با روش تقطیر با آب زیرگونه Achillea millefolium subsp. elbursensis از ارتفاع ۳۰۰۰ متری دیزین در برگ و گل به ترتیب ۰/۰۹ درصد و ۰/۰۵ درصد ارزیابی شده است. رنگ انسانس آبی پرنگ بود و نتایج حاصل از تجزیه انسانس نشان داد مقدار ترکیب کامازولن در گل ۵۴ درصد و در برگ ۳۵ درصد بود. سایر ترکیبات عمده در گل و برگ به ترتیب شامل پارا-سیمن (۴/۱٪ و ۸/۱۹٪)، کامفور (۸/۱٪ و ۸/۵٪) و ایزوبورنئول (۶/۷٪ و ۷/۵٪) بودند (Jaimand *et al.*, 2006).

فمول مولکولی کامازولن $C_{14}H_{16}$ و وزن مولکولی آن ۱۹۸ و نام علمی کامازولن ۱ و ۴- دی متیل- ۷- اتاژولن است که لیندازولن نیز نامیده می‌شود.

از مونوترپنهای اکسیژن‌دار ۱،۸-سینئول (۴/۹٪) و از دسته سزکویی ترپن‌های هیدروکربن‌های ترکیب ای-کاربوفیلن (۴/۴٪) برخلاف نمونه برگ مطالعه قبلی (Jaimand *et al.*, 2006) در این برگ این گونه شناسایی شد. لینالول (۲/۷٪)، کامفور (۲/۲٪) و ای-نزویلول (۲/۷٪) سایر ترکیبات بالای ۲ درصد بودند که فقط کامفور مشابه مطالعه قبلی (Jaimand *et al.*, 2006) بود ولی درصد آن بسیار کمتر از گزارش قبلی است.

این گیاه با هیچ یک از زیرگونه‌های دیگر *Achillea millefolium* در ایران و حتی سایر کشورها قابل مقایسه نیست. بیشترین مقدار سزکویی‌ترپن کامازولن به دست آمده از این گیاه در کانادا گزارش شده که حدود ۲۶/۷ درصد در گل وجود داشته است (Lorencio *et al.*, 1999).

جدول ۲. ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس برگ *Achillea millefolium* subsp. *elbursensis*

درصد	RI ¹	نام ترکیب	ردیف
۰/۳	۹۴۲	α -Pinene	۱
۰/۳	۹۷۲	Sabinene	۲
۰/۷	۹۷۶	β -Pinene	۳
۰/۶	۹۸۷	Myrcene	۴
۱/۸	۱۰۲۷	Limonene	۵
۴/۹	۱۰۳۱	1,8-Cineole	۶
۰/۳	۱۰۳۶	<i>trans</i> - β -Ocimene	۷
۰/۵	۱۰۵۱	<i>Cis</i> Sabinene Hydrate	۸
۲/۷	۱۰۸۱	Linalool	۹
۲/۲	۱۱۱۹	Camphor	۱۰
۱/۹	۱۱۶۵	Borneol	۱۱
۰/۴	۱۱۶۹	Isopulegol	۱۲
۰/۹	۱۱۸۵	α -Terpineol	۱۳
۴/۴	۱۴۱۸	<i>cis</i> -Caryophyllene	۱۴
۰/۶	۱۴۴۵	α -Humulene	۱۵
۰/۴	۱۴۷۴	β -Chamigrene	۱۶
۲/۷	۱۵۵۹	<i>cis</i> -Nerolidol	۱۷
۰/۷	۱۵۶۹	Globulol	۱۸
۰/۴	۱۶۵۲	α -Eudesmol	۱۹
۶۹/۲	۱۷۲۸	Chamazulene	۲۰

جرمی II، ستون DB-۵ (نیمه قطبی) به طول ۳۰ میلی‌متر، قطر داخلی ۰/۲۵ میلی‌متر و ضخامت لایه فاز ساکن برابر ۰/۲۵ میکرون است. دتکتور Ion trap (سیستم تله یونی)، گاز حامل هلیوم، سرعت جریان گاز حامل ۵۰ ml/min و انرژی یونیزاسیون ۷۰ الکترون ولت است. درجه حرارت ۴۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد با سرعت افزایش ۴ درجه سانتی گراد در دقیقه، درجه حرارت محفظه تزریق ۲۶۰ درجه سانتی گراد و دمای ترانسفرلاین ۲۷۰ درجه سانتی گراد تنظیم شده است. شناسایی طیف‌ها به کمک شاخص‌های بازداری آن‌ها که با تزریق هیدروکربن‌های نرمال (C₇-C₂₅) تحت شرایط یکسان با تزریق اسانس‌ها و توسط برنامه کامپیوتری نوشته شده (زبان بیسیک) محاسبه شدند و در ضمن مقایسه آن‌ها با مقادیری که در منابع مختلف منتشر شده صورت پذیرفت و با استفاده از طیف‌های جرمی ترکیب‌های استاندارد، استفاده از اطلاعات موجود در کتابخانه ترپن‌ویدها در کامپیوتر دستگاه GC/MS تایید شدند. محاسبه کمی (تعیین درصد هر ترکیب) به کمک داده پرداز EuroChrom 2000 به روش نرمال کردن سطح^۱ و نادیده گرفتن ضرایب پاسخ^۲ مربوط به به طیف‌ها انجام شد.


۲. نتایج و بحث

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بازدهی اسانس برگ‌های گیاه (۰/۸۲٪ حجمی/ وزنی) به دست آمد. تجزیه شیمیایی اسانس مندرج در جدول ۲ در زیرگونه البرزی تعداد ۲۰ ترکیب در برگ را شناسایی نمود که بخش عمده تشکیل‌دهنده اسانس ترکیب کامازولن (۶۹/۲٪) بود. حضور رنگ آبی پرنگ اسانس در واقع نشانه حضور بالای ترکیب کامازولن است.

جایمند و هم‌کاران (Jaimand *et al.*, 2006) در مطالعه ای در *Achillea millefolium* subsp. *elbursensis* بر این نکته اذعان دارند اما درصد ترکیب کامازولن (۳۵٪) کمتر از مطالعه حاضر گزارش شده است. کامازولن یک سزکویی‌ترپن است که از ماده‌ی پیش‌ساز «پروکامازولن» (ماتریسین) تحت تأثیر حرارت به وجود می‌آید.

1. Area normalization method
2. Response factors

grow in Cuba. *Journal of Essential Oil.*, 10: 427-428.



شکل ۱: ساختار کامازولن موجود در اسانس بومادران البرزی

۴. نتیجه گیری

میزان بالای ترکیب کامازولن در برگ این گیاه بالغ بر ۶۹ درصد بیانگر بالا بودن ارزش داروئی برگ گونه بومادران البرزی می باشد. بنابراین حفظ این ذخیره ارزشمند ژنتیکی در رویشگاههای اندک در رشته کوههای البرز بسیار ارزشمند است. تولید و پرورش این گونه ارزشمند می تواند گامی موثر در راستای زراعت متابولیک کامازولن محسوب شود.

۵. منابع

- Candan, F., Unlu, M., Tepe B. and Daferera, D. 2003. Antioxidant and antimicrobial activity of the essential oil and methanol extracts of *Achillea millefolium* ssp. *millefolium* (asteraceae). *Journal of Ethnopharmacology.*, 87: 215-220
- Figueiredo, A.C., Barrso, J.C., Pais, M.S.S. and Scheffer, J.J.C. 1992. Composition of the essential oil from leaves and flowers of *Achillea millefolium* ssp. *millefolium*. *Flavour and Fragrance Journal.*, 7: 219-222.
- Haidara, k., Zamir, L., Shi, Q.W. and Batist, G. 2006. The flavonoid Casticin has multiple mechanisms of tumor cytotoxicity action. *Cancer Letters.*, 242: 180-190.
- Jaimand, K., Rezaee, M.B. and Mozaffarian, V. 2006. Chemical constituents of the leaf and flower oils from *Achillea millefolium* subsp. *elbursensis*. *Journal of Essential Oil Research.*, 18: 293-295
- Lorenco, P.M.L., Figueiredo, A.C., Barroso, J.G., Pedro, L.G. and Oliveira, M.M. 1999. Essential oils from hairy root cultures and from plant roots of *Achillea millefolium*. *Phytochemistry.*, 51: 637-642.
- Pino, J.A., Rosado, A. and Fuents, V. 1998. Chemical composition of the leaf oil of *Achillea millefolium*