

## مقایسه پارازیتسم ظاهری و حاشیه‌ای زنبورهای پارازیتوئید تخم زنجبرک مو *Arboridia kermanshah Delabola* (Hem., Cicadellidae) در اقلیم‌های مختلف

### استان اصفهان

مسعود لطیفیان<sup>۱\*</sup>، ابراهیم سلیمان‌نژادیان<sup>۲</sup>

۱- استادیار، موسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری کشور، اهواز  
۲- دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

### چکیده

تخم زنجبرک مو *Arboridia kermanshah Delabola* در تاکستان‌های استان اصفهان مورد حمله دو گونه زنبور پارازیتوئید *Anagrus atomus* L. (گونه A) و *Ufens* sp. (گونه B) قرار می‌گیرد. برای انجام این تحقیق از مناطق مختلف اقلیم‌های استان اصفهان تعداد ۲۷ تاکستان انتخاب شد. در هر هکتار از تاکستان‌های انتخابی تعداد ۱۰ عدد بوته مو به صورت تصادفی انتخاب و از هر بوته سه برگ از نواحی پایین، وسط و بالا نمونه برداری شد. سپس تعداد تخم‌های سالم و پارازیت‌شده شمارش گردیده و به کمک آن‌ها درصد پارازیتسم ظاهری در هر تاکستان برآورد شد. از هر اقلیم سه نمونه ۳۰ تایی از تخم‌های زنجبرک پارازیت‌شده به صورت تصادفی انتخاب شده و تعداد زنبورهای خارج شده هر دو گونه ثبت شد. به کمک داده‌های حاصل درصد پارازیتسم حاشیه‌ای دو گونه محاسبه و با هم مقایسه گردیدند. متوسط درصد پارازیتسم ظاهری در کل استان ۸/۳۳ درصد بوده که دامنه آن از حداقل ۱/۵ در اقلیم بسیار گرم با بیابان‌های خشک تا حداکثر ۴۳ درصد در معتدل سرد با بیابان‌های گرم و خشک متغیر بود. اقلیم‌های معتدل سرد با بیابان‌های گرم و خشک و نیمه‌خشک سرد با بیابان‌های خشک با متوسط ۸۲/۸ درصد دارای بیشترین درصد پارازیتسم حاشیه‌ای برای گونه A و اقلیم بسیار گرم با بیابان‌های خشک با متوسط ۴/۹ درصد دارای بیشترین درصد پارازیتسم حاشیه‌ای برای گونه B بود. پارازیتسم حاشیه‌ای هر دو گونه دارای همبستگی متوسط تا زیاد با درصد پارازیتسم ظاهری در اقلیم‌های مختلف استان اصفهان بودند. همبستگی گونه A مثبت بوده، به عبارت دیگر با افزایش درصد پارازیتسم حاشیه‌ای این گونه درصد پارازیتسم ظاهری در اقلیم‌های مختلف افزایش یافته بود. این در حالی است که همبستگی گونه B منفی بوده و با افزایش درصد پارازیتسم حاشیه‌ای این گونه در هر اقلیم از درصد پارازیتسم ظاهری آن کاسته شده بود. با توجه به مجموع نتایج ارایه شده می‌توان چنین استنباط نمود که در اقلیم‌های مختلف استان اصفهان گونه *A. atomus* کارایی بیشتری نسبت به گونه *Ufens* sp. دارد.

واژه‌های کلیدی: زنجبرک مو، پارازیتسم ظاهری، پارازیتسم حاشیه‌ای

\* نویسنده رابط، پست الکترونیکی: [masoudlatifian@yahoo.com](mailto:masoudlatifian@yahoo.com)

تاریخ دریافت مقاله (۸۸/۱۲/۱۵) - تاریخ پذیرش مقاله (۸۹/۴/۱۵)



## مقدمه

گونه غالب زنجبرک مو در تاکستان‌های استان اصفهان (*Arboridia kermanshah* Delabola (Hem., Cicadellidae) می‌باشد (Latifian et al., 2004) که مورد حمله دو گونه زنبور پارازیتوئید *Anagrus atomus* L. (Hym., Mymaridae) و *Ufens* sp. (Hym., Trichogrammatidae) قرار می‌گیرد (Hesami et al., 2001). این دو گونه به‌طور هم‌زمان در طول فصل جمعیت تخم این زنجبرک را پارازیته می‌کنند (Hesami et al., 2001).

زنبور *A. atomus* به‌عنوان پارازیتوئید تخم زنجبرک‌های (*Erythroneura eburnean* Fieber (Hem., Cicadellidae) (Bakkendorf, 1971) و (*Erythroneura elengantula* Osborn (Hem., Cicadellidae) (Remund et al., 1994) و (*Erythroneura elengantula* Osborn (Hem., Cicadellidae) (Corbet & Rosenheim, 1996) روی مو نیز گزارش شده است.

زنبورهای جنس *Ufens* نیز گونه‌های مختلف زنجبرک‌ها را در مرحله تخم مورد حمله قرار می‌دهند. از جمله می‌توان به گونه *Ufens principalis* Owen (Hym., Trichogrammatidae) اشاره کرد که پارازیتوئید تخم زنجبرک‌های جنس *Homalodisca* بوده (Wahaibi & Morse, 2010) و یا گونه *Ufens latipennis* Yousuf and Shafee که پارازیتوئید تخم زنجبرک (*Nephotettix virescens* (Distant) (Hem., Cicadellidae) در هندوستان می‌باشد (Yousuf & Shafee, 1987).

یکی از مهمترین مواردی که در برآورد اثر عوامل مرگ و میر در جمعیت‌های مختلف زنجبرک‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بررسی نقش کنترل‌کنندگی پارازیتوئیدهایی می‌باشد که نظیر شرایط این مطالعه به‌طور هم‌زمان جمعیت میزبان را تحت تاثیر قرار می‌دهند (Elkinton et al., 1992). وقتی که یک گونه زنجبرک در مراحل مختلف رشدی و یا حتی در یک مرحله به‌صورت هم‌زمان مورد حمله چند نوع پارازیتوئید قرار می‌گیرد، مشکلاتی نظیر رقابت بین گونه‌های پارازیتوئید به‌وجود می‌آید.

مطالعات انجام شده روی زنبورهای پارازیتوئید تخم زنجبرک‌ها از خانواده‌های *Trichogrammatidae* و *Mymaridae* نشان می‌دهد که این زنبورها در حال تعادل با هم بوده اما اطلاعاتی راجع به هم‌زیستی و شعاع پارازیتسم این دو گروه وجود ندارد. علاوه بر این، روش فعالیت و تغییرات جمعیت این دو گروه یکسان می‌باشد (Denno & Perfact, 1993; Settel & Wilson, 1998).

چنانچه نمونه‌ای از میزبان پارازیته شده در شرایط مزرعه‌ای جمع‌آوری گردد، برای تشخیص میزان پارازیتسم می‌توان یا آن‌ها را پرورش داده و منتظر خروج حشرات کامل پارازیتوئید ماند و یا بدن میزبان را تشریح نمود. مشکل موجود این است که گاهی نتایج این دو روش تخمین‌های متفاوتی از درصد پارازیتسم ارائه می‌دهند. بعضی از میزبان‌ها ممکن است در طی دوره پرورش تلف شده و علایم پارازیتسم را نشان ندهند. بعضی نیز در اثر عوامل دیگری غیر از پارازیتسم تلف گردند. چنین مواردی باعث ایجاد خطا در محاسبه درصد پارازیتسم می‌گردند (Walton et al., 1990). این تفاوت‌ها باعث تمایز پارازیتسم ظاهری<sup>۱</sup> (درصد پارازیتسمی که مستقیماً در نمونه‌برداری برآورد می‌گردد) از پارازیتسم حاشیه‌ای<sup>۲</sup> (درصد پارازیتسمی که در اثر پرورش میزبان‌های پارازیته شده به‌دست می‌آید) می‌شود (Holler & Braune, 1988).

1- Apparent parasitism  
2- Marginal parasitism

تشخیص میزبان‌های پارازیت‌ها برای برآورد حمله حاشیه‌ای وابسته به دوره زمانی می‌باشد که می‌توان در آن دشمن طبیعی را در بدن میزبان تشخیص داد. در سال‌های اخیر از روش‌های مولکولی نظیر الکتروفورز (Holler & Braune, 1988) و روش‌های سرولوژیکی (Walton et al., 1990) برای تشخیص میزبان‌های پارازیت‌ها استفاده شده است. این روش‌ها از حساسیت کافی برای تشخیص تخم و یا لاروهای سنین پایین در مراحل اولیه پارازیت‌یسم برخوردار نیستند (Dent & Walton, 1997).

از طرفی شرایط محیطی در میزان موفقیت پارازیت‌یویدهای زنجرخ‌ها بسیار موثر است. در حالت طبیعی پارازیت‌یویدها محیطی را برای زندگی انتخاب می‌کنند که فعالیت‌های آن‌ها در آن فضا به‌نحو موثر و با حداکثر کارایی انجام شود. این موضوع در جابجایی و انتقال دشمنان طبیعی از نقطه‌ای به نقطه دیگر حایز اهمیت می‌باشد.

از جمله عوامل محیطی موثر بر پارازیت‌یویدهای زنجرخ‌ها می‌توان به دما، رطوبت و نور اشاره نمود (Denno & Perfact, 1993). آگاهی از نقش این عوامل در برآورد کارایی پارازیت‌یویدهای زنجرخ‌ها در کاربرد صحیح آن‌ها ضرورت دارد، برای این منظور می‌توان مجموع دمای لازم برای کامل کردن مراحل زندگی پارازیت‌یوید و زنجرخ را برآورد نموده و به کمک آن پیش‌بینی‌های لازم جهت رهاسازی موثر پارازیت‌یوید را به عمل آورد (Denno & Perfact, 1993).

گاهی نیازهای محیطی چند گونه پارازیت‌یوید که روی نوعی خاص از زنجرخ‌ها فعالیت می‌کنند با هم فرق می‌کنند. این موضوع باعث می‌گردد که هر یک از آن‌ها میکروکلیمای خاصی را برای فعالیت خود انتخاب کرده و رقابت در میان آن‌ها کاهش پیدا کرده و کارایی آن‌ها افزایش یابد (Settel & Wilson, 1998). زنجرخ *Prokelisia marginata* Van (Hem., Delphacidae) توسط زنبور پارازیت‌یوید *Anagrus delicatus* Dozier (Hym., Mymaridae) می‌گردد. مطالعات نشان داده است که یک رابطه وابسته به تراکم بین تعداد تخم میزبان و درصد پارازیت‌یسم در مناطق مختلف جغرافیایی وجود دارد (Cornin & Strong, 1999).

در شرایط داخل کشور تحقیقات مختلفی در رابطه با خصوصیات پارازیت‌یسمی زنبورهای خانواده Mymaridae انجام شده است از جمله این تحقیقات می‌توان به بررسی تغییرات پارازیت‌یسم فصلی زنبور *A. atomus* در جمعیت زنجرخ *Empoasca decipiens* Paoli (Hem., Cicadellidae) اشاره کرد (Naseri et al., 2007). در این بررسی ضمن بررسی درصد پارازیت‌یسم ظاهری و حاشیه‌ای زنبورهای پارازیت‌یوید تخم زنجرخ مو در استان اصفهان، کارایی آن‌ها در اقلیم‌های مختلف آب و هوایی بررسی شده است.

## مواد و روش‌ها

از مناطق مختلف هریک از اقلیم‌های استان اصفهان براساس سطح زیر کشت تعداد ۲۷ تاکستان انتخاب شد. مناطقی از استان اصفهان که زیر کشت مو قرار دارند، طبق تقسیم‌بندی کوپن به سه اقلیم تقسیم می‌گردند (Karimi, 1992):

- الف) اقلیم بسیار گرم با بیابان‌های خشک (منطقه ۱ به اختصار: BWHS)
- ب) اقلیم نیمه‌خشک سرد با بیابان‌های خشک (منطقه ۲ به اختصار: BSKS)
- ج) معتدل سرد با بیابان‌های گرم و خشک (منطقه ۳ به اختصار: DCAS)

در هر هکتار از تاکستان انتخابی تعداد ۱۰ عدد بوته مو به صورت تصادفی انتخاب گردیده و از هر بوته سه برگ از نواحی پایین، وسط و بالا برداشته شد استاندارد بودن تعداد نمونه‌ها قبلاً در تحقیقات انجام شده اثبات شده است (Latifian *et al.*, 2009). تخم‌های حشره به صورت برجستگی لویبایی شکل در سطح برگ قابل رویت بودند (Latifian *et al.*, 2004). تراکم این تخم‌ها به کمک استریومیکروسکوپ شمارش و ثبت گردید. تخم‌های پارازیتسه پس از مدتی سیاه شده و به سادگی از تخم‌های سالم تفکیک شدند. تعداد تخم‌های سالم و پارازیتسه شمارش گردیده و به کمک آن‌ها درصد پارازیتسم در هر تاکستان برآورد شد.

از هر اقلیم سه نمونه ۳۰ تایی از تخم‌های زنجبرک پارازیتسه شده به صورت تصادفی انتخاب شده و تعداد زنبورهای خارج شده هر دو گونه A (*Anagrus atomus*) و B (*Ufens sp.*) ثبت شد. پارازیتسم حاشیه‌ای دو گونه زنبور A و B در سه نوع اقلیم براساس روش زیر (Elkinton *et al.*, 1992) محاسبه شده و ضمن تجزیه واریانس به روش آنالیز یک طرفه<sup>۱</sup> با استفاده از روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن با هم مقایسه گردیدند. گام اول: محاسبه b (ثابت معادله پارازیتسم حاشیه‌ای) برای این منظور از رابطه زیر استفاده می‌گردد:

$$b = c(d_A + d_B) + 1 - d_B$$

در این رابطه  $d_A$  و  $d_B$  به ترتیب میزان پارازیتسم ظاهری گونه A و گونه B می‌باشند که به طور مستقیم از داده‌های مزرعه‌ای و از برآورد نسبت کسر تعداد تخم پارازیتسه به تعداد کل تخم محاسبه می‌گردند. گام دوم: محاسبه  $m_A$  در سه نوع اقلیم: برای این منظور از رابطه زیر استفاده می‌گردد:

$$m_A = [b - (b^2 - 4cd_A)^{1/2}] / 2c$$

گام سوم: محاسبه  $m_B$  در سه نوع اقلیم:

برای این منظور از رابطه زیر استفاده می‌گردد:

$$m_B = d_B / (1 - cm_A)$$

در این روابط  $m_A$  و  $m_B$  به ترتیب پارازیتسم حاشیه‌ای گونه A و B بوده و c نسبت مرگ و میر میزبان در اثر پارازیتوئید A هنگام حمله هم‌زمان زنبورهای A و B می‌باشد. در این آزمایش به دلیل عدم وجود داده در رابطه با رقابت دو پارازیتوئید، مقدار c معادل ۰/۵ در نظر گرفته شده است (Elkinton *et al.*, 1992). ارتباط بین پارازیتسم ظاهری با پارازیتسم حاشیه‌ای با استفاده از روش تجزیه همبستگی<sup>۲</sup> مورد بررسی قرار گرفت به این ترتیب که از آنجا که هر دو صفت کمی هستند از روش اسپیرمن استفاده شد. قدرمطلق ضریب همبستگی نشان‌دهنده شدت ارتباط بین پارازیتسم ظاهری و حاشیه‌ای و علامت آن نشان‌دهنده نوع ارتباط مستقیم و یا معکوس بین روند تغییرات دو صفت بود.


## نتایج و بحث

### مقایسه پارازیتسم ظاهری تخم زنجبرک مو در مناطق مختلف استان اصفهان

متوسط درصد پارازیتسم در کل استان ۸/۳۳ درصد بوده که دامنه آن از حداقل ۱/۵ در اقلیم بسیار گرم با بیابان‌های خشک تا حداکثر ۴۳ درصد در اقلیم معتدل سرد با بیابان‌های گرم و خشک متغیر می‌باشد.

1- ANOVA  
2- Correlation Analysis

مقایسه اثرات اقلیم بر درصد پارازیتسیم ظاهری نشان داد که بین سه نوع اقلیم تفاوت معنی داری در سطح ۵ درصد ملاحظه می گردد ( $P=0/01$ ,  $df=25$  و  $F=36/53$ ). نتایج مقایسه میانگین درصد پارازیتسیم ظاهری در سه نوع اقلیم براساس آزمون چنددامنه‌ای دانکن در شکل ۱ ملاحظه می شود.



شکل ۱- مقایسه میانگین درصد پارازیتسیم ظاهری دو گونه زنبور پارازیتوید A و B در اقلیم‌های مختلف (اقلیم بسیار گرم با بیابان‌های خشک منطقه ۱، اقلیم نیمه خشک سرد با بیابان‌های خشک منطقه ۲، معتدل سرد با بیابان‌های گرم و خشک منطقه ۳) استان اصفهان

Fig 1- Comparison of the mean of apparent parasitism of two hymenopterous parasitoids A and B on different climatic regions (very hot with dry deserts<sup>1</sup>, cold semi dry with dry deserts<sup>2</sup> and cold semi with warm and dry deserts<sup>3</sup>) of Isfahan province

همان‌طور که در شکل ۲ ملاحظه می گردد، اقلیم معتدل سرد با بیابان‌های گرم و خشک با متوسط درصد پارازیتسیم ۲۸/۷۵ دارای بالاترین فعالیت پارازیتسیم بوده و پس از آن اقلیم‌های نیمه خشک سرد با بیابان‌های خشک و بسیار گرم با بیابان‌های خشک به ترتیب با متوسط درصد پارازیتسیم ۸/۰۶ و ۳/۰۴ قرار دارند.

مقایسه پارازیتسیم حاشیه‌ای تخم زنجبرک مو در مناطق مختلف استان اصفهان

پارازیتسیم حاشیه‌ای دو گونه زنبور پارازیتوید A و B در اقلیم‌های مختلف استان اصفهان براساس روابط ۱، ۲ و ۳ محاسبه شد که نتایج آن در جدول ۱ ملاحظه می گردد.

مقایسه اثرات اقلیم بر درصد پارازیتسیم حاشیه‌ای دو گونه نشان داد که بین سه نوع اقلیم تفاوت معنی داری در سطح ۵ درصد ملاحظه می گردد ( $P=0/01$ ,  $df=25$  و  $Fa=0/44$  و  $Fb=17/72$ ). نتایج مقایسه میانگین درصد پارازیتسیم در سه نوع اقلیم براساس آزمون چنددامنه‌ای دانکن در جدول ۱ ملاحظه می شود.

1- BWHS  
2- BSKS  
3- DCAS

جدول ۱- محاسبه و مقایسه پارازیتسم حاشیه‌ای دو گونه زنبور پارازیتوئید A و B در اقلیم‌های مختلف استان اصفهان

Fig 1- Calculating and comparison of the marginal parasitism of the parasitoid A and B on different climatic regions of Isfahan province

Replications	BWHS (منطقه ۱)		
	B	$m_A$	$m_B$
1	1.25	0.89	0.059
2	1.22	0.57	0.072
3	1.35	0.75	0.019
Average	1.27	0.74B	0.05A
Replications	BSKS (منطقه ۲)		
	B	$m_A$	$m_B$
1	1.35	0.74	0.019
2	1.39	0.89	0.033
3	1.31	0.85	0.006
Average	1.35	0.83A	0.019B
Replications	DCAS (منطقه ۳)		
	B	$m_A$	$m_B$
1	1.39	0.81	0.018
2	1.39	0.88	0.034
3	1.39	0.77	0
Average	1.39	0.82A	0.017B


همان‌طور که در جدول ۱ ملاحظه می‌شود، اقلیم‌های معتدل سرد بیابان‌های گرم و خشک و نیمه‌خشک سرد با بیابان‌های خشک با متوسط ۸۲/۸ دارای بیشترین درصد پارازیتسم حاشیه‌ای برای گونه A بوده و پس از آن اقلیم بسیار گرم با بیابان‌های خشک با متوسط درصد پارازیتسم ۷۴ درصد قرار دارند. اقلیم بسیار گرم با بیابان‌های خشک با متوسط ۴/۹ درصد دارای بیشترین درصد پارازیتسم حاشیه‌ای برای گونه B بوده و پس از آن اقلیم‌های معتدل سرد بیابان‌های گرم و خشک و نیمه‌خشک سرد با بیابان‌های خشک با متوسط ۲ درصد قرار دارند.

بر اساس نتایج به‌دست آمده با کاهش درصد پارازیتسم حاشیه‌ای گونه A در هر اقلیم بردرصد پارازیتسم حاشیه‌ای گونه B افزوده شده است. بین درصد پارازیتسم حاشیه‌ای دو گونه در سه اقلیم رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد ( $t=-0/58$ ,  $r=-0/5$ ). بنابراین در اقلیم‌های معتدل سرد بیابان‌های گرم و خشک و نیمه‌خشک سرد با بیابان‌های خشک با آن‌که دارای بیشترین درصد پارازیتسم حاشیه‌ای برای گونه A بوده، درصد پارازیتسم حاشیه‌ای برای گونه B کم بود و در اقلیم بسیار گرم با بیابان‌های خشک بیشترین درصد پارازیتسم حاشیه‌ای برای گونه B ثبت شد.

#### بررسی ارتباط بین پارازیتسم حاشیه‌ای و ظاهری تخم زنجبرک مو در مناطق مختلف استان اصفهان

نتایج آنالیز همبستگی بین دو نوع درصد پارازیتسم حاشیه‌ای و ظاهری در سه اقلیم مورد مطالعه در شکل ۲ به‌شرح زیر ارایه شده است:


درصد پارازیتسم حاشیه‌ای هر دو گونه دارای همبستگی متوسط تا قوی با درصد پارازیتسم ظاهری در اقلیم‌های مختلف استان اصفهان بوده‌اند. همبستگی گونه A مثبت بوده، به‌عبارت دیگر با افزایش درصد پارازیتسم حاشیه‌ای این گونه درصد پارازیتسم ظاهری در اقلیم‌های مختلف افزایش یافته است. این درحالی است که همبستگی گونه B منفی بوده و با افزایش درصد پارازیتسم حاشیه‌ای این گونه در هر اقلیم درصد پارازیتسم ظاهری کاسته شده است.



شکل ۲- ضرایب همبستگی (r) بین پارازیتسم حاشیه‌ای و ظاهری دو گونه زنبور پارازیتوید A و B در اقلیم‌های مختلف استان اصفهان  
 Fig. 3- Correlation coefficient (r) between marginal and apparent parasitism of hymenopterous parasitoids A and B on different climatic regions of Isfahan province

این نتایج نشان می‌دهد که گونه غالب در رقابت دو گونه برای پارازیت کردن تخم‌های زنجبرک مو، گونه A بوده است. گونه B در اقلیم‌هایی موفق بوده که درصد پارازیتسم حاشیه‌ای گونه A کاهش می‌یابد. چنانچه درصد بقا تخم‌های زنجبرک مو از فعالیت گونه A بدون در نظر گرفتن گونه B محاسبه شود (درصد پارازیتسم حاشیه‌ای - ۱۰۰ = درصد بقا) و سپس همبستگی آن را با درصد پارازیتسم حاشیه‌ای B برازش گردد، ضریب همبستگی مثبت و معنی‌داری ( $r=0/5$ ) و  $t(N-2)=0/58$  در اقلیم‌های مختلف نشان می‌دهد. اما بین درصد بقا تخم‌های حاصل از پارازیتسم گونه B با درصد پارازیتسم حاشیه‌ای گونه A همبستگی معنی‌داری قابل برازش نبود. این نتایج نشان می‌دهد که توانایی پارازیتسم گونه B تحت تاثیر گونه A قرار می‌گیرد. اما عکس این حالت صادق نیست.

بررسی ارتباط تراکم جمعیت تخم زنجبرک مو با پارازیتسم حاشیه‌ای و ظاهری در مناطق مختلف استان اصفهان برای این منظور رابطه همبستگی بین تراکم تخم زنجبرک مو با پارازیتسم ظاهری و حاشیه‌ای دو گونه در اقلیم‌های مختلف استان اصفهان بررسی شد که نتایج آن در شکل ۳ ملاحظه می‌گردد.



شکل ۳- ضرایب همبستگی ( $r$ ) بین پارازیتسم حاشیه‌ای و ظاهری دو گونه زنبور پارازیتوئید A و B با تراکم تخم زنجبرک مو در اقلیم‌های مختلف استان اصفهان

Fig. 3- Correlation coefficient ( $r$ ) between marginal and apparent parasitism of hymenopterous parasitoids A and B with grape leafhopper egg densities on different climatic regions of Isfahan province

همان‌طور که در شکل ۳ ملاحظه می‌گردد بین تراکم تخم زنجبرک مو و پارازیتسم ظاهری در اقلیم‌های مختلف استان همبستگی قوی و معنی‌داری در سطح ۵ درصد ملاحظه می‌شود. اما ارتباط را به‌طور کامل توجیه نمی‌کند، زیرا همان‌طور که در قسمت‌های قبلی توضیح داده شد، در اقلیم‌هایی که گونه A فعالیت وابسته به انبوهی ضعیف‌تری نشان می‌دهد گونه B وارد عمل شده و فرصت پارازیتسم را پیدا می‌کند. از نظر ارتباط وابسته به انبوهی، پارازیتسم حاشیه‌ای گونه A قوی‌تر از گونه B عمل می‌نماید.

با توجه به مجموع نتایج ارائه شده می‌توان چنین استنباط نمود که گونه کارتر در اقلیم‌های مختلف استان اصفهان گونه A می‌باشد. بیشترین فعالیت این گونه در اقلیم‌هایی است که دارای دماهای کمتر و رطوبت نسبی بالاتری می‌باشد و از این لحاظ با ویژگی‌های میزبان هماهنگی دارد (Martinson & Dennehy, 1995). با وجود غالب بودن این گونه در اکثر اقلیم‌ها نسبت به گونه دوم، ولی دو گونه با سازش با شرایط اقلیمی متفاوت در واقع از شدت رقابت بین گونه‌ای کاسته و کارایی خود را افزایش می‌دهند.

مطالعات انجام شده در رابطه با پارازیتوئیدهای سایر زنجبرک‌ها نیز مهم بودن عوامل اقلیمی را در کارایی آن‌ها تایید می‌کند. به‌عنوان مثال در بررسی‌های انجام شده پیرامون زنبور پارازیتوئید *Gonatocerus ashmeadi* Girault (Hym., Mymaridae) که روی تخم‌های زنجبرک *Homalodisca coagulata* (Say) (Hem., Cicadellidae) فعال می‌باشد، نشان می‌دهد که انتخاب نژادهای مناسب در مناطق جغرافیایی مختلف متناسب با نوع اقلیم رهاسازی عامل مهم در موفقیت مبارزه بیولوژیک می‌باشد (Jesse et al., 2005). در مطالعات انجام شده در تاجیکستان‌های آلمان سه گونه زنبور پارازیتوئید به‌نام‌های *Anagrus atomus* L. (Hym., Mymaridae)، *Stethynium triclavatum* Enock (Hym., Mymaridae) و *Anagrus avalae* Soyka (Hym., Mymaridae) به‌عنوان پارازیتوئیدهای زنجبرک مو گزارش گردیده‌اند. نتایج تحقیق



فوق‌الذکر نشان می‌دهد که زنبورهای مزبور در ابتدا و انتهای فصل زراعی از کارایی کافی در کنترل زنجبرک مو برخوردار نیستند. در میان گونه‌های مورد بررسی *A. avalae* به دلیل هم‌زمانی فنولوژیکی بیشتر با گونه آفت در کنترل آن نقش موثرتری دارد (Boll & Herrmann, 2004). مطالعات انجام شده در رابطه با زنبورهای پارازیتوئید تخم *Bemesia tabaci* (Hym., Aphelinidae)، شامل گونه‌های *Gennadius* (Hem., Aleyrodidae)، *Eretmocerus* spp. و *Encarsia* spp. (Hym., Aphelinidae) نشان می‌دهد که درصد پارازیتیسیم ظاهری دو گونه در مناطق اقلیمی مختلف از ۴۳/۷ تا ۱۰۰ درصد متغیر می‌باشد. در این مطالعه مشخص شده است که در میان عوامل اقلیمی علاوه بر عوامل آب و هوایی نوع پوشش گیاهی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است (Stansly et al. 1997). اکثر محققانی که در رابطه با بوم‌شناسی و زیست‌شناسی زنجبرک‌ها مطالعه کرده‌اند به این نکته اشاره نموده‌اند که پارازیتوئیدها نقش مهمی در دینامیس جمعیت آن‌ها دارند (Chantarasa & Hirashima, 1984; Prischmann et al., 2007). انجام مطالعات مشابه در رابطه با پارازیتوئیدهای زنجبرک مو در ایران برای شناسایی نژادهای مختلف سازگار آن‌ها برای طراحی مبارزه بیولوژیک موفقیت‌آمیز با آن‌ها از ضروریات می‌باشد. حداکثر نرخ پارازیتیسیم زنبور *A. atomus* در این تحقیق ۸۹ درصد محاسبه شد. این درحالی است که حداکثر میزان پارازیتیسیم همین زنبور در شرایط فعالیت روی زنجبرک *E. decipiens* ۳۳/۳ درصد ذکر گردیده است (Naseri et al., 2007). براساس سایر تحقیقات این زنبور در فعالیت پارازیتیسیمی خود در روی زنجبرک *E. decipiens* به‌صورت وابسته به‌عکس تراکم عمل می‌کند (Agboka et al., 2003) اما نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت زنبور روی *A. kermanshah* به‌صورت وابسته به انبوهی مستقیم است و این موضوع می‌تواند یکی از دلایل موفقیت زنبور *A. atomus* در مهار جمعیت زنجبرک مو باشد. البته تفاوت ویژگی‌های گیاه میزبان *A. atomus* از جمله اندازه، شکل و بافت نیز در موفقیت زنبور *A. atomus* در جمعیت زنجبرک‌های مختلف موثر می‌باشد که انجام تحقیقات تکمیلی در رابطه با شناسایی علل این تفاوت‌ها در گیاهان مختلف جهت بهبود کارایی کنترل بیولوژیک طبیعی با این زنبور ضروری است (Bottrel & Barbosa, 1998). نتایج این تحقیق برتری زنبور *A. atomus* را نسبت به *Ufens* sp. نشان داد. در سایر تحقیقات انجام شده، مقایسه کارایی این زنبور برتری آن‌را نسبت به زنبور *Anagrus epos* Girault (Hymenoptera: Mymaridae) در کنترل جمعیت تخم زنجبرک مو به‌نام *Erythroneura variabilis* Beamer (Hem., Cicadellidae) (Pickett et al., 1989) و نسبت به زنبور *Anagrus nigriventris* Girault (Hym., Mymaridae) در کنترل زنجبرک *Circulifer tenellus* Baker (Wahaibi & Walker, 2000) نشان داده است. پیشنهاد می‌شود برای شناسایی نژادهای مختلف سازگار جهت استفاده در مبارزه بیولوژیک مطالعات مشابهی انجام شود.

## References

- Agboka, K., Agboko, K. T., Poehling, H. M., Raupach, K. and Borgemeister, C. 2003. Searching and oviposition behavior of *Anagrus atomus* (Hym.: Mymaridae) on four host plant of its host, the green leafhopper *Empoasca decipiens* (Hom.: Cicadellidae). Journal of Agriculture Science, 16: 667-678.
- Bakkendorf, O. 1971. Description of *Oligostia tominici* (Hym.: Trichogrammatidae) and Notes on the hosts of *Anagrus atomus* and *Anaphes autumnalis* (Hym.: Mymaridae). Entomophaga, 16: 363-366.
- Boll, S. and Herrmann, T. V. 2004. A long-term study on the population dynamics of the grape leafhopper (*Empoasca vitis*) and anatoagnistis mymarid species. Journal of Pest Science, 77(1): 33-42.
- Bottrell, D. G. and Barbosa, P. 1998. Manipulating natural enemies by plant variety selection and modification: A realistic strategy? Annual Review of Entomology, 43: 347-367.
- Corbet, A. and Rosenheim, J. A. 1996. Impact of natural enemy overwintering refuge and its interaction with the surrounding landscape. Ecological entomology, 21: 155-164.

- Cornin, J. T. and Strong, D. R. 1999.** Dispersal-dependent oviposition and aggregation of parasitism. *The American Naturalist*, 154: 23-36.
- Chantaras, A. S. and Hirashima, Y. 1984.** Host range and host suitability of *Anagrus incarnatus* (Hym.: Mymaridae) an egg parasitoid of delphacid plant hopper. *Applied Entomology*, 19: 491-497.
- Denno, R. F. and Perfact, J. T. 1993.** *Plant Hoppers Their Ecology and Management*. Chapman & Hall, London, 532pp.
- Dent, D. R. and Walton, M. P. 1997.** *Methods in Ecological and Agricultural Entomology*. CAB. Newyork, 387 pp.
- Elkinton, J. S. Buonaccosi, J. P. Bellowes, T. S. and Van Driesche, R. G. 1992.** Marginal attack rate, K-values and density dependence in the analysis of contemporaneous mortality factors. *Researches on Population Ecology*, 34: 29-44.
- Hesami, Sh. Syedoleslami, H. and Ebadi, R. 2001.** Study on the morphology of *Anagrus atomus* (Hym.: Mymaridae) the egg parasitoid of grape leafhopper *Arboridia kermanshah* (Hom.: Cicadellidae). *Journal of Entomological Society of Iran*, 21(1): 51-67.
- Holler, C. and Braune, H. J. 1988.** The use of isoelectric focusing to assess percentage hymenopterus parasitism in aphid populations. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 47: 105-114.
- Jesse, H. de Walker, L. and Jones, A. 2005.** Genetic differentiation among geographic populations of *Gonatocerus ashmeadi*, the predominant egg parasitoid of the glassy-inged sharpshooter, *Homalodisca coagulata*. *Journal of Insect Science*, pp: 1-9.
- Karimi, M. 1992.** *Climatology of Central Regions of Iran*. Industrial University of Isfahan, 96 pp.
- Latifian, M. Seyedoleslami, H. and Khajeali, J. 2004.** Morphology of immature stages, biology and seasonal population fluctuation of grape leafhopper *Arboridia kermanshah* in Isfahan province. *Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources*, 9(3): 229-240.
- Latifian, M., Seyedoleslami, H. and Khjeali, J. 2009.** Comparison of several sampling techniques to estimate population densities of grape leafhopper *Arboridia kermanshah* delabola (Hom.: cicadellidae). *Journal of Entomological Research*, 1(2): 95-108.
- Martinson, J. E. and Dennehy, J. 1995.** Influence of temperature driven phenology and photoperiodic induction of reproduction diapause on population dynamics of *Erythroneura comes*. *Environmental entomology*, 26(5): 1504-1514.
- Nasari, B., Fathipour, Y. and Talebi, A. A. 2007.** Seasonal parasitism of *Empoasca decipiens* by *Anagrus atomus* on four bean species in Tehran area. *Jouranal of Applied Entomology and Phytopathology*, 75(1): 1-11.
- Pickett, C. H., Wilson, L. T., Flaherty, D. L. and Gonzales, D. 1989.** Measuring the host preference of parasites: An aid in evaluating biotype of *Anagrus epos* (Hym.: Mymaridae). *Entomophaga*, 34: 551-558/
- Prischmann, D., Storm, G. L., Wright, C. and Snyder, W. E. 2007.** Identity, abundance and phenology of *Anagrus* spp. and leafhoppers associated with Grape, Blackberry and wild Rose in Washington state. *Annal Entomology Society of America*, 100: 1-41.
- Remund, U., Boller, E. F. and Gut, D. 1994.** Beneficial arthropods in vine hillsides with natural cover flora. *Obst and Weinbau*, 130: 164-167.
- Settel, W. H. and Wilson, L. T. 1998.** Invasion by the varied leafhopper and biotic interaction, parasitism, competition, and apparent competition. *Ecology*, 7(4): 1461-1470.
- Stansly P. A., Schuster, D. J. and Liu, T. X. 1997.** Apparent parasitism of *Bemisia argentifolii* (Hom.: Aleyrodidae) by Aphelinidae (Hymenoptera) on vegetable crops and associated weeds in south Florida. *Biological Control*, 9(1): 49-57.
- Wahaibi, A. K. and Walker, G. P. 2000.** Searching and oviposition behavior of a Mymarid egg parasitoid *Anagrus nigriventris* on five host plant species of its leafhopper host, *Circulifer tenellus*. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 96: 9-25.
- Wahaibi, A. K. and Morse, J. G. 2010.** Biology of the Adult Stage of *Ufens principalis* (Hymenoptera: Trichogrammatidae), an egg parasitoid of *Homalodisca* spp. (Hemiptera: Cicadellidae) in Southern California. *Annals of the Entomological Society of America*, 103(2): 236-246.
- Walton, M. P., Powell, W., Loxadale, H. D. and Allen-Williams, L. 1990.** Electrophoresis as a tool for estimating levels of hymenopterus parasitism in field populations of the cereal aphid. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 54: 271-279.
- Yousuf, M. and Shafee, S. A. 1987.** Taxonomy of Indian Trichogrammatidae (Hym.: Chalcidoidea). *Indian Journal Systematic Entomology*, 4: 52-200.

## Comparison of apparent and marginal parasitism of egg parasitoid of grape leafhopper *Arboridia kermanshah* Delabola (Hem., Cicadellidae) in different climatic regions of Isfahan, Iran

M. Latifian<sup>1\*</sup>, E. Soleyman-nejadian<sup>2</sup>

1- Assistant Professor, Date Palm and Tropical Fruits Research Institute, Ahwaz, Iran

2- Associate Professor, Plant Protection Department, Agricultural faculty, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran

### Abstract

Eggs of grape leafhopper *Arboridia kermanshah* Delabola (Hem., Cicadellidae) are attacked by two parasitoid species *Anagrus atomus* L. (Hym., Mymaridae) (species A) and *Ufens* sp. (Hym., Trichogrammatidae) (species B) in Isfahan vineyards, Iran. For this research, 27 vineyards were selected randomly in different climatic regions of Isfahan. Ten plants were selected randomly per hectare of each vineyard and 3 leaves were sampled on each plant from lower, middle and upper strata. Then healthy and parasitized eggs were counted and the percentage of apparent parasitism was calculated in each vineyard. Three samples that each including 30 parasitized leafhoppers eggs were selected randomly from different climatic regions and the number of wasps were recorded. The percentage of marginal parasitism was calculated and compared for the two species. The average percentage of apparent parasitism in area of study was 8.33 that its range was varied at least 1.5 percent in very hot with dry desert up to 43 percent in dry temperate cold desert. The semi cold with warm and dry desert and semi-arid cold with dry desert climatic region with an average 82.8 percent had the highest percentage of marginal parasitism for species A and very hot with dry desert climate with an average 4.9 percent had the highest percentage of marginal parasitism for species B. The marginal parasitism of both species had moderate to high correlation with the percentage of apparent parasitism. The correlation coefficient of, in other words, the apparent parasitism was increased by increasing its marginal parasitism in climatic regions. While the correlation coefficient of species B was negative the apparent parasitism was decreased by increasing its marginal parasitism in climatic zones. Based on data obtained, it can be interferred that *A. atomus* was more efficient than *Ufens* sp. in different climatic regions of Isfahan province.

**Key words:** Grape leafhopper, appearance parasitism, marginal parasitism

\* Corresponding Author, E-mail: [masoudlatifian@yahoo.com](mailto:masoudlatifian@yahoo.com)  
Received: 6 Mar. 2010 - Accepted: 16 Jul. 2010