

بخشی از فون آفات و بندپایان مفید گیاهان دارویی و مرتعی در اصفهان

محمد رضا باقری^{۱*}، مهدی نصر اصفهانی^۱

۱- به ترتیب مرتب و استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی

چکیده

طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ مزارع گیاهان دارویی در ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهید فزو، کبوترآباد و جنت‌آباد اصفهان و باغ گیاه‌شناسی کاشان بازدید و با استفاده از روش‌های مختلف، آفات و جانوران مفید موجود جمع‌آوری شد. تعدادی از نمونه‌های جمع‌آوری شده با استفاده از منابع معتبر شناسایی و سایرین به موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان ارسال شد. در این بررسی جمما ۴۱ گونه آفت و ۲۱ گونه حشره مفید از روی ۴۰ گونه گیاه دارویی و مرتعی جمع‌آوری و شناسایی گردید که به شرح زیر می‌باشد:

(الف) آفات:

Class: Insecta

Order: Lepidoptera

Pieris rapae Lecerf, *Helicoverpa armigera* Huebner, *Caradrina exigua* Huebner, *Agrotis segetum* Schiff, *Plusia gamma* L., *Eublemma parva* Huebner

Order: Orthoptera

Aiolopus sp., *Acrotylus* sp., *Sphingonotus* sp., *Heteracris* sp., *Gryllotalpa gryllotalpa* L.

Order: Coleoptera

Sitona humeralis Steph., *Sitona puncticollis* Steph., *Apion aestivum* Schiff., *Larinus flavesiensis* Germ., *Larinus liliiputianus* Fst., *Spermophagus sericeus* Geoffr., *Anthrenus verbasci* L., *Anthrenus vorax* Water, *Anthrenus* sp.

Order: Hemiptera

Graphosoma criticum L., *Macrostelus leavis* Ribaut, *Empoasaca* sp., *Astroagalia sinuata* Mulsant & Rey, *Aphis gossypii* Glover, *A. nerii* Boy.de.Fons., *Uroleucon (Uromolan) compositae* Theobald, *Pleotrichophorus grandulosus* Kalt., *Brachycaudus helichrysi* Kalt., *Eucarazzia elegans* Ferrari, *Hyadaphis sphondyti* Koch, *Parlatoria ephedrae* Lindinger, *Ephedraphis ephedrae* New.

Order: Diptera

Acanthiophilus helianthi Rossi

Order: Thysanoptera

Thrips tabaci Lindeman

Class: Arachnida

Order: Trombidiformes

Tetranychus urticae Koch

Class: Gastropoda

Order: Pulmonata

Helicella krynickii Krynicki, *H. candeharica* Pfeiffer

*نویسنده رابط، پست الکترونیکی: mrbagheri_esf@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله (۲۲/۱۲/۸۸) - تاریخ پذیرش مقاله (۲۲/۱۲/۸۹)



ب) دشمنان طبیعی:

Class: Insecta

Order: Coleoptera

Coccinella septempunctata L., *Oenopia conglobata* L., *Hippodamia variegata* Goeze, *Adalia bipunctata* L., *Psyllobora vigintiduopunctata* L., *Scymnus syriacus* Marseul, *Chilocorus bipustulatus* L., *Stethorus punctillum* weise, *S. gilvifrons* Mulsant

Order: Thysanoptera

Aeolothrips fasciatus (L.), *Aeolothrips intermedius* Bagnall

Order: Hemiptera

Orius albidipennis (Reuter)

Order: Neuroptera

Chrysoperlla carnea Stephens

Order: Hymenoptera

Antistrophoplex conthurnatus Masi, *Bracon hebetor* Say

Class: Arachnida

Order: Araneae

Misumena vatia Clerk, *Nigma flavescents* Walckenaer, *Thomisus onustus* Walckenaer, *Heliophanus cupreus* Walckenaer, *Dictyna* sp. Juvenile, *Xysticus* sp. Juvenile

واژه‌های کلیدی: گیاهان دارویی، فون، آفات، بندپایان مفید، اصفهان

مقدمه

با توسعه کشت گیاهان دارویی مسئله آفات نیز به صورت یک فاکتور مهم در کمیت و کیفیت محصول تولیدی مد نظر قرار گرفته است. خسارت کمی آفات به طور عمده شامل کاهش در عملکرد محصول مورد انتظار است، اما خسارت کیفی، که در پاره‌ای موارد مهمتر از خسارت کمی است، به کاهش خواص مورد نظر در محصول تولیدی بر می‌گردد. این خسارت می‌تواند به صورت تغییر در بو، مزه، رنگ، درصد متabolیت‌ها در واحد وزن و نظایر آن نمود پیدا کند. خسارت آفات در تمامی مراحل تولید گیاه دارویی، در مزرعه، ابزار یا فروشگاه‌های عرضه گیاهان دارویی و حتی در کارخانجات یا کارگاه‌های فرآوری یا محل مصرف ظهر می‌یابد.

هر چند بعضی از گیاهان دارویی به علت داشتن ترکیبات خاص سبب گریز یا مرگ آفات می‌شوند، اما گروهی از آفات به خصوص شته‌ها که قابلیت سازگاری فراوانی با انواع گیاهان دارند به صورت یک عضل در مناطق کاشت این گیاهان خودنمایی می‌کنند (Zarrabi, 1998). از سوی دیگر استفاده از سموم شیمیایی در گیاهان دارویی با محدودیت مواجه است. سموم شیمیایی، به خصوص سموم سیستمیک، سبب تغییر بعضی از خواص گیاه نظیر طعم، عطر، یا رنگ آن شده و احتمالاً می‌تواند در خواص گیاه نیز تغییراتی ایجاد کنند. بنابراین روش‌های توصیه شده بیشتر شامل استفاده از حشره‌کش‌های ارگانیک (Purohit & Vysa, 2004) و مبارزه بیولوژیک و زراعی در قالب یک برنامه IPM است (Amponsah *et al.*, 2002). براساس مطالعات شپارد و همکاران (Shepard, 2003) در بررسی تاثیر آفات بر گیاهان Lygaeidae و مدیریت کترل آن‌ها، مهمترین آفات گیاهان دارویی سوسک‌های خانواده Miridae، سنک‌های Cicadellidae، شته‌های Aphididae و پروانه‌ها بهستند و بهترین روش کترل آن‌ها استفاده از دشمنان طبیعی است. آن‌ها سفیدبالک (*Bemisia*) و پروانه *Agrotis* را مهمترین آفات گیاهان دارویی ذکر کردند. حجت و مصدق دو گونه شته را از روی شوید (Hodjat & Mosaddegh, 1979) و رضوانی و همکاران فهرستی از شته‌های ایران را از روی گیاهان دارویی گزارش کردند (Rezwani *et al.*, 1994). قشلاقی و همکاران فون حشرات آفات چند گیاه دارویی مهم را معرفی نمودند (Gheshlaghi *et al.*, 1994). ضرایب در بررسی فون آفات گیاهان دارویی در دو منطقه تهران و یاسوج با ذکر ۲۲

گونه، شته‌های خانواده Aphididae را دارای وابستگی زیادی با گیاهان دارویی دانسته است (Zarrabi, 1998). خانی و همکاران در بررسی فون آفات گیاهان دارویی همین نتیجه‌گیری را در مورد شته‌ها و گیاهان دارویی به دست آورده‌اند. آن‌ها ۷ گونه شته، دو گونه مگس سفید، یک گونه مگس ریشه، یک گونه کنه تارعنکبوتی و یک گونه ترپیس پیاز را از روی گیاهان دارویی جمع‌آوری و معرفی کرده‌اند (Khani *et al.*, 2004). یارمند بخشی از فون حشرات گیاهان دارویی ایران را معرفی کرد (Yarmand, 2002). نعمت‌اللهی و باقری چهار گونه کفسدووزک را از گلستانهای کاشان گزارش کردند (Nematollahi & Bagheri, 2002). باقری و نصرافهانی بخشی از فون آفات گیاهان دارویی اصفهان & Bagheri (Bagheri & Haghigate Isfahani, 2002) و باقری و حقیقت‌اصفهانی بخشی از فون حشرات مفید را در گیاهان دارویی بررسی کردند (Yarmand *et al.*, 2006). یارمند و همکاران بخشی از فون بندپیان گیاهان دارویی مراعط در استان‌های تهران، قزوین و اصفهان را مطالعه و ۱۰۲ گونه بندپیای آفت و مفید را گزارش کردند (Yarmand *et al.*, 2004). با هدف کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز مهم گیاهان دارویی در قالب یک برنامه IPM و به عنوان نخستین قدم، جمع‌آوری و شناسایی این آفات و دشمنان طبیعی آن‌ها در ایستگاه‌های تحقیقاتی وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان در قالب یک طرح خاص در دستور کار قرار گرفت. مقاله حاضر بخشی از نتایج به دست آمده از اجرای این طرح در ایستگاه‌های وابسته به این مرکز تحقیقاتی است.

مواد و روش‌ها

طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ از مزارع و باغات گیاهان دارویی در نقاط مختلف استان اصفهان از جمله مزارع گیاهان دارویی ایستگاه‌های جنت‌آباد (شهرستان نجف‌آباد) با مختصات جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۸ دقیقه شمالی و ۵۱ درجه و ۲۲ دقیقه شرقی و ارتفاع ۱۷۵۴ متر از سطح دریا، کبوترآباد (اصفهان) با مختصات جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۰ دقیقه شمالی و ۵۱ درجه و ۴۹ دقیقه شرقی و ارتفاع ۱۵۴۱ متر از سطح دریا، دستگرد (اصفهان) با مختصات جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۶ دقیقه شمالی و ۵۱ درجه و ۲۶ دقیقه شرقی و ارتفاع ۱۶۱۱ متر از سطح دریا و باغ گیاه‌شناسی کاشان با مختصات جغرافیایی ۳۳ درجه و ۵۹ دقیقه شمالی و ۵۱ درجه و ۲۶ دقیقه شرقی و ارتفاع ۹۸۲ متر از سطح دریا به‌طور مکرر بازدید به عمل آمد و نمونه‌برداری از آفات موجود روی گیاهان کشت شده در این مزارع و دشمنان طبیعی آن‌ها با استفاده از روش‌های مختلف، مانند حرکت در مزرعه به صورت M یا W و تور زدن، مشاهده مستقیم، ضربه زدن و تکان دادن بوته‌ها در سینی سفید و جمع‌آوری توسط قلم مو و اسپیراتور انجام شد. همچنین مراحل نابالغ آن‌ها جمع‌آوری و به منظور به دست آوردن حشرات بالغ در آزمایشگاه پرورش داده شد. حشرات جمع‌آوری شده کوچک بالاگسله به داخل شیشه‌های محتوی الكل یا الكل ۷۵ درجه + ۵ تا ۷ درصد گلیسیرین متقل و حشرات بزرگ‌تر پس از انتقال به آزمایشگاه اتاله شدند. کلیه نمونه‌های جمع‌آوری شده کدگذاری و محل و تاریخ جمع‌آوری، همچنین نوع گیاه میزبان یادداشت گردید. تعدادی از نمونه‌ها با استفاده از منابع معتبر شناسایی و سایرین به موسسه تحقیقات گیاه‌پژوهشکی کشور و دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان ارسال شد. شناسایی گونه‌های گیاهان دارویی و مرتّعی مورد بررسی توسط محققین گیاهان دارویی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان انجام گرفت. نمونه‌های شناسایی شده در بخش تحقیقات گیاه‌پژوهشکی اصفهان و موسسه تحقیقات گیاه‌پژوهشکی کشور نگهداری می‌شوند.

نتایج

طی این بررسی جمعاً تعداد ۴۱ گونه آفت متعلق به ۱۸ خانواده از ۸ راسته و ۳ رده جانوری از روی ۴۰ گونه گیاه دارویی و مرتعی جمع‌آوری و شناسایی گردید. همچنین ۲۱ گونه دشمنان طبیعی این آفات جمع‌آوری و شناسایی شد. جانوران شناسایی شده به تفکیک راسته همراه با میزان‌های آن‌ها در جدول شماره ۱ آورده شده‌اند.

در این بررسی از راسته بالپولکداران (Lepidoptera) پنج گونه از خانواده‌های Pieridae و Noctuidae جمع‌آوری و شناسایی گردید. افراد بالغ این راسته به خصوص در زمان گلدهی با تراکم بسیار زیاد به‌طرف مزارع گیاهان دارویی، مانند اسطوخودوس، زوفا، نعناع و گل‌گاوزبان جلب می‌شوند. از راسته راست بالان (Orthoptera) پنج گونه آفت جمع‌آوری گردید که از جمله آفات عمومی هستند. چهار گونه از آن‌ها از خانواده ملخ‌های شاخک کوتاه (Acrididae) هستند که در تابستان و پاییز به مزارع حمله می‌کنند. آن‌ها دارای پراکنش وسیعی بوده و از جزایر کیپورد تا شمال آفریقا، جنوب اروپا، کشورهای سواحل دریای مدیترانه و خاورمیانه و شمال هندوستان پراکنده هستند (Anonymous, 2011). معمولاً اراضی بایر را برای تخم‌زی انتخاب می‌کنند و زمستان‌گذرانی نیز به صورت تخم است. حشرات بالغ و پوره‌ها برای تغذیه به مراتع و مزارع مجاور هجوم می‌برند. در تابستان سال‌های مورد بررسی این ملخ‌ها در گله‌های چندهزارتایی به مزارع گیاهان دارویی ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد حمله کرده و خسارت قابل توجهی به بار آورده‌اند که خسارت آن‌ها روی زوفا، نعناع، ماری تیغال، بادرنجبویه و کرچک قابل توجه بود. پنجمین گونه‌ای که از این راسته جمع‌آوری شد، آبدزدک (Gryllotalpa gryllotalpa L. (Orth., Gryllotalpidae) است که در بیشتر مزارع گیاهان دارویی مناطق مورد بررسی، به خصوص در اراضی شنی و مروط‌بود، پراکنده بوده و خسارت می‌زند. در سال‌های مورد بررسی آفت مذکور از ایستگاه‌های تحقیقات کبوترآباد، شهید فزووه و جنت‌آباد جمع‌آوری گردید.

از راسته سخت بالپوشان (Coleoptera) آفانی از ۳ خانواده جمع‌آوری گردید. شش گونه از آفات جمع‌آوری شده از خانواده Curculionidae هستند. این خانواده بزرگترین گروه جانوری با ۴۱ هزار گونه است که در ۳۶۰۰۰ جنس و ۵۰ زیرخانواده تقسیم بندی می‌شوند (Booth et al., 1990). از همین راسته یک گونه بنام *Spermophagus sericeus* (Geoffr.) از روی هوفاریقون، روناس، اسطوخودوس و خسارت می‌زند. در سال‌های مورد بررسی آفت مذکور از این قاببالان از داخل دانه‌ها تغذیه کرده و بذرخوار هستند. بعضی از آن‌ها به‌ویژه به گیاهان خانواده لگومینوز حمله می‌کنند و آفات خطرناک انباری هستند. این گونه در سراسر جهان پراکنده است و با گونه دیگری بنام *S. calystegiae* Luk. & Ter-Min. (Col., Bruchidae). تشخیص داده می‌شوند. گونه *S. sericeus* با گیاه *Convolvulus arvensis* L. (Solanales, Convolvulaceae) وابستگی زیادی دارد و در مناطق گرمسیر و درماههای گرم سال جمعیت آن افزایش می‌یابد. این حشره تخم‌های خود را روی غلاف‌ها می‌گذارد. تخمگذاری در اوخر اردیبهشت‌ماه است. لاروهای جوان از اواسط خرداد وارد بذور می‌شوند و تا زمان شفیرگی همان‌جا می‌مانند (Toth et al., 2001).

از خانواده Dermestidae یا سوسک‌های پوست ۳ گونه از جنس *Anthrenus* Schaeffer در کاشان از روی رازیانه و گیاه مرتعی ریش‌پری (Poales, Poaceae) *Pennisetum orientale* Pers. جمع‌آوری و شناسایی گردید. این خانواده دارای گونه‌هایی بسیار مخرب و از نظر اقتصادی مهم می‌باشد. آن‌ها غالباً پوسیده‌خوار هستند و در گروه‌های کثیر بر روی محصولات گیاهی و جانوری فعالیت می‌کنند که بیشتر خسارت وارد شده ناشی از فعالیت لاروهایست. رژیم غذایی آن‌ها علاوه بر استفاده از مواد پوسیده و لاشه جانوران، تغذیه از گرده گل‌ها نیز می‌باشد (Booth et al., 1990).

از راسته Hemiptera زیرراسته ناجور بالان (*Graphosoma criticum* L., Pentatomidae) گونه (Heteroptera) از روی رازیانه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جنت آباد جمع‌آوری گردید. این سن در تمام مناطق ایران وجود دارد و غذای اصلی آن‌ها گیاهان مختلف خانواده چتریان است. زمستان گذرانی آن‌ها به صورت حشره کامل است و از خرداد ماه در مزارع و مراتع به صورت کپه‌ای بر روی گیاهان مذکور ظاهر می‌شوند. از همین راسته، ۱۲ گونه حشره از پنج خانواده Cicadelidae, Delphasidae, Aphididae, Callaphididae و Diaspididae جمع‌آوری و شناسایی گردید.

در این تحقیق از خانواده Cicadellidae که با یک یا تعداد اندکی خار کوچک روی ساق پای عقبشان مشخص می‌شوند سه گونه زنجرک از روی گیاهان دارویی کرچک، بادرشپو، زوفا، بادرنجبویه، صابونی، گل گاویزان ایرانی و کاسنی جمع‌آوری شد. زنجرک‌ها روی اغلب گیاهان زراعی باغی و غیر مشمر یافت می‌شوند. اغلب آن‌ها از شیره برگ‌ها تغذیه می‌کنند تعدادی از گونه‌ها دارای اهمیت اقتصادی هستند و خسارت آن‌ها شامل: تخرب کلروفیل برگ و نقره‌ای شدن آن‌ها و نهایتاً خشکیدگی کامل برگ، مختل کردن فیزیولوژی گیاه با قطع آوندهای چوبی و آبکش، خسارت به جوانه‌های گیاه با تخمیری در روی آن‌ها، انتقال بیماری‌های ویروسی و ایجاد پیچیدگی و زگیل در برگ می‌باشد (Borror et al., 1989).

از بین گونه‌های مذکور، زنجرک *Empoasca* sp. (Hem., Cicadellidae) دارای فراوانی بسیار زیادی در میان تمام گیاهان مورد مطالعه به خصوص کرچک بود، به طوری که مزرعه کرچک کبوتر آباد به‌طور صد درصد به آفت مذکور آلوه بود. خسارت اصلی گونه *Macrostelus laevis* Ribaut. (Hem., Cicadellidae) انتقال بیماری ویروسی به گیاهان است (Nematollahi & Khajehali, 2000).

خانواده Delphacidae بزرگترین خانواده زنجرک‌های است و افراد آن با مهمیز پهن بزرگ در انتهای ساق پای عقبشان شناخته می‌شوند. بسیاری از گونه‌ها کوچک هستند و بعضی نیز بالهای شان را از دست داده‌اند. گونه *Laodelphax striatellus* Fallen (Hem., Delphacidae) از روی بادرشپو، گل گاویزان ایرانی و کاسنی در ایستگاه‌های تحقیقاتی شهید فروه و کبوتر آباد اصفهان جمع‌آوری و شناسایی گردید. این حشره که ناقل ویروس‌هایی نظری ویروس کوتولگی زبر ذرت و موzaییک ایرانی ذرت می‌باشد دارای دو فرم بال کوتاه و دراز می‌باشد و بین نر و ماده آن اختلاف مرغولوژیکی وجود دارد (Nematollahi & Khajehali, 2000).

از خانواده‌های Aphididae و Callaphididae جمعاً ۸ گونه شته از روی گیاهان دارویی مختلف جمع‌آوری شد. بیماری‌های ویروسی خطروناکی مانند موzaییک می‌تواند توسط شته ها منتقل شود (Borror et al., 1989). به نظر رسد که شته‌ها به خوبی می‌توانند با گیاهان دارویی مختلف سازگاری نشان دهند.

گونه *Parlatoria ephedrae* Lindinger (Hem., Diaspididae) از روی ریش بزر در باغ گیاه‌شناسی کاشان جمع‌آوری و شناسایی شد. این سپردار در ایران ابتدا در سال ۱۳۴۰ به‌وسیله فرج‌بخش گزارش شده است. آفت به تنه درختچه حمله می‌کند و سبب ضعف و خشکیدگی آن می‌شود. پراکنده‌گی آن از استان‌های کرمان، مرکزی و شمال ایران (Modarres Awal, 2001) و اصفهان (Bagheri & Nasr Isfahani, 2002) گزارش شده است.

دو گونه مگس، آفات مهم گیاهان دارویی منطقه هستند. مگس زیتون *Bactrocera oleae* (Rossi) (Dip., Tephritidae) که تا سال ۱۳۸۲ آفت قرنطینه استان بوده است، یک آفت خطروناک در کشورهای حوزه مدیترانه، غرب آسیا، شرق، غرب و جنوب آفریقا و هند است و در سال‌های اخیر نیز به نیم‌کره غربی راه یافته و تقریباً در تمام مناطق زیتون‌کاری جهان

یافت می‌شود (Fletcher, 1989). لارو این آفت مونوفاژ است و فقط از میوه زیتون تغذیه می‌کند. لاروها با ایجاد دلان در گوشت میوه می‌توانند تا ۳۰ درصد محصول را از بین ببرند. آفت بسته به اقلیم میتواند ۲ تا ۵ نسل در سال داشته باشد (Fletcher, 1989).

مگس گلنگ (*Acanthiophilus helianthi* (Rossi) (Dip., Tephritidae) کاشت گلنگ در کشور وجود دارد. این آفت علاوه بر گلنگ اهلی از گلنگ وحشی (*Carthamus oxyacantha* و علف هرز تلخه (*Acroptilon repens* (L.) (Asterales, Asteraceae) (Bieb.(Asterales, Asteraceae) این آفت ۳ نسل در سال دارد و لارو آن از دانه و سایر قسمت‌های نرم قوزه تغذیه کرده، عملکرد و درصد روغن دانه را کاهش می‌دهد (Al-Ali et al., 1977) آفت از اوخر اردیبهشت ظاهر می‌شود و تا پایان مهرماه در مزارع گلنگ منطقه دیده می‌شود. نگارندگان این آفت را در تمام سال‌های اجرای تحقیق در مزارع گلنگ استان مشاهده و جمع‌آوری کردند. از راسته *Haplorthrips* sp. و *Thrips tabaci* L. (Thysanoptera, Thripidae) و *Thysanoptera*, (Thripidae) از روی گیاهان دارویی مختلف جمع‌آوری و توسط بخش رده‌بندی حشرات موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی شناسایی شد. تریپس پیاز *T. tabaci* یک آفت جهانی با تعداد بسیار زیادی میزان است. این آفت در سال‌های مورد بررسی با جمعیت بالا از روی گیاهان دارویی مختلف از ایستگاه تحقیقات شهید فروه جمع‌آوری شد. لازم به ذکر است این ایستگاه در منطقه‌ای واقع شده است که یکی از مراکز مهم کشت پیاز در استان است و این نکته می‌تواند توجیه کننده تراکم بالای آفت روی گیاهان دارویی این ایستگاه باشد.

شاخه نرم تنان (Mollusca) بعد از شاخه بندهای از نظر تعداد گونه متنوع‌ترین شاخه هستند (Tadjalli Pour, 1982). رطوبت و حرارت تاثیر زیادی در انتشار جغرافیایی آن‌ها دارد. عموماً جمعیت گونه‌های نرم تن خشکی‌زی از مناطق نسبتاً گرم و مرطوب به‌طرف مناطق سردسیر یا گرم و خشک کاهش می‌یابد. اما عوامل دیگری نظیر گیاه میزان یا جنس خاک در تغییرات جمعیت آن‌ها موثر است (Tadjalli Pour, 1982). به همین دلیل علیرغم آن‌که اصفهان جزء مناطق گرم و خشک محسوب می‌گردد، می‌توان در گیاهان دارای سطوح سبز زیاد، که ایجاد سایه و رطوبت کافی می‌کنند، این جانوران را در جمعیت زیاد مشاهده نمود.

در این بررسی دو گونه حلزون (*H. krynickii* و *Helicella candeharica* Pfeiffer (Pulmonata, Hygromiidae) (*Krynicki* (Pulmonata, Hygromiidae) در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی شهید فزوه از روی گیاهان زنجیل شامی، کنگرفنگی، زرین گیاه، کلماتیس، سنبل‌الطیب، عروسک پشت پرده، توت رویاهی، بومادران و آویشن جمع‌آوری و شناسایی گردید.

گونه *H. candeharica* دارای صد مخروط خیلی کوتاه به قطر ۹-۶ و عرض ۱۵-۱۲ میلی‌متر با تعداد پیچ‌های ۵/۵ پیچش است. رنگ عمومی خاکستری سفید با نوارهای قهوه‌ای پهن و قله صد قهوه‌ای می‌باشد (Tadjalli Pour, 1982). این حلزون از شمال کشور از روی بوته‌های *Anthemis*, *Cercium*, *Artemesia* و تعدادی علف‌های هرز، بوته‌پنبه، مرکبات و سیب نیز جمع‌آوری شده است. از سایر نقاط کشور (از جمله اصفهان) از روی تنه درختان مختلف نظیر سیب گلابی و زردآلو جمع‌آوری شده است (Mirzai, 1972).

در جدول ۱ اسمای علمی آفات جمع‌آوری شده و اسمای فارسی، انگلیسی و علمی گیاهان میزان به تفکیک آورده شده است.

جدول ۱- آفات گیاهان دارویی و مرتفعی جمع آوری شده طی سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۸۲ در استان اصفهان و میزبان‌های آنها

Table 1- The pests of range and medicinal plants collected in Isfahan province during 1999-2003 and their hosts

Scientific name of the pest	Plant host (In Persian)	Plant host	Scientific name of Plant host
<i>Helicoverpa armigera</i> Hübner (Lep., Noctuidae)	شاهدانه، کدو، اسفناج، کرچک، زوفا، گلرنگ	Cannabis, Gourd, Spinach, Castor oil plant, Hyssop, Safflower	<i>Cannabis sativa</i> , <i>Cucurbito pepo</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Ricinus communis</i> , <i>Hyssopus officinalis</i> , <i>Carthamus tinctorius</i>
<i>Plusia gamma</i> L. (Lep., Noctuidae)	کدو، اسفناج، نعناع، زوفا، ماری‌تیغال	Gourd, Spinach, Peppermint, Hyssop, Mary Thistle	<i>Cucurbito pepo</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Mentha spp.</i> , <i>Hyssopus officinalis</i> , <i>Silybum marinum</i>
<i>Agrotis segetum</i> Sch. (Lep., Noctuidae)	اسفناج، نعناع، ماری‌تیغال	Spinach, Peppermint, Mary Thistle	<i>Chenopodium album</i> , <i>Mentha spp.</i> , <i>Silybum marinum</i>
<i>Caradrina exigua</i> Hübner (Lep., Noctuidae)	اسفناج، کرچک، نعناع، کتان	Spinach, Castor oil plant, Peppermint, Bombast	<i>Chenopodium album</i> , <i>Riccinus communis</i> , <i>Mentha spp.</i> , <i>Linum spp.</i>
<i>Pieris rapae</i> Le Cerf. (Lep., Pieridae)	اسطرخودوس، ماری‌تیغال، زوفا، کدو، گل‌گاویزان	Common lavender, Mary Thistle, Hyssop, Gourd, Borage	<i>Lavandula angustifolia</i> , <i>Silybum marinum</i> , <i>Hyssopus officinalis</i> , <i>Cucurbito pepo</i> , <i>Borago officinalis</i> , <i>Carthamus tinctorius</i>
<i>Eublemma parva</i> Hübner (Lep., Erebidae)		گلرنگ	
<i>Aiolopus</i> sp. (Orth., Acrididae)	زوفا، نعناع، ماری‌تیغال، بادرنجبویه، کرچک	Hyssop, Peppermint, Mary Thistle, Lemon balm, Castor oil plant	<i>Hyssopus officinalis</i> , <i>Mentha spp.</i> , <i>Silybum marinum</i> , <i>Mellisa officinalis</i> , <i>Ricinus communis</i>
<i>Acrotylus</i> sp. (Orth., Acrididae)	زوفا، نعناع، ماری‌تیغال، بادرنجبویه، کرچک	Hyssop, Peppermint, Mary Thistle, Lemon balm, Castor oil plant	<i>Hyssopus officinalis</i> , <i>Mentha spp.</i> , <i>Silybum marinum</i> , <i>Mellisa officinalis</i> , <i>Ricinus communis</i>
<i>Sphingonotus</i> sp. (Orth., Acrididae)	زوفا، نعناع، ماری‌تیغال، بادرنجبویه، کرچک	Hyssop, Peppermint, Mary Thistle, Lemon balm, Castor oil plant	<i>Hyssopus officinalis</i> , <i>Mentha spp.</i> , <i>Silybum marinum</i> , <i>Mellisa officinalis</i> , <i>Ricinus communis</i>
<i>Heteracris</i> sp. (Orth., Acrididae)	زوفا، نعناع، ماری‌تیغال، بادرنجبویه، کرچک	Hyssop, Peppermint, Mary Thistle, Lemon balm, Castor oil plant	<i>Hyssopus officinalis</i> , <i>Mentha spp.</i> , <i>Silybum marinum</i> , <i>Mellisa officinalis</i> , <i>Ricinus communis</i>
<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> L. (Orth., Gryllotalpidae)		آفت عمومی	-
<i>Sitona humeralis</i> Steph. (Col., Curculionidae)	هوفاریقون، روناس	St John's wort, Madder	<i>Hypericum perforatum</i> , <i>Rubia tinctorum</i>
<i>S. puncticollis</i> Steph. (Col., Curculionidae)	هوفاریقون، روناس	St John's wort, Madder	<i>Hypericum perforatum</i> , <i>Rubia tinctorum</i>
<i>Apion aestivalium</i> Schiff. (Col., Curculionidae)	هوفاریقون، روناس، مخلصه	St John's wort, Madder, Pyrethrum	<i>Hypericum perforatum</i> , <i>Rubia tinctorum</i> , <i>Tanacetum coccineum</i>
<i>Larinus flavescens</i> Germ. (Col., Curculionidae)	هوفاریقون، روناس، مخلصه	St John's wort, Madder, Pyrethrum	<i>Hypericum perforatum</i> , <i>Rubia tinctorum</i> , <i>Tanacetum coccineum</i>
<i>L. liliputanus</i> Fst. (Col., Curculionidae)	ختنی	Marshmallow	<i>Althaea officinalis</i>
<i>Spermophagus sericeus</i> Geoffr. (Col., Bruchidae)	هوفاریقون، روناس، اسطرخودوس، رزماری(اکلیل کوهی)	St John's wort, Madder, Common Lavender, Rosemary	<i>Hypericum perforatum</i> , <i>Rubia tinctorum</i> , <i>Lavandula angustifolia</i> , <i>Rosmarinus officinalis</i>
<i>Anthrenus verbasci</i> L. (Col., Dermestidae)	رازیانه، ریش پری	Fennel, Pennisetum	<i>Foeniculum vulgare</i> , <i>Pennisetum orientale</i>
<i>Anthrenus vorax</i> Water (Col., Dermestidae)	رازیانه، ریش پری	Fennel, Pennisetum	<i>Foeniculum vulgare</i> , <i>Pennisetum orientale</i>
<i>Anthrenus</i> sp. (Col., Dermestidae)	رازیانه، ریش پری	Fennel, Pennisetum	<i>Foeniculum vulgare</i>
<i>Graphosoma criticum</i> L. (Hem., Pentatomidae)	رازیانه	Fennel	<i>Dracocephalum moldavicum</i> , <i>Echium amoenum</i> , <i>Cichorium intybus</i>
<i>Laodelphax striatellus</i> Fallen (Hem., Delphacidae)	بادرشپو، گل‌گاویزان ایرانی، کاسنی	Moldavian Balm, Borage, Common Chicory	
<i>Macrostelles leavis</i> Ribaut (Hem., Cicadellidae)	کرچک، بادرشپو، زوفا، بادرنجبویه، صابونی، گل‌گاویزان ایرانی، کاسنی	Castor oil plant, Moldavian Balm, Hyssop, Lemon Balm, Common Soapwort, Borage, Common Chicory	<i>Ricinus communis</i> , <i>Dracocephalum moldavicum</i> , <i>Hyssopus officinalis</i> , <i>Mellisa officinalis</i> , <i>Saponaria officinalis</i> , <i>Echium amoenum</i> , <i>Cichorium intybus</i>
<i>Empoasca</i> sp. (Hem., Cicadellidae)	کرچک، بادرشپو، زوفا، بادرنجبویه، صابونی، گل‌گاویزان ایرانی، کاسنی	Castor oil plant, Moldavian Balm, Hyssop, Lemon Balm, Common Soapwort, Borage, Common Chicory	<i>Ricinus communis</i> , <i>Dracocephalum moldavicum</i> , <i>Hyssopus officinalis</i> , <i>Mellisa officinalis</i> , <i>Saponaria officinalis</i> , <i>Echium amoenum</i> , <i>Cichorium intybus</i>
<i>Astroagalia sinuata</i> Mulsant & Rey (Hem., Cicadellidae)	کرچک، بادرشپو، زوفا، بادرنجبویه، صابونی، گل‌گاویزان ایرانی، کاسنی	Castor oil plant, Moldavian Balm, Hyssop, Lemon Balm, Common Soapwort, Borage, Common Chicory	<i>Ricinus communis</i> , <i>Dracocephalum moldavicum</i> , <i>Hyssopus officinalis</i> , <i>Mellisa officinalis</i> , <i>Saponaria officinalis</i> , <i>Echium amoenum</i> , <i>Cichorium intybus</i>
<i>Aphis gossypii</i> Glover (Hem., Aphididae)	کرفن، گاویزان ایرانی و گاویزان داروئی	Celery, Borage	<i>Apium graveolens</i> , <i>Borago officinalis</i> , <i>Echium amoenum</i>

Scientific name of the pest	Plant host (In Persian)	Plant host	Scientific name of Plant host
<i>A. nerii</i> Boy.de.Fons. (Hem., Aphididae)	خرزهه	Oleander	<i>Nerium oleander</i>
<i>Uroleucon(Uromolan) compositae</i> Theobald (Hem., Aphididae)	گلرنگ	Safflower	<i>Carthamus tinctorius</i>
<i>Pleotrichophorus grandolosus</i> Kalt. (Hem., Aphididae)	گلرنگ	Safflower	<i>Carthamus tinctorius</i>
<i>Brachycaudus helichrysi</i> Kalt. (Hem., Aphididae)	گلرنگ	Safflower	<i>Carthamus tinctorius</i>
<i>Eucarazzia elegans</i> Ferrari (Hem., Aphididae)	بادرنجبویه	Lemon Balm	<i>Melissa officinalis</i>
<i>Hyadaphis sphondyti</i> Koch (Hem., Aphididae)	رازیانه	Fennel	<i>Foeniculum vulgare</i>
<i>Ephedraphis ephedrae</i> New. (Hem., Callaphididae)	ربیش بز	Ephedra	<i>Ephedra distachya</i>
<i>Parlatoria ephedrae</i> Lindinger (Hem., Diaspididae)	ربیش بز	Ephedra	<i>Ephedra pachyclada</i>
<i>Acanthiphilus helianthi</i> Rossi (Dip., Tephritidae)	گلرنگ	Safflower	<i>Ephedra distachya</i>
<i>Bactrocera oleae</i> (Rossi)(Dip., Tephritidae)	زیتون	Olive	<i>Ephedra pachyclada</i>
<i>Thrips tabaci</i> Lindeman (Thysanoptera, Thripidae)	رازیانه ، بادرنجبویه، ختمی، افسنطین	Fennel, Lemon Balm, Marshmallow, Absinthe wormwood	<i>Carthamus tinctorius</i>
<i>Haplothrips</i> sp. (Thysanoptera, Thripidae)	رازیانه ، بادرنجبویه، ختمی، افسنطین	Fennel, Lemon Balm, Marshmallow, Absinthe wormwood	<i>Olea europaea</i>
<i>Tetranychus urticae</i> Koch (Aracnida, Tetranychidae)	کدو، نعناع، رازیانه، اسطوخودوس، رزماری(اکلیل کوهی)، انجیر، بادرنجبویه و مریم گلی	Gourd, peppermint, Fennel, Common Lavender, Rosemary, Common Fig, Lemon Balm, Garden Sage	<i>Foeniculum vulgare, Melissa officinalis, Althaea officinalis, Artemisia absinthium</i>
<i>Helicella krynickii</i> Krynicki (Pulmonata, Hygrimiidae)	زنجبل شامی، کنگرفرنگی، زرین گیاه، کلماتیس، سنبل الطیب، عروسک پشت پرده، توت رویاهی، بومادران، آویشن	Elecampane, Artichoke, Dragonhead, Clematis, Valerian herb, Chinese Lantern (Bladder Cherry), Salad Burnet, Yarrow, Thyme	<i>Cucurbito pepo, Mentha spp., Foeniculum vulgare, Lavandula angustifolia, Rosmarinus officinalis, Ficus carica, Melissa officinalis, Salvia officinalis, Inula helenium, Cynara scolymus, Deracocephalum kotschi, Clematis spp., Valeriana officinalis, Physalis alkekengi, Sanguisorba minor, Achillea millefolium, Thymus spp., Inula helenium, Cynara scolymus, Deracocephalum kotschi, Clematis spp., Valeriana officinalis, Physalis alkekengi, Sanguisorba minor, Achillea millefolium, Thymus spp.</i>
<i>H. candeharica</i> Pfeiffer (Pulmonata, Hygrimiidae)	زنجبل شامی، کنگرفرنگی، زرین گیاه، کلماتیس، سنبل الطیب، عروسک پشت پرده، توت رویاهی، بومادران، آویشن	Elecampane, Artichoke, Dragonhead, Clematis, Valerian herb, Chinese Lantern (Bladder Cherry), Salad Burnet, Yarrow, Thyme	<i>Inula helenium, Cynara scolymus, Deracocephalum kotschi, Clematis spp., Valeriana officinalis, Physalis alkekengi, Sanguisorba minor, Achillea millefolium, Thymus spp.</i>

دشمنان طبیعی

در این بررسی علاوه بر جمع آوری آفات گیاهان دارویی، دشمنان طبیعی آنها نیز به صورت مقدماتی جمع آوری و شناسایی شد. مسلماً طیف دشمنان طبیعی آفات گیاهان دارویی بسیار گسترده‌تر است و ضروری است با یک پژوهش جامع نسبت به شناسایی آنها اقدام و در صورت امکان از آنها جهت کنترل آفات در گیاهان دارویی استفاده نمود.

I) Class: Insecta

A) Order: Coleoptera,

Family: Coccinellidae

Coccinella septempunctata L.

Adalia bipunctata L.

Oenopia conglubata L.

Stethorus punctillum Weise

Stethorus gilvifrons Mulsant

Scymnus syriacus Marseul

Psyllobora vigintiduopunctata L.

Hippodamia variegata Goeze

Chilocorus bipustulatus L.

کفشدوزک‌های مذکور از روی گیاهان دارویی، کدو، نعناع، رازیانه، اسطوخودوس، رزماری، انجیر، بادرنجبویه و مریم گلی آلوده به شته‌های *Eucararia elegans* Ferrari, *Hyadaphis sphondyti* Koch, *Aphis fabae*, *Aphis gossypii* و *Tetranychus urticae* Kock جمع‌آوری گردید.

B) Order Thysanoptera,

Family: Aelothripidae

Aeolothrips fasicatus Bagnal

Aeolothrips intermedius Bagnal

گونه‌های مذکور از روی گیاهان دارویی رازیانه و بادرنجبویه جمع‌آوری شد. این گونه‌ها همگی شکارچی بوده و از پوره‌های تریپس‌های آفت *Thrips tabaci* و *Haplothrips* sp. تغذیه می‌کنند.

C) Order: Hemiptera,

Family: Anthocoridae

Orius albidipennis Reuter

سنک شکارچی اوریوس از پوره‌های تریپس‌های مضر و لاروهای پروانه و سوسک‌های قاب بال تغذیه می‌کند. این گونه از روی رازیانه، بادرنجبویه، ختمی و افسنطین جمع‌آوری شد.

D) Order: Neuroptera,

Family: Chrysopidae

Chrysoperlla carnea Stephens

بالتوري سبز یک شکارگر موثر آفات مختلف بهویژه شته‌ها، شپشک‌ها، تریپس‌ها، سفیدبالک‌ها، تخم و لارو پروانه‌ها است. این حشره مفید از اواسط بهار تا پاییز در اکثر مزارع گیاهان دارویی به وفور یافت می‌گردد و به طور مکرر طی سال‌های تحقیق توسط مولفین جمع‌آوری گردید.

E) Order: Hymenoptera

Family: Braconidae

Bracon hebetor Say

Family: Torymidae

Anistophplex conthurnatus Masi

این دو گونه، زنبورهای پارازیتوئید شفیره‌های مگس گلنگ هستند که در سال‌های اجرای تحقیق جمع‌آوری و شناسایی شدند.

II) Class Arachnida

عنکبوت‌ها شکارگرهای عمومی هستند و تقریباً در تمام اکوسیستم‌های طبیعی و زراعی یافت می‌شوند. از این جانوران گونه‌های ذیل در مزارع گیاهان دارویی مورد بررسی، جمع‌آوری و شناسایی شد:

F) Order: Araneae

Family: Thomisidae

Xysticus sp. (L.)

Thomisus onustus Walckenaer

Misumena vatia (Clerk)

Family: Dictynidae

Dictyna sp. (Juvenile)

Nigma flavescens (Walckenaer)

Family: Salticidae

Heliophanus cupreus Walckenaer

بحث

گیاهان دارویی از جمله محصولاتی هستند که دارای بازار مناسب داخلی و خارجی می‌باشند. در این میان کیفیت گیاهان تولید شده دارای اهمیت فوق العاده‌ای است. این گیاهان به علت داشتن ترکیبات خاص می‌توانند اثرات متفاوتی روی حشرات داشته باشند. آن‌ها می‌توانند مانند یک کایرومون عمل کرده و سبب جلب گونه‌های خاصی به طرف مزارع شوند. به عنوان مثال پروانه‌ها از جمله حشراتی هستند که به خصوص در زمان گل‌دهی با جمعیت فوق العاده زیاد در این مزارع مشاهده می‌شوند. شته‌ها از جمله آفاتی هستند که به نظر میرسد قادر باشند خود را با این گیاهان سازگار نمایند. همچنین گونه‌هایی از قاب‌بالان که معمولاً به عنوان آفت انباری شناخته می‌شوند، قادرند از بذور در حال رسیدن این گیاهان تغذیه نمایند. در این بررسی در مجموع ۴۱ گونه آفت از راسته‌های مختلف جانوری از روی گیاهان دارویی و مرتعی جمع‌آوری شد که بیشترین گونه‌های جمع‌آوری شده از راسته Hemiptera (با ۱۵ گونه که آن‌ها از خانواده‌های زنجرک‌ها و شته‌ها بودند) و پس از آن از راسته‌های Coleoptera (با ۹ گونه) و Lepidoptera (با ۶ گونه) بوده است. به نظر میرسد همچنان که شپارد و همکاران (Shepard, 2003) و ضرابی (Zarrabi, 1998) و خانی و همکاران (Khani et al., 2004) نشان داده‌اند افراد این راسته‌ها وابستگی زیادی با گونه‌های گیاهان دارویی دارند. نقش کایرومون‌ها در این مورد می‌تواند قابل بررسی باشد.

از سوی دیگر همین مواد قادرند سبب راهنمایی دشمنان طبیعی افات به طرف مزارع گیاهان دارویی شوند. به طوری که تعداد گونه‌های مفید در این مزارع، در مقابل تعداد گونه‌های مضر قابل توجه است. در این حالت این مواد حکم یک سینومون را پیدا می‌کنند که هم برای گیاه دارویی و هم برای عامل بیولوژیک مفید است. در این بررسی ۲۱ گونه دشمن طبیعی آفات جمع‌آوری و شناسایی شد که بیشترین گونه‌ها (۹ گونه) از خانواده Coccinellidae (کفشدوزک‌ها) بوده است. به طور یقین تعداد دشمنان طبیعی موجود در این مزارع بسیار بیشتر از این تعداد است. سایر تحقیقات انجام گرفته در زمینه فون بندپایان مفید گیاهان دارویی، از جمله باقری و حقیقت‌اصفهانی (Bagheri & Haghigate Isfahani, 2004) و یارمند و همکاران (Yarmand et al., 2006) نیز تنها به صورت جنبی، و نه یک تحقیق مستقل صورت گرفته است در حالی که با توجه به محدودیت استفاده از روش مبارزه شیمیایی در مزارع گیاهان دارویی لزوم شناسایی صحیح و دقیق دشمنان طبیعی این آفات و استفاده از روش‌های مبارزه غیرشیمیایی مانند مبارزه بیولوژیکی و استفاده از موادی که روی رفتارهای حشرات تاثیر دارند، دور کننده‌ها، مواد ضد تغذیه‌ای و جلب کننده‌ها، توجیه‌پذیر می‌باشد. لزوم تحقیقات در زمینه شناسایی و بررسی کارایی دشمنان طبیعی و استخراج و تولید عصاره‌های گیاهی و استفاده از آن‌ها در کنترل آفات ضروری به نظر می‌رسد.

سپاسگزاری

این تحقیق با استفاده از اعتبارات شورای پژوهش‌های علمی کشور اجرا شده است. بدین وسیله از شورای مذکور تشکر و قدردانی می‌گردد. همچنین از آقایان دکتر علی رضوانی، دکتر ابراهیم ابراهیمی، دکتر محسن مفیدی نیستانک، دکتر جهانگیر خواجه‌علی، مهندس ابراهیم گیلاسیان، مرحوم مهندس هوشنگ بروم‌نده، خانم‌ها مهندس صحراء قوامی و مهندس معصومه مقدم بخاطر شناسائی نمونه‌های جانوری؛ و خانم مهندس لیلی صفائی بخاطر شناسائی نمونه‌های گیاهی تشکر و قدردانی می‌گردد.

References

- AI-Ali, AS., AI-Neamy, IK., Abbas, SA., Abduel-Masih, AME., AS-AL, A., Neamy, IK-AI. and AME-Abdul, M.** 1977. On the life-history of the safflower fly *Acanthiophilus helianthi* Rossi (Dip., Tephritidae) in Iraq. Zeitschrift fur Angewandte Entomologie, 83(2): 216-223.
- Amponsah, K., Crensil, O'R., Odamten, T. and Ofusohene-Djan, W.** 2002. Manual For the Propagation and Cultivation of Medicinal plants of Ghana. Aburi Botanic garden. 31 PP.
- Anonymous.** 2011. Acrididae.http: //dbpedia.neofonia.de/brows/rdf-type: Insect/order:Orthoptera/family: Bandwing/
- Bagheri, M. R. and Haghigate Isfahani, G.** 2004. A part of beneficial arthropods fauna on medicinal plants on Isfahan province, pp:456. In: Proceedings of the 12th Iranian Biology Conference, 31Aug.-2Sept., Hamedan, Iran. [in Persian with English summary]
- Bagheri, M. R. and Nasr Isfahani, M.** 2002. Some medicinal plants fauna in Isfahan, pp:75. In: Proceeding of the 15th Iranian Plant Protection Congress, 7-11 Sept., Kermanshah, Iran. [in Persian with English summary]
- Balackowsky, A. S.** 1966. Entomologie applique a l'agriculture. Tome II, Lepidopteres. Premier volume. 1057 pp.
- Bey-Bienko, G. Ya.** 1967. Keys to the insects of the European USSR. Vol.I: 190-361.
- Booth, R. G.; Cox, M. L. and Madge, R. B.** 1990. IIE Guides to insects of importance to man, B. Coleoptera. International institute of Entomology. C. A. B international. 384pp.
- Borror, D. Y., Triplehorn, C. A. and Johnson, N. F.** 1989. An Introductionto the study of insects. Saunders college Publishing. 875pp.
- Fletcher, B.** 1989. Life history strategies of tephritid fruit flies. In: Robinson A. and Hooper G.(eds) Amsterdam Fruit flies, their biology, natural enemies and control. Volume 3B. Elsevier Science Publishers.195-208.
- Gheshlaghi, N., Yazdani, D., Rasoulian, Gh. and Ghebleh, M.** 1994. Contribution to the some pests of several medicinal plants in Iran. pp:169. In Proceeding of the 3th Iranian Crop Production & Breeding Cogress, 29Aug.-1Sep., Tabriz, Iran. [in Persian with English summary]
- Hodjat, S. H. and Mosaddegh, M. S.** 1979. First report of two aphids in Iran. Ent. Phyt. Appliq., 47(1) : 45-52.
- Khani, M., Haghir, A., Naghdibadi, A. and Yazdani, D.** 2004. Notes on the fauna of medicinal plants in Tehran province, pp:108. In: Proceeding of the 16th Iranian Plant Protection Congress, 28Aug.-1Sept., Tabriz, Iran. [in Persian with English summary]
- Mirzai, A.** 1972. Mollusks of agricultural importance in Iran. Plant Pests and Diseases Research Institute Press. 68+5 pp. [in Persian with English summary]
- Modarres Awal, M.** 2001. list of agricultural pests and their natural enemies in Iran. Ferdowsi Mash'had University Press. 429+7pp. [in Persian with English summary]
- Nematollahi, M. R. and Bagheri,M. R.** 2002. Part of Coccinellid fauna on damask rose in Kashan region, In: Proceeding of the 15th Iranian Plant Protection Congress, 7-11 Sept., Kermanshah, Iran, pp:176. [in Persian with English summary]
- Nematollahi, M. R. and Khajehali, J.** 2000. Major leafhoppers and planthoppers (Hom.: Auchenorrhynca) of corn fields in Isfahan, In: Proceedings of the 14th Iranian Plant Protection Congress, 5-8Sept., Isfahan, Iran, pp:235. [in Persian with English summary]
- Purohit, S. S. and Vyas S. P.** 2004. Medicinal plant Cultivation, a Scientifical approach including processing and financial guidelines. Agrobios, India, 624pp.
- Rezwani, A.** 2001. Key to the aphids (Homoptera: Aphidinea) in Iran. Agricultural Research, Education and Extention Organisation Publication. 304 pp.
- Rezwani, A.; Termeh, F. and Moosawi, M.** 1994. Aphids of Iran and Their hosts. Plant Pests and Diseases Research Institute press. 67pp.
- Shepard, B. M.** 2003. Management of pests on Medicinal Plants and influence of pest damage on active principle (Final Report). Coastal Research and Education Center. Charleston, Sc.29414.
- Tadjalli Pour, M.** 1982. Les Mollusques Terrestres et Fluviatiles de L'Iran, Tome I, Fascicule. Institute for humanities and cultural studies press. 309pp.
- Toth, P., Varablova, M. and Cagan, L.** 2001. Bionomics of *Spermophagus sericeus* (Geoffroy) (Coleoptera: Bruchidae) a potential biological control agent of *Convolvulus arvensis* L. Acta fytotechnica et Zootechnica, Vol. 4, Special Number.

- Yarmand, H.** 2002. Insect's fauna associated with medicinal plants of Iran, In: Proceedings of National Iranian Congress of Medicinal Plants, 13-15 Feb., Tehran, Iran, pp: 209. [in Persian with English summary]
- Yarmand, H., Sadeghi, S. E., Mohammadi, M., Ebrahimi, S. S., and Seif Allahi, A. R.** 2006. Survey of arthropods associated with range medicinal plants in Tehran, Ghazvin and Isfahan provinces. Iranian journal of forest and Range Protection Research, 3(2): 107-128.
- Zarrabi, M.** 1998. Insect fauna of 27 medicinal plant species in two geographical zone; north of Tehran and Yasuj (Kohkiluyeh and Boyer Ahmad province), In: Proceeding of the 13th Iranian Plant Protection Congress, 23-27 Aug., Karaj, Iran, p: 225. [in Persian with English summary]

Archive of SID

The fauna of harmful and beneficial arthropods of medicinal and range plants in Isfahan

M. R. Bagheri¹*, M. Nasr Isfahani¹

Respectively Lecturer and Assistant Professor, Agricultural and Natural Resources Research Center of Isfahan, Plant Protection Department

Abstract

Medicinal plant fields of Shahid Fozveh, Kabootar Abad and Djannat Abad for Agriculture and Natural Resource Research Stations and Kashan Botanical Garden were surveyed, during 1999-2003. Pests and beneficial arthropods were collected by different methods. Collected specimens were identified through valid sources and/or specialists of Iranian Research Institute of Plant Protection (IRIPP) and Agriculture Faculty, Isfahan University of Technology (IUT). In this research, 41 pest and 21 beneficial species were collected and identified on 40 medicinal and range plants in Isfahan province, as follows:

a) The Pests:

Class: Insecta

Order: Lepidoptera

Pieris rapae Lecerf, *Helicoverpa armigera* Huebner, *Caradrina exigua* Hüebner, *Agrotis segetum* Schiff, *Plusia gamma* L., *Eublemma parva* Hüebner

Order: Orthoptera

Aiolopus sp., *Acrotylus* sp., *Sphingonotus* sp., *Heteracris* sp., *Gryllotalpa gryllotalpa* L.

Order: Coleoptera

Sitona humeralis Steph., *Sitona puncticollis* Steph., *Apion aestivum* Schiff., *Larinus flavescens* Germ., *Larinus liliputanus* Fst., *Spermophagus sericeus* Geoffr., *Anthrenus verbasci* L., *Anthrenus vorax* Water, *Anthrenus* sp.

Order: Hemiptera

Graphosoma criticum L., *Macrostelus leavis* Ribaut, *Empoasaca* sp., *Astroagalia sinuata* Mulsant & Rey, *Aphis gossypii* Glover, *A. nerii* Boy.de.Fons., *Uroleucon (Uromolan) compositae* Theobald, *Pleotrichophorus grandulosus* Kalt., *Brachycaudus helichrysi* Kalt., *Eucarazzia elegans* Ferrari, *Hyadaphis sphondyti* Koch, *Parlatoria ephedrae* Lindinger, *Ephedraphis ephedrae* New.

Order: Diptera

Acanthiophilus helianthi Rossi

Order: Thysanoptera

Thrips tabaci Lindeman

Class: Arachnida

Order: Trombidiformes

Tetranychus urticae Koch

Class: Gastropoda

Order: Pulmonata

Helicella krynickii Krynicki, *H. candeharica* Pfeiffer

b) Beneficial arthropods:

Class: Insecta

Order: Coleoptera

Coccinella septempunctata L., *Oenopia conglobata* L., *Hippodamia variegata* Goeze, *Adalia bipunctata* L., *Psyllobora vigintiduopunctata* L., *Scymnus syriacus* Marseul, *Chilocorus bipustulatus* L., *Stethorus punctillum* weise, *S. gilvifrons* Mulsant

Order: Thysanoptera

Aeolothrips fasciatus (L.), *Aeolothrips intermedius* Bagnall

Order: Hemiptera

Orius albidipennis (Reuter)

Order: Neuroptera

Chrysoperlla carnea Stephens

Order: Hymenoptera

Antistrophoplex conthurnatus Masi, *Bracon hebetor* Say

Class: Arachnida

Order: Araneae

Misumena vatia Clerk, *Nigma flavescentes* Walckenaer, *Thomisus onustus* Walckenaer, *Heliophanus cupreus* Walckenaer, *Dictyna* sp. Juvenile, *Xysticus* sp. Juvenile

Keywords: medicinal plants, fauna, pests, beneficial arthropods, Isfahan

*Corresponding Author, E-mail: mrbagheri_esf@yahoo.com
Received: 13 Mar. 2010 – Accepted: 13 Mar. 2011