

مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‌پره هندی روی سه رقم خرما در *Plodia interpunctella* (Hubner) (Lep., Pyralidae)

شرایط آزمایشگاهی

حمیده پوربھی^{۱*}، علی اصغر طالبی^۲، عباسعلی زمانی^۳، شیلا گلدسته^۴، ناصر فرار^۵

- ۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
- ۲- دانشیار، گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
- ۳- استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
- ۴- استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران
- ۵- مرتب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده

شب‌پره هندی (*Plodia interpunctella* (Hubner)) از آفات مهم انباری خرما در ایران و بسیاری از مناطق جهان می‌باشد. پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل این آفت روی سه رقم خرما (زاهدی، شهابی و کبکاب) مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات آزمایشگاهی در دمای 27 ± 2 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 45 ± 5 درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشناختی و ۸ ساعت تاریکی انجام شد. امید به زندگی شب‌پره در مرحله تخم روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب $44/45$ ، $44/29$ و $47/89$ روز محاسبه شد. نرخ ناخالص باروری روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب $172/1$ ، $160/2$ و $121/0$ تخم به ازای هر ماده محاسبه گردید. بین میانگین نرخ ناخالص باروری روی ارقام مختلف خرما تفاوت معنی دار مشاهده نشد. نرخ خالص زادآوری روی رقم زاهدی با $96/8$ بیشتر از سایر ارقام بود. کمترین مقدار این پارامتر روی رقم کبکاب $43/84$ محاسبه شد که تفاوت معنی داری با ارقام شهابی و زاهدی داشت اما بین ارقام زاهدی و شهابی تفاوت معنی دار مشاهده نشد. نرخ تعداد تخم در روز و تعداد تخم بارور در روز در شب‌پرهای پرورش یافته روی رقم زاهدی به ترتیب $25/09$ و $22/38$ تعیین شد که بیشترین مقدار را در بین ارقام مورد مطالعه نشان داد.

واژه‌های کلیدی: شب‌پره‌هندی، ارقام خرما، جدول زندگی، جدول تولید مثل

*نویسنده رابط، پست الکترونیکی: Poorbehi_h@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله (۲۱/۶/۸۹) - تاریخ پذیرش مقاله (۱۵/۵/۹۰)



مقدمه

شبپره هندی (*Lepidoptera*) در رده‌بندی حشرات به راسته *Pyralidae* (Lep., Pyralidae) (Hubner) (Hubner, 1808) و زیرراسته *Ditrysia*. بالاخانواده *Pyraloidea*, خانواده *Pyralidae* و زیرخانواده *Phycitinae* تعلق دارد (Borror et al., 1989). از مهمترین آفات انباری در مناطق مختلف جهان بهویژه مناطق حاره‌ای آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا است (Mohandass et al., 2007; Na & Ryoo, 2000; Tzanakakis, 1959) و لارو این آفت از اغلب مواد غذایی که دارای منشا گیاهی هستند تغذیه می‌کند (Bagheri Zenoz, 1973). از شبپره‌هندی به عنوان آفت مهم بقولات، غلات، گردو، بادام، پسته، میوه‌های خشک، دانه‌های روغنی، خرما و بذور در ایران نام برده شده است (Sepasgozarian, 1975).

تمام فعالیت‌های این پروانه در مدت شب و در تاریکی صورت می‌گیرد و در طول روز در پناهگاه‌های مختلف مانند شکاف دیوارها، درزهای در و پنجره انبار و سایر پناهگاه‌ها، بدون حرکت به سر می‌برد (Bagheri Zenoz, 1973). جفت‌گیری در ۲۴ ساعت اول رخ می‌دهد (Silhacek et al., 2003) و ۱۲ تا ۴۸ ساعت بعد از جفت‌گیری شروع به تخم‌گذاری می‌کنند (Mendoza & Pena, 2004). تخم‌گذاری معمولاً در شب انجام می‌شود (Ebeling, 2002). دما و رطوبت از عوامل مهم تاثیرگذار بر روی تخم‌گذاری شبپره هندی می‌باشد و بالاترین باروری در دمای ۳۰ درجه سلسیوس رخ می‌دهد (Mbata, 1985). در مطالعه‌ای مشخص شد در دمای ۱۵ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۷۰ درصد هیچ لاروی از تخم خارج نشده و همه تخم‌ها بر اثر سرما می‌میرند (Bell, 1975). تخم‌ها اغلب روی مواد غذایی یا نزدیک به آن (Mullen & Arbogast, 1977) به‌طور منفرد یا در دسته‌های ۱۲ تا ۳۰ عددی گذاشته می‌شوند (Sepasgozarian, 1975). مدت زمان تخم‌ریزی ۱ تا ۸ روز طول می‌کشد، بیشترین تعداد تخم‌ریزی در روزهای اول انجام می‌شود و به مرور تعداد تخم‌ریزی کاهش می‌یابد. تعداد تخم با توجه به نوع ماده غذایی متفاوت است. در شرایط ۲۷ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۶۰-۵۰ درصد مدت تغیریخ تخم‌ها حداقل ۲ روز و حداقل ۳ روز بوده است (Marzban, 1997). در شرایط آزمایشگاهی حرارت ۲۷ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 45 ± 5 درصد هر پروانه ماده در طول زندگی خود ۴۰ تا ۲۷۵ عدد و به طور متوسط ۱۵۰ عدد تخم می‌گذارد و روی گردو پس از ۶ تا ۷ روز تخم‌ها باز می‌شوند (Bagheri Zenoz, 1973). در دمای 27 ± 2 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 45 ± 5 درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی طول دوره جنبی روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب $3/27 \pm 0/04$ ، $3/10 \pm 0/03$ و $2/27 \pm 0/05$ تعیین شد، بین دوره رشد جنبی شبپره هندی روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب اختلاف معنی‌دار مشاهده شد (Johnson et al., 1992; Pourbhei et al., 2009). تغیریخ تخم ۸۸٪ و ۹۶٪ به ترتیب روی پسته و بادام متغیر می‌باشد.

طول زمان لاروی با توجه به نوع ماده غذایی متفاوت است که به ترتیب در پسته، گردو و بادام به‌طور متوسط $31/38$ و $38/38$ و $74/38$ روز بوده است. لاروها در هر سه نوع ماده غذایی ۴ تا ۷ بار پوست‌اندازی کردند و به این ترتیب می‌توان گفت این حشره دارای ۵ تا ۸ سن لاروی است (Marzban, 1997). طول دوره لاروی روی رقم کبکاب $48/90 \pm 0/92$ و رقم زاهدی $37/85 \pm 0/65$ روز تعیین شد و میانگین طول دوره لاروی روی رقم شهابی $43/01 \pm 0/78$ می‌باشد، بین میانگین طول دوره لاروی روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب اختلاف معنی‌دار مشاهده شد (Pourbhei et al., 2009).

لاروها پس از رشد کامل پیله محکم و سفید رنگی دور خود تنیده و در داخل آن به شفیره تبدیل می‌شوند. دوره شفیرگی به‌طور متوسط ۶ تا ۸ روز طول می‌کشد ولی در شرایط نامناسب این دوره ممکن است خیلی طولانی شود (۴۳ روز) (Bagheri Zenoz, 1973). میانگین طول دوره شفیرگی آفت روی خرمای زاهدی و کبکاب به ترتیب $7/47 \pm 0/18$ و $7/19 \pm 0/15$ روز تعیین شد. بین طول دوره شفیرگی آفت روی ارقام زاهدی و کبکاب اختلاف معنی‌دار وجود نداشت، اما

با شب پره های پرورش یافته روی خرمای شهابی (17 ± 0.1 روز) تفاوت معنی داری مشاهده شد (Pourbehi *et al.*, 2009). از مرحله تخم تا ظهر حشرات کامل شب پره هندی، در دمای 30°C درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 76% درصد روی سورگوم شکسته و گندم به ترتیب $25/7$ و $46/1$ روز تعیین شده است (Allotey & Goswami, 1990). در دمای 1°C درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 75 ± 2 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی میانگین طول دوره زندگی قبیل از بلوغ شب پره *Ectomyelois ceratonia* روی خرما $83/6 \pm 1/23$ می باشد (Norozzi, 2007) حشرات کامل زندگی کوتاهی ($7-9$ روز) دارند و باعث خسارت مستقیم به محصولات انباری نمی شوند (Sambaraju, 2007). میانگین طول عمر حشرات کامل *Batrachedra amydraula* در دمای $30 \pm 1^\circ\text{C}$ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی $60 \pm 5\%$ درصد و در تاریکی کامل روی ماده غذایی مصنوعی تهیه شده از پودر خرمای قصب (400 گرم)، آرد گندم (400 گرم)، عسل (150 گرم)، مخمر نانوایی (25 گرم) و گلیسرین مایع (120 میلی لیتر) برای نرها $7/04 \pm 0/39$ روز و ماده ها $8/71 \pm 0/39$ روز محاسبه شد (Rahmani *et al.*, 2008). در دمای 20°C تا $22/5$ درجه سلسیوس ($\pm 0/5$ درصد و 16 ساعت روشنایی در شبانه روز روی مغز پسته خشک مشخص شد که حداقل نیاز دمای شب پره هندی $13/1$ درجه سلسیوس و مجموع نیاز حرارتی برای کامل شدن یک دوره زندگی این حشره $526/3$ روز- درجه می باشد. آلدگی به آفات، از مشکلات اساسی محصولات انباری به ویژه خرما بوده واز آن جایی که خرما به علت مرغوبیت خاص سالیانه به میزان قابل توجهی در داخل کشور مصرف و یا به خارج صادر می شود بنابراین بررسی ویژگی های زیستی این آفت می تواند در بازارگانی و افزایش کیفیت محصول خرما نقش مهمی داشته باشد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب پره هندی روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب می باشد که بتوان تغییرات جمعیت آفت در نسل های متوالی را پیش بینی کرد. از این رو شناخت ویژگی های زیستی این آفت از لحاظ فاکتورهای زیستی امری مهم و ضروری می باشد.

مواد و روش ها

تشکیل جمعیت اولیه شب پره هندی

خرماهای آلدود در تابستان از انبار استان بوشهر جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد، سپس لاروهای شب پره هندی از درون خرماهای آلدود جدا شدند و روی هر رقم به صورت جدا در ظروف پرورش به ابعاد 12×13 سانتی متر قرار گرفتند. حشرات کامل و لاروهای آفت به مدت 1 نسل روی ارقام کبکاب، زاهدی و شهابی در ظروف پرورش در دمای $27 \pm 2^\circ\text{C}$ درجه سلسیوس، رطوبت $45 \pm 5\%$ درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی به طور انفرادی پرورش یافتدند. پس از سپری شدن اول از حشرات پرورش یافته روی هر کدام از ارقام خرما جداگانه تخم گیری شد.

بررسی پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب پره *Plodia interpunctella*

جدول زندگی

برای تشکیل جدول زندگی تعداد 100 عدد تخم شب پره هندی روی 3 رقم خرما (زاهدی، شهابی و کبکاب) درون پتری قرار داده شد. درون هر یک از پتری ها که حاوی یکی از خرمای مورد بررسی بود، یک عدد تخم شب پره هندی قرار داده شد. برای سهولت بررسی وضعیت لاروهای سنین 1 و 2 ابتدا ارقام مختلف خرما به ذرات کوچکی به اندازه تقریبی یک سانتی متر خرد شدند. با گذشت زمان و اتمام رژیم غذایی اولیه با توجه به نیاز لاروها مقداری مواد غذایی به محیط

رشد اضافه شد و مواد دفعی لاروها از محیط پرورش خارج شد. ظروف حاوی حشرات از مرحله تخم تا پایان عمر حشرات کامل به صورت روزانه از نظر طول مراحل مختلف زندگی حشره و همچنین مرگ و میر مراحل مختلف زندگی حشره روی هر یک از ارقام خرما به طور دقیق بررسی شدند و از شبپرههای ماده بارور برای محاسبه پارامترهای تولیدمثل استفاده شد. پارامترهای جدول زندگی بر اساس سن (x) و تعداد افراد زنده مانده در سن x (N_x) و بر اساس روش (Carey 1993) محاسبه گردید.

جدول تولید مثل

برای انجام آزمایش ۲۰ شبپره ماده با عمر حداقل ۲۴ ساعت از هر رژیم غذایی انتخاب و هر کدام به یکی از پتری‌ها به همراه ۱ یا ۲ شبپره نر منتقل و میزان تخم‌گذاری روزانه شمارش شد. این کار تا پایان عمر شبپرههای ماده ادامه یافت. از نظر تجزیه کمی جمعیت، تولیدمثل عبارت از فرایند نرخ سرانه تولید نتاج در یک دوره معین زمان می‌باشد. مهمترین واحد محاسبه پارامترهای تولید مثل تعداد تخم‌های تولید شده توسط هر ماده در فاصله زمانی x تا $x+1$ می‌باشد که با M_x نشان داده می‌شود. سایر اجزای مورد نیاز برای محاسبه پارامترهای تولیدمثل عبارتند از: سن (x), بقاء میان دو گروه سنی x و $x+1$ (L_x) و نرخ تفریح تخم در سن x (h_x).

برای محاسبه نرخ ذاتی و نرخ متناهی افزایش جمعیت از پارامترهای رشد جمعیت، داده‌های حاصل از سن (x), نسبت بقا در سن x (I_x) و میانگین تعداد تخم ماده تولید شده به ازای هر ماده در سن x (m_x) در یک جدول وارد و با استفاده از روابط مربوطه محاسبه گردید. داده‌های مربوط به آزمایش با استفاده از نرم‌افزار SAS Institute, 2003 (SAS Institute, 2003) و Minitab, 2000 (MINITAB, 2000) تجزیه گردید. برای اینکه پارامترها از لحاظ آماری دارای تکرار و میانگین شوند از روش آماری جکنایف (Maia et al., 2000) برای محاسبه پارامترها استفاده شد.


نتایج و بحث

جدول زندگی

در این تحقیق جدول زندگی برای توصیف مرگ و میر شبپره *P. interpunctella* تهیه شد. برای هر رقم خرما ۱۰۰ تخم انتخاب گردید و مرگ و میر آنها روزانه تا ظهر حشرات کامل و پس از آن تا انتهای عمر حشرات به صورت کاهش در تعداد ثبت شد. نتایج به دست آمده از محاسبه پارامترهای اساسی جدول زندگی شبپره هندی روی سه رقم خرما که عبارت از نرخ بقاء (I_x) و امید به زندگی (e_x) در شکل (۱) نشان داده شده است، همچنین توزیع فراوانی مرگ و میر افراد اولیه (d_x) و نرخ مرگ و میر یا مرگ و میر ویژه سنی (q_x) برای سه رقم خرما در شکل (۱) نشان داده شده است.

حداکثر مقدار نرخ بقا روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب در روزهای ۶۷-۶۶-۶۷ و ۷۹-۷۸-۷۸ به دست آمد. کاهش نرخ بقا در زمان ظهر حشرات کامل روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب ۶۰٪، ۶۹٪ و ۴۶٪ محاسبه شد، بنابراین روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب ۴۰٪، ۳۱٪ و ۵۴٪ افراد قبل از بلوغ مردند. نرخ بقاء شبپره *Ectomyelois ceratoniae* روی خرما در دمای 30 ± 1 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 75 ± 2 درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی با افزایش سن کاهش یافت که حداکثر مقدار آن روزهای ۹۵-۹۶ به دست آمد (Norozi, 2007). امید به زندگی شبپره در مرحله تخم روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب ۴۴/۴۵، ۴۴/۴۵ و ۵۲/۲۹.

۴۷/۸۹ روز محاسبه شد. با نزدیک شدن به روزهای پایانی عمر حشره، امید به زندگی روی هر سه رقم کاهش یافت. امید به زندگی شبپره کوچک خرما *Batrachedra amydraula* در دمای 30 ± 1 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 60 ± 5 و در تاریکی کامل روی ماده غذایی مصنوعی تهیه شده از پودر خرمای قصب (400 گرم)، آرد گندم (400 گرم)، عسل (150 گرم)، مخمر نانوایی (25 گرم) و گلیسیرین مایع (120 میلی لیتر) در مرحله تخم بیشتر از سایر مراحل محاسبه شد (Rahmani *et al.*, 2008). بر اساس نتایج به دست آمده میانه سن مرگ و میر یا زمانی که 50 درصد افراد می‌میرند در ارقام شهابی و کبکاب به ترتیب بین روزهای $58-59$ و $59-60$ و برای رقم زاهدی روز 53 به دست آمد. احتمال زنده ماندن حشرات کامل تا سن x (p_x) در اولین روز مرگ و میر حشرات کامل روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب $0.97/0.96$ و 0.90 درصد به دست آمد. احتمال زنده ماندن حشرات کامل شبپره *E. ceratoniae* تا سن x (p_x) در رژیم غذایی خرما 0.90 درصد به دست آمد که به تدریج کاهش می‌یابد (Norozi, 2007).



شکل ۱- مقایسه آماره‌های جدول زندگی شبپره *P. inter punctella* روی سه رقم خرما
Fig. 1- Comparision of life table parameters of *P. inter punctella* on three cultivars of date

جدول تولید مثل.

بر اساس نتایج به دست آمده میانگین تعداد تخمهای گذاشته شده روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب برابر با $17/7$ ، $17/8 \pm 15/4$ و $15/3 \pm 15/4$ می‌باشد. در تحقیقی میانگین باروری این آفت روی گندم $96/8$ و روی

ذرت شکسته/۲۰۷۴ محسوبه شد (Allotey & Goswami, 1990) و روی گردو، بادام و سبوس گندم به ترتیب ۲۵۸، ۲۷۴ و ۲۸۰ تعیین شد (Johnson *et al.*, 1992). نرخ ناخالص باروری شبپره عبارت است از متوسط تعداد تخم تولید شده توسط یک فرد ماده در طول عمر بر اساس نتایج به دست آمده (جدول ۱) بیشترین نرخ ناخالص باروری روی رقم زاهدی ۱۷۲/۱±۱۷/۵ تخم به ازای هر ماده می‌باشد. مقدار این پارامتر روی ارقام شهابی و کبکاب به ترتیب برابر ۱۶۰/۲±۱۵/۰ و ۱۲۱/۰±۱۸/۳ تخم به ازای هر ماده محسوبه شد. بین میانگین این پارامتر در ارقام مختلف تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد (df=۵۹؛ F=۲/۴۶۴؛ P=۰/۰۹۴).

نرخ ناخالص زادآوری شبپره هندی که عبارت است از متوسط تعداد تخم تفریخ شده از کل تخم‌های تولید شده توسط یک حشره ماده می‌باشد، روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب ۱۴۹/۰±۱۴/۱، ۱۵۸/۴±۱۶/۱ و ۱۰۷/۷±۱۶/۳ محسوبه شد. بین میانگین این پارامتر در ارقام مختلف خرما تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد (P=۰/۰۵۷؛ F=۳/۰۱۳؛ df=۵۹). نرخ ناخالص زادآوری شبپره *E. ceratoniae* روی رژیم غذایی انار ۱۰۳/۱۵±۶/۷۴ و پسته ۱۰۸/۵۷±۹/۹۳ به‌شكل معنی‌داری بالاتر از انجیر (۵۱/۸۸±۴/۳۴) و خرما (۳۹/۰۴±۶/۳۱) بود، اختلاف معنی‌داری بین رژیم غذایی انار و پسته همچنین خرما و انجیر وجود نداشت (Norozi, 2007).

نرخ ناخالص تفریخ که نسبت نرخ ناخالص زادآوری به نرخ ناخالص باروری است برابر یا کمتر از یک می‌باشد. کمترین مقدار این پارامتر بر روی رقم کبکاب (۰/۰۹) و بیشترین مقدار این پارامتر روی رقم زاهدی (۰/۰۹۳) می‌باشد. نرخ ناخالص تفریخ شبپره *E. ceratoniae* روی رژیم غذایی انجیر برابر با ۰/۹۳ تعیین شد (Norozi, 2007) که مشابه نتایج به دست آمده از این تحقیق روی رقم زاهدی است. نرخ خالص باروری عبارت است از متوسط تعداد تخم تولید شده توسط یک حشره ماده در طول عمر با در نظر گرفتن احتمال بقای آن فرد می‌باشد. نرخ خالص باروری روی رقم کبکاب برابر ۴۹/۲۶±۸/۱۶ تخم به ازای هر ماده به‌دست آمد که تفاوت معنی‌داری با ارقام زاهدی و شهابی داشت (P=۰/۰۰؛ F=۸/۸۲۷؛ df=۵۹)، اما بین ارقام زاهدی (۱۰۵/۱±۱۱/۳) و شهابی (۸۸/۸۳±۹/۱۶) تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. نرخ خالص زادآوری یا متوسط تعداد تفریخ شده از تخم‌های تولید شده توسط یک فرد ماده در طول عمر با در نظر گرفتن احتمال بقای ماده‌ها، روی رقم زاهدی با ۹۷/۸±۱۰/۴ بیشتر از سایر ارقام بود. کمترین مقدار این پارامتر روی رقم کبکاب ۴۳/۸۴±۷/۲۶ محسوبه شد که تفاوت معنی‌داری با ارقام شهابی و زاهدی داشت (P=۰/۰۰؛ F=۹/۶۶۲؛ df=۵۹)، اما بین ارقام زاهدی و شهابی تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد (جدول ۱). علت پایین‌تر بودن این پارامتر روی رقم کبکاب نسبت به دو رقم دیگر پایین‌تر بودن نرخ تفریخ تخم بر روی این رقم می‌باشد. نرخ خالص زادآوری شبپره *E. ceratoniae* روی انار، پسته، انجیر و خرما به ترتیب ۶۸/۳۱±۵/۹۶، ۵۴/۸۱±۴/۹۸، ۲۴/۵۲±۳/۷۶ و ۵/۸۲±۰/۹۶ محسوبه شد که بین چهار رژیم غذایی اختلاف معنی‌داری وجود داشت (Norozi, 2007). میانگین تعداد تخم روزانه و تعداد تخم بارور روزانه در شبپره‌های پرورش یافته روی رقم زاهدی به ترتیب ۲۵/۰۹±۲/۶۱ و ۲۲/۳۸±۲/۳۰ تعیین شد که بیشترین مقدار را در بین ارقام شهابی و کبکاب نشان داد (جدول ۱). میانگین تعداد تخم روزانه و تعداد تخم بارور روزانه در شبپره روی خرما ۳۸/۰۰±۴/۷۱ و ۳/۵۵±۰/۵۷ محسوبه شد (Norozi, 2007) که کمتر از نتایج به‌دست آمده در تحقیق حاضر می‌باشد.

نرخ ذاتی افزایش جمعیت عبارت از نرخ افزایش به ازای هر ماده تحت شرایط معین و بدون عامل محدود کننده می‌باشد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت یکی از مهمترین شاخص‌های زیستی و جمعیتی حشرات بوده و بیانگر نرخ افزایش جمعیت یک گونه در شرایط معین می‌باشد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت معمولاً به عنوان شاخصی در موفقیت یک حشره

مفید یا عامل بیولوژیک بر علیه آفات به کار می‌رود (Fathipour *et al.*, 2004). داده‌های آزمایشی مورد نیاز برای محاسبه نرخ ذاتی افزایش جمعیت بر پایه جمعیت ماده است و شامل یک گروه (Cohort) از افرادی است که در شرایط خاص برای تعیین باروری و بقا مورد بررسی قرار می‌گیرند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r_m) این شبپره روی هر سه رقم خرما، دارای تفاوت معنی‌داری است ($P=0.00$; $F=26/813$; $df=59$). بیشترین مقدار این پارامتر روی رقم کبکاب برابر 0.06911 ± 0.00249 ماده به ازای هر ماده در روز و کمترین مقدار این پارامتر روی رقم شهابی 0.08135 ± 0.00223 محاسبه شد. بین نرخ ذاتی افزایش جمعیت *E. ceratoniae* روی انار 0.013 ± 0.007 و پسته 0.003 ± 0.000 اختلاف معنی‌داری وجود نداشت و این دو رژیم با اختلاف معنی‌داری بالاتر از رژیم غذایی انجیر (0.003 ± 0.005) و خرما (0.018 ± 0.002) بودند، همچنین بین رژیم‌های غذایی انجیر و خرما اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت شبپره کوچک خرما *B. amydraula* روی ماده غذایی مصنوعی 0.039 (روز/۱) محاسبه شد (Rahmani *et al.*, 2008). نرخ متناهی افزایش جمعیت نشان دهنده میزان افزایش جمعیت در هر روز نسبت به روز قبل می‌باشد. میزان این پارامتر روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب 0.001 ± 0.001 , 0.0987 ± 0.0001 و 0.0001 ± 0.0001 محاسبه شد. نرخ متناهی افزایش جمعیت شبپره در ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشد. ($P=0.00$; $F=9682/273$; $df=59$). نرخ متناهی افزایش جمعیت *B. amydraula* روی ماده غذایی مصنوعی 0.0398 (روز/۱) تعیین گردید (Rahmani *et al.*, 2008).

مجموع نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که شبپره‌های پرورش یافته روی رقم زاهدی از نرخ افزایش جمعیت بالاتری نسبت به سایر ارقام (شهابی و کبکاب) برخوردار بودند. رقم زاهدی حساس‌ترین و رقم کبکاب مقاوم‌ترین رقم برای باروری و رشد و نمو این آفت می‌باشد. نتایج این تحقیق درک بهتری از رشد جمعیت آفت فراهم نموده و می‌تواند در مدیریت این آفت نقش مهمی ایفا کند.

جدول ۱- آماره‌های تولیدمثلی شبپره *P. interpunctella* روی سه رقم خرماTable 1- Reproduction parameters of *P. interpunctella* on three cultivars of date

| Parameter | Cultivars of date | | | Unit |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | Zahedi | Shahabi | Kabkab | |
| Life time reproductive rate | | | | |
| Gross fecundity rate | 17/5a \pm 172/1 | 15/2a \pm 160/2 | 18/3a \pm 121/0 | egg |
| Gross fertility rate | 16/1a \pm 158/4 | 14/1a \pm 149/0 | 107/7 \pm 16/3a | egg |
| Gross hatch rate | 93% | 92% | 89% | egg |
| Net fecundity rate | 105/1 \pm 11/3a | 88/83 \pm 9/16a | 49/26 \pm 8/16b | egg |
| Net fertility rate | 96/8 \pm 10/4a | 82/61 \pm 8/52a | 43/84 \pm 7/26b | egg |
| Daily reproductive rate | | | | |
| Mean eggs/day | 25/09 \pm 2/61a | 1/60ab \pm 20/77 | 2/19b \pm 16/12 | eggs/day |
| Mean fertile eggs/day | 2/30 a \pm 22/38 | 1/55 \pm 20/61 | 1/95b \pm 14/34 | eggs/day |

• Same letters in each row are not significantly different at 5% level

•

References

- Allotey, J. and Goswami, L. 1990. Comparative biology of two phytid moths, *Plodia interpunctella* (hubn.) and *Ephestia cautella* (wlk.) on some selected food media. Insect and Science its Application, 11: 209–215.

- Bagheri Zenoz, A. 1973.** *Plodia interpunctella* et ses ennemis naturels. Journal of Entomological Society of Iran, 1 (1): 23-40. [in Persian with English summary]
- Bell, C. H. 1975.** Effects of temperature and humidity on development of four pyralid moth pests. Journal of Stored Products Research, 11:167-175.
- Borror, D. J., Triplehorn, C. A. and Johnson, N. F. 1989.** An introduction to the study of insects. Saunders College publishing, 6ed, 875 pp.
- Carey, J. R. 1993.** Applied Demography for Biologists, with Special Emphasis on Insect Oxford University Press, 205 pp.
- Ebeling, W. 2002.** Pests of stored food products. Uraban Entomology. U.C, Riverside, pp. 1-43.
- Fathipour, Y., Jafari, A. and Hosseini, S. M. 2004.** Population growth statistics of *Creontiades pallidus* (Het.: Miridae) and associated predators *Nabis capsiformis* (Het.: Nabidae) and *Chrysoperla carnea* (Neu.: Chrysopidae). Journal of Entomological Society of Iran, 23 (2): 15-31. [in Persian with English summary]
- Johnson, J. A., Wofford, P. L. and Whitehand, L. C. 1992.** Effect of diet and temperature on development rates, survival and reproduction of Indian meal moth (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Economic Entomology, 85:561-566.
- Maia, A. H. N., Luiz, A. J. B. and Campanhola, C. (2000)** Statistical inference on associated fertility life table parameters using Jakkknife technique: Computational aspects. Journal of Economic Entomology, 93(2):511-518.
- Marzban, R. 1997.** Biological control of *Plodia interpunctella* in nuts (pistachio, walnut and almond) by *Bacillus thuringiensis* bacteria. M.Sc thesis, Tarbiat Modares University, 119 pp. [in Persian with English summary]
- Mbata, G. N. 1985.** Some physical and biological factors affecting oviposition by *Plodia interpunctella* (Hubner) (Lepidoptera: Pyralidae). Insect Science and Application, 6: 597-604.
- Mendoza, J. P. and Pena, M. A. 2004.** Development, reproduction, and control of the Indian meal moth, *Plodia interpunctella* (Lep.: Pyralidae) in stored seed garlic in Mexico. Journal of Stored Products Research, 40: 409-421.
- MINITAB. 2000.** MINITAB User's Guide, version 13.20. MINITAB Ltd, UK.
- Mohandass, S., Arthur, F. H., Zhu, K. Y. and Throne, J. E. 2007.** Biology and management of *Plodia interpunctella* (Lepidoptera: Pyralidae) in stored products. Journal of Stored Products Research, 43: 302-311.
- Mullen, M. A. and Arbogast, R. T. 1977.** Influence of substrate on oviposition by 2 species of product moths. Environmental Entomology, 6: 641-644.
- Na, J. H. and Ryoo, M. I .2000.** The influence of temperature on development of *Plodia interpunctella* (Lep.: Pyralidae) on dried vegetable commodities. Journal of Stored Products Research, 36: 125-129.
- Norozi, A. 2007.** Influence of four food sources (pomegranate, pistachio, fig and date) on demography parameters of *Ectomyelois ceratoniae* (Lep.: Pyralidae) in laboratory conditions. M.Sc Thesis, Tarbiat Modares University, 99 pp. [in Persian with English summary]
- Pourbehi, H., Talebi, A.A., Zamany, A.A., Goldasteh, Sh. and Farrar, N. 2009.** Comparison of the biological characteristics of the *Plodia interpunctella* Hubner (Lep., Pyralidae) on three cultivars date in laboratory conditions. Journal of Entomological Research, 1(4): 288-279. [in Persian with English summary]
- Rahmani, Sh., Marouf, A., Abolhassani, A. and Amir maafi, M. 2008.** Demography of *Batrachedra amydraula* (Lep.: Batrachedridae) under laboratory conditions. Applied Entomology and Phytopathology, 76 (1): 79-89. [in Persian with English summary]
- Sambaraju, K. 2007.** Studies on factors affecting behavior, ecology, and reproductive success of the Indian meal moth, *Plodia interpunctella*. Oklahoma State University, Ph. D. Thesis. 142 pp.
- SAS Institute. 2003.** JMP: A Guide to Statistical and Data Analysis, version 5.0.1. SAS Institute, Cary, NC.
- Sepasgozarian, H. 1975.** Storage pests of Iran and the their control. Tehran University publication, 212pp. [in Persian with English summary]
- Silhacek, D., Murphy, C. and Arbogast, R. T. 2003.** Behavior and movements of indian meal moths (*Plodia interpunctella* (Hubner) during commodity infestation. Journal of Stored Products Research, 39: 171-184.
- Tzanakakis, M. E. 1959.** An ecological study of the Indian meal moth, *Plodia interpunctella*, with emphasis on diapause. Hilgardia, 29: 205-246.

Comparison of the life table and reproduction parameters of the *Plodia interpunctella* (Hubner) (Lep., Pyralidae) on three cultivars of date in laboratory conditions

H. Pourbehi^{1*}, A. A. Talebi², A. A. Zamany³, Sh. Goldasteh⁴, N. Farrar⁵

1- Department of Entomology, College of Agriculture, Islamic Azad University, Arak Branch, Iran

2- Associate Professor, Department of Entomology, College of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3- Assistant Professor, Department of Plant Protection, Razi University, Kermanshah, Iran

4- Assistant Professor, Young Researchers club, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

5- Lecturer, Research Center of Agricultural and natural resources, Boushehr, Iran

Abstract

The Indian meal moth, *Plodia interpunctella* (Hubner) (Lep., Pyralidae) is one of the serious pests of stored date in Iran and many parts of the world. In this research life table and reproduction parameters of *P. interpunctella* on three cultivars of date were studied. The experiments were conducted in laboratory conditions at temperature of 27 ± 2 °C, $45\pm5\%$ relative humidity and a photoperiod of 16L:8D hours. The results indicated that, the life expectancy in egg period were 44/45, 52/29 and 47/89 days on Zahedi, Shahabi and Kabkab cultivars, respectively. The gross fecundity rate on Zahedi, Shahabi and Kabkab cultivars were estimated 172.1 ± 17.5 , 160.2 ± 15.2 and 121.0 ± 18.3 egg per female, respectively. There was no significant difference among gross fecundity rate on different cultivars of date. The net fertility rate on Zahedi cultivar with $96/8\pm10/4$ was more than the other cultivars. The lowest value of this parameter on Kabkab cultivar $43/84\pm7/26$ was estimated that there was significant difference with Zahedi and Shahabi cultivars, but no significant difference was observed between Zahedi and Shahabi cultivars. The mean egg per day and mean fertile eggs per day of moths developed on Zahedi cultivar were estimated $25/09\pm2/61$ and $22/38\pm2/30$, respectively that was shown the maximum value among examined cultivars.

Key words: *Plodia interpunctella*, Cultivars of date, Life table, Reproduction

*Corresponding Author, E-mail: Pourbehi_h@yahoo.com
Received: 12 Sep. 2010 – Accepted: 6 Aug. 2011