

اثر خاک دیاتومه ایران روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، *Callosobruchus maculatus F.* (Col., Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی

حسین رضا رضایی ترشیزی^۱، حسین فرازمند^{۲*}، شیلا گلدرسنه^۳، عارف معروف^۲

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک

۲- به ترتیب استادیار و مریبی، موسسه تحقیقات گیاه‌پرشنگی کشور، تهران

۳- استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران

چکیده

مطالعات آزمایشگاهی به منظور ارزیابی اثر حشره کشی فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه (سایان[®]) روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، (*Callosobruchus maculatus F.* (Col.:Bruchidae)، در دمای 30 ± 1 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 60 ± 5 درصد در تاریکی صورت گرفت. دامنه غلظت‌های خاک دیاتومه برای زیست سنجی شامل 30 ، 72 ، 173 و 416 و برای مقایسه میزان کاهش نتاج حشرات کامل شامل صفر (شاهد)، 30 ، 72 ، 173 و 1000 پی ام بودند که در شش تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که بعد از گذشت 3 روز غلظت 1000 پی ام اثر قابل قبولی از خود نشان می‌دهد. مقدار LC_{50} فرمولاسیون فوق برای حشرات کامل *C. maculatus* در این مدت $58/85$ پی ام برآورد گردید. تفاوت معنی‌دار بین لوبیاهای تیمار نشده و تیمار شده با خاک دیاتومه از نظر کاهش نتاج نشان داد که خاک دیاتومه موجب کنترل حشرات تازه ظاهر شده می‌گردد و میزان کاهش نتاج در غلظت 1000 پی ام حدود 81 درصد بود. میزان پایداری خاک دیاتومه ثابت بوده، بطوریکه با گذشت زمان، میزان کارایی آن کاهش نمی‌یابد. لذا از فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه (سایان[®]) می‌توان بعنوان محافظ مناسب حبوبات در برابر حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، خاک دیاتومه، ایران، کنترل آفت

مقدمه

سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، (*Callosobruchus maculatus F.* (Col., Bruchidae)، یکی از مهم‌ترین آفات حبوبات است که باعث کاهش کمی و کیفی بذور لوبیا چشم بلبلی، ماش، نخود سفید، لوبیا قرمز، عدس و باقلاء می‌گرد- (Bagheri-

*تلویتنده رابط، پست الکترونیکی: farazmand@entomology.ir

تاریخ دریافت مقاله (۹۰/۱/۲۶) - تاریخ پذیرش مقاله (۹۰/۸/۱۸)

Zenouz, 1995) بذور لوبيا چشم بلبلی بعد از ۳ تا ۵ ماه انبار داري، بطور ۱۰۰ درصد توسط سوسک چهار نقطه‌ای جبویات از بین می‌روند و وزن محصول تا ۶۰ درصد کاهش می‌يابد (Keita et al., 2000). يکی از متداول ترین روش‌های كنترل آفات انباری استفاده از ترکیبات تدخینی متیل بروماید و فسفین می‌باشد. مصرف این سموم تدخینی به دلیل سمیت فوق العاده روی انسان و سایر عوارض آن، در حال محدود شدن می‌باشد (Bell & Wilson, 1995; Daglish & Collins, 1999). با توجه به اثر نامطلوب متیل بروماید روی لایه ازن، مصرف آن فقط تا سال ۲۰۱۵ مجاز می‌باشد (Makhijani and Gurney, 1995). علاوه بر این مقاومت آفات انباری نسبت به سم فسفین گزارش شده است (Chaudhry, 2000).

تحقیقات گسترده‌ای به منظور استفاده از پودرهای معدنی و آفتکش‌های گیاهی که خطرات زیست محیطی کمتری داشته باشند، جهت کنترل آفات انباری در حال ارزیابی است (Thomson et al., 2000). خاک دیاتومه (DE)، به عنوان یک جایگزین برای حشره کش‌های شیمیایی بطور روز افزون استفاده شده و به عنوان یک جزء ضروری مدیریت تلفیقی آفات در محصولات انباری تشخیص داده شده است (Korunic, 1999). خاک دیاتومه شامل فسیل اسکلت دیاتوم هاست (Subramanyam & Roesli, 2000). خاک دیاتومه، یک سنگ رسوبی متخلخل سبک وزن مشکل از باقیمانده سیلیس‌های ما قبل تاریخ می‌باشد (Round et al., 1990). این ترکیبات پودری از طریق تماس با کوتیکول حشرات، موم لایه کوتیکول رویی حشرات را از بین برد و به دلیل از دست رفتن آب بدن، منجر به مرگ حشرات می‌شوند (Ebeling, 1971). البته عوامل مختلفی از قبیل رطوبت نسبی، دما، منع خاک معدنی دیاتومه، گونه حشره، مرحله زندگی حشره، سوش حشره، دانه و تراکم آفت، می‌توانند روی کارآیی DE اثر بگذارند (Fields, 1998). سمیت پایین DE برای پستانداران، کاربرد آن را برای کاربران آسان کرده است (Fields et al., 2002). تاکنون تعداد زیادی از فرمولاسیون‌های خاک دیاتومه بعنوان طولانی مدت محصولات می‌باشد (White et al., 1975). مقایسه فرمولاسیون‌های مختلف تجارتی می‌تواند اثربخش باشد (Arthur, 2000). همچنین مطالعه تاثیر فرمولاسیون® Sayan (T. castaneum) نشان داد که غلطت کمتر از مرگ و میر حشرات کامل T. castaneum du Val (Tribolium confusum) می‌باشد (Hashemi et al., 2011).

بررسی تاثیر فرمولاسیون® SilicoSec خاک دیاتومه برای کنترل *Sitophilus oryzae* L. نشان داد که غلطت ۱۲۵ ppm بعد از ۱۴ و ۲۱ روز، موجب ایجاد تلفات ۹۹ و ۱۰۰ درصد می‌گردد (Wakil & Shabbir, 2005). علاوه بر این بررسی سمیت فرمولاسیون® Protect-It خاک دیاتومه روی دو گونه سوسک انباری *T. confusum* (Herbst) و *T. castaneum* (Val) کمتر از مرگ و میر حشرات کامل *T. castaneum* نشان داد که مرگ و میر حشرات کامل *T. castaneum* du Val (Tribolium confusum) می‌باشد (Arthur, 2000). همچنین مطالعه تاثیر فرمولاسیون® Sayan خاک دیاتومه برای کنترل حشرات کامل *T. castaneum* (Golestan- آرد، 2000) نشان داد که غلطت ۳۱۵ پی پی ام موجب ایجاد ۹۰ درصد تلفات می‌گردد (Hashemi et al., 2011).

مقایسه فرمولاسیون‌های مختلف تجارتی خاک دیاتومه روی چند جمعیت شپشه آرد، *T. castaneum*، نشان داد که دو فرمولاسیون® Protect-It و Perma-Guard® به ترتیب موثرترین و کم اثرترین فرمولاسیون خاک دیاتومه جهت کنترل جمعیت‌های شپشه آرد بودند (Arnaud et al., 2005).

مطالعه اثر دما روی سمیت فرمولاسیون *Rhyzopritha dominica* F. SilicoSec خاک دیاتومه، بر روی حشرات کامل و *T. castaneum* نشان داد که مرگ و میر اولیه هر دو گونه بطور معنی داری در دماهای بالاتر (۲۷ و ۳۲ درجه سلسیوس) افزایش می یابد (Ziaeet al., 2006).

در این تحقیق، تاثیر حشره کشی غلظت های مختلف فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه (Sayan[®]) بر روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

پرورش حشرات: حشرات مورد استفاده در این تحقیق که شامل حشرات کامل *C. maculatus* بود، از دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان تهیه شده و روی لوبيا چشم بلبلی در شرایط دمایی 30 ± 1 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵۰ ± ۶٪ در تاریکی پرورش یافت.

فرمولاسیون خاک دیاتومه مورد استفاده در این تحقیق، حشره کش سایان[®]، خاک دیاتومه ایران، با فرمولاسیون پودری (Dust)، تولید شرکت کیمیا سبزآور ایران بود که ماده مؤثر آن، خاک معدنی دیاتومه و حاوی ۸۰٪ سیلیکون دی اکسید (Mیکرون و وزن مخصوص آن ۰/۵ g/ml - ۰/۶ می باشد. شکل ظاهری DE بصورت پودر نرم و به رنگ کرم یا طوسی روشن است. دانه بندی ذرات کمتر از ۵۰ میکرون و بعد از زمان های ۴۸ و ۷۲ ساعت، میزان مرگ و میر حشرات پت گردید.

آزمایش زیست سنجی: جهت محاسبه LC₅₀ پس از انجام آزمون مقدماتی و به منظور تعیین غلظت حداقل و حد اکثر، پنج غلظت خاک دیاتومه شامل ۳۰، ۷۲، ۱۷۳ و ۴۱۶ پی ام (میلی گرم از DE بر کیلوگرم لوبيا)، به همراه تیمار شاهد انتخاب گردید. آزمایش با شش تکرار انجام شد و هر تکرار شامل ده عدد حشره کامل دو تا سه روز سوسک چهار نقطه ای حبوبات (مخلوط نر و ماده) بود. آزمایش در ظروف ۱۰۰ میلی لیتری انجام شد. در هر ظرف مقدار ۵۰ گرم از لوبيا (رقم مشهدی با رطوبت ۱۲٪) با غلظت موردنظر خاک دیاتومه به همراه حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات قرار گرفت. سپس ظروف در دستگاه انکوباتور در دمای 30 ± 1 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۶۰ ± ۵٪ در تاریکی قرار گرفته و بعد از زمان های ۴۸ و ۷۲ ساعت، میزان مرگ و میر حشرات پت گردید.

تعیین نتاج سوسک چهار نقطه ای حبوبات در غلظت های مختلف خاک دیاتومه: به منظور بررسی مقایسه توانایی تولید نسل حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات در غلظت های مختلف خاک دیاتومه، این آزمایش با شش غلظت خاک دیاتومه (۳۰، ۷۲، ۱۷۳، ۴۱۶ و ۱۰۰۰ پی ام) به همراه شاهد، در شش تکرار و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. جهت انجام این آزمایش، از لوبيا چشم بلبلی استفاده شد. جهت آزمایش، تعداد ده عدد حشره کامل دو تا سه روز در ظروف با لوبيا چشم بلبلی تیمار شده رهاسازی و پس از گذشت ۱۰ روز، حشرات کامل از تمامی ظروف خارج شدند. سپس ظروف حاوی لوبيا چشم بلبلی تیمار شده به مدت ۳۰ روز در انکوباتور نگهداری شدند. پس از مشاهده اولین ظهر حشره کامل در ظروف، تعداد حشرات بالغ نسل جدید در هر ظرف، به مدت ۱۰ روز شمارش گردید. به منظور برآورد میزان کاهش نتاج از رابطه زیر استفاده گردید (Aldryhim, 1990).

$$100 \times [\text{تعداد نتاج حاصل در شاهد} / (\text{تعداد نتاج حاصل در تیمار} - \text{تعداد نتاج حاصل در شاهد})] = \text{درصد کاهش تولید نتاج}$$

بررسی پایداری خاک دیاتومه ایران جهت کنترل سوسک چهار نقطه‌ای جبویات

بر اساس نتایج حاصل از آزمایش‌های قبل، غلظت‌های ۳۰، ۴۱۶، ۷۲، ۱۷۳، ۷۲ و ۱۰۰۰ پی‌پیام خاک دیاتومه انتخاب گردید. مقدار ۲ کیلوگرم لوبيا چشم بلبلی از هر غلظت مشخص شده با خاک دیاتومه تیمار و به فواصل زمانی ۰، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ روز نگهداری شد، جهت آزمایش در هر طرف مقدار ۵۰ گرم از مخلوط لوبيا چشم بلبلی تیمار شده با غلظت موردنظر خاک دیاتومه در فواصل زمانی مختلف به همراه ده عدد حشره کامل دو تا سه روز سوسک چهار نقطه‌ای جبویات، در شش تکرار و در قالب طرح کاملاً تصادفی قرار گرفت. سپس ظروف در دستگاه انکوباتور در دمای 30 ± 1 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 60 ± 5 % و تاریکی مطلق قرار گرفته و بعد از زمان‌های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت، میزان مرگ و میر حشرات ثبت گردید.


تجزیه داده‌ها

محاسبه پروبیت درصد تلفات و معادله خط رگرسیون برای تعیین LC₅₀ با استفاده از نرم افزار StatsDirect (version 2.7.2) انجام شد. همچنین نتایج حاصل از آزمایش‌های تعیین میزان کاهش حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای آرد و تعیین پایداری خاک دیاتومه، با کمک نرم‌افزار SAS (Ver. 9) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

نتایج

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت خاک دیاتومه، میزان تلفات حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای جبویات نیز افزایش می‌یابد. به طوری که بعد از ۷۲ ساعت، کمترین میزان تلفات در غلظت ۳۰ میلی‌گرم DE در کیلوگرم لوبيا به میزان ۴۷ درصد و بیشترین میزان تلفات در تیمار ۴۱۶ میلی‌گرم در کیلوگرم لوبيا به مقدار ۸۲٪ به ثبت رسید و این در حالی بود که میزان تلفات تیمار شاهد پس از ۷۲ ساعت فقط ۳ درصد بود (شکل ۱). بر اساس نتایج بدست آمده، میزان LC₅₀ برای فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه، بعد از ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت، به ترتیب $159/87, 609/55$ و $58/85$ میلی‌گرم در کیلوگرم لوبيا چشم بلبلی (ppm) بود (جدول ۱). مقایسه LC₅₀ در زمان‌های مختلف نشان می‌دهد که میزان تاثیر خاک دیاتومه با گذشت زمان افزایش می‌یابد، به طوری که به عنوان مثال میزان تلفات تیمار ۴۱۶ میلی‌گرم در کیلوگرم لوبيا بعد از ۴۸، ۲۴ و ۷۲ ساعت، به ترتیب برابر ۴۲، ۶۰ و ۸۲ درصد بود (شکل ۱). لذا مشخص شد که تلفات غلظت‌های مختلف خاک دیاتومه پس از تیماردهی آغاز گشته و بتدریج افزایش می‌یابد.

نتایج تجزیه واریانس میزان کاهش تولید نتاج در نسل اول حشرات *C. Maculatus*. نشان دهنده تفاوت معنی‌دار تیمارها در سطح ۱٪ بود (df=4, 25; P=0.0001; C.V.: 18.98%). نتایج آزمایش نشان داد که بالاترین میزان کاهش تولید نتاج در تیمار "۱۰۰۰ پی‌پیام" به مقدار ۸۰/۶۸ درصد و کمترین مقدار آن در تیمار "۳۰ پی‌پیام" به مقدار ۷/۸۸ درصد بود (جدول ۲). مقایسه تیمارها نشان می‌دهد که تیمار "۳۰ پی‌پیام" با دارابودن کمترین میزان کاهش تولید نتاج در نسل اول (بالاترین مقدار ظهور حشرات کامل) در گروه a، و تیمارهای "۱۰۰۰" و "۴۱۶ پی‌پیام" با دارابودن بیشترین میزان کاهش نتاج حشرات کامل نسل اول در گروه a آماری قرار می‌گیرند.



شکل ۱- میانگین تلفات حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات در غلظت‌های مختلف خاک دیاتومه بعد از ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت

Fig. 1-Mean mortality of *C. Maculatus* adults exposed to different concentrations of DE after 24, 48 and 72 hours

جدول ۱- میزان سمیت فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات

Table 1- The toxicity of Iranian formulation of diatomaceous earth against adults *C. Maculatus* (n =6)

Time (h)	Number	LC (mg/kg wheat)		95% Confidence interval	Slope \pm SE	Chi-Square (df)	P-value
		LC ₅₀	LC ₉₀				
24	360	609.55	4017.93	461.86-880.93	1.565 \pm 0.195	1.54 (3)	0.6743
48	360	159.87	3038.70	111.04-227.61	1.003 \pm 0.148	5.61 (3)	0.1322
72	360	58.85	711.77	14.41-208.30	1.184 \pm 0.175	10.87 (3)	0.0125

mg per kg wheat (ppm)

نتایج تجزیه واریانس تعیین پایداری خاک دیاتومه نشان داد که بین میزان تلفات خاک دیاتومه تیمار شده با لوبيا چشم بلبلی در زمان‌های مختلف اختلاف معنی دار وجود ندارد ($df=4, 150; P=0.9715; C.V.: 4.50\%$). همچنین بر اساس اطلاعات به دست آمده، بین غلظت‌های مختلف خاک دیاتومه اختلاف معنی داری مشاهده شد ($df=5, 150; P=0.0001$). علاوه بر آن اثر متقابل غلظت و زمان نگهداری خاک دیاتومه نیز قادر اختلاف معنی دار بود ($df=20, 150; C.V.: 4.50\%$). نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین میانگین میزان تلفات حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات در حشرات تیمار شده با مخلوط تازه لوبيا و خاک دیاتومه، با مقدار ۵۶/۶۷ درصد و پایین‌ترین میانگین میزان تلفات در حشرات تیمار شده با مخلوط لوبيا و خاک دیاتومه نگهداری شده به مدت ۱۲۰ روز، به میزان ۵۲/۳۳ درصد بود (شکل ۲). همچنین مقادیر میزان تلفات حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات در غلظت‌های مختلف نشان داد که تیمار "۱۰۰۰ پی پی ام" با حدود ۹۱/۳۳ درصد دارای بیشترین میزان تلفات و تیمار "شاهد" با حدود ۶ درصد کمترین میزان تلفات را دارد. لذا تمام غلظت‌های خاک دیاتومه با تیمار "شاهد" دارای اختلاف معنی دار بودند (جدول ۳). مقایسه میزان تلفات غلظت‌های مختلف در زمان‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که در تمام غلظت‌ها، به جز تیمار شاهد، پایین‌ترین میزان تلفات در زمان "۱۲۰ روز" مشاهده شد.


جدول ۲- میانگین کاهش تولید نتاج در نسل اول حشرات سوسک چهار نقطه‌ای جبویات در تیمارهای مختلف خاک دیاتومه بعد از ۷۲ ساعت

Table 2- Mean of *F₁* emergence reduction of *C. Maculatus* exposed to different concentrations of DE after 72 (n = 6)

Diatomaceous earth concentrations ¹	<i>F₁</i> emergence reduction (%) ± SE
30	7.88 ± 2.38 d
72	14.90 ± 5.58 d
173	30.70 ± 1.94 c
416	53.55 ± 1.24 b
1000	80.68 ± 0.62 a

¹mg per kg wheat (ppm)

²Means followed by the different letters are significantly different (P < 0.01, DMRT)



شکل ۲- میانگین میزان تلفات حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای جبویات در مخلوط لوبيا چشم بلبلی و خاک دیاتومه نگهداری شده در زمان‌های مختلف

Fig. 2- Mean mortality of *C. Maculatus* adults in black-eye bean and DE mixtures kept in different periods

جدول ۳- میانگین تلفات حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای جبویات در غلظت‌های خاک دیاتومه بعد از ۷۲ ساعت

Table 3- Mean mortality of *C. Maculatus* adult exposed to different concentrations of DE (n = 6)

Diatomaceous earth concentrations ¹	Mean mortality (%) ± SE
0	6.00 ± 0.91 e
30	44.33 ± 1.33 d
72	53.67 ± 1.31 c
173	57.33 ± 1.26 c
416	74.00 ± 2.61 b
1000	91.33 ± 1.42 a

¹mg per kg wheat (ppm)

²Means followed by the different letters are significantly different (P < 0.01, DMRT)

بحث

بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق افزایش غلظت فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه موجب افزایش تلفات حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای جبویات می‌گردد که این نتیجه با مشاهدات آزمایش آرناد و همکاران (2005) مطابقت داشته به طوری که با افزایش غلظت فرمولاسیون Protect-It® خاک دیاتومه، میزان مرگ و میر حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای جبویات نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این اطلاعات به دست آمده حاکی از مطابقت نتایج این تحقیق با مشاهدات آزمایش Arnaud و همکاران (2005) دارد، که در نتیجه تحقیق انجام شده، افزایش غلظت خاک دیاتومه Sayan®، میزان تلفات حشرات کامل شپشه آرد، *T. confusum*, شد (Golestan-Hashemi et al., 2011).

همچنین آزمایشات نشان داد، تاثیر خاک دیاتومه با افزایش زمان قرار گرفتن حشرات کامل در لوبيا چشم بلبلی تیمار شده با آن، افزایش می‌یابد، کاربرد فرمولاسیون Protect-It® خاک دیاتومه روی *T. castaneum* و *T. confusum* نیز نشان داد که مدت زمان قرارگرفتن حشرات بالغ در داخل گندم‌های تیمار شده با میزان تلفات ارتباط مستقیم دارد

و با گذشت زمان، مقدار مرگ و میر حشرات افزایش می‌یابد (Arthur, 2000). همچنین کاربرد فرمولاسیون® Sayan خاک دیاتومه روی *T. confusum* نشان داد که میزان تلفات حشرات کامل، با گذشت زمان، افزایش می‌یابد، به طوری که میزان تلفات حشرات کامل شیشه آرد در غلظت ۳۱۵ پی‌پی‌ام، بعد از ۷ و ۱۴ روز به ترتیب ۲/۵ و ۹۰ درصد به دست آمد (Golestan-Hashemi et al., 2011). آزمایشات زیست‌سنگی فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه حاکی از آن بود که میزان غلظت لازم خاک دیاتومه بعد از ۷۲ ساعت جهت ایجاد تلفات ۵۰ درصد برابر حدود ۵۹ میلی‌گرم DE در کیلوگرم لوپیا می‌باشد. این در حالی است که میزان LC₅₀ برای فرمولاسیون® SilicoSec روی حشرات کامل *T. castaneum* حدود ۲۶۷ میلی‌گرم DE در کیلوگرم گندم و فرمولاسیون® Sayan روی حشرات کامل *T. confusum* حدود ۱۸۳ میلی‌گرم DE در کیلوگرم گندم بوده است، که نتایج حاکی از تاثیر بالاتر فرمولاسیون® SilicoSec به Sayan نسبت به (Ziaeet al., 2008) دارد. همچنین کاربرد غلظت ۲۵۰ میلی‌گرم فرمولاسیون® Silico-sec خاک دیاتومه در کیلوگرم گندم، موجب ایجاد تلفات ۵۹ درصدی روی حشرات کامل *T. confusum* گردیده است (Chintzoglou et al., 2007; Golestan-Hashemi et al., 2011) علاوه بر این غلظت پیشنهادی فرمولاسیون‌های Protect-It® و Protect-It-It® و Sayan خاک دیاتومه، جهت کنترل کامل جمعیت-های مختلف حشرات کامل شیشه آرد، به ترتیب، ۱۰۰۰ و ۶۵۰ پی‌پی‌ام بوده است (Arnaud et al., 2005; Golestan-Hashemi et al., 2011).

مقایسه تاثیر چهار فرمولاسیون خاک دیاتومه (Protect-It®, Perma-Guard®, Insecto®, Dryacide®)، روی *T. castaneum* در کشورهای استرالیا، کانادا و انگلستان نشان داد که فرمولاسیون Protect-It®، موثرترین و Guard®، کم اثرترین این ترکیبات بودند، به طوری که LC₅₀ برای فرمولاسیون Protect-It®، پس از ۱۴ روز، در کشورهای استرالیا، کانادا و انگلستان، به ترتیب شامل ۳۴۴، ۷۷۰ و ۴۶۲ پی‌پی‌ام بود (Fields et al., 2002). همچنین مقایسه فرمولاسیون‌های مختلف خارجی خاک دیاتومه روی حشرات کامل شیشه آرد، *T. castaneum* (Herbst)، نیز نشان داد که فرمولاسیون Protect-It® نسبت به سایر فرمولاسیون‌ها از کارایی بالاتری برخوردار است (Arnaud et al., 2005) و این در حالی است که بر اساس اطلاعات به دست آمده فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه (Sayan®) نسبت به فرمولاسیون‌های خارجی از تاثیر مطلوب‌تری برخوردار بوده است (Golestan-Hashemi et al., 2011). مشاهدات به دست آمده از میزان ظهور حشرات کامل شیشه آرد نیز نشان داد که با افزایش غلظت خاک دیاتومه، میزان ظهور نیز کاهش می‌یابد، به طوری که کمترین میزان ظهور حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای در غلظت ۱۰۰۰ پی‌پی‌ام به دست آمد به طوری که میانگین شاخص کاهش تولید نسل اول آن حدود ۸۱ درصد بود و این با نتایج به دست آمده از میزان تلفات حشرات کامل پس از ۷۲ ساعت در غلظت‌های مختلف مطابقت دارد. در بررسی میزان ظهور حشرات کامل *T. castaneum*، توانایی تولید مثل بالغین در گندم سالم تیمار شده با غلظت‌های مختلف فرمولاسیون SilicoSec کاملاً متوقف شد و هیچ‌گونه نتاجی مشاهده نشد (Ziaeet al., 2007). همچنین در تحقیقات Fields (2002)، ظهور نسل اول حشرات کامل *T. castaneum* در تمامی گندم‌های تیمار شده با خاک دیاتومه پایین بود. علاوه بر این میانگین کاهش نتاج نسل اول حشرات کامل *T. confusum* در گندم‌های تیمار شده با غلظت ۵۰۰ پی‌پی‌ام فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه (Sayan®) حدود ۹۰ درصد بود (Golestan-Hashemi et al., 2011) که از لحاظ کاهش میزان ظهور حشرات کامل، با نتایج این تحقیق مشابه است.

به هر حال یافتن یک DE جدید که در غلظت‌های پایین مؤثر باشد به ذخیره‌سازی دانه عاری از حشرات و باقیمانده‌های حشره‌کش شیمیایی کمک می‌کند (Arnaud et al., 2005). بنابراین می‌توان اظهار نمود که فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه (Sayan®) دارای پایداری مناسبی بوده و لذا می‌تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای کنترل شیمیایی و یا

به صورت تلفیق با سایر روش‌های کنترلی جهت حفاظت محصولات انباری از سوسک چهار نقطه‌ای جبویات و سایر آفات انباری مدنظر قرار گیرد. همچنین با توجه به میزان مصرف بسیار کم خاک دیاتومه در سیلوها و انبارها و نیز قیمت پایین خاک دیاتومه فرمولاسیون ایران در مقایسه با فرمولاسیون‌های خارجی، لذا از لحاظ اقتصادی نیز مقرن به صرف می‌باشد.

سپاسگزاری

نگارندگان از موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به جهت همکاری در اجرای تحقیق و نیز از شرکت کیمیا سبزآور ایران به جهت تامین فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه موردنیاز تشکر می‌نمایند.

References

- Aldryhim, Y. N. 1990.** Efficacy of the amorphous silica dust, Dryaccine, against *Tribolium confusum* DUV. and *Sitophilus granarius* (L.) (Coleoptera: Tenebrionidae and Curculionidae). Journal of Stored Products Research, 26(4): 207-210.
- Arnaud, I., Ian, H. T., Brostaux, Y. and Haubruge, E. 2005.** Efficacy of diatomaceous earth formulations admixed with grain against populations of *Tribolium castaneum*. Journal of Stored Products Research, 41(2):121-130.
- Arthur, F. H. 2000.** Impact of food source on survival of red flour beetles and confused flour beetles *Tribolium confusum* DUV. (Coleoptera: Tenebrionidae) exposed to diatomaceous earth. Stored Product and Quarantine Entomology, 93(4): 1347- 1356.
- Bagheri-Zenouz, E. 1995.** Stored products pests and its control methods. 2nd ed. Sepehr Publishing. 309 pp.
- Bell, C. H. and Wilson, S. M. 1995.** Phosphine tolerance and resistance in *Trogoderma granarium* (Everts.) (Coleoptera: Dermestidae). Journal of Stored Products Research, 31: 199-205.
- Chaudhry, N. Q. 2000.** Phosphine resistance. *Pesticide Outlook*. V. 11(3): 88-91.
- Chintzoglou, G., Athanassiou, C. G. and Arthur, F. H., 2008.** Insecticidal effect of spinosad dust, in combination with diatomaceous earth, against two stored-grain beetle species. Journal of Stored Products Research, 44: 347-353.
- Daglish, G. J. and Collins, P. J. 1999.** Improving the relevance of assays for Phosphine resistance. In: Stored product protection, Eds. Jin, X., Liang, Q. Liang, Y. S., Tan, X.C. and Guan, L. H., pp. 584-593.
- Ebeling, W., 1971.** Sorptive dusts for pest control. Annual Review of Entomology 16, 123–158.
- Fields, P. G., 1998.** Diatomaceous earth: Advantages and limitations. Proceedings of the 7th International Working Conference on Stored-Product Protection, 1.
- Fields, P., Allen, S., Korunic, Z., McLaughlin, A. and Stathers., T. 2002.** Standardized testing for diatomaceous earth. . Proceedings of the 8th International Working Conference on Stored-Product Protection, 1.
- Golestan-Hashemi, F.S., Farazmand, H., Karimzadeh-Esfahani, J., Marouf, A. 2011.** Effect of Iranian formulation of diatomaceous earth on confused flour beetle, *Tribolium confusum* du Val (Col.: Tenebrionidae), under laboratory conditions. Iranian Journal of Entomological Research. 2(4): 307–317.
- Keita, S.M., Vincent, C., Schmit, J., Arnason, J.T. and Belanger, A. 2001.** Efficacy of essential oil of *ocimum basilicum* L.and *O.gratissimum* L.applied as An insecticidal fumigant and powder to control *Callosobrucus maculatus* (Fab.)(Coleoptera:Bruchidae). Journal of stored products Reserch, 37:339-349.
- Korunic, Z., 1998.** Diatomaceous earths, a group of natural insecticides. Journal of Stored Products Research. 34: 87–97.
- Korunic, Z., 1999.** Enhanced diatomaceous earth: an alternative to methyl bromide. Australian Journal of Technology 2: 95-104.
- Makhijani, A. and K. R. Gurney. 1995.** Mending the ozone hole: science, technology and policy. MIT. Press, Cambridge, MA.
- Round, F. E., Crawford, R. M. and Mann, D. G. 1990.** The diatoms. Cambridge University Press, Cambridge, 747 p.

- Subramanyam, Bh., Roesli, R., 2000.** Inert dusts. In: Subramanyam, Bh, Hagstrum, D.W. (Eds.), Alternatives to Pesticides in Stored-product IPM. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 321–373.
- Thomson, G.D., Dutton, B., Sparks, T.S., 2000.** Spinosad – a case study:an example from a natural programs discovery program. Pest Management Science 56: 696–702.
- Wakil, W. and Shabbir, A., 2005.** Evaluation of diatomaceous earth admixed with rice to control *Sitophilus oryzae* (L.) (Coleoptera: Curculionidae). Journal of Pakistan Entomology, 27, No 2.
- White, G. D., Berndt, W. L. and Wilson, J. L. 1975.** Evaluating diatomaceous earth, silica-aerogel dusts, and malathion to protect stored wheat from insects. Marketing Research Report United States Department of Agriculture, No. 1038: 18 p.
- Ziaeef, M., Safaralizadeh, M. H. and Shayesteh, N. 2006.** Efeects of temperature and exposure interval on the toxicity of silico-sec® against two stored products insects. Pak. Entomol, 28: No.1.
- Ziaeef, M., Safaralizadeh, M. H. and Shayesteh, N. 2007.** Efficacy of Silicosec®, a Diatomaceous earth formulation against *Tribolium castaneum* (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae). Pakistan Journal of Biological Sciences 10 (21): 3841-3846.

Archive of SID

Effect of Iranian formulation of diatomaceous earth on bruchid beetle, *Callosobruchus maculatus* F. (Col., Bruchidae), under laboratory conditions

Hosseinreza-Rezaei Torshizi¹, Hossein Farazmand^{2*}, Shila Goldasteh³, Aref Marouf²

1- Graduated student, Department of Entomology, Agriculture faculty, Islamic Azad University, Arak branch, Arak, Iran

2- Department of Agricultural Entomology, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran

3- Department of Entomology, Arak Azad University, Arak, Iran

Abstract

One of the most promising alternatives to synthetic insecticides for the control of stored product pests is diatomaceous earth (DE). Laboratory studies were performed to evaluate the insecticidal effects of Iranian formulation of DE (Sayan®) on adults of bruchid beetle, *Callosobruchus maculatus* F. (Coleoptera: Bruchidae), at 30 ± 1 °C and 60 ± 5 % RH in dark. Experiments for bioassay and adult emergence evaluation, were carried out with 5 concentrations (30, 72, 173 and 416 ppm (mg DE/kg wheat)) and 6 concentrations (0, 30, 72, 173, 416 and 1000 ppm), respectively, with 6 replications. The results showed that the concentration 416 ppm of DE had acceptable effects on *C. maculatus* mortality after 3 days. After 3 days, the LC₅₀ of DE for *C. maculatus* adults was estimated to be 58.85 ppm. There was significant difference between DE-treated and untreated bean for progeny production, as DE killed the newly emerged beetles and the concentration 1000 ppm of DE had acceptable effects on F₁ emergence reduction (81%). As time goes by, DE stability and efficiency were constant. As a result, Iranian formulation of diatomaceous earth (Sayan®) can be used to protect grains against *C. maculatus* adults.

Key words: bruchid beetle, *callosobruchus maculatus*, diatomaceous earth, Iran, pest control

*Corresponding Author, E-mail: farazmand@entomology.ir
Received: 15 Apr. 2011 – Accepted: 9 Nov. 2011

