

بررسی حساسیت مراحل مختلف زیستی عسلک پنبه *Bemisia tabaci Gennadius*

(به پایری پروکسی فن و روغن سیتوویت) (Hem., Aleyrodidae)

صادیقه اشتری^{۱*}، علی اصغر پورمیرزا^۲، محمدحسن صفرعلیزاده^۲

۱- مری، حشره‌شناسی کشاورزی مرکز آموزش علمی کاربردی، جهاد کشاورزی استان مرکزی
۲- دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

عسلک پنبه در برابر سموم شیمیایی بهشدت از خود مقاومت نشان داده و از نظر کمی و کیفی عملکرد پنبه را کاهش می‌دهد. از آنجا که باور عمومی بر این است که حشره‌کش‌های Biorational بهدلیل داشتن خصوصیات ویژه از جمله کمتر برهم زدن محیط‌زیست حشره‌کش‌های مطلوبی هستند، در این تحقیق حساسیت مراحل مختلف زیستی عسلک پنبه *Bemisia tabaci* نسبت به پایری پروکسی فن، روغن سیتوویت و مخلوط آن‌ها ارزیابی گردید. از روغن سیتوویت و پایری پروکسی فن در ۵ غلظت و تیمار شاهد استفاده شد. مقدار LC₅₀ حشره‌کش پایری پروکسی فن برای حشره‌کامل، تخم، مراحل نابالغ (پوره و شفیره) به ترتیب ۴۵/۰۴، ۱۰۸۶ و ۱۱/۴۷ پی‌سی‌ام تعیین گردید. LC₅₀ روغن سیتوویت برای حشره‌کامل، تخم و مراحل نابالغ (پوره و شفیره) به ترتیب ۱۵۵۴ و ۸۸۴/۷۹ و ۶۸۴/۷۰ پی‌سی‌ام برآورد شد. بهمنظور ارزیابی نقش سینرژیستی روغن سیتوویت LC₂₅ سم پایری پروکسی فن در هر مرحله زیستی با LC₂₅ روغن سیتوویت مخلوط گردید که در نتیجه میزان تلفات در حشره‌کامل، تخم و مراحل نابالغ به ترتیب ۵۲/۳۶٪، ۶۲/۲۲٪ و ۶۹/۱۹٪ به دست آمد و معلوم گردید که روغن سیتوویت اثر پایری پروکسی فن را تشدید می‌کند.

واژه‌های کلیدی: عسلک‌پنبه، زیست‌سنگی، روغن سیتوویت، پایری پروکسی فن، سینرژیسم

مقدمه

عسلک پنبه با نام علمی *Bemisia tabaci Gennadius* (Hem., Aleyrodidae) در ایران و بسیاری از کشورهای جهان به عنوان آفت درجه یک پنبه شناخته شده است (Bagheri, 2000). این آفت چندخوار بوده و به ۵۰۰ گونه از ۷۵ خانواده گیاهی حمله می‌کند و در ایران تقریباً در تمام مناطق کشت پنبه به استثنای مغان فعالیت دارد (Javanmoghadam & Noori, 1997). استفاده از حشره‌کش‌های شیمیایی علیه این آفت مشکلاتی را در بردارد که از آن جمله می‌توان بقایای این سموم در محیط، بهم خوردن تعادل طبیعی و انهدام عوامل کنترل طبیعی را نام برد. از آنجایی که مراحل مختلف زیستی

*نویسنده رابط، پست الکترونیکی: aroya95@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله (۲۸/۹/۸۹) - تاریخ پذیرش مقاله (۲۰/۸/۹۰)



عسلک پنبه به حشره‌کش‌های زیادی مقاوم شده‌اند سوموم بیورشنا^۱ را که از نظر نحوه تاثیر متفاوت با حشره‌کش‌های سنتیک دیگر هستند بیشتر مورد تایید قرار می‌دهند (Sheybani Tazraji, 2000). این ترکیبات مواد بیولوژیکی هستند که برای کنترل آفت خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند و تاثیر بازی روى دیگر موجودات زنده غیرهدف ندارند. ترکیبات شبه هورمون‌های جوانی، مشابه هورمون‌های حشرات اثر نموده و تعادل هورمونی حشرات را به هم‌زده، تغییرات اساسی از نظر مرفوولوژی ایجاد می‌نمایند (Gerling & Sinai, 1994; Cadogan *et al.*, 1997). ترکیبات تنظیم کننده رشد حشرات انتخابی عمل نموده و سمیت کمی برای پستانداران دارند و سازگاری محیطی آن‌ها در مقایسه با سایر حشره‌کش‌ها بیشتر است و می‌توانند جایگزین حشره‌کش‌های با طیف عمل وسیع شوند (Cadogan *et al.*, 1997). استفاده از پایری‌پروکسی فن^۲ در بسیاری از مناطق برای کنترل حشرات سپردار و شپشک‌ها از جمله *Aonidiella aurantii* (Maskell) در باغات مرکبات توصیه شده است (Peleg, 1988). سمعپاشی سن دوم پورگی عسلک پنبه با ۰/۰۴ تا ۵ میلی‌گرم در لیتر پایری‌پروکسی فن در رشد طبیعی مرحله پوپاریومی اثر داشته و از ظهور کلیه حشرات کامل جلوگیری کرده است. همچنین استفاده از همین سم با همین دز در سومین سن پورگی به میزان ۹۱ تا ۱۰۰ درصد از ظهور حشرات کامل جلوگیری کرده است (Horowitz & Ishaaya, 1992). پایری‌پروکسی فن یک شبه هورمون جوانی است که فعالیت جوانسانسازی دارد و به طور موثری از تغیریخ تخم عسلک پنبه به طور مستقیم یا از طریق تاثیر بر ماده‌ها جلوگیری می‌کند (Horowitz & Ishaaya, 1994). در یک آزمایش که اثر پایری‌پروکسی فن روی سه زنبور پارازیتوبید داخلی مگس سفید شامل *E. transvena* Timberlake (Hym., Aphelinidae), *Encarsia pergandiella* Howard (Hym., Aphelinidae) و *E. pergandiella* (Hym., Aphelinidae) بررسی شد معلوم گردید که پایری‌پروکسی فن برای *E. formosa* Gahan (Hym., Aphelinidae) برای *E. transvena* نسبتاً ایمن و برای *E. formosa* (به‌ویژه شفیره) نسبتاً سمی است (Liu & Stansly, 1997). کاربرد روغن برای کنترل شپشک‌های نباتی در حالت زمستان‌گذرانی و به طور کلی مرحله تخم حشرات موثر است. همچنین روغن‌ها به طور معمول در فرمولاسیون آفت‌کش‌ها به عنوان پخش‌کننده و چسباننده استفاده می‌شوند (Davidson *et al.*, 1991) با به کار بردن غلاظت ۴ در هزار روغن سیتوفویت روی مراحل نابالغ عسلک پنبه نتایج مطلوبی حاصل شده است (Valizadegan, 1999). برای کنترل آفات ممکن است مخلوط چندین آفت‌کش با هم به کار روند. بر هم‌کشن بین آفت‌کش‌ها زمانی که به طور همزمان یا متوالی به کار می‌روند شامل اثرات افزایشی، سینزیزیستی و آناتگونیستی می‌باشد (Duffus & Worth, 1996). مهمترین مزیت پدیده سینزیزیسم کنترل مقاومت آفات می‌باشد. بدلیل قیمت گران ترکیبات سینزیزیست امروزه از بعضی ترکیبات دیگر از جمله روغن‌ها برای افزایش سمعیت استفاده می‌گردد (Flint, 2002). تحقیقات نشان داده است که اضافه کردن روغن‌ها به سوموم سبب افزایش تلفات سفیدبالک گلخانه می‌شود (Horwitz *et al.*, 1997) در تحقیقی میزان LC₅₀ روغن سیتوفویت برای حشره‌کش بیورشنا^۳ ۱۴۰ پی‌پی‌ام تعیین گردید و مشخص شد که روغن سیتوفویت دارای اثر کشنده‌گی مطلوبی روی شته سبز هلو است (Hosseini Naveh, 2010). از این رو هدف این تحقیق بررسی حساسیت مراحل مختلف زیستی عسلک پنبه به حشره‌کش بیورشنا^۱ و در نهایت کاهش مصرف آن و جایگزین نمودن این حشره‌کش با روغن سیتوفویت می‌باشد، جهت نیل به این هدف از پایری‌پروکسی فن متعلق به گروه آنالوگ‌های هورمون جوانی^۴ و روغن سیتوفویت استفاده گردید.

1-Biorational

2-Pyriproxyfen

3- Juvenile hormone analogues

مواد و روش‌ها

۱- پرورش گیاه میزبان و حشره

گلدان‌های پلاستیکی به قطر ۱۸ و ارتفاع ۱۸ سانتی‌متر انتخاب گردید. در تعدادی از گلدان‌ها بذر توتون و در تعداد دیگر بذر گوجه‌فرنگی کاشته شد. پس از سبز شدن بوته‌های گوجه‌فرنگی و توتون، بوته‌های ضعیف از گلدان‌ها حذف شدند. برای به‌دست آوردن جمعیتی از افراد نابالغ، تعداد زیادی حشره‌کامل روی گلدان‌های توتون و گوجه‌فرنگی رهاسازی شدند و ۴ هفته پس از رهاسازی کلیه مراحل زیستی روی برگ‌ها مشاهده گردید. برای تهیه تخم، حشرات کامل عسلک پنبه به تعداد زیاد روی بوته‌های گوجه‌فرنگی و توتون کاشته شده در گلدان‌ها رهاسازی شدند. سه روز پس از رهاسازی به‌وسیله بینوکولر برگ‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و برگ‌هایی که دارای حداقل ۴۰ عدد تخم بوده و عاری از پوره بودند برای آزمایش انتخاب شدند. قفسه‌هایی به ابعاد 100×70 سانتی‌متر در قاعده و ارتفاع ۹۰ سانتی‌متر ساخته شد و پارچه‌ای توری (۵۰ مش) با سوراخ بسیار ریز طوری روی قفسه قرار گرفت که همه جوانب آن به‌خوبی پوشیده شد. برای آبیاری از یکسری ظرف سرم استفاده گردید. هنگامی که بوته‌های گوجه‌فرنگی و توتون به رشد کافی رسیدند، حشرات جمع‌آوری شده به‌داخل قفسه انتقال یافتند.

۲- ترکیبات مورد استفاده

- ۱- پایری پروکسیفن با نام‌های تجاری (Sumilarv^R) و (Tiger^R) و (Nemesis^R) و (Admiral^R) موجود است. این ترکیب تنظیم کننده رشد به صورت امولسیون غلیظ با ماده موثره ۱۰٪ به بازار عرضه می‌شود. میزان توصیه شده علیه آفات پنبه ۷/۵-۰/۵ لیتر در هکتار و ساخت شرکت Sumitomo ژاپن می‌باشد.
- ۲- روغن سیتوویت: دارای امولسیفایر، پخش‌کننده، خیس‌کننده و به صورت مایع صدرصد خالص، ساخت شرکت BASF آلمان می‌باشد.

۳- آزمایش تعیین محدوده غلظت‌های لازم

هدف از این آزمایش، تعیین دامنه‌ای از غلظت‌های سم بود که مرگ و میری معادل ۲۵ و ۷۵ درصد در جمعیت مورد نظر ایجاد نماید (Robertson & Presiler, 1992). برای مشخص کردن این محدوده غلظت توصیه شده سم را به عنوان غلظت وسط در نظر گرفته و برای به‌دست آوردن چهار غلظت دیگر با فاصله ۵ برابر دو غلظت بالای غلظت حدودست و دو غلظت پایین غلظت حدودست انتخاب شدند. آزمایش‌های مقدماتی با ۵ غلظت از محلول سمی و یک تیمار شاهد (آب) انجام یافتند. از روی غلظت‌های مقدماتی غلظت‌های اصلی محاسبه گردیدند. در همه آزمایش‌ها درصد تلفات شاهد با استفاده از فرمول آبوت اصلاح شد (Abbott, 1925).

۴- بررسی اثر حشره‌کشی دو ترکیب روی حشره‌کامل

جهت آزمایش، برگ‌هایی از توتون و گوجه‌فرنگی را بدون جدا شدن از گیاه، به مدت ۵ ثانیه در ۵۰۰ میلی‌لیتر از غلظت مورد نظر حشره‌کش غوطه‌ور کرده و بعد از خشک شدن داخل ظروف یکبار مصرف که در کناره آن شیاری برای قرار گرفتن دم برگ تعییه شده بود و دهانه آن با توری مسدود می‌شد قرار گرفتند (Prabhaker *et al.*, 1988). در مورد

حشرات کامل عسلک پنبه ابتدا با آسپیراتور تعدادی حشره کامل جمع آوری گردیده و سپس به ظروف منتقل شدند. مرگ و میر حشرات کامل ۲۴ ساعت بعد (به دلیل کوتاهی طول عمر حشره کامل عسلک پنبه) از آزمایش شمارش گردید. پایری پروکسی فن در غلظت های ۱۳۰، ۳۰۰، ۶۸۰ و ۱۵۴۰ پی بی ام و سیتوویت در غلظت های ۱۰۰، ۴۱۰، ۱۷۱۰ و ۷۰۹۰ پی بی ام استفاده شدند. هر غلظت دارای ۵ تکرار بود و در هر آزمایش تیمار شاهد (آب) به کار رفت. برای رقیق کردن غلظت ها از آب استفاده شد. تعداد حشرات کامل مورد استفاده برای هر غلظت در هر تکرار به طور متوسط ۲۶ عدد بود.

۵- بررسی اثر حشره کشی دو ترکیب روی مرحله تخم

جهت آزمایش، ابتدا برگ هایی که دارای تعداد کافی تخم بودند، بدون جدا شدن از گیاه، به مدت ۵ ثانیه در ۵۰۰ میلی لیتر از غلظت حشره کش غوطه ور شدند (Prabhaker *et al.*, 1989). پس از خشک شدن برگ ها در داخل ظروف یکبار مصرف قرار گرفتند. غلظت های مورد استفاده برای پایری پروکسی فن ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۱۳۰، ۳۲۰ پی بی ام و غلظت های استفاده شده برای روغن سیتوویت ۵، ۲۱۰، ۹۰۰، ۳۸۰ و ۱۶۵۹۰ پی بی ام بودند. برای هریک از این ترکیبات شیمیایی ۵ غلظت به علاوه یک تیمار شاهد هر کدام در ۵ تکرار در نظر گرفته شد. تعداد تخم های مورد استفاده برای هر غلظت در هر تکرار به طور متوسط ۴۶ عدد بود. چون دوره انکوباسیون تخم ۱۳-۱۷ روز است، مرگ و میر تخم جهت اطمینان از باز شدن همه تخم ها بعد از ۱۵ روز شمارش گردید. بعد از این مدت برگ های تیمار شده از گیاه جدا گردیده و مرگ و میر حشرات در زیر بینوکلر مورد بررسی قرار گرفت. برای رقیق کردن غلظت ها از آب استفاده شد.

۶- بررسی اثر حشره کشی دو ترکیب روی مراحل نابالغ

در این آزمایش ها برگ های حاوی مراحل مختلف پورگی و شفیرگی را بدون جدا شدن از گیاه، به مدت ۵ ثانیه در ۵۰۰ میلی لیتر از محلول حشره کش مورد نظر غوطه ور کرده و پس از ۲۰ دقیقه برگ ها در ظروف یکبار مصرف قرار داده شدند (Prabhaker *et al.*, 1989). درصد تلفات ۴ روز پس از تیمار کردن (چون دوره تغییر جلد مراحل نابالغ ۴-۳ روز است لذا ۴ روز پس از تیمار کردن شمارش انجام شد که از باز شدن تقریباً همه تخم ها اطمینان حاصل شود) محاسبه شد. غلظت های استفاده شده برای پایری پروکسی فن ۱۰، ۵، ۲۰، ۴۰ و ۱۲۰ پی بی ام و غلظت های مورد استفاده برای سیتوویت ۱۸۰، ۵۳۰، ۶۰، ۱۵۷۰ و ۴۶۶۰ پی بی ام بودند. برای هر یک از سوم ۵ غلظت به علاوه یک تیمار شاهد با آب و برای هر غلظت ۵ تکرار در نظر گرفته شد. تعداد مراحل نابالغ برای هر غلظت در هر تکرار به طور متوسط ۳۶ عدد بود. برای رقیق کردن غلظت ها از آب استفاده شد.

۷- بررسی تاثیر مخلوط سم پایری پروکسی فن و روغن سیتوویت روی مراحل مختلف زیستی عسلک پنبه

جهت انجام این آزمایش غلظت LC₂₅ حشره کش پایری پروکسی فن در هر مرحله را با غلظت LC₂₅ روغن سیتوویت در همان مرحله مخلوط نموده و تاثیر ترکیب حاصل مطابق روش های پیشین روی مرحله مورد نظر بررسی قرار گرفت. دلیل به کار بردن این غلظت این است که ممکن است ترکیبی که به عنوان سینثزیست به کار می رود اثر تشدید کننده ای زیاد روی سم مورد نظر داشته باشد و درصد تلفات تا ۱۰۰ درصد بررسد که داده های حاصل قابل تجزیه و

تحلیل نباشد. همچنین ممکن است اثر تشدید کنندگی ناچیزی روی سم مورد نظر داشته باشد. به همین دلایل غلطت LC_{25} به کار برده شد که در هر دو صورت یک کنترل مطلوب به دست آید.

۸- تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SAS انجام شد (SAS Institute, 1994). نمودارها نیز توسط نرم‌افزار Microsoft Excel رسم شدند.

نتایج


زیست‌سنجی عسلک پنبه تحت تاثیر پایری‌پروکسی‌فن

با تجزیه پروبیت داده‌های به دست آمده از زیست‌سنجی‌های عسلک پنبه با حشره‌کش پایری‌پروکسی‌فن، غلطت‌های ۵۰ درصد مرحله تخم، مراحل نابالغ و حشره‌کامل این حشره برآورد گردید. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق حساسیت مراحل نابالغ به این حشره‌کش به مراتب بیشتر از سایر مراحل می‌باشد. مرحله تخم هم نسبت به حشره‌کامل، به پایری‌پروکسی‌فن حساستر است. مقدار بالای LC_{50} پایری‌پروکسی‌فن برای حشره‌کامل بیانگر اثر ناچیز این سم بر این مرحله زیستی می‌باشد. بررسی مقادیر x^2 محاسبه شده (با حدود اطمینان ۹۵٪) با جدول محاسبه^a، نشان داد که داده‌ها به خوبی با مدل پروبیت برآذش می‌یابند (جدول ۱). همچنین منحنی رابطه بین لگاریتم غلطت و پروبیت درصد تلفات در مراحل مختلف زیستی تعیین شد. از آنجا که شبی خطوط پروبیت سوم مختلف نشان دهنده تغییرات در فعالیت سم به ازای افزایش هر واحد دز یا غلطت می‌باشد (Robertson *et al.*, 2007) چنین نتیجه گرفته می‌شود به ازای افزایش هر واحد سم خط پروبیت رسم شده برای مراحل نابالغ بیشترین تلفات را نسبت به دو مرحله دیگر نشان می‌دهد (شکل ۱).

جدول ۱- بررسی تلفات مراحل مختلف زیستی تحت تاثیر سم پایری‌پروکسی‌فن

Table1- Different developmental stages mortality under the influence of pyriproxyfen

Stages	LC_{50} (ppm)	(95%) Lower-Upper	$a \pm SE$	$b \pm SE$	χ^2 (df=3)	Probability
Egg	45.04	18.46 -90.97	0.76 ± 0.12	-1.26 ± 0.23	8.43	0.03
Immature	11.47	8.75-14.40	0.99 ± 0.15	-1.05 ± 0.18	0.93	0.62
Adult	1086	858.65-1424	1.09 ± 0.11	-3.32 ± 0.34	1.20	0.75



شکل ۱- رابطه لگاریتم غلطت و پروبیت درصد تلفات مراحل مختلف زیستی تحت تاثیر پایری‌پروکسی‌فن

Fig1- Relationship between log concentration and probit of mortality for different developmental stages under the influence of pyriproxyfen


زیست‌سنجدی عسلک پنبه تحت تاثیر روغن سیتوویت

در این تحقیق نیز با تجزیه پروبیت داده‌های حاصل از زیست‌سنجدی عسلک پنبه با روغن سیتوویت غلظت‌های کشندۀ ۵۰ درصد مرحله تخم، مراحل نابالغ و حشره‌کامل برآورد گردید. با توجه به بررسی LC_{50} ‌های حاصله مراحل نابالغ حساسیت بیشتری نسبت به مرحله تخم و حشره‌کامل نشان دادند که حساس‌تر بودن مراحل نابالغ و تخم نسبت به حشره‌کامل را می‌توان به اثرات تماسی روغن سیتوویت نسبت داد. پس از مقایسه مقادیر x^2 محاسبه شده در این تحقیق با عدد x^2 محاسبه شده (توسط جدول x^2)، مشخص می‌شود که داده‌ها پراکندگی چندانی نداشته‌اند (جدول ۲). رابطه بین لگاریتم غلظت و پروبیت درصد تلفات نیز در مراحل مختلف زیستی تعیین شد. همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، خط پروبیت رسم شده برای تاثیر روغن سیتوویت روی مراحل نابالغ نسبت به دو خط دیگر تلفات بیشتری را نشان می‌دهد (شکل ۲).

جدول ۲ - تلفات مراحل مختلف زیستی تحت تاثیر روغن سیتوویت

Table2- Different developmental stages mortality under the influence of citowett oil

Stages	LC_{50} (ppm)	(95%) Lower-Upper	a ±SE	b±SE	t (df=3)	Probability
Egg	884.79	338.87-2146	0.70±0.09	-2.09±0.30	10.48	0.01
Immature	684.70	516.55-915.54	0.76±0.07	-2.16±0.21	3.43	0.32
Adult	1554	354.61-5595	0.58±0.10	-1.86±0.35	7.62	0.05



شکل ۲- رابطه لگاریتم غلظت و پروبیت درصد تلفات مراحل مختلف زیستی تحت تاثیر روغن سیتوویت
Fig2-Relationship between the log concentration and percent mortality probit of citowett oil used on different developmental stages of *B.tabaci*

زیست‌سنجدی عسلک پنبه تحت تاثیر مخلوط پایری‌پروکسیفن و روغن

در این آزمایش غلظت‌های مورد استفاده برای مخلوط سم و روغن در مرحله حشره‌بالغ ۳۷۳ پی‌پی‌ام، برای تخم ۱۰۵ پی‌پی‌ام و در مورد مراحل نابالغ ۹۲ پی‌پی‌ام بود (جدول ۳). اختلاط روغن سیتوویت با حشره‌کش پایری‌پروکسیفن علاوه بر افزایش اثر کشنندگی باعث کاهش میزان مصرف سم شده و در نتیجه کاهش خطرات ناشی از مصرف آن می‌گردد. به علت ارزان بودن و بی‌خطر بودن روغن‌ها برای محیط زیست و کاهش مقاومت احتمالی آفات به آن، استفاده از مخلوط این دو حشره‌کش توصیه می‌شود. از آنجا که بالاترین مقدار LC_{25} حشره‌کش پایری‌پروکسیفن و روغن سیتوویت مربوط به حشره‌کامل می‌باشد، پیش‌بینی می‌شود مخلوط این دو مقدار یعنی ۳۷۳ پی‌پی‌ام روى کلیه مراحل زیستی عسلک پنبه

مرگ و میری بالای ۵۰ درصد ایجاد کند. لذا بر اساس نتایج این پژوهش، کاربرد مخلوط این دو ماده برای کنترل عسلک پنبه قابل توصیه می‌باشد.

جدول ۳- تلفات مراحل مختلف زیستی تحت تاثیر مخلوط سم و روغن

Table3- Different developmental stages mortality under the influence of the mixture of pyriproxyfen and citowett oil

Stages	Number	Time (day)	Corrected mortality	Concentration(ppm) LC_{25} of Pyriproxyfen + LC_{25} of Citowett oil
Egg	438	15	60.75	105(6+99)
Immature	409	4	67.56	92(2.5+89.5)
Adult	254	1	48.77	373(264+109)

بحث

در این تحقیق پایریپروکسی芬 به ترتیب برای مراحل نابالغ، تخم و حشره کامل، سمی ارزیابی شد. در تحقیق مشابه با این تحقیق (LC_{50} پایریپروکسی芬 را برای مرحله تخم عسلک پنبه ۵۱ پی‌پی‌ام و برای پوره سن اول این آفت ۱۸ پی‌پی‌ام محاسبه کردند که این نتایج با نتایج تحقیق حاضر تشابه دارد. همچنین این محققین در آزمایش‌های خود روی عسلک پنبه گزارش نمودند که اولین مرحله پورگی حساس‌ترین مرحله آفت بوده و با بالا رفتن سن حشره (مراحل پورگی) تحمل آن نیز به سم افزایش می‌یابد و در تمام موارد پوپاریوم‌ها دارای تحمل بالاتری نسبت به تمام مراحل پورگی بودند. در حالتی که پوپاریوم‌ها مستقیماً مورد سم‌پاشی قرار گیرند تحمل بیشتری نسبت به مرحله پورگی از خود نشان می‌دهند. این محققین اعلام کردند که علت حساسیت کمتر تخم وجود لایه غیرقابل نفوذ کوریون می‌باشد. از آنجا که آنالوگ‌های هورمون جوانی بیشتر در مراحلی از رشد حشره موثرند که میزان هورمون جوانی در همولنف نسبتاً بالا باشد لذا به طور مستقیم در مرگ و میر حشره بالغ اثر چندانی ندارند و تاثیرشان بیشتر به شکل عقیم نمودن تخم‌های گذاشته شده توسط فرد ماده می‌باشد. در زیست‌سنجه عسلک پنبه با روغن سیتوویت نتایج نشان داد که مراحل نابالغ و تخم نسبت به حشره کامل حساس‌ترند. در تحقیق مشابه انجام شده میزان LC_{50} روغن سیتوویت برای حشره کامل و مرحله تخم سفیدبالک گلخانه (*Trialeurodes vaporariorum*) (Westood ۱۳۱۰ پی‌پی‌ام و LC_{50} به ترتیب ۲۵۸۰ پی‌پی‌ام) گزارش گردید (Hosseini Naveh, 2010) که با میزان LC_{50} روغن سیتوویت روش مراحل مشابه در عسلک پنبه تفاوت دارد. همچنین میزان LC_{50} روغن سیتوویت برای مراحل نابالغ سفید بالک گلخانه ۲۵۰ پی‌پی‌ام محاسبه شد که با میزان LC_{50} محاسبه شده برای مرحله مشابه عسلک پنبه تفاوت دارد. این تفاوت می‌تواند ناشی از اختلاف بین گونه‌های مزبور باشد و ممکن است که از نظر حساسیت به روغن سیتوویت مراحل تخم و حشره کامل عسلک پنبه نسبت به مراحل مشابه در سفیدبالک گلخانه حساس‌تر بوده و مراحل نابالغ در عسلک پنبه نسبت به سفیدبالک گلخانه مقاوم‌تر می‌باشد. همچنین میزان LC_{50} سیتوویت در مورد مراحل نابالغ عسلک پنبه ۵۱۸ پی‌پی‌ام محاسبه شده بود، (Valizadegan, 1999)، که با نتیجه این تحقیق مشابه می‌باشد و تفاوت مشاهده شده می‌تواند به علت تفاوت در بیوتیپ حشره و سابقه مبارزه با حشرات باشد. برای بررسی اثر مخلوط حشره‌کش پایریپروکسی芬 و روغن سیتوویت در LC_{25} آن‌ها مخلوط و بر مراحل مختلف مورد بررسی اثر داده شد و میزان مرگ و میر حاصل از آن تعیین گردید. میزان مرگ و میر ناشی از اختلاط LC_{25} حشره‌کش پایریپروکسی芬 و روغن سیتوویت در مقایسه با تلفات مورد انتظار از مجموع آن‌ها ۲/۳۶ درصد در حشره بالغ ۱۲/۳۲ درصد در مرحله تخم و ۱۹/۱۹ درصد در مرحله نابالغ بیشتر بود که از نظر افزایش میزان کشنده‌گی پس از اضافه کردن روغن به حشره‌کش با نتایج بدست آمده توسط سایر محققین همانگی دارد.

(Gibson & Rice, 1986; Heungens & Buysse, 1990; Lo *et al.*, 1999; Abdul-Sattar & Jarjees, 2000) براساس نتایج حاصله از تحقیق حاضر و بررسی های سایر پژوهشگران می توان نتیجه گرفت که عسلک پنبه به دلیل شرایط خاص بیولوژیکی و رفتاری، استعداد بالقوه زیادی برای مقاوم شدن در برابر اکثر سموم دارد از این جهت بایستی با دید دقیق تر و با اعمال اصول مدیریتی صحیح نسبت به کنترل انبوهی جمعیت آن پرداخته شود. عسلک پنبه آفتی است که سالیان زیاد در ایران به صورت آفت غالب مطرح بوده است و چون عموماً روی محصولات مهم فعالیت دارد همیشه در معرض سپاهشی های مکرر و متعدد قرار داشته است این مساله بروز پدیده مقاومت در برابر سموم را در آن تسریع کرده است.

سپاسگزاری

نگارندگان وظیفه خود می دانند که از مسئولین دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به خاطر فراهم نمودن امکانات این تحقیق تشکر و قدردانی نمایند.

References

- Abdul-Sattar, A. A. and Jarjees, M. M. 2000.** Effect of certain insecticides and their mixtures with local mineral oil on green peach aphid (*Myzus persicae*) and the incidence of virus diseases on potatoes. Arab Journal of Plant Protection, 18(2): 57-63.
- Abbott, W. S. 1925.** A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology. 18: 265-267.
- Bagheri, A. 2000.** Comparison of extracts of neem kernel india and german and pirimiphos methyl and fenpropathrin in controlling (*Bemisia tabaci* Genn.) greenhouse condition .M.Sc. thesis. of UniversityUrmia. 132pp.
- Cadogan, B. L., Retnakaran, A. and Meating, J. H. 1997.** Efficacy of RH 5992, a new insect growth regulator against spruce bud worm (Lep: Tortricidae) in a Boreal forest. Journal of Economic Entomology, 90(2): 551-559.
- Davidson, N. A., Dibble, J. E., Flint, M. L., Marer, P. J. and Cuye, A. 1991.** Managing insect and mites with spray oils. IPM Education and Publications, University of California, 3347, 5-10, 36.
- Decock, A., Degheele, D., Ishaaya, I. and Vandeveire, M. 1995.** Response of buprofezin-susceptible and resistant strains of *Trialeurodes vaporariorum* (Hem: Aleyrodidae) to pyriproxyfen and diafenthionuron. Journal of Economic Entomology, 88(4): 763-767.
- Duffus, J. H. and Worth, H. G. J. 1996.** Fundamental Toxicology for Chemists. Royal Society of Chemistry, Cambridge, Page7.
- Flint, M. L. 2002.** Pest notes: Whiteflies. Oakland: University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, Publication. 7401pp.
- Gerling, D. and Sinai, P. 1994.** Buprofezin effects on two parasitoid species of whitefly (Hem: Aleyrodidae). Journal of Economic Entomology, 78(4): 842-846.
- Gibson, R. W. and Rice, A. D. 1986.** The combined use of mineral oil and pyrethroids to control plant viruses transmitted non and semi-persistently by *Myzus persicae*. Annals of Applied Biology, 109(2): 465-472.
- Heungens, A. and Buysse, G. 1990.** Chemical control of the greenhouse whitefly (*Trialeurodes vaporariorum* Westw.) in azalea culture. Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent, 55(2b): 667-674.
- Horowitz, A. R. and Ishaaya, I. 1992.** Novel phenoxy juvenile hormone analoge (Pyriproxyfen) suppresses embryogenesis and adult emergence of sweetpotato whitefly (Hem: Aleyrodidae). Journal of Economic Entomology, 85(6): 2113-2117.
- Horowitz, A. R. and Ishaaya, I. 1994.** Managing resistance to insect growth regulators in the sweetpotato whitefly (Hem: Aleyrodidae). Journal of Economic Entomology, 87(4): 866-871.
- Horwitz, A. R., Mendelson, Z. and Ishaya, L. 1997.** Effect of abamectin mixed with mineral oil on the sweet potato whitefly (Hem: Aleyrodidae). Journal of Economic Entomology, 90(2): 349-353.

- Hosseini Naveh, F. 2010.** Evaluation of effects of primicarb, citowett oil and the mixture of either compound on *Trialeurodes vaporariorum* and *Myzus persicae* in greenhouse. Iranian Journal of Plant Protection Science, 41(1): 95.
- Javanmoghadam, H. and noori, P. 1997.** The study of pollution levels in different varieties of cotton against (*Bemisia tabaci* Genn.). 12th Iranian plant protection congress, Karaj agricultural college. page105.
- Liu, T. X. and Stansly, P. A. 1997.** Effects of pyriproxyfen on three species of *Encarsia* (Hym: Aphelinidae) endoparasitoids of *Bemisia argentifolii* (Hem: Aleyrodidae). Journal of Economic Entomology, 90(2): 404-411.
- Lo, P. L., Bradley, S. J. and Murrell, V. C. 1999.** Evaluation of organically-acceptable the green peach aphid (*Myzus persicae*). 52nd New Zealand Plant Protection Conference. 75-79.
- Peleg, B. A. 1988.** Effect of a new phenoxy juvenile hormone analoge on California red scale (Hom: Diaspididae), Florida wax scale (Hom: Aphelinidae). Journal of Economic Entomology, 81(1): 88-92.
- Prabhaker, N., Coudirect, D. L. and Toscano, N. C. 1988.** Effect of synergists on organophosphate and permethrin resistance in sweetpotato whitefly (Hem: Aleyrodidae). Journal of Economic Entomology, 81(1): 34-39.
- Prabhaker, N., Toscano, N. C. and Coudirect, D. L. 1989.** Susceptibility of immature and adult stage of the sweetpotato whitefly (Hem: Aleyrodidae) to selected insecticide. Journal of Economic Entomology, 82(4): 983-988.
- Robertson, J. L. and Presiler, H. K. 1992.** Pesticide Bioassays With Arthropods. CRC Press, London, 193pp.
- Robertson, J. L., Russell, R. M., Presiler, H. K. and Savin, N. E. 2007.** Pesticide Bioassays With Arthropods. CRC Press, Inc., 127pp.
- SAS Institute. 1994.** SAS/STAT users guide. SAS Institute, Cary, NC.
- Sheybani Tazraji, Z. 2000.** Effect of chitin synthesis inhibitor compounds on egg and larval different ages of Colorado potato beetle in Urmia, M.Sc. thesis. University Urmia. 164PP.
- Valizadegan, A. 1999.** Control of sweet potato whitefly with bioassays some good technique in greenhouse. M.Sc. thesis. University Urmia. 150pp.

Studies on susceptibility of different developmental stages of *Bemisia tabaci* Gennadius (Hem., Aleyrodidae) to pyriproxyfen and citowett oil.

S. Ashtari¹*, A. A. Pourmirza², M. H. Safar Alizadeh²

1- Lecture, Agricultural entomology applied scientific center of jihad-e-agricultural markazi, Arak

2- Associate Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, University of Urmia

Abstract

This pest strongly demonstrates resistance against chemical pesticides and decreases the yield of cotton and worsens its quality as well. Since Biorational pesticides are generally desirable, believing to have less disturbance of the environment; this research covers the study of susceptibility of different developmental stages of *Bemisia tabaci* Gennadius to pyriproxyfen, citowett oil and their mixture too. Citowett oil and pyriproxyfen have been used in 5 concentrations and control treatment. The LC₅₀ value of pyriproxyfen for adult, egg, and immature stages was 1086, 45.04 and 11.47 PPM, respectively. This criterion to citowett oil for adult, egg; and immature stages was 1554, 884.79 and 684.70 PPM in the same order. To evaluate the synergistic effect of citowett oil on pyriproxyfen we used the mixture of LC₂₅ of either compound. The results revealed that there are 52.36%, 62.32% and 69.19% mortality rate for adult, egg, immature stages respectively. The experiments showed that citowett oil is able to enhance efficiency of pyriproxyfen.

Key words: *Bemisia tabaci*, Bioassay, Citowett oil, Pyriproxyfen, Synergism

*Corresponding Author, E-mail: aroya95@gmail.com
Received: 19 Dec. 2010 – Accepted: 11 Nov. 2011