

ارزیابی مقاومت ارقام و ژنتوتیپ‌های مختلف بادام نسبت به کنه تارتان دو لکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و گلخانه *Tetranychus urticae* Koch

نریر سعیدی

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده

مقاومت ارقام و ژنتوتیپ‌های مختلف بادام شامل 'مامایی'، 'سفید'، 'ربع'، 'شکوفه'، 'آذر'، 'نان پاریل'، 'شهرود ۶'، 'شهرود ۷'، 'شهرود ۱۳'، 'شهرود ۲۱' و 'شهرود ۱۲' (فرانیس) نسبت به کنه تارتان دولکه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. جهت یکنواختی اثر پایه، تمامی ارقام و ژنتوتیپ‌ها روی پایه GF677 پیوند زده شدند و مقاومت آنها نسبت به کنه تارتان دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و گلخانه بررسی گردید. جهت مطالعه آزمایشگاهی قطعاتی با اندازه مساوی (cm \times ۲/۵) از برگ‌های هر رقم تهیه و روی پنه مرتطب درون پتری دیش قرار داده شد و هر کدام با پنج عدد کنه ماده بالغ بارور (۳-۵ روزه) آلوده شدند. نمونه‌ها درون انکوباتور و در دمای $25 \pm 1^\circ\text{C}$ ، رطوبت نسبی $55 \pm 5\%$ و دوره نوری ۱۴:۱۰ (تاریکی:روشنایی) نگهداری و پس از ۷۲ ساعت میزان تخریزی و مرگ و میر کنه‌ها شمارش گردید. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین و کمترین میزان تخریزی، به ترتیب روی ارقام 'مامایی' و 'شهرود ۲۱' و بیشترین تلفات روی ژنتوتیپ 'شهرود ۱۳' دیده شد. مطالعه فاکتورهای زیستی کنه تارتان دولکه ای در شرایط آزمایشگاهی روی ارقام مختلف بادام نشان داد که ارقام و ژنتوتیپ‌های مختلف بادام روی درصد زنده‌مانی، طول دوره پورگی، طول عمر بالغین و تعداد تخم گذاشته شده توسط هر ماده تاثیر متفاوتی دارند. بالاترین درصد زنده‌مانی مراحل نابالغ روی رقم 'آذر' (۸۸٪) و کمترین آن روی ارقام 'شکوفه' (۴۷٪) و 'شهرود ۲۱' (۵۰٪) مشاهده شد. طولانی‌ترین دوره پورگی (۵/۵ روز) روی 'شهرود ۲۱' دیده شد. کوتاه‌ترین طول عمر بالغین روی ژنتوتیپ 'شهرود ۲۱' (۱۵/۵ روز) و رقم 'شکوفه' (۵/۲ روز) و طولانی‌ترین طول عمر روی رقم 'مامایی' (۱۰/۴۵ روز) مشاهده شد. بیشترین میزان تخریزی به ازای هرماده مربوط به رقم 'مامایی' (۵۷/۶ تخم/ماده) و کمترین مربوط به رقم 'شکوفه' (۱۵/۱ تخم/ماده) و ژنتوتیپ 'شهرود ۲۱' (۳۱ تخم/ماده) بود. بررسی گلخانه‌ای نیز نشان داد که بیشترین تراکم جمعیت آفت روی رقم 'نان پاریل' و ژنتوتیپ 'شهرود ۶' و کمترین آن روی رقم 'شکوفه' و ژنتوتیپ 'شهرود ۲۱' بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که رقم 'شکوفه' و ژنتوتیپ‌های 'شهرود ۲۱' و 'شهرود ۱۳' نسبت به کنه تارتان دولکه‌ای مقاومترین درحالیکه ارقام 'مامایی' و 'نان پاریل' حساس‌ترین ارقام به کنه تارتان دولکه‌ای بودند.

واژه‌های کلیدی: بادام، مقاومت، کنه تارتان دولکه‌ای، *Tetranychus urticae*

نویسنده رابط، پست الکترونیکی: zarirsaeidi@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله (۱۶/۱۱/۹۰) - تاریخ پذیرش مقاله (۱۵/۱۱/۹۱)



مقدمه

گونه‌های متعددی از کنه‌ها شامل کنه‌های تارتان *Tetranychus pacificus* Mc ، *Tetranychus urticae* Koch.، *Panonychus ulmi* Koch.، کنه قرمز اروپایی *Tetranychus turkestanii* Ugarov & Nikolskii، Gregors قهقهه‌ای (Zalom *et al.*, 2006) از روی بادام گزارش شده‌اند (Scheutten). کنه‌های فوق با تغذیه از شیره گیاهی موجب زردی و ریزش برگ‌ها شده و در نتیجه موجب کاهش رشد رویشی گیاه و کاهش محصول می‌گردد. تغذیه کنه‌های تارتان باعث کاهش فتوسنتز شده و طول دوره تغذیه همبستگی منفی با میزان عملکرد محصول دارد (Sances *et al.*, 1979). در آلدگی شدید، کنه‌ها تمامی کلروفیل برگ را از بین برده و موجب ریزش برگ‌ها می‌شوند. کوتاه بودن سیکل زندگی، میزان بارآوری بسیار بالا و بروزسریع مقاومت نسبت به بسیاری از کنه‌کش‌ها، کترول شیمیایی کنه‌های تارتان را مشکل کرده است (Luczynski *et al.*, 1990). آفتکش‌های شیمیایی اگرچه نقش موثری در کترول کنه‌های تارتان دارند ولی دارای معاایب بسیار نظیر هزینه بالا، سمیت برای دشمنان طبیعی، اثرات نامطلوب در محیط زیست و خطر برای سلامتی انسان می‌باشند. کترول بیولوژیکی از مهم‌ترین روش‌های کترول کنه‌های تارتان گزارش شده است. تریپس‌های شش لکه‌ای جنس *Scolothrips*، کفسدولوزک‌های جنس *Stethorus* کنه‌های شکارگرخانواده Phytoseiidae می‌توانند کترول مناسبی روی کنه‌های بادام داشته باشند (Zalom *et al.*, 2006). استفاده از روش‌های زراعی نظیر تقویت مناسب و صحیح درختان، کاهش گرد و غبار و حفظ پوشش گیاهی سطح باغ می‌تواند تا حدودی در کترول کنه‌های تارتان بادام مؤثر باشد (Zalom *et al.*, 2006). در بین روش‌های زراعی استفاده از ارقام متحمل یا مقاوم مهم‌ترین جزء مدیریت تلفیقی آفات (IPM) به شمار می‌رود (Wetson & Snyder, 1990).

استفاده از ارقام مقاوم به دلیل اقتصادی بودن و سهولت استفاده، مهم‌ترین ابزار در مدیریت کترول انبوهی کنه‌های تارتان به شمار می‌رود (Van-Impe *et al.*, 1993). مقاومت گیاه میزان به کنه‌های تارتان در محصولات مختلفی نظیر گوجه فرنگی (Dori *et al.*, 1999; Saeidi, 2002; Saeidi & Salehi, 2005)، لویا (Weston *et al.*, 1989; Saeidi, 2006) ذرت (Tadmor *et al.*, 1999) و پنبه (Wilson, 1994) گزارش شده است. تاکنون در مورد مقاومت بادام نسبت به کنه‌های تارتان مطالعه‌ای انجام نشده است و روی درختان میوه نیز گزارش‌های زیادی در مورد مقاومت ارقام به کنه‌های تارتان دیده نمی‌شود. بیشترین مطالعات انجام شده مربوط به مقاومت توت فرنگی و تمشک به کنه تارتان دولکه‌ای (*T. urticae*) است. به عنوان مثال در مطالعه مقاومت ۱۸ رقم تمشک نسبت به کنه تارتان دولکه‌ای، کمترین میزان تخم‌ریزی آفت روی رقم ۷۶^۹ گزارش گردید و مقاومت در این رقم اساس ژنتیکی داشته است (Wilde *et al.*, 1991). همچنین مقاومت ۷۶ رقم توت فرنگی به کنه تارتان دولکه‌ای با استفاده از روش زیست‌سنگی دیسک برگی مطالعه شد و براساس میزان تخم‌ریزی آفت و خسارت وارد به گیاه، ارقام مورد مطالعه در شش گروه از بسیار مقاوم تا بسیار حساس طبقه‌بندی شدند که در بین آن‌ها رقم^۷ Profumata di Tortona^۷ بسیار مقاوم بوده است (Gimenez-Ferrer *et al.*, 1993). در مطالعه‌ای دیگر همبستگی منفی و معنی‌داری بین مقاومت توت فرنگی به کنه تارتان دولکه‌ای و تراکم تریکومها و میزان فنل موجود در برگ مشاهده شده است (Luczynski *et al.*, 1990). همچنین مکانیسم‌های مقاومت در ارقام توت فرنگی به کنه تارتان دو لکه‌ای در شرایط گلخانه بررسی شد و نتایج نشان داد که رقم^۷ Florida bell^۷ دارای مقاومت آنتی‌بیوکسی و آنتی‌زنوزی است به‌طوری که کمترین تراکم آفت و کمترین خسارت وارد روى آن مشاهده شد و در رقم^۷ Totem^۷ مکانیسم تحمل

ناخته شد (تراکم جمعیت زیاد آفت و خسارت کم گیاه) و در ارقام 'Canoga' و 'Profumata di Tortona' مکانیسم فوق حساسیت شناسایی گردید (Gimenez-Ferrer et al., 1994).

هدف از این تحقیق، بررسی مقاومت ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف بادام خصوصاً ارقام جدید و دیرگل نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای می‌باشد. از آنجایی که سیاست وزارت جهاد کشاورزی توسعه ارقام دیرگل بادام بهمنظور فرار از خسارت سرمازدگی می‌باشد لذا لازم است قبل از معروفی و توسعه سطح زیر کشت این ارقام، وضعیت آلدگی آنها نسبت به آفات کلیدی بادام از جمله کنه تارتن دولکه‌ای بررسی گردد.

مواد و روش‌ها

مواد گیاهی

مواد گیاهی مورد مطالعه عبارت بودند از ارقام 'مامایی'، 'سفید'، 'ربیع'، 'شکوفه'، 'آذر'، و 'نان پاریل' و ژنوتیپ‌های 'شهرود ۱۳'، 'شهرود ۱۲'، 'شهرود ۷' و 'شهرود ۲۱'. برای یکسانسازی اثر پایه در اوایل بهار پایه‌های 'GF677' در گلدان‌های با گنجایش ۲۰ کیلوگرم مخلوطی از خاک و کود حیوانی پوسیده (به نسبت مساوی) کشت گردید. اواخر خرداد پیوندک از ارقام فوق تهیه و روی پایه‌های 'GF677' پیوند زده شد. پیوندک‌ها از کلکسیون باغ امامیه واقع در ۱۲ کیلومتری شهر سامان استان چهارمحال و بختیاری تهیه شد. از هر رقم چهار تکرار و در هر تکرار سه گیاه از هر رقم وجود داشت.

الف) بررسی‌های آزمایشگاهی

قطعه‌های برگی با اندازه مساوی (۲/۵ cm طول×۱/۵ cm عرض) تهیه و درون پتری دیش (به قطر ۱۲ cm) روی پنبه مرطوب قرار داده شدند و مطالعات زیر بر روی آنها انجام گرفت.

۱- مطالعه میزان تخم‌ریزی و میزان مرگ و میر کنه روی هر رقم

پنج کنه ماده بارور (۵-۳ روزه) روی هر قطعه برگی قرار داده شد و پتری دیش (به قطر ۱۲ cm) روی دمای $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ ، دوره نوری ۱۰:۱۴ (تاریکی:روشنایی) ساعت و رطوبت نسبی $55 \pm 5\%$ قرار داده شدند. مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی و در ۶ تکرار انجام شد. پس از ۷۲ ساعت میزان تخم‌ریزی و مرگ و میر کنه‌های بالغ روی هر قطعه برگی شمارش شد.

۲- مطالعه فاکتورهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای (*T. urticae*) روی قطعات برگی ارقام مختلف بادام

این آزمایش در ۳۰ تکرار انجام گردید. از هر تیمار ۳۰ عدد قطعه برگی تهیه و در پتری دیش (به قطر ۱۲ cm و ارتفاع ۲ cm) روی پنبه مرطوب قرار داده شد. یک عدد کنه ماده بارور روی هر دیسک قرار داده شد. پس از ۱۲ ساعت کنه‌ها حذف و فقط سه عدد تخم باقی گذاشته شد. تخمهای روزانه به طور مرتبت بازدید و زمانی که لاروهای تفریخ شدند روی هر دیسک برگی یک لارو باقی گذاشته شد و بقیه از بین برده شدند. قطعات برگی به صورت روزانه مورد بازدید قرار گرفتند و مراحل مختلف رشدی آفت یادداشت گردید. فاکتورهای اندازه‌گیری شده روی هر رقم شامل درصد زنده‌مانی، طول دوره پورگی، طول عمر و تعداد تخم گذاشته شده توسط هر فرد ماده بود. به دیسک‌هایی که کنه‌های ماده در مرحله

استراحت سوم بودند یک کنه نر اضافه شد و کنه‌های نر ۲۴ ساعت پس از ظهر کنه‌های ماده حذف شدند. دیسک‌ها به صورت روزانه مورد بازدید قرار گرفتند و تعداد تخم گذاشته شده توسط هر کنه ماده تا زمان مرگ آن شمارش گردید.

ب) مطالعه مقاومت ارقام بادام به کنه تارتان دولکه‌ای در شرایط گلخانه

تیمارهای مورد مطالعه پس از پیوند شدن روی پایه‌های 'GF677' در شرایط گلخانه نگهداری شدند. برای هر تیمار چهار تکرار در نظر گرفته شد. پس از این که پیوندک‌ها به اندازه کافی (حدود ۱۰ سانتی متر) رشد کردند، آلودهسازی با تعداد ۵ عدد کنه ماده بالغ بارور صورت گرفت. سه هفت‌هه پس از آلودهسازی کلیه برگ‌های آلوده هر رقم برداشت و جمعیت آفت (تخم، نمف، و کنه بالغ) روی هر رقم به کمک بینوکول و در بزرگنمایی $10 \times$ شمارش گردید. میزان خسارت واردہ به هر رقم نیز بر اساس درصد نقاط کلروزه در سطح برگ، بهروش نمره دهی (۰-۶) و به صورت زیر ارزیابی شد (Saeidi, 2006).

-بدون خسارت

- ۱- نقاط کلروزه کمتر از ۱۰ درصد سطح برگ‌ها
- ۲- نقاط کلروزه بین ۱۰-۲۵ درصد سطح برگ‌ها
- ۳- نقاط کلروزه بین ۲۶-۴۰ درصد سطح برگ‌ها
- ۴- نقاط کلروزه بین ۴۱-۶۰ درصد سطح برگ‌ها
- ۵- نقاط کلروزه بین ۶۱-۸۰ درصد سطح برگ‌ها
- ۶- نقاط کلروزه بین ۸۱-۱۰۰ درصد سطح برگ‌ها

ج) محاسبات آماری

محاسبات آماری به کمک نرم افزار SAS انجام گردید. تجزیه واریانس داده‌ها به کمک PROC ANOVA و مقایسه میانگین به کمک آزمون چند دامنه‌ای دانکن صورت گرفت. برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شد.

نتایج و بحث

نتایج بررسی مقاومت ارقام مختلف بادام نسبت به کنه تارتان دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه روی قطعات برگی نشان داد که بیشترین میزان تخم‌ریزی روی ارقام 'مامایی' (۷/۸۲ تخم / کنه / روز) و 'نان پاریل' (۷/۶۱ تخم / کنه / روز) و کمترین آن روی ژنوتیپ 'شهرود' (۲۱/۵۲ تخم / کنه / روز) بود. بیشترین تلفات کنه (۱/۸۳ از ۵ عدد کنه رهاسازی شده) روی ژنوتیپ 'شهرود' (۱۳ شمارش شد (جدول ۱).

جدول ۱- مقایسه میانگین (\pm SE) میزان تخم‌ریزی و تلفات کنه تارتن دولکه‌ای روی قطعات برگی ارقام/ ژنتیپ‌های مختلف بادامTable 1- Mean comparison (\pm SE) of two-spotted spider mite oviposition and mortality on leaf deics of different almond cultivars/genotypes

Cultivar/Genotype	No. Eggs/5 mites/3 days	No. Eggs/mite/ day	No. dead mites (out of 5)
'Rabie'	89.83 \pm 39.3 ab	5.99 \pm 2.62 ab	1.17 \pm 1.4 ab
'Shahrood 6'	91.5 \pm 28.58 ab	6.10 \pm 1.9 ab	1.67 \pm 1.5 a
'Shahrood 7'	85.83 \pm 27.11 ab	5.72 \pm 1.8 ab	1.33 \pm 0.82 ab
'Sefid'	93.67 \pm 35 ab	6.24 \pm 2.3 ab	1.00 \pm 0.16 ab
'Shokofeh'	88 \pm 17.93 ab	5.87 \pm 1.2 ab	1.50 \pm 0.83 ab
'Azar'	99 \pm 16.87 ab	6.60 \pm 1.1 ab	0.33 \pm 0.52 b
'Mamaei'	117.33 \pm 21.88 a	7.82 \pm 1.4 a	1.00 \pm 0.63 ab
'Non pariel'	114.17 \pm 28.16 a	7.61 \pm 1.9 a	0.50 \pm 0.82 b
'Shahrood 12'	115.50 \pm 25.1 a	7.42 \pm 1.3 a	1.30 \pm 0.73 ab
'Shahrood 21'	82.83 \pm 31.69 b	5.52 \pm 2.1 b	1.50 \pm 0.55 ab
'Shahrood 13'	91.17 \pm 40.93 ab	6.08 \pm 2.7 ab	1.83 \pm 1.36 a

* Means with the same letter(s) in each column are not significantly different at P>0.05 using Duncan Multiple Range Test (DMRT)

نتایج بررسی‌های گلخانه‌ای نیز نشان داد که سه هفته پس از آلوده‌سازی ارقام مختلف تاثیر متفاوتی روی افزایش جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای داشتند. بالاترین میزان تخم‌ریزی روی ژنتیپ 'شاہرود ۶' (۳۷/۵۸ تخم) و کمترین میزان تخم‌ریزی روی رقم 'شکوفه' (۱۰/۲ تخم) و ژنتیپ 'شاہرود ۲۱' (۱۵/۲ تخم) دیده شد. بیشترین جمعیت پوره و بالغ روی رقم 'نان پاریل' و ژنتیپ 'شاہرود ۶' (به ترتیب ۵۶/۵ و ۵۳/۹۲ تخم) و کمترین روی 'شکوفه' و 'شاہرود ۲۱' (به ترتیب ۱۴/۵۸ و ۲۰/۵ پوره و بالغ) مشاهده شد. در مجموع می‌توان گفت که بیشترین تراکم جمعیت آفت روی رقم 'نان پاریل' و ژنتیپ 'شاہرود ۶' و کمترین آن روی رقم 'شکوفه' و ژنتیپ 'شاہرود ۲۱' بوده است. بیشترین میزان خسارت وارد روی رقم 'نان پاریل' و ژنتیپ 'شاہرود ۶' و کمترین آن روی ژنتیپ‌های 'شاہرود ۱۳' و 'شاہرود ۲۱' دیده شد (جدول ۲).

جدول ۲- مقایسه میانگین (\pm SE) جمعیت کنه تارتان دو لکه‌ای روی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف بادام و میزان خسارت واردہ روی هر رقم سه هفته پس از آلودهسازی در شرایط گلخانه

Table 2- Mean comparison (\pm SE) of two-spotted spider mite population on different almond cultivars/genotypes and plant damage score, 3 weeks after infestation in greenhouse condition

Cultivar/Genotype	No. Eggs	No. Adults & Nymphs	Total	Damage score
'Rabie'	22.83 \pm 14 c	22.58 \pm 15.3 bc	45.42 \pm 23.3 cd	5
'Shahrood 6'	37.58 \pm 23.6 a	53.92 \pm 31.2 a	91.5 \pm 53.3 a	6
'Shahrood 7'	28.25 \pm 16.8 ab	33.25 \pm 14 b	61.5 \pm 28.8 c	5
'Sefid'	21.83 \pm 10.4 c	21.50 \pm 8.14 bc	43.33 \pm 15cd	5
'Shokofeh'	10.20 \pm 10.8 d	14.58 \pm 9.6 c	24.75 \pm 16.2 d	4
'Azar'	18.50 \pm 10.9 c	21.42 \pm 15.6 bc	39.92 \pm 23.9 cd	4
'Mamaei'	23.75 \pm 13.4 c	19.08 \pm 9.1 bc	42.83 \pm 18.3 cd	5
'Non pariel'	36.58 \pm 22.3 a	56.50 \pm 26.6 a	93.1 \pm 44.7 a	6
'Shahrood 12'	20.50 \pm 8.4 c	19.10 \pm 5.1 bc	38.53 \pm 14.2 cd	5
'Shahrood 21'	15.20 \pm 11.9 cd	20.50 \pm 13.1 bc	35.67 \pm 18.5cd	3
'Shahrood 13'	26.92 \pm 11.5 bc	48.25 \pm 12.9 a	75.12 \pm 16 b	3

* Means with the same letter(s) in each column are not significantly different at P>0.05 using Duncan Multiple Range Test (DMRT)

مطالعه زیست‌شناسی کنه تارتان دو لکه‌ای روی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف بادام نشان داد که ارقام و ژنوتیپ‌های بادام روی درصد زنده‌مانی، طول دوره پورگی، طول عمر بالغین و تعداد تخم گذاشته شده توسط هر ماده تاثیر متفاوتی دارند. بالاترین درصد زنده‌مانی مراحل نابالغ روی رقم آذربایجان (۸۸٪) و کمترین آن روی رقم 'شکوفه' (۴۷٪) و ژنوتیپ 'شاھرود ۲۱' (۵۰٪) مشاهده شد. بالاترین طول دوره پورگی (۵/۲۷ روز) روی ژنوتیپ 'شاھرود ۲۱' دیده شد (جدول ۳). کمترین طول عمر بالغین روی ژنوتیپ 'شاھرود ۲۱' (۵/۱۵ روز) و رقم 'شکوفه' (۵/۲ روز) و بیشترین طول عمر روی رقم 'مامایی'، (۱۰/۴۵ روز) مشاهده شد (جدول ۳). بیشترین میزان تخمریزی مربوط به رقم 'مامایی' (۵۷/۶ تخم /ماده) و کمترین مربوط به رقم 'شکوفه' (۱۵/۱ تخم /ماده) بود (جدول ۳).

در این مطالعه، مقاومت ارقام مختلف بادام نسبت به کنه تارتان دو لکه‌ای در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای بررسی گردید. در آزمایشگاه بر اساس روش Leaf disk bioassay میزان تخمریزی آفت اندازه‌گیری شد و بر اساس آن ارقام به گروههای مختلفی تقسیم‌بندی شدند. این روش قبلاً به طور موفقیت‌آمیزی برای بررسی مقاومت ارقام توت فرنگی (Gimenez-Ferrer et al., 1993)، تمشک (Wilde et al., 1991) گوجه فرنگی (Saeidi & Mallik, 2006) و گوجه فرنگی (Gimenez-Ferrer et al., 1993) تارتان دو لکه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. اما از آنجایی که به دلیل روابط پیچیده گیاه میزان، آفت و محیط نتایج به دست آمده در آزمایشگاه ممکن است در برخی موارد قابل اعتماد نباشد، لذا ارقام (Gimenez-Ferrer et al., 1993)

بادام در شرایط گلخانه نیز مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج به دست آمده در شرایط گلخانه نیز نتایج آزمایشگاهی را تأیید نموده اند.

اگرچه مطالعات زیادی در خصوص رشد و نمو و تولیدمثل کنه تارتن دولکه‌ای روی گیاهان زراعی نظری پنه و لوبيا انجام شده است (Carey & Bradley, 1982; Parslika & Huszar, 2004)، اما مطالعات اندکی در زمینه ویژگی‌های زیستی و تولیدمثلی آفت نظری نرخ رشد و نمو، زنده‌مانی، طول عمر بالغین، زادآوری و روی درختان میوه وجود دارد. در مطالعه مقاومت سه رقم هلو نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای (Riahi *et al.*, 2011) گزارش شده است که ارقام مختلف هلو به‌طور معنی‌داری روی تولیدمثل، زنده‌مانی و سایر پارامترهای جدول زندگی *T. urticae* تاثیر می‌گذارند و کمترین و بیشترین طول دوره رشد و نمو مراحل نابالغ ماده را به ترتیب روی ارقام 'جی-اچ هیل' (۹/۴۳ روز) و 'ردتاپ' (۱۰/۳ روز) مشاهده شده است در حالی که در مطالعه حاضر این میزان از ۳/۵ روز روی ژنتوتیپ 'شهرود ۷' تا ۵/۵ روز روی ژنتوتیپ 'شهرود ۲۱' متغیر بوده است. این تفاوت‌ها نشان‌گر این است که ارقام و ژنتوتیپ‌های بادام در مقایسه با ارقام هلو مطالعه شده میزان مناسب‌تری برای کنه تارتن دولکه‌ای محسوب می‌شوند. میزان تخم‌ریزی و درصد زنده مانی که روی ارقام مختلف هلو تفاوتی نداشت در صورتی که تحقیق حاضر نشان داد ارقام مختلف بادام بطور معنی‌داری بر فعالیت‌های زیستی آفت تاثیر می‌گذارند.

به‌دلیل تاثیر قابل توجه ارقام مختلف گیاهی روی تغییرات جمعیت کنه‌های تارتن، اجرای یک برنامه مدیریت تلفیقی موفق مستلزم مطالعه ویژگی‌های زیستی آفت روی ارقام مختلف است (Krips *et al.*, 1998; Kasap, 2002). مطالعات زیادی در این خصوص روی ارقام مختلف گیاهی انجام شده است. متوسط زادآوری آفت در دمای بهینه (۲۷-۲۵ درجه سانتی‌گراد) روی لوبيا ۱۴۳/۹ تخم/ماده (Shih *et al.*, 1976)، روی بادمجان ۱۴۱ (Ju *et al.*, 2008) و روی ارقام مختلف هلو از ۱۱/۵۳ تا ۱۸/۵۴ عدد (Riahi *et al.*, 2011) گزارش شده است در حالی که در مطالعه حاضر از ۱۵/۱ (تخم/ماده) روی رقم 'شکوفه' تا ۵۷/۶ روی رقم 'مامایی' متغیر بوده است. طول عمر کنه‌های ماده از ۵/۲ روز روی رقم 'شکوفه' تا ۱۰/۴۵ روز روی رقم 'مامایی' متغیر بوده است اما این میزان روی ارقام مختلف هلو (۵/۴۴ تا ۶/۶۲ روز) گزارش شده است (Riahi *et al.*, 2011). اختلافات مشاهده شده در نتیجه ویژگی‌های برگ‌گونه‌های مختلف گیاهی و یا ارقام مختلف یک گونه می‌باشد. ویژگی‌هایی نظیر ضخامت کوتیکول، نوع و تراکم تریکومهای غدهای و غیرعلویه، وجود مواد شیمیایی سمی، و بر روی رشد و نمو، تولیدمثل و درصد زنده‌مانی کنه تارتن دولکه‌ای تاثیر می‌گذارد (Gimenez-Ferrer *et al.*, 1993; Saeidi & Mallik, 2006).

بر اساس نتایج آزمایشگاهی و گلخانه‌ای به دست آمده ارقام 'مامایی' و 'نان پاریل' حساس‌ترین ارقام به کنه تارتن دولکه‌ای بودند و بعد از آن‌ها ژنتوتیپ 'شهرود ۱۲' و رقم 'سفید' قرار داشتند. ارقام محلی بادام ('سفید' و 'مامایی') بیشترین سطح زیر کشت منطقه را پوشش می‌دهند ولی به دلیل زودگل بودن معمولاً در بسیاری از سال‌ها با سرمازدگی مواجه می‌شوند. سطح زیر کشت ژنتوتیپ جدید 'شهرود ۱۲' به دلیل دیرگل بودن و سایر صفات باغبانی مطلوب نیز در حال گسترش است بنابراین داشتن اطلاعات کافی در خصوص وضعیت مقاومت آن‌ها نسبت به آفات کلیدی منطقه از جمله کنه تارتن دولکه‌ای و ارایه راه حل مناسب (ترجیحاً غیر شیمیایی) ضروری به‌نظر می‌رسد. نتایج این تحقیق نیز نشان داد که رقم 'شکوفه' و ژنتوتیپ‌های 'شهرود ۲۱' و 'شهرود ۱۳' نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای در مقایسه با بقیه مقاوم‌تر بودند. مکانیسم مقاومت در ارقام فوق احتمالاً از نوع آنتی‌بیوز است زیرا مرگ و میر مراحل نابالغ روی آن‌ها زیاد، طول

عمر بالغین کمتر و میزان تخم‌ریزی ماده‌ها نیز کمتر از سایر ارقام است (جداول ۱، ۲ و ۳). از آنجایی که این دو ژنوتیپ در مقایسه با ارقام محلی ('سفید' و 'مامایی') و ژنوتیپ دیرگل 'شهرود ۱۲' از نظر اقتصادی در درجه دوم اهمیت قرار دارند، بنابراین با دورگ‌گیری بین آنها و ژنوتیپ دیرگل 'شهرود ۱۲' می‌توان نتایجی را انتخاب کرد که علاوه بر داشتن صفات مطلوب باغبانی، نسبت به کنه‌های تارتان نیز مقاوم باشند

Archive of SID

جدول ۳- تاثیر ارقام و ژنتیپ‌های مختلف بادام روی فاکتورهای زیستی ($X \pm SE$) که تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاهیTable 3- Effect of different almond cultivars/genotypes on biological parameters ($X \pm SE$) of two-spotted spider mite in laboratory condition

Cultivar/Genotype	No. Larvae (replicates)	No. of emerged adults	No. of females	Survival %	Nymphal period (day)	Adults longevity (day)	Egg/Female
'Rabie'	28	21	17	75	4.06±0.13 cd	7.95±2.8 abc	45± 2 c
'Shahrood 6'	42	30	21	72	4.95±0.36 ab	5.57±0.9 bc	44.3± 2.3 c
'Shahrood 7'	42	32	24	76	3.5±0.46 e	5.47±1.1 bc	29.9± 1.9 e
'Sefid'	24	18	14	75	4.62±0.25 bc	6.8±1.2 bc	46.6± 2.6 c
'Shokofeh'	36	17	15	47	4.57±0.29 bc	5.2±1.6 c	15.1± 1.5 f
'Azar'	27	24	20	88	4.73±0.33 ab	5.06±1.36 c	36.3± 2.3 d
'Mamaei'	48	36	22	75	4.48±0.33 bcd	10.45±1.08 a	57.6± 1.6 a
'Non pariel'	30	23	16	76	3.94±0.66 ed	8.13±1.2 ab	52.1± 1.1 b
'Shahrood 12'	48	34	22	71	4.61±0.31 bc	10.45±1.08 a	48.6± 1.5 bc
'Shahrood 21'	36	18	15	50	5.27±0.46 a	5.15±2.5 c	31± 1.8 e
'Shahrood 13'	35	28	21	80	4.73±0.39 ab	7.07±1.95 bc	28.8± 2.8 e

* Means with the same letter(s) in each column are not significantly different at $P>0.05$ using Duncan Multiple Range Test (DMRT)

References:

- Carey, J. R. and Bradley, J. W. 1982.** Developmental rates, vital schedules, sex ratios, and life tables for *Tetranychus urticae*, *Tetranychus turkestanii* and *Tetranychus pacificus* on cotton. *Acarologia*, 23(4):333-345.
- Dorri, H., Ardeh, M. J. and Arbabi, M. 1999.** Field evaluation resistance of bean lines and varieties to two-spotted spider mite. Final Report of Research Project, Agricultural Research Center, Markazi Province. 20 p. [In Persian with an English summary]
- Gimenez-Ferrer, R. M., Scheerens, J. C. and Erb, W. A. 1993.** *In vitro* screening of 76 strawberry cultivars for two spotted spider mite resistance. *Hort Science*, 28: 841-844.
- Gimenez-Ferrer, R. M., Erb, W. A., Bishop, B. L. and Scheerens, J. C. 1994.** Host-pest relationships between the two spotted spider mite and strawberry cultivars with differing levels of resistance. *Journal of Economic Entomology*, 87: 168-175.
- Ju, K., Sangkoo, L., JeongMan, K., YoungRip, K., TaeHeung, K. and JiSoo, K. 2008.** Effect of temperature on development and life table parameters of *Tetranychus urticae* Koch (Acari: Tetranychidae) reared on eggplants. *Korea Journal of Applied Entomology*, 47(2): 163-168.
- Kasap, I. 2002.** Biology and life tables of the two-spotted spider mite, *Tetranychus urticae* (Acari: Tetanychidae) on three different host plants in laboratory conditions. *Turkish Journal of Entomology*, 26: 257-266. [In Turkish with an English summary].
- Krips, O. E., Witul, A., Willemse, P. J. E. L. and Dicke, M. 1998.** Intrinsic rate of population increase of the spider mite, *Tetranychus urticae* on the ornamental crop gerbera: intraspecific variation in host plant and herbivore. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 89: 159-168.
- Luczynski, A., Isman, M. B., Raworth, D. A. and Chan, C. K. 1990.** Chemical and morphological factors of resistance against the two-spotted spider mite in beach strawberry. *Journal of Economic Entomology*, 83: 564-569.
- Parslka, J. and Huszar, J. 2004.** Influence of temperature and host plants on the developmental and fecundity of the spider mite, *Tetranychus urticae*. *Plant Protection Science*, 40(4): 141-144.
- Riahi, E., Nemati, A., Shishehbor, P. and Saeidi, Z. 2011.** Population growth parameters of the two-spotted spider mite, *Tetranychus urticae*, on three peach varieties in Iran. *Acarologia*, 51(4): 473-480
- Saeidi, Z. 2002.** Study resistance of five commercial Chitti bean varieties to two-spotted spider mite in Lordegan. Final Report of Research Project, Agricultural Research Center, Chaharmahal va Bakhtiari Province. 17 p. [In Persian with an English summary]
- Saeidi, Z. and Salehi, F. 2005.** Study on the resistance to two-spotted spider mite of selected lines from Lordegan chitti bean variety. *Plant Pests and Diseases*, 73(1): 65-77. [In Persian with an English summary]
- Saeidi, Z. 2006.** Nature of resistance to two-spotted spider mite in *Lycopersicon* species. Ph.D. thesis, University of Agricultural Sciences, Bangalore, India, 159 pp.
- Saeidi, Z. and Mallik, B. 2006.** *In vitro* screening of 67 *Lycopersicon* cultivars for resistance to two-spotted spider mite. *Journal of Biological Science*, 6(5): 847- 853.
- Saeidi, Z. 2011.** Biology of the spider mite (*Schizotetranychus smirnovi* Wainst.) on almond. Final Report of Research Project, Agricultural and Natural Resources Research Center, Chaharmahal va Bakhtiari Province. 57 p. [In Persian with an English summary]
- Sances, F.V., Waman, J. A. and Ting, J. P. 1979.** Morphological response of strawberry leaves to infestation of the two spotted spider mite. *Journal of Economic Entomology*, 72: 710-713.
- Shih, C. T., Poe, S. L. and Cromroy, H. L. 1976.** Biology, life table and intrinsic rate of increase of *Tetranychus urticae*. *Annals Entomology of America*, 69:362-364.
- Tadmor, Y., Lewinsohn, E., Abo-Moch, F., Bar-Zur, A. and Mansour, E. 1999.** Antibiosis of maize inbred lines to the carmine spider mite, *Tetranychus cinnabarinus*. *Phytoparasitica*, 27:35-41.
- Van-Impe, G., Hanc, T. and Van, I. G. 1993.** A technique for testing varietal susceptibility to the mite *T. urticae*. Application to bean, cucumber, tomato, strawberry. *Agronomy*, 13 (8): 739-749.

- Weston, P. A., Johnson, D. A., Burton, H. T. and Snyder, J. C. 1989.** Trichome secretion composition, trichome densities, and spider mites resistance of ten accessions of *Lycopersicon hirsutum*. Journal of American Society for Horticultural Science, 114: 492–498.
- Weston, P. A. and Snyder, J. C. 1990.** Thumbtack bioassay: a quick method of measuring plant resistance to two spotted spider mites (Acari: Tetranychidae). Journal of Economic Entomology, 83:501-504.
- Wilde, G., Thomas, W. and Hall, H. 1991.** Plant resistance to two spotted spider mite (Acari: Tetranychidae) in raspberry cultivars. Journal of Economic Entomology, 84: 251-255.
- Wilson, L. J. 1994.** Plant quality effect on life history parameters of the two spotted spider mite on cotton. Journal of Economic Entomology, 87(6): 1664-1673.
- Zalome, F. G., Pickel, C., Bentley, W. J., Covello, R. L., Steenwyk, R. A. V. and Freeman, M. W. 2006.** Almond webbing spider mites. UC IPM pest management guidline, Almond UC ANR publication. 5 p.

Investigation on resistance of different almond cultivars/genotypes to two-spotted spider mite, *Tetranychus urticae* Koch in laboratory and greenhouse condition

Z. Saeidi

Department of Plant Protection, Agricultural & Natural Resources Research Center, Chaharmahal & Bakhtiari Province, Iran

Abstract

Resistance of different almond cultivars/genotypes including, 'Sefid', 'Mamaei', 'Rabie', 'Shokofeh', 'Azar', 'Non pareil', 'Shahrood 6', 'Shahrood 7', 'Shahrood 12', 'Shahrood 13' and 'Shahrood 21' were studied to two-spotted spider mite (TSSM, (*Tetranychus urticae* Koch). All cultivars/genotypes were grafted on 'Gf677' rootstock in 4 replications. Study was done in the laboratory and greenhouse conditions. Leaf discs (2.5×1.2 cm) were prepared from leaves and placed on wet cotton in a plastic petri dish and infested with 5 adult female mites (3-5 days in age). Leaf discs were kept in an incubator at 25±1°C, RH= 55±5% and a photoperiod of 14:10 (L:D). After 72 h, mite oviposition and mortality were measured. Based on the results, the highest and lowest oviposition were observed on 'Mamaei' and 'Shahrood 21' cultivars. The highest mite mortality was observed on 'Shahrood 13'. Biological characteristics study of TSSM on different cultivars in the laboratory showed that cultivars significantly affected survival, immature period, mature period and mite oviposition. The highest survival percentage was recorded on 'Azar' (88%) and the lowest on 'Shokoofe' (47%) and 'Shahrood' (%%). The longest (5.27 days) immature period was observed on 'Shahrood 21'. The shortest mature period was observed on 'Shahrood 21' (5.15 days) and 'Shokoofe' (5.2 days); whereas, the longest (10.45 days) was observed on 'Mamaei'. The highest ovipositional rate (57.6 eggs/female) was observed on 'Mamaei'; whereas, the lowest was recorded on 'Shokoofe' (15.1 eggs/female) and 'Shahrood 21' (31 eggs/female). Greenhouse study showed that the highest density of mite population was supported on 'Non pareil' and 'Shahrood 6' cultivars while the lowest one was reared on 'Shokofeh' and 'Shahrood 21'. Results indicated that 'Shokofeh', 'Shahrood 21' and 'Shahrood 13' variety/genotypes were the most resistant, whereas 'Mamaei' and 'Non pareil' were the most susceptible varieties to two-spotted spider mite.

Key words: Almond, Resistance, Spider mites, *Tetranychus urticae*

* Corresponding Author, E-mail: zarirsaeidi@yahoo.com
Received: 5 Feb. 2012 - Accepted: 3 Feb. 2013