

گزارش گونه‌های جدید از پادمان خانواده Isotomidae (Apterygota: Collembola) برای فون ایران

علیه یحیی پور^۱، معصومه شایان مهر^{۲*}

۱-دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

۲-استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

خانواده ایزوتومیده (Isotomidae) دومین خانواده بزرگ از لاحاظ تنوع گونه‌ای در راسته پادمان (Collembola) می‌باشد. این شش‌پایان بدن کشیده و بدون فلس دارند و بر خلاف خانواده انتموبریده (Entomobryidae) طول همه بندهای شکمی یک اندازه می‌باشند. اکثر گونه‌های این خانواده در اکوسیستم‌های خشکی، و در خاک یا بقایای گیاهی زندگی می‌کنند ولی عده‌ای از گونه‌ها را می‌توان از روی آب در اکوسیستم‌های آبی پیدا کرد. در بررسی فونستیک این خانواده در طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۹، نمونه‌هایی از خاک و خاکبرگ مناطق مختلف شهر ساری جمع آوری شدند. پادمان توسط قیف برلیز جمع آوری گردید و اسلاید میکروسکوپی با استفاده از محلول هویر تهیه شد. در مجموع هشت گونه از هفت جنس از این خانواده جمع آوری و شناسایی شد، که از بین سه گونه برای ایران جدید می‌باشد که در لیست زیر با * مشخص شده‌اند. عبارتند از: *Isotomurus cf. italicus*^{*}, *Isotomurus sp.*^{*} (aff. *palustris-unifasciatus*), *Cryptopygus*^{*} cf. *ponticus* (Stach, 1947)., *Folsomides parvulus* (Stach, 1922), *Folsomia candida* (Willem, 1902), *Proisotoma minima*^{*} (Absolon, 1901) *Isotomiella minor* (Schaffer, 1896), *Isotoma viridis* (Bourlet, 1839)

واژه‌های کلیدی: پادمان، Arthropleona، Collembola، Isotomidae، ساری، ایران

*نویسنده رابط، پست الکترونیکی: Shayanm30@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله (۹۱/۳/۱۷) - تاریخ پذیرش مقاله (۹۱/۱۲/۲)



مقدمه

پادمان یا دمفرنی‌ها (Collembola) یکی از مهم‌ترین و فراوان‌ترین بندپایان خاکزی به شمار می‌آیند و تراکم آن‌ها در برخی خاک‌های جنگلی گاهی به بیش از چند میلیون در هر متر مربع می‌رسد (Petersen & luxton, 1982). این شش پایان در اکثر مناطق دنیا وجود دارند. تنها تعداد کمی از آنها به عنوان آفت محصولات کشاورزی شناخته شده‌اند و در اصل پادمان یکی از مفیدترین راسته‌های شش پایان در طبیعت محسوب می‌شوند. مهم‌ترین نقش پادمان در محیط زیست شامل دخالت در فرایندهای تجزیه، کمک به چرخش عناصر غذایی و تغییر در نحوه رشد گیاهان می‌باشد (Visser, 1985; Klironomos & Kendrick, 1995; Rusek, 1998; Chahartaghi et al., 2005) در رده بندی قدیم پادمان در شاخه بند پایان، رده حشرات و راسته پادمان تقسیم می‌شود. راسته پادمان خود به سه زیر راسته Arthropleona، Neelipleona، Symphypleona تقسیم می‌شود. اما در رده بندی جدید پادمان راسته ای از حشرات نبود بلکه خود به عنوان یک رده در کنار رده حشرات قرار می‌گیرند و سه زیر راسته به زیر رده تغییر نموده اند (Hopkin, 2005). با این وجود هنوز در بسیاری از منابع از لغت حشرات برای نام بردن این بندپایان استفاده می‌شود. آرتروپلنونا (Arthropleona) شامل گونه‌هایی از پادمان می‌باشد که دارای بدن کمایش کشیده (طول بدن بیشتر از عرض بدن) می‌باشند و در آن‌ها مرز بین بندهای قفسه سینه و بندهای شکم به راحتی قابل دیدن نیست. گونه‌های سیمیپلنونا (Symphypleona) و نیلیپلنونا (Neelipleona) بر عکس دارای بدن کروی شکل می‌باشند که بندهای سینه و بخش جلویی شکم در هم ادغام شده اند (Fjellberg, 1998). خانواده ایزوتومیده (Isotomidae) یکی از خانواده‌های مهم و متنوع به لحاظ گونه‌ای در زیر رده آرتروپلنونا (Arthropleona) می‌باشد. این خانواده احتمالاً اولین انشعاب در گروه پادمان انتموبریامورفا (Entomobryomorpha) می‌باشد (Hopkin, 2005). همه بندهای شکم دارای طول یکسان بوده و اغلب گونه‌ها در خاک، خاکبرگ، شکاف تخته سنگ‌های کنار ساحل یا حتی روی آب‌ها زندگی می‌کنند. اعضای این خانواده را می‌توان در سراسر جهان یافت. از گونه Folsomia candida (Willem, 1902) بطور معمول در آزمایش‌های بوم سمشناسی به عنوان شاخص زنده برای بررسی اثرات ترکیبات شیمیایی روی بی‌مهرگان غیر هدف در خاک استفاده می‌شود (Hopkin, 1997). تاکنون بیش از هزار گونه از پادمان این خانواده در سراسر دنیا شناسایی و نام‌گذاری شده است. در مورد پادمان ایران همانند پادمان دیگر بخش‌های آسیا اطلاعات کمی نسبت به اروپا و آمریکا وجود دارد و مطالعات چندانی در مورد فون پادمان انجام نشده است. بیشتر گزارش‌ها مربوط به گونه‌هایی بوده است که در مزرعه یا گلخانه به عنوان آفت تلقی شده‌اند. مانند گزارش گونه Sminthurus viridis (L.) از خانواده اسمیتوریده (Sminthuridae) توسط گاردنر از مزارع گندم و یونجه خوزستان که با جمعیت فراوان جمع آوری شده است و در فهرست آفات مهم نباتات و فرآورده‌های کشاورزی ایران ثبت گردید (Farahbakhsh, 1961). اولین مطالعه جامع درباره فون پادمان ایران در ۵ استان شمالی و مرکزی انجام شد که قدیم‌ترین گزارش در مورد گونه‌های خانواده ایزوتومیده (Isotomidae) می‌باشد. در این گزارش هفت جنس و ۱۷ گونه از این خانواده برای اولین بار گزارش شد (Cox, 1982). پنج گونه از پادمان متعلق به خانواده ایزوتومیده (Isotomidae) از تهران گزارش شده است (Moravvej, 2007). در تحقیق دیگری از گلخانه‌های سبزی و صیفی و گل‌های زیستی در استان اصفهان نمونه‌هایی از پادمان بر روی ریشه و طوفقی گیاهچه‌های پژمرده مشاهده و جمع آوری شد که گونه Proisotoma minuta (Tullberg, 1871) از روی بنفسه آفریقایی جمع آوری گردید که متعلق به خانواده ایزوتومیده (Isotomidae) بود (Nematolahi. et al, 2009). با توجه به اهمیت پادمان به عنوان بخش مهمی از شبکه غذایی خاک و به منظور شناخت بهتر گونه‌های این خانواده در شهرستان ساری اقدام به جمع آوری و شناسایی گونه‌های موجود در خاک و خاکبرگ مناطق مختلف این شهرستان گردید.

مواد و روش‌ها

مکان نمونه‌برداری

به‌منظور بررسی فون پادمان در شهرستان ساری، نمونه‌برداری‌هایی در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹ (جولای ۱) انجام شد. این روش مقداری خاک برگ (حدود یک کیلوگرم) به‌همراه لایه زیرین خاک برداشته و به کیسه‌های نایلونی تیره منتقل شد. از آن جایی که رطوبت در وجود پادمان نقش دارد، در جاهایی که سطح رویی خاک خشک بود نمونه‌برداری از خاک لایه زیرین انجام شد. نمونه‌ها برای جداسازی پادمان از خاک و خاک برگ به آزمایشگاه منتقل گردید.

روش جداسازی

پادمان با استفاده از قیف برلیز از خاک و خاک برگ استخراج گردید. به‌منظور استخراج کامل پادمان، نمونه‌ها تا خشک شدن نهایی (به مدت ۵-۲ روز) داخل قیف برلیز باقی ماندند. پادمان داخل آب جمع‌آوری شده و به‌وسیله استریومیکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی بیشتر و جهت نگهداری برای مدت زمان طولانی‌تر از الکل ۷۵ درصد استفاده شد.

آماده‌سازی و شناسایی نمونه

برای تهیه پرپاراسیون از پادمان مایع هویر و در بعضی موارد از مخلوط گلیسیرین و اسید لاکتیک (به نسبت ۱:۵) استفاده شد. نمونه‌هایی از پادمان که بدن تیره داشتند، لازم است در ابتدا شفاف و بی‌رنگ شوند. برای این کار از محلول شفاف کننده نسبیت (شامل کلرال هیدرات ۴۰ گرم، آب مقطر ۲۵ سی سی، هیپو کلریک اسید غلیظ ۲.۵ سی سی) استفاده شد. مدت زمانی که لازم است تا نمونه‌ها در محلول‌های مورد استفاده شفاف و بی‌رنگ شوند بستگی به گونه پادمان دارد. قبل از تهیه اسلاید، پادمان بی‌رنگ شده در الکل شستشو داده شد تا مواد اضافی موجود در بین موهای بدن برطرف شوند. لازم است اسلایدها حداقل سه تا پنج روز در دمای ۴۰-۶۰ درجه سلسیوس در آون بمانند تا مایع فیکس کننده خشک شود (Christianen, Fjellberg, 1980; Fjellberg, 1998; Fjellberg, 2007; Fjellberg, 1990). در نهایت کار شناسایی با کمک کلیدهای معتبر انجام شد (Potapov, 2001). نمونه‌های مورد نظر پس از تشخیص، اولیه مورد تایید و دکتر پوتاپوف (Potapov) از روسیه قرار گرفت. از نمای کلی بدن حشره (با درشت نمایی X¹⁰) و از قسمت‌های مهم بدن حشره (با درشت نمایی X⁴⁰) به‌وسیله میکروسکوپ مجهز به دوربین عکس‌برداری شد. اسلایدهای تهیه شده در مجموعه حشرات آزمایشگاه حشره‌شناسی گروه گیاپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری موجود می‌باشند.

نتایج

نمونه‌های جمع‌آوری شده از زیستگاه‌های مختلف شهرستان ساری شامل خاک جمع‌آوری شده از جنگل، جلگه و دشت، زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها (جدول ۱)، به صورت هفت جنس و هشت گونه شناسایی گردید:

Isotomiella minor, *Folsomia candida*, *Isotoma viridis*, *Folsomides parvulus*, *Proisotoma minima*, *Isotomurus cf. italicus*, *Isotomurus sp.* (aff. *palustris-unifasciatus*), *Cryptopygus ponticus*.

این هشت گونه متعلق به خانواده Isotomidae می‌باشد (Hopkin, 2005; Fjelberg, 2007). بر اساس تقسیم‌بندی این خانواده در راسته Entomobryomorpha و بالا خانواده Isotomoidea قرار می‌گیرد (Bellinger *et al.*, 2010). بعضی گونه‌های فوق برای اولین بار برای فون ایران و استان مازندران معروفی می‌شوند و بعضی دیگر برای فون دنیا نیز جدید هستند که اقدامات لازم به منظور شناسایی و توصیف بهتر گونه ادامه دارد.

جدول ۱- اطلاعات مربوط به مناطق نمونه‌برداری گونه‌های خانواده انتوموبرییده در شهرستان ساری (استان مازندران)

Table 1- Information on sampling regions of Entomobryidae family species in Sari city (Mazandaran Province)

Species	Location	AMSL	Date	Habitat	Longitude Latitude
<i>Isotoma viridis</i>	Abmal village	-10 m	2011/9/23	Citrus garden	36°42'52"N 53°6'00"E
<i>Isotomorus. Sp.(aff. Italicus)</i>	Kordkhail village	-11 m	2011/2/16	Robinia tree	36°42'52"N 53°6'00"E
<i>Isotsoma viridis</i>	Sari- Chafteesar	-11 m	2010/6/5	Margin of Citrus garden	36°42'52"N 53°6'00"E
<i>Cryptopygus ponticus</i>	Salardare	28 m	2011/2/23	Forest	36°32'42"N 53°7'31"E
<i>Folsomides parvulus</i>	Sari	-15 m	2010/3/17	House garden	36°43'29"N 53°7'27"E
<i>Isotomiella minor</i>	zare	12 m	2011/1/20	Forest	36°32'2"N 52°7'45"E
<i>Folsomia candida</i>	Sari	-10 m	2011/1/8	House garden	36°42'52"N 53°5'32"E
<i>Isotomorus sp.1(aff. Palustris-unifasciata)</i>	Badele- Natural Resources Faculty	12m	2011/5/15	Acer tree	36°34'42"N 53°11'31"E
<i>Proisotoma minima</i>	Sari- Ghaemshahr	13m	2011/9/19	Citrus garden	36°31'8"N 53°12'4"E
<i>Isotomorus sp.1(aff. Palustris-unifasciata)</i>	Abmal village	-10 m	2011/1/6	Peach garden	36°42'52"N 53°5'32"E
<i>Isotomorus sp.1(aff. Palustris-unifasciata)</i>	Sari- Kiasar	1138m	2011/10/2	Forest	36°42'53"N 53°5'45"E

کلید شناسایی جنس‌های خانواده **Isotomidae** (Fjellberg, 1980; Fjellberg, 1998; Fjellberg, 2007)

- بندهای ۶-۴ شکمی در هم ادغام شده‌اند *Folsomia*
- بندهای شکم به‌ویژه بند ۵-۴ کاملاً از هم جدا می‌باشند ۲
- چشم و اندامک پس شاخکی وجود ندارد *Isotomiella*
- دارای چشم و اندامک پس شاخکی ۳
- منوبریوم بدون مو یا دارای موهای محدود در بخش جلویی سطح شکمی ۴
- منوبریوم دارای موهای شکمی فراوان ۶
- دنз دارای بیش از یک موی شکمی و چشم‌ها متغیر و بدون ویژگی بالا ۵
- دنз بلند و استوانه‌ای شکل *Cryptopygus*
- دنز کوتاه و ضخیم *Proisotoma*
- شکم دارای تریکوبوتری به‌ویژه در بند چهارم شکم *Isotomurus*
- شکم بدون تریکوبوتری *Isotoma*

۱- جنس *Isotoma* (Bourlet, 1839)

یکی از بزرگ‌ترین جنس‌های این خانواده می‌باشد، با موهای دراز و اره ای، دارای ۸+۸ چشم ساده، اندام پس شاخکی (PAO) کوچک و گرد و دارای ضخامت کم و نزدیک به چشم‌های ساده. پالپ آرواره پایین دو شاخه و لب بالا دارای ۵۵۴ مو، لبه راسی لب بالا با ۴ تا خورده‌گی در اندازه متغیر، آرواره بالا قوی و بدون تغییرات، آرواره‌های پایین با ورقه‌های کوتاه و به صورت متراکم با دندانه‌های کوچک پوشیده شده است. تعداد اندام‌های حسی در گونه‌های کوچک ۶ عدد و بیشتر از افراد بزرگ است. موهای شکمی در قفسه سینه و جود ندارد و لوله شکمی با تعدادی مو در قسمت جلویی، رتیناکلوم با ۴+۴ دندانه و تعدادی مو، لبه داخلی ناخن‌ها دارای ۲ دندانه. منوبریوم با موهای ضخیم راسی-شکمی شبیه خار بوده و موکرو با ۳ دندانه و بدون موهای جانبی (Fjellberg, 1998). اعضای این جنس در میان پادمان جزو بزرگ‌ترین جنس‌ها از لحاظ جثه به شمار می‌روند و اندازه حشره کامل گاهی به ۳-۴ میلی‌متر می‌رسد. از این جنس گونه *I. virdis*(Bourlet) جمع آوری شد که قبل نیز توسط کوکس از شمال ایران گزارش شده است (Cox, 1982).

گونه (Isotoma viridis (Bourlet, 1839)

طول بدن ۴-۳ میلیمتر و گاهی به بیش از ۶ میلیمتر نیز می‌رسد. رنگ بدن متغیر و از زرد کمرنگ تا سبز، قهوه‌ای تیره یا حتی قرمز (شکل ۱-a). گاهی دارای نوارهای عرضی باریک و مشخص در حاشیه عقبی هر ترثیت. این تنوع رنگ سبب پیدایش واریته‌های مختلف در درون این گونه شده است.

سر: دارای ۸+۸ چشم ساده بوده و اندام پس شاخکی (PAO) به اندازه نصف طول چشم ساده می‌باشد (شکل ۱-b). شاخک‌ها دارای اندامک‌های حساس و بند چهارم شاخک دارای موی دو شاخه سوزنی شکل هستند. تمام بخش‌های بدن دارای سنسیلا مویی شکل هستند.

شکم: لوله شکمی دارای موهای فراوان. بخش ضخیم منوبریم دارای دندانه ساده (شکل ۱-d)، دنر در بخش عقبی دارای موهای زیاد (شکل ۱-c) و در بخش قاعده‌ای دارای دو ماکروستا رو به عقب. این گونه یکی از گونه‌های فعال پادمان سطحی‌زی می‌باشد.

۲- جنس (Isotomiella (Bagnall, 1939)

اعضای این جنس معمولاً به رنگ سفید و فاقد لکه یا نقش و نگار روی بدن، بدون چشم ساده و به علت نداشتن اندام پس شاخکی (PAO) در میان خانواده ایزوتومیده با جنس *Folsomina* مشترک می‌باشند. از این جنس گونه معمول زیر جمع آوری و شناسایی شد.

گونه (Isotomiella minor (Schaffer, 1896)

این گونه دارای اندازه کوچک (۱۱۰.۷ میلیمتر) می‌باشد (شکل ۲-a). رنگ بدن سفید رنگ. شکل بدن شبیه به یک *Isotoma* معمولی است.

سر: فاقد اندام بینایی و اندام پس شاخکی (PAO) می‌باشد (شکل ۲-b) اولین بند شاخک دارای دو سنسیلا حساس در قسمت راس شکمی و حدود ۱۸ مو معمولی و دو میکروستا در قسمت قاعده ای می‌باشد. بند دوم شاخک دارای موهای معمولی دو میکروستا پایه‌ای بوده و هیچ سنسیلایی ندارند. سر، قفسه سینه و دو بخش اول شکمی دارای یک سیستم پشتی از کانال‌های شاخه‌ای شده پوستی می‌باشند که به بخش شکمی بدن و بخش‌های بند اول پایه‌ای جشره متصل است. بند چهارم شاخک دارای یک گروه از اندام‌های لوپیایی شکل می‌باشد (شکل ۲-c).

شکم: فورکا بلندتر از سر بوده (شکل ۲-d) و موکرو دارای سه دندانه می‌باشد (شکل ۲-e). سطح پشتی بند پنجم و ششم شکم دارای موهای مژدهار می‌باشد. موهای سطح شکمی منوبریوم دارای آرایش خاص ۵+۵ می‌باشد. این گونه جهان‌وطنی می‌باشد و قبلاً از شمال ایران (Cox, 1982) و همچنین از تهران گزارش شده است (Moravvej et al., 2007).

۳- جنس (Cryptopygus Willem, 1901)

لب بالا دارای سنسیلا به شکل مو به تعداد سه مو نزدیک مبدأ و پایه‌ها دارای چهار مو وسطی و پنج موی کناری می‌باشند. اعضای این جنس دارای دنر باریک و ظرفی و ساق پا دارای هفت مو در راس خود می‌باشد تعریف بالا از جنس *Cryptopygus* بسیار نزدیک به جنس *Proisotoma* M. Bourlet می‌باشد. تفاوت اساسی آنها به ترکیب دو بخش انتهایی شکمی بر می‌گردد به طوری که در جنس *Cryptopygus* بند پنجم و ششم شکمی با هم ادغام شده اند (شکل ۳-b). در حال حاضر گونه‌های جنس *Cryptopygus* یک گروه غیر یکنواخت و ناهمگن را تشکیل می‌دهند که برخی از آنها فاصله بسیاری با گونه

تیپ (*antarcticus*) دارند که ممکن است در آینده به جنس‌های دیگری تعلق گیرند. از این جنس گونه زیر برای اولین بار از استان مازندران گزارش می‌شود. این گونه از استان تهران نیز جمع آوری و شناسایی شده است (Moravvej *et al.*, 2007).

گونه *Cryptopygus ponticus* (Stach, 1947)

اندازه بدن حدود ۱ میلی‌متر و به رنگ خاکستری می‌باشد (شکل ۳-a).

سر: دارای اوماتیدی رنگدانه‌دار به تعداد ۵+۵ می‌باشد. اندام پس شاخکی (PAO) بیضی شکل و فشرده و طول آن ۴-۳ برابر اوماتیدی می‌باشد (شکل ۳-c).

شکم: ساق پنجه بدون مو های چماقی و ناخن‌ها با دندانه‌های داخلی ریز و لوله شکمی دارای ۴+۴ (به ندرت ۳+۳ یا حتی ۵+۵) موی جانی و ۴-۵ موی عقبی (شکل ۳-d)، رتیناکولوم با ۴+۴ دندانه (شکل ۳-e) و ۱ مو و منوبریوم دارای ۱+۱ و گاهی ۲+۱ موی داخلی می‌باشد (شکل ۳-f). دنر در قسمت عقبی دارای ۷-۶ مو و موکرو دارای دو دندانه می‌باشد (شکل ۳-g).

۴-جنس *Isotomurus* (Borner, 1903)

گونه‌های این جنس بسیار شبیه جنس *Isotoma* می‌باشند. اما تفاوت آن به وسیله وجود تریکوبوتري در بند دو و چهارم شکم مشخص می‌شود (شکل ۴-b-۴). گونه‌های این جنس توسط نقش و نگار بدن قابل تمایز هستند. شکل سر در این جنس متفاوت از جنس *Isotoma* می‌باشد. دهان مخروطی شکل و دارای بیشترین برجستگی می‌باشد. از مشخصات این جنس چشم‌های ساده به صورت ۸+۸ لب بالا با ۵۵۴ موی بلند و باریک، لبه بالایی لب بالا دارای چهار تاخوردگی تیز، لبه بیرونی آرواره پایین به صورت دو شاخه و دارای چهار مو می‌باشد. لب پایین با تعدادی مو در قسمت ابتدایی پالپ می‌باشد. آرواره بالا عادی و قوی، موهای دراز در هر سمت از بند چهارم شکم به صورت یک سه ضلعی پیداست. در صورتی که در جنس مشابه موها به صورت ردیفی هستند. بند دو و چهار شکم دارای ۳۳۱ تریکوبوتري و بند پنجم شکم با ۷+۷ اندام حسی معمولی می‌باشد. از این جنس، گونه *I. palustris* یک گونه معمول می‌باشد که قبلا از ایران گزارش شده است (Cox, 1982). اما این گونه خود مجموعه‌ای از چند گونه می‌باشد که مورفولوژی بسیار مشابهی دارند و اصطلاحا *Palustris-group* نامیده می‌شوند. رده بندی *Palustris-group* بسیار پیچیده می‌باشد. در مجموع دو گونه از جنس *Isotomurus* به شرح زیر جمع آوری و شناسایی شد که با توجه به مشخصات نمونه‌ها، طبق نظر دکتر پوتاپف گونه‌های جدید می‌باشند که باید توصیف شوند.

گونه (Isotomurus sp.1 (aff. *palustris-unifasciatus*)

این گونه دارای فراوانی بیشتری نسبت به گونه دیگر جنس *Isotomurus* در بین نمونه های جمع آوری شده می باشد (شکل ۴-a). نمونه های جمع آوری شده در گروه *Palutirs* قرار می گیرد. یعنی از لحاظ داشتن ۳+۳ موی جانی روی لوله شکمی (شکل ۴-b) و نداشتن مو روی موکرو شبیه به *Palustris*-group می باشد در حالی که طرح های روی بدن (دارای یک نوار طولی و تعدادی لکه های جانبی به موازات این بند روی شکم) آن را به گونه *unifasciatus* نزدیک کرده است. از طرف دیگر ارگان شکمی نرها تنها روی بند چهارم تکامل یافته است که این گونه را به گونه *I. italicus* شبیه می نماید. از مشخصات دیگر این گونه که مشاهده شد، وجود اندام پس شاخکی (شکل ۴-d)، ضخیم شدگی منوبریوم (شکل ۴-e) و تیره بودن کلپیوس (شکل ۴-f) می باشد. این گونه احتمالاً گونه جدید برای فون جهان می باشد که بررسی بیشتر روی نمونه ها توسط دکتر پوتاپف هم چنان ادامه دارد.

گونه (Isotomurus sp. 2 (aff. *italicus*)

اندازه بدن ۲ میلی متر و به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری است (شکل ۵-a). سر: سر دارای یک لکه سیاه در قسمت وسط در پشت چشم هاست که به شکل نوار باریک تا بین چشم ها امتداد یافته اند. پایه های شاخک تیره تر از بقیه جاهای بدن است. ناحیه فرنتوکلیپال تیره نیست. اندام پس شاخکی (پائو) به وضوح درازتر از قطر نزدیک ترین چشم امتداد یافته است (شکل ۵-b). لب بالا دارای ۵ تا ۶ مو نزدیک قاعده می باشد. شکم: ماکروستا شکمی کوتاه می باشد. رتیناکولوم دارای ۸ تا ۱۰ مو می باشد. منوبریوم کوتاه بوده (شکل ۵-c) و دارای چند دندانه کوتاه و کوچک می باشد. دنر دارای یک پوشش پراکنده مو پشتی است (شکل ۵-d) و هم چنین کرانولیت شده است (شکل ۵-e). فورکا دارای دندانه های کوچک با پایه کناری بوده و موکرو دارای دو دندانه می باشد (شکل ۵-f) کنگره های کناری ناخن کوچک بوده و یا وجود ندارند. در جنس نر این گونه اندام جنسی نر به خوبی نمایان می باشد (شکل ۵-g).

۵- جنس *Folsomides* Stach, 1922

اعضای این جنس به سادگی با بدن استوانه ای شکل و درازشان که دارای یک خمیدگی بین بند چهارم و پنجم شکمی تشخیص داده می شوند. فورکا در آنها وجود داشته و دنر کوتاه تر از منوبریوم است. چشم ها ۵+۵ یا کمتر است. اندام پس شاخکی موجود می باشد. انتهای شاخک پهن و بدون برآمدگی مشخص می باشد. از این جنس گونه زیر جمع آوری و شناسایی شد.

گونه (*Folsomides parvulus* (Stach, 1922)

اندازه بدن این گونه به طول ۰.۹ میلی متر و داری بدن لوله ای شکل است (شکل ۶-a). قادر لکه هایی روی بدن است. لکه های تیره زیر چشم ها توسعه یافته است. سر: اندام پس شاخکی بلند و باریک با سه موی پشتی می باشد (شکل ۶-b). پالپ آرواره پایین دو شاخه بوده و ساق پنجه اول، دوم و سوم به ترتیب دارای ۲۰، ۲۰ و ۲۲ مو می باشد. شکم: در جنس ماده این گونه اندام جنسی ماده به خوبی نمایان می باشد (شکل ۶-c) یا به ندرت دو تا در یک طرف می باشد. موکرو بدون دندانه و با دنر ادغام شده است. موکرو و دنر با سه موی پشتی (شکل ۶-d). این گونه قبل از شمال ایران معرفی شده است (Cox, 1982).

۶- جنس Folsomia (Willem, 1902)

اعضای این جنس دارای سه بند انتهای شکمی ادغام شده هستند. بدن اغلب خطی و یا استوانه‌ای می‌باشد ولی بعضی گونه‌ها دارای بدن گلابی شکل شبیه جنس *Isotoma* می‌باشد. لب بالا دارای تعداد فراوان مو می‌باشد. رتیناکولوم با ۴+۴ دندانه و یک مو می‌باشد. پیش پنجه دارای ۷ موی مشابه می‌باشد. منوبریوم دارای موی شکمی جلویی بوده و موهای پشتی آن ویژگی خوبی برای تشخیص جنس می‌باشد. از این جنس گونه *F. candida* قبل از شمال ایران گزارش شده است (Cox, 1982).

گونه Folsomia candida (Willem, 1902)

این گونه به رنگ سفید و اندازه بدن بین ۰.۹ تا ۲.۵ میلی‌متر می‌باشد (شکل a-۷). سر: چشم ساده در آن وجود ندارد. اندام پس شاخکی (PAO) بیضی شکل و طول آن ۰.۹-۰.۵ برابر عرض بند اول شاخک می‌باشد (شکل b-۷). شکل بدن باریک و بلند بوده و شکم کمی به شکل نوک تیز درآمده است. پالپ آرواره پایین دو شاخه بوده و لوب بیرونی آرواره پایین دارای ۴ موی زیرین می‌باشد. سر دارای ۴ تا ۵ موپشت لبی است. شکم: فورکا قوی دارای سلول‌های استوانه‌ای داخلی و دارای بیشتر از ۲۰ موی شکمی در نمونه‌های بزرگ می‌باشد. مانو بریوم دارای چندین (۱۶-۳۲) موی شکمی می‌باشد. دنر دارای ۱۰-۷ موی پشتی و ۴۰-۲۰ موی شکمی می‌باشد (شکل c-۷). ناخن‌ها دارای یک دندانه داخلی کوچک هستند. این گونه دارای انتشار جهانی بوده و در بسیاری از آزمایشگاه‌های سم‌شناسی و اکولوژی به عنوان یک استاندارد جهت تعیین آلودگی‌ها یا اثرات جانی سوم استفاده می‌شود. گونه فوق از خاک منطقه حاشیه رودخانه از زیر درخت صنوبر در روستای کردخیل جمع آوری و شناسایی شد.

۷- جنس Proisotoma Borner, 1901

اعضای این جنس یک گروه کاملاً متجانس را تشکیل می‌دهند اما ممکن است با یکسری ویژگی‌های زیر تشخیص داده می‌شوند: گونه‌هایی با فورکا رشد یافته هستند. چشم‌ها و رنگ‌دانه در آنها موجود است. منوبریوم دارای ۱+۱ و یا ۳+۳ مو در بخش جلویی سطح شکمی بوده و موی دیگر شکمی روی منوبریوم وجود ندارد. بند پنجم و ششم شکمی در هم ادغام نشده است. بند اول تا سوم بدون سنسیلایا دارای سنسیلای بسیار ریز می‌باشند. بند اول پای جلویی حشره ماکروستا بیرونی و ساق پا دارای ۷ مو در راس آن می‌باشد. پوست آنها صاف و بدون برآمدگی مشخص می‌باشند. این گونه برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

گونه Proisotoma minima (Absolon, 1901)


اندازه بدن آن‌ها بیش از ۰/۸ میلی‌متر است و به رنگ سفید می‌باشد که گاهای دارای رنگدانه‌های تیره می‌باشد (شکل a-۸). سر: چشم‌ها ۵+۵ و در اندازه متغیر می‌باشند. اندام پس شاخکی (پائو) بیضی شکل بوده و اندازه آن دو برابر طویل‌تر از نزدیک‌ترین چشم می‌باشد (شکل b-۸). بند اول شاخک دارای ۱۵ مو بوده که یکی در قسمت پشتی می‌باشد. روی بند دوم شاخک سنسیلایا حساس وجود دارد که کمی ضخیم شده است.

قفسه سینه و شکم: قفسه سینه و بند دوم شکم بدون مو شکمی هستند. فورکا کمی کوتاه بوده و دنزرداری چهارتا پنج عدد موپشتی و شش مو شکمی است (شکل c-۸). ساق پنجه دارای هفت مو در بخش قاعده‌ای خود می‌باشند.




شکل ۱- گونه a: *Isotoma viridis*. b: نمای کلی گونه b- اندام پس شاخکی (پست آنتنال ارگان) c- دنس و موکرو d- بخش ضخیم منوبریوم
درشت نمایی ۱۰X و b-c-d درشت نمایی ۴۰X (اصلی)

Fig. 1- a: *Isotoma viridis*. b: post antennal organ (PAO) c: dens and mucro d: thick part of manubrium (a: magnification 10X and b-c-d: magnification 40X) (original)



شکل ۲- گونه a: *Isotomiella minor* b: نمای کلی گونه b- فاقد اندام بینایی و اندام پس شاخکی (پست آنتنال ارگان) c- بند چهارم شاخک دارای اندام لوبیایی شکل d- فورکا e- موکرو سه دندانه (a: درشت نمایی ۱۰X و b-c-d-e: درشت نمایی ۴۰X (اصلی))

Fig. 2- a. *Isotomiella minor* b. This species without PAO and ocelli c. the fourth segment of antennal d: furca e: mucro
(a: magnification 10X and b-c-d-e: magnification 40X) (original)




شکل ۳- گونه a : *Cryptopygus ponticus* b. five and six segments of abdomen are combined c. PAO d. ventral tube e. Tenaculum with 4 teeth f. manubrium with two clear hair g. mucro.
 آنتال ارگان) d- لوله شکمی یا ونترال تیوب e- تناکولوم دارای چهار دندانه f- منوبریوم با دو موی مشخص g- موکرو. (a: درشت نمایی ۱۰X
 و b-c-d-e-f-g: درشت نمایی ۴۰X) (اصلی)

Fig. 3- a. *Cryptopygus ponticus* b. five and six segments of abdomen are combined c. PAO d. ventral tube e. Tenaculum with 4 teeth f. manubrium with two clear hair g. mucro.
 (a: magnification 10X and b-c-d-e-f-g: magnification 40X) (original)



شکل ۴- گونه (a) : *Isotomurus sp.1*(aff. *Palustris- unifasciatus*) b. تریکوبوتی .c. لوله شکمی.d. اندام پس شاخکی
 (پست آنتال ارگان) e. ضخیم شدگی منوبریوم f. کلپیوس (a: درشت نمایی ۱۰X و b-c-d-e-f: درشت نمایی ۴۰X) (اصلی)

Fig. 4- a. *Isotomurus sp.1*(aff. *Palustris- unifasciatus*) b: Trichobothria c. ventral tube d. PAO e. the thick of segment manubrium
 f. clypeus (a: magnification 10X and b-c-d-e-f: magnification 40X) (original)




شکل ۵- گونه a : نمای کلی گونه b- اندام پس شاخکی (پست آنتال ارگان) c- منوبریوم- d- دنз دارای موهای متراکم e- دنز کرانولیت f- موکرو g- اندام جنسی خارجی در نرها (a: درشت نمای ۱۰X و b-c-d-e-f-g: درشت نمای ۴۰X) (اصلی)

Fig. 5- a. *Isotomurus* sp.2(aff. *Italicus*) b. PAO c. manubrium d. dens with a lot of setae e. dens crenulated f. mucro g. genitalia organ in male (a: magnification 10X and b-c-d-e-f-g: magnification 40X) (original)




شکل ۶- گونه کلی گونه -a: *Folsomides parvulus* b: Head of the same specimen of *Folsomides parvulus* shown in . The post-antennal organ (PAO) is long and thin and there are 2+2 ocelli. C. genitalia organ in female. d. Furca of the same specimen of *Folsomides parvulus* there are three dorsal setae on the dens (*). The mucro has two teeth and is fused to the dens (a: magnification 10X and b-c-d: magnification 40X) (original)

Fig. 6- a. *Folsomides parvulus* b. Head of the same specimen of *Folsomides parvulus* shown in . The post-antennal organ (PAO) is long and thin and there are 2+2 ocelli. C. genitalia organ in female. d. Furca of the same specimen of *Folsomides parvulus* there are three dorsal setae on the dens (*). The mucro has two teeth and is fused to the dens (a: magnification 10X and b-c-d: magnification 40X) (original)



شکل ۷- گونه a : Folsomia candida b. نمای کلی گونه b- آنتنال پس شاخکی (پست آنتنال ارگان) c- قسمت سوم قفسه سینه دارای ۲+۲ یا ۳+۳ در دو طرف قسمت شکمی d- فورکا. اقتباس از سایت (www.stevehopkin)

Fig. 7- a. *Folsomia candida* b.The PAO is quite broad and is shorter than the width of the first antennal segment (ant1). c. Ventral side of third thoracic segment of *Folsomia candida* has 2+2 (arrows) (or 3+3) setae in this position. d. furca (picture from www.stevehopkin)



شکل ۸- گونه a : *Proisotoma minima* b : نمای کلی گونه b- اندام پس شاخکی (پست آنتنال ارگان) و چشم‌های ساده c- فورکا کمی کوتاه بوده و دنз دارای چهار تا پنج عدد موی پشتی و شش موی شکمی. اقباس از سایت (www.stevehopkin.com)

Fig 8- a. *Proisotoma minima* b. PAO and ocelli c. furca (picture from [www.stevehopkin](http://www.stevehopkin.com))

بحث و نتیجه‌گیری

هدف اصلی این تحقیق شناسایی فون پادمان خانواده Isotomidae در شهرستان ساری بود که طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۹ انجام گرفت. در این بررسی هشت گونه از هفت جنس، به نام‌های *Isotomiella minor* *Isotoma viridis* *Isotomurus sp.1* (aff. *palustris-unifasciatus*) *Proisotoma minima* *Folsomides parvulus* *Cryptopygus ponticus* *Folsomia* شناسایی شد. تاکنون از خانواده ایزوتورمیده ۱۷ گونه از هفت جنس (Cox, 1982) از ایران گزارش شده است (Cox, 1982). از جنس *Isotomurus* یک گونه معمولی می‌باشد که قبلاً از ایران گزارش شده است (Cox, 1982)، اما این گونه خود مجموعه‌ای از چند گونه می‌باشد که مورفولوژی بسیار مشابهی دارند و اصطلاحاً Palustris-group نامیده می‌شوند. رده بندی Palustris-group بسیار پیچیده می‌باشد که با توجه به مشخصات نمونه‌ها، طبق نظر دکتر پوتاپوف گونه‌های جدید می‌باشند که بررسی بیشتر روی نمونه‌ها هم چنان ادامه دارد.

References

- Bellinger, P. F., Christansen, K. A. and Janssens, F.** 2010. Checklist of the Collembola of the world. Available from URL: <http://www.collembola.org>, (Accessed at Feb 2010).
- Chahartaghi, M., Langel, R., Scheu, S., Ruess, L.** 2005. Feeding guilds in Collembola based on nitrogen stable isotope ratios. *Soil Biology and Biochemistry*, 37, 1718-1725.
- Christiansen, K. A.** 1990. Insecta: collembola. In: Dindal, D. L. (Editor). *Soil Biology Guide*. John Wiley and Sons. New York, pp. 965-995.
- Cox, P.** 1982. The Collembola fauna of north and north western Iran. *Entomologist's Monthly Magazine*, 118: 39-49.
- Farahbakhsh, Gh.** 1961. A checklist of economically important insects and other enemies of plant and agriculture products in iran. Department of plant protection, ministry of agriculture. Tehran, Iran, 1, 153 pp.
- Fjellberg, A.** 1980. Identification keys to Norwegian Collembolan. Norsk Entomologisk Forening, Ås.
- Fjellberg, A.** 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I. Poduromorpha. Brill, Leiden, Boston.
- Fjellberg, A.** 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part II. Entomobryamorpha and Symphyleona . Brill, Leiden, Boston.
- Hopkin, S. P.** 1997. Biology of springtails (Insecta : collembola) Oxford university press , oxford,322 pp.
- Hopkin, S.** 2005. The biology of Collembola (springtails): the most abundant insects in the world. Available from URL: <http://www.fathom.com/features/122603>. (Accessed at Feb 2010).
- Klironomos, J. N., Kendrick, W. B.** 1995. Simulative effects of arthropods on endomycorrhizas of sugar maple in the presence of decaying litter. *Functional Ecology*, 9, 528-536.
- Moravvej, S. A., Potapov, M., Kamali, K. and Hodjat, S. H.** 2007. Isotomidae (Collembola of the Tehran region (Iran). *Zoology in the Middle East*, 41: 118.
- Nematolahi, M., Bagheri, M. and Radwanski, J. M.** 2009. New reports of Collembola for iran with surveying of their importance in the greenhouse of Isfahan province, iran. *Plant Protection Journal*, 1(3): 327-335.
- Petersen, H., Luxton, M.** 1982. A comparative analysis of soil fauna populations and their role in decomposition processes. *Oikos* 39, 288-309.
- Potapow, M.** 2001. Synopses on Palaeartic collembola. Staatliches Museum fur Naturkunde Gorlitz, 603 pp.
- Rusek, J.** 1998. Biodiversity of Collembola and their functional role in the ecosystem. *Biodiversity and Conservation*, 7, 1207-1219.
- Visser, S.** 1985. Role of soil invertebrates in determining the composition of soil microbial communities. In: Fitter, A.H., Atkinson, D., Read, D.J., Usher, M.B. (Eds), *Ecological Interactions in Soil*. Blackwell Scientific, Oxford, pp. 297-317.

New reports of some species of Isotomidae (Apterygota: Collembola) for Iranian fauna

E. Yahyapoort¹, M. Shayan Mehr^{*2}

1. Ms.c Student of Agricultural Entomology, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2. Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Crop Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources

Abstract

Family of Isotomidae is the second largest family in the order of Collembola. These springtails are elongate and lack scales on the upper surface of the body. In contrary of Entomobryidae family, the abdominal segments are all of similar length. They live in soil, leaf litter in terrestrial ecosystem or in associated with freshwater in aquatic ecosystem. In a faunistic study of Isotomidae family, several soil and leaf litter samples were collected from different location of Sari regions during 2010-2011. The specimens were extracted by heat in Berlese funnel and mounted on microscopic slides using Hoyer's medium. Totally, eight species of seven genera from this family were identified as follows: *Isotomiella minor*, *Folsomia candida*, *Isotoma viridis*, *Folsomides parvulus*, *Proisotoma minima*^{*}, *Isotomurus cf. italicus*^{*}, *Isotomurus* sp.^{*} (aff. *palustris-unifasciatus*), *Cryptopygus*^{*} cf. *ponticus*. The marked species by * are considered as new records for Collembola fauna of Iran.

Keywords: Collembola, Arthropoda, Isotomidae, Sari, Iran.

^{*}Corresponding Author, E-mail: Shayanm30@yahoo.com
Received: 6 Jun. 2012 - Accepted: 20 Feb. 2013