

## مطالعه مقدماتی کنه‌های اریبایتید در بنادر عسلویه و لنگه، (ایران)

محمود علی خانی<sup>\*</sup>، تورج ارکانی<sup>۱</sup>، حسین هاشم‌زاده<sup>۲</sup>، رضا فنایی شوشتاری<sup>۳</sup>

۱- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک ، پاکستان پژوهشگران جوان، اراک، ایران

۳- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه تخصصی حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

۴- استادیار، گروه تخصصی حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

### چکیده

طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۸ در مطالعه کنه‌های اریبایتید در جنوب ایران، ۶ جنس متعلق به ۶ خانواده جمع‌آوری شدند که تعداد ۵ نمونه در سطح گونه شناسائی شدند. در بین آنها، ۳ جنس و ۲ گونه که با علامت ستاره مشخص شده‌اند برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

گونه *Hypozetes translamellatus* دارای بیشترین تعداد نمونه در محل‌های نمونه‌برداری بوده است. خانواده Scheloribatidae دارای بیشترین گونه شناسایی شده است. طبق داده‌های نمونه‌برداری، خانواده‌های Oribatulidae و Tegoribatidae به ترتیب دارای بیشترین پراکنش در محل‌های نمونه‌برداری بودند.

اسامی علمی جنس‌ها و گونه‌ها به شرح ذیل است:

*Heptacarus*\* sp., (Lohmanniidae); *Damaeolus asperatus*\* (Berlese, 1904), (Damaeolidae); *Oribatula (Zygoribatula) undulata* Berlese, 1916, (Oribatulidae); *Scheloribates fimbriatus* Thor, 1930. *S. praeincisus* (Berlese, 1910), (Scheloribatidae); *Hypozeetes translamellatus*\* Wallwork, 1965, (Tegoribatidae); *Lamellobates*\* sp., (Mycobatidae).

واژه‌های کلیدی: کنه‌های اریبایتید، گزارش جدید، بنادر عسلویه و لنگه، ایران

\* نویسنده رابط، پست الکترونیکی: [Mahmud.alikhani@gmail.com](mailto:Mahmud.alikhani@gmail.com)

تاریخ دریافت مقاله (۱۱/۱۰/۸۹)- تاریخ پذیرش مقاله (۹/۹/۹۰)

## مقدمه

گروه کنه‌های اریبایتید از نظر تعداد یکی از بندپایان غالب در اکثر افق‌های آلی خاک هستند. نقش کنه‌های اریبایتید در تجزیه کردن، سیکل غذایی و تشکیل خاک مهم است (Akrami, 2007).

کنه‌های اریبایتید غالباً به عنوان پوسیده‌خوار و قارچ‌خوارهای ریزه‌خوار شناخته می‌شوند، اما احتمالاً شکارگری فرصت طلبانه روی نماتدها و دیگر جانوران کوچک و نظافتچی‌گری روی بندپایان کوچک مرده (لاش‌خواری) کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است (Norton & Behan-Pelletier, 2009). کنه‌های اریبایتید به دلیل پیچیدگی ساختاری و کارکردی اجتماع‌شان و ویژگی‌هایی که در دیگر بندپایان یافت نمی‌شود، پتانسیل فراوانی برای استفاده در سمساشی محیطی دارند (Lebrun & Van Straalen, 1995).

لیست فون اریبایتیدهای ایران شامل گزارشات جدید و توصیف چندین گونه جدید است که توسط بايارتوگنوخ و اکرمی (Mahunka & Akrami, 2001); ماھونکا و اکرمی (Bayartogtokh & Akrami, 2000); حداد ایرانی نژاد و همکاران (Bastan et al., 2008); اکرمی (Akrami, 2007); هدادد ایرانی‌نجاد et al., 2003)؛ اکرمی و همکاران (Akrami et al., 2009) و منتشر شده است.

هدف نهایی این مطالعه، تعیین گونه‌های اریبایتید بندر لنگه و بندر عسلویه است. پیش از این تحقیق گونه‌های اریبایتید این مناطق مورد بررسی قرارنگرفته بود.

## مواد و روش‌ها

به منظور بررسی کنه‌های خاکزی بندرلنگه و بندر عسلویه، نمونه‌هایی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ از خاک این مناطق گرفته شد. هر نمونه شامل ۲ تا ۴ بیله‌چه از سطح تا عمق ۱۵ سانتی‌متری خاک گیاهان زراعی و علف‌های هرز بود. پس از ثبت مشخصات، نمونه‌ها به آزمایشگاه گروه گیاه‌پژوهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک منتقل شد. برای استخراج نمونه‌های موجود در خاک از قیف برلیز استفاده شد. پس از جداسازی، کنه‌های راسته نهان‌استیگمایان در الكل ۷۵٪ نگهداری و برای شفافسازی به محلول لاکتونول منتقل شدند. برای شناسایی کنه‌های انتخاب شده با استفاده از مخلوط هویر اسلامید میکروسکوپی تهیه شد (Akrami, 2007).

تهیه اسلاید با روش Krantz (1978) انجام شد. در بعضی از موارد که شناسایی کنه‌ها در سطح گونه میسر نبود، نام جنس نوشته شده است و به دنبال آن از "sp." استفاده شد.

همه نمونه‌ها در بخش حشره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک نگهداری می‌شود. تعدادی از نمونه‌ها در کلکسیون حشرات در گروه گیاه‌پژوهی دانشگاه شیراز نگهداری می‌شود.

## نتایج

در مجموع ۶ جنس و ۵ گونه متعلق به ۶ خانواده جمع‌آوری و شناسایی شد. در بین نمونه‌ها، ۳ جنس و ۲ گونه گزارشات جدیدی برای فون کنه‌های ایران هستند. گونه‌های اریبایتید در زیر لیست شده‌اند و داده‌های نمونه‌برداری هر گونه شامل: جنسیت، تعداد نمونه، تاریخ، محل جمع‌آوری و میزان است.

## لیست ارجایتیدها و داده‌های نمونه‌برداری

**Damaeolidae Grandjean, 1965*****Damaeolus asperatus* (Berlese, 1904)**

نمونه‌های مطالعه شده: ۱ نر، تاریخ ۱۳۸۷/۹/۷، محل جمع آوری: بندر عسلویه، میزبان: خاک زیر چمن.

پراکنش: ناحیه Holarctic به استثنای شمال، و ایالات متحده (کلمبیا) (Subias, 2004). این گونه برای

اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

**Lohmanniidae Berlese, 1916*****Heptacarus* sp.**

نمونه‌های مطالعه شده: ۴ ماده، تاریخ ۱۳۸۷/۶/۱۰، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان: خاک زیر چمن.

پراکنش: نامشخص. این جنس برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

**Mycobatidae Grandjean, 1954*****Lamellobates* sp**

نمونه‌های مطالعه شده: ۱ ماده، تاریخ ۱۳۸۷/۶/۱۱، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان: خاک زیر چمن.

پراکنش: نامشخص. این جنس برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

**Oribatulidae Thor, 1923*****Oribatula (Zygoribatula) undulata* Berlese, 1916**

نمونه‌های مطالعه شده: ۱ نر، تاریخ ۱۳۸۷/۶/۱۲، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان: خاک زیر چمن؛ ۱ ماده، تاریخ

۱۳۸۷/۶/۱۵، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان: خاک زیر چمن.

پراکنش: ناحیه Pantrropic (به استثنای Subtropic (Neotropic (Subias, 2004). قبلا از ایران گزارش شده است Haddad (Irani-Nejad et al., 2003; Bastan et al., 2008; Lotfollahi et al., 2010)

**Scheloribatidae Granjean, 1953*****Scheloribates praeincisus* (Berlese, 1910)**

نمونه‌های مطالعه شده: ۲ ماده، تاریخ ۱۳۸۷/۶/۱۲، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان: خاک زیر چمن؛ ۱ ماده، تاریخ

۱۳۸۷/۶/۱۱، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان: خاک زیر چمن؛ تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۸، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان:

خاک زیر چمن؛ ۱ نر، تاریخ ۱۳۸۷/۶/۱۵، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان: خاک زیر چمن.

پراکنش: ناحیه Pantropic و Subtropic (Bayartogtokh & Akrami, 2004). قبلا از ایران گزارش شده است, (2000).

***Scheloribates fimbriatus* Thor, 1930**

نمونه‌های مطالعه شده: ۶ ماده و ۲ نر، تاریخ ۱۳۸۷/۶/۱۶، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان: خاک زیر چمن؛ تاریخ

۱۳۸۷/۶/۱۰، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان: خاک زیر چمن؛ تاریخ ۱۳۸۷/۶/۱۶، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان:

خاک زیر چمن.

پراکنش: دارای پراکنش جهانی (Subias, 2004). قبلا از ایران گزارش شده است; (Haddad Irani-Nejad et al., 2003)

**Tegoribatidae Grandjean, 1954**

***Hypozeetes translamellatus* Wallwork, 1965**

نمونه‌های مطالعه شده: ۱۰ ماده و ۹ نر، تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۷، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان: خاک زیر چمن؛ تاریخ ۱۸/۵/۱۳۸۷، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان: خاک زیر چمن؛ ۳ ماده و ۳ نر، تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۷، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان: خاک زیر چمن؛ ۲ ماده، تاریخ ۱۶/۶/۱۳۸۷، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان: خاک زیر چمن؛ ۴ ماده و ۵ نر، تاریخ ۱۰/۶/۱۳۸۷، محل جمع آوری: بندر لنگه، میزبان: خاک زیر چمن.

پراکنش: ناحیه Ethiopia (چاد و کنگو) و عربستان سعودی (Subias, 2004). این جنس و گونه برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

**بحث**

به ترتیب ۵ و ۴۷ نمونه در سطح جنس و گونه شناسایی شد. تنها یک گونه در بندر عسلویه و ۵ جنس و ۴ گونه در اکوسیستم بندر لنگه گزارش شد. تمام گونه‌ها در محیط‌های خاکی یافت شدند. خانواده Scheloribatidae (Scheloribates sp.) دارای بیشترین گونه شناسایی شده بود.

خانواده Scheloribatidae در محیط‌های با ثبات، به خاطر تولید مثل نسبتاً بالا و سیکل زندگی کوتاه با ۳-۲ نسل در هر سال، در بیشترین تعداد یافت می‌شوند (Maribie et al., 2011).

طبق داده‌های نمونه‌برداری خانواده‌های Oribatulidae، Tegoribatidae و Scheloribatidae پر از ترتیب دارای بیشترین پراکنش در محل‌های نمونه‌برداری بودند. نتایج ما با مطالعات فرانکلین و همکاران بخوبی مطابقت دارد، که با بررسی تنوع و پراکنش اریبایتیدها در بزرگیل و پرو دریافتند، گونه‌های Scheloribates sp. *Rostrozetes foevolatus* و *Galumna* sp. و *Zygoribatula frisiae* و *Scheloribates laevigatus* بیش از ۲۶٪ از محیط ثبت شده، دارای بیشترین پراکنش بودند (Franklin et al., 2006).

مورازا و پنا با مطالعه گونه‌های اریبایتید در محیط‌های انتخابی منطقه گومرا (جزایر قناری، اسپانیا) دریافتند بیشترین فراوانی (یافت شده در بیشترین نمونه‌ها) مربوط به *Techtocepheus sarekensis* (Moraza & Pena, 2005) درصد است (۳۶ درصد).

گونه *Hypozeetes translamellatus* دارای بیشترین تعداد نمونه در محل‌های نمونه‌برداری بود. در بررسی کنه‌های جنوب ایران، نمونه‌های محدود از کنه‌های اریبایتید مورد شناسایی قرار گرفت که لزوم مطالعات بیشتر در این منطقه ضروری به نظر می‌رسد.

**سپاسگزاری**

از خانم دکتر بهان پلتیر، استاد پژوهش موزه ملی حشرات و کنه‌های کانادا (موسسه کشاورزی و کشاورزی-غذایی کانادا) و همچنین دکتر محمد علی اکرمی از گروه گیاه‌پردازی دانشگاه شیراز که در تشخیص و تایید نمونه‌ها ما را یاری دادند سپاسگزاری می‌شود.

هزینه انجام این پژوهش توسط باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در قالب طرح تحقیقاتی به شماره ۸۸۳۸۶ تامین شد که بدین وسیله سپاسگزاری می‌گردد.

## References

- Akrami, M. A. 2007.** Introduction of twelve species of brachypyline oribatid mites (Acari: Oribatida: Brachypylina) new Records for the fauna of Iran. *J. Agric. Sci. Technol.* Vol. 9: 77-86.
- Bastan, S. R., Akrami, M. A., Saboori, A. R. and Vafaei Shoushtari, R. 2008.** Introduction of some brachypyline oribatid mites (Oribatida: Brachypylina) of Arak region, Markazi province, Iran. 18<sup>th</sup> Iranian plant protection congress. 261p (in Persian).
- Bayartogtokh, B. and Akrami, M. A. 2000.** Poronotic oribatid mites (Acari: Oribatida: Poronota) from Iran. *J. Acrol. Soc. Jpn.*, 9(2):159-172.
- Franklin, E., E. M. R. Santos and Albuquerque, M. I. C. 2006.** Diversity and distribution of oribatid mites (Acari: Oribatida) in a lowland rain forest in Peru and in several environments of the Brazilians states of Amazonas, Pondonia, Roraima and Para. *Braz. J. Biol.*, 66(4): 999-1020.
- Haddad Irani-Nejad, K., Hajiqanbar, H. R. and Talebi Chaichi, P. 2003.** Oribatid mites of the sugar beet fields in Miandoab plain. *J. Agric. Sci.*, 14(1): 55-67 (in Persian).
- Krantz, G. W. 1978.** A manual of Acarology. 2<sup>nd</sup> Edition. Oregon University Book Store, Inc., Corvallis, Oregon, USA. 509 PP.
- Lebrun, P. and Van Straalen, N. M. 1995.** Oribatid mites: Prospects for their use in ecotoxicology. *Exp. Appl. Acarol.*, 19: 361-379.
- Lotfollahi, P., K. Haddad Irani-Nejad, and Hugo, L. 2010.** *Oribatula* Berlese, 1896 (Sarcophagidae: Oribatulidae) mites of alfalfa fields in Northwest of East Azarbaijan province with a new species record for mite fauna of Iran. 19<sup>th</sup> Iranian plant protection congress. 378p (in Persian).
- Mahunka, S. and Akrami, M. A. 2001.** Galumnatid mites from Iran (Acari: Oribatida). *Ann. hist.-nat. Mus. natn. hung.*, 93: 231- 237.
- Maribie, C. W., G. H. N. Nyamasyo, P. N. Ndegwa, J. K. Mung's atu, J. Lagerlof and Gikungu, M. 2011.** Abundance and diversity of soil mites (Acari) along a gradient of land use types in Taita Taveta, Kenya. *Tropical and subtropical Agroecosystems*, 13: 11-26.
- Moraza, M. L. and Pena, M. A. 2005.** Oribatid mites (Acari :Oribatida) in selected habitats of La Gomera (Canary Islands, Spain). *Boln. Asoc. Esp. Ent.*, 29(1-2): 39-54.
- Norton, R. A. and Behan- Pelletier, V. M. 2009.** Suborder oribatida, In: Krantz, G. W. and Walter, D. E. (Eds.), A manual of Acarology. 3<sup>rd</sup> ed. 430- 564. Texas tech university Press.
- Subias, L. S. 2004.** Listado sistemático, sinonímico y biogeográfico de los acaros oribatidos (Acariformes, Oribatida) del mundo( 1758-2002). *Graellsia* 60, 3-305.

## Preliminary study of oribatid mites(Acari: oribatida) in Assaluyeh and Lengeh ports, Iran

**M. Alikhani<sup>1\*</sup>, T. Arkani<sup>1</sup>, H. Hashemzadeh<sup>2</sup>, R. Vafaei Shooshtari<sup>3</sup>**

1-Young Researchers Club, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

2- Graduated student, Department of Entomology, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran

3- Assistant professor, Department of Entomology, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran

### Abstract

During 2008-2009, in oribatid mites study of south of Iran, six genera belonging to six families were collected that five specimens were identified at level of species. Among which, three genera and two species that marked by an asterisk are recorded for the first time from Iran.

The species of *Hypozeres translamellatus* has the most numerically specimens in sampling sites. The family of Scheloribatidae (*Scheloribates* sp.) has the highest total identified species. According to sampling data the families of Scheloribatidae, Tegoribatidae and Oribatulidae have the highest distribution in sampling sites respectively. Scientific name of each genus and species is presented:

*Heptacarus*\* sp., (Lohmanniidae); *Damaeolus asperatus*\* (Berlese, 1904), (Damaeolidae); *Oribatula* (*Zygoribatula*) *undulata* Berlese, 1916, (Oribatulidae); *Scheloribates fimbriatus* Thor, 1930. *S. praeincisus* (Berlese, 1910), (Scheloribatidae); *Hypozeres*\* *translamellatus*\* Wallwork, 1965, (Tegoribatidae); *Lamellobates*\* sp., (Mycobatidae).

**Key words:** Acari, New records, Oribatida, Assaluyeh and Lengeh ports, Iran

\* Corresponding Author, E-mail: [Mahmud.alikhani@gmail.com](mailto:Mahmud.alikhani@gmail.com)  
Received:1 jan 2011-Accepted:30 nov 2011