

## بررسی اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک در میزان عناصر معدنی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع طالقان)

حسین ارزانی<sup>۱</sup>، محمود حمیدیان<sup>\*۲</sup>، حسین آذرنیوند<sup>۳</sup>، محمد علی زارع چاهوکی<sup>۴</sup>

### چکیده

با توجه به اهمیت عناصر معدنی در تغذیه دام‌های چرا کننده از مرتع و تغییرات میزان عناصر در مراحل مختلف فنولوژیک در گیاهان، آگاهی دامداران و مرتعداران از این تغییرات برای برنامه ریزی صحیح ورود و خروج دام و تامین نیازهای تغذیه ای دام‌های چرا کننده از مرتع در زمان‌های مختلف فصل چرا، ضروری است. در این مطالعه میزان شش عنصر پرمصرف کلسیم، منیزیم، فسفر، کلر، سدیم و پتاسیم و پنج عنصر کم مصرف آهن، مس، روی، کبالت و منگنز در هشت گونه مرتعی پهنه برگ علفی *Prangus uloptera*, *Medicago sativa*, *Lotus goebelia*, *Trifolium montanum*, *Sanguisorba minor*, *Stachys inflate*, *Ferula ovina* و *Melilotus officinalis* مراتع طالقان اندازه گیری شد. برای تعیین اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک از تجزیه واریانس دو طرفه استفاده شد و در صورت معنی دار شدن اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک، از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد؛ با پیشرفت مراحل رشد گیاه، میزان عناصر پرمصرف و کم مصرف کاهش پیدا کردند، و بین مقدار روی، مس، منگنز، فسفر، کلر، پتاسیم و سدیم مورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژیک اختلاف معنی داری وجود نداشت، ولی بین مقدار منیزیم، کلسیم، آهن و کبالت هشت گونه در مراحل مختلف فنولوژیک تفاوت معنی دار در سطح ۹۹٪ وجود داشت.

**کلمات کلیدی:** عناصر معدنی، مراتع طالقان، گوسفندها، مرحله فنولوژیک، آزمون دانکن

۱ - عضو هیئت علمی، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، کرج، ایران

۲ - دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، کرج، ایران

۳ - عضو هیئت علمی، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، کرج، ایران

۴ - عضو هیئت علمی، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، کرج، ایران

انباستگی یون‌های سدیم و کلر نسبت به پتاسیم، کلسیم و منیزیم بیشتر است و اختلاف معنی داری بین میانگین غلظت هر یک از یون‌ها ر گونه‌ای مختلف وجود داشت<sup>(۱)</sup>، و داولتشینا و یولچیوا<sup>(۲)</sup> (۱۹۸۹)، در رابطه با ترکیب شیمیایی و معدنی *Salsola orientalis*, *Kochia prosterta* مطالعاتی انجام دادند که داده‌های مربوط به پروتئین خام، سلولز، خاکستر، فسفر و کلسیم در گیاهان مذکور را در چند مرحله رشد اندازه گیری کردند. نتایج نشان داد که ترکیب شیمیایی گیاه با تغییر سن تغییر یافت<sup>(۳)</sup>. و همچنین برکن و استیننس<sup>(۴)</sup> (۲۰۰۴) تغییرات فصلی غلظت عناصر کادمیوم و روی در گونه‌های مرتتعی بومی نروژ را مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که؛ که تنوع فصلی عناصر بخصوص در فصل بهار وجود دارد و غلظت عناصر در فصول مختلف و در گیاهان مختلف تغییر می‌یابد<sup>(۲)</sup>. تحقیقات سنجدی و همکاران<sup>(۳)</sup> (۲۰۰۵) نیز نشان می‌دهد عامل تغییرات فصلی در تغییر محتوای غذایی گونه مورد بررسی بسیار موثر است<sup>(۱۰)</sup>.

ور مقانی و همکاران<sup>(۴)</sup> (۲۰۰۶) عناصر معدنی گیاهان مرتتعی استان ایلام ( گونه‌های گندمیان و پهن برگ علفی) را مورد مطالعه قرار دادند و

## مقدمه

از مهم‌ترین عوامل محدود کننده عملکرد رشد و تولید مثل در حیوانات مزرعه به ویژه هنگام چرا در مرتع کمبود مواد معدنی یا عدم تعادل آن‌ها می‌باشد، کمبود مواد معدنی مهم در حیوانات نه تنها باعث کاهش تولید می‌گردد، بلکه می‌تواند به بیماری‌های متابولیکی سخت نیز منجر گردد (۱۰). یکی از عوامل موثر بر میزان عناصر معدنی در گیاهان مرتتعی مرحله رشد گیاه است، بدین معنی که مرحله بلوغ گیاه تأثیر مهمی روی غلظت مواد معدنی دارد. یکی از مهم‌ترین این تأثیرها کاهش غلظت فسفر است که به طور معمول با بالغ شدن گیاه رخ می‌دهد (۱). مرحله بلوغ نیز تأثیر مهمی روی مواد معدنی دارد (۱۱) و غلظت عناصر در فصول مختلف و در گونه‌های مختلف پهن برگ علفی و گندمیان تغییر می‌یابد. بالاترین سرعت جذب مواد معدنی تقریباً در مرحله رویشی گیاه صورت می‌گیرد. با افزایش سن گیاه در سرعت جذب مواد معدنی تغییراتی اساسی روی می‌دهد، این کاهش اصولاً به واسطه افزایش نسبی در مواد ساختمانی (دیوار سلولی و لیگنین) و ترکیبات نشاسته‌های ایجاد می‌شود (۶ و ۷).

عصری (1996) با بررسی عناصر معدنی چند گونه شور پسند به این نتیجه رسید که در این گیاهان

1 . Davletshina , Yulchieva

2. Brekken, Steinnes

3. Sanjay etal

مراحل مختلف فنولوژی در سارال کردستان نمودند. دریافتند که؛ میزان عناصر منگنز، روی و آهن در سه گونه مورد مطالعه به طور معنی داری باهم اختلاف داشته و مقایسه عناصر مورد نظر در مراحل یکسان در گونه های مختلف حاکی از عدم اختلاف معنی دار از لحاظ میزان مس در مرحله رویشی و آهن در مرحله بذردهی بود(۴)، و همچنین اسفندیاری (۲۰۰۸)، با اندازه گیری عناصر معدنی، کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم و روی در سه گونه گیاهی در سایت پشتہ عباس سبزوار بیان کرد که بین میزان عناصر معدنی، بین مراحل مختلف رشد و بین گونه ها از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود دارد و کلسیم، پتاسیم، سدیم، منیزیم، روی و فسفر هر گونه در مراحل مختلف فنولوژی با یکدیگر در سطح ۱٪ تفاوت معنی دار دارند(۵).

با توجه به اهمیت عناصر معدنی در تغذیه دام های چرا کننده از مرتع و تغییرات میزان عناصر در مراحل مختلف فنولوژیک در گیاهان و در نتیجه لزوم آگاهی دامداران و مرتعداران از این تغییرات برای برنامه ریزی صحیح ورود و خروج دام و تامین نیازهای تغذیه ای دام های چرا کننده از مرتع در زمان های مختلف فصل چرا، در این مطالعه میزان شش عنصر پرمصرف کلسیم، منیزیم، فسفر، کلر، سدیم و پتاسیم و پنج عنصر

دریافتند که اختلاف میانگین کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم و آهن در مراحل مختلف نمونه برداری معنی دار بوده در حالیکه میانگین منگنز، مس و روی در این مراحل اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد(۱۲). همچنین استر پرز کرونا و همکاران<sup>۱</sup> (۱۹۹۸) تأثیر فصل رشد را روی مقدار تولید، پروتئین، لیگنین، سلولز، همی سلولز و قابلیت هضم پذیری ماده خشک و همچنین تجمع عناصر معدنی را در نمونه های گیاهی علفزارهای نیمه خشک اسپانیا تعیین کردند، و نتیجه گیری کردند که در طی فصول رشد مقدار مواد معدنی کاهش پیدا کرد در حالی که فیبر افزایش پیدا کرد(۶). همچنین حیدریان آقاخانی و همکاران (۲۰۱۱)، در پژوهشی به منظور بررسی مقدار منیزیم، کلسیم، سدیم، پتاسیم و فسفر در چهار گونه بوته ای غالب و شور پسند مراتع بیابانی سبزوار در سه مرحله رویشی (رویشی، گلدهی و بذردهی)، با بررسی مراحل مختلف فنولوژیک در گونه های مذکور مشخص کردند که خاکستر، فسفر و منیزیم طی دوره رویش روند افزایشی، پتاسیم روند کاهشی و سدیم و کلسیم روند مشخصی نداشتند(۷). این عباسی و ساعدی (۲۰۰۹) اقدام به بررسی کمی عناصر کم مصرف در سه گونه مهم مرتعی در

.....بررسی اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک در میزان عناصر معدنی گیاهان .....۳۸

طالقان دارای شیب بالای ۴۵ درصد است، میزان بارندگی حوزه آبخیز طالقان در مناطق مختلف این حوزه متغیر بوده، اقلیم منطقه به روش دومارتن، اقلیم اصلی حوزه طالقان شامل مدیترانه‌ای، نیمه مرطوب، مرطوب و خیلی مرطوب است. از نظر سنگ‌شناسی قسمت اعظم منطقه از سنگ‌های آتشفسانی مربوط به سازند کرج و سنگ‌های Ngc و Ngm و gy1 تشکیل شده است (۳).

#### گونه‌های مورد مطالعه

نمونه برداری از گونه‌های مذکور در سه مرحله فنولوژیک، رویشی، گلدهی و بذر دهی به روش کاملاً تصادفی در مراتع گلینگ، فشنده، شهرک، کرکبود، حسنجون، جزینان و هرنج شهرستان طالقان انجام شد (جدول ۱).

کم مصرف آهن، مس، روی، کبات و منگنز در هشت گونه مرتوعی پهنه برگ علفی *Prangus uloptera* *Medicago sativa*, *Lotus goebelia*, *Trifolium montanum*, *Sanguisorba minor*, و *Stachys inflate*, *Melilotus officinalis* مورد استفاده گوسفند در مراحل رویشی، گلدهی و بذر دهی در مراتع طالقان اندازه گیری شد.

#### مواد و روش‌ها

##### منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخیز طالقان از زیر حوزه‌های آبخیز سفید ۱۳۲۵ کیلومتر مربع است که از مشخصات خاص این حوزه ارتفاع زیاد و شیب تند است. بطوریکه ارتفاع متوسط آن معادل ۲۵۰۰ متر و حداقل ارتفاع آن ۴۳۰۰ متر است. ۸۰ درصد حوزه آبخیز

جدول ۱- اسامی گونه‌های گیاهی مورد مطالعه

ردیف	نام گونه	نام تیره	کلاس خوشخوارکی	فرم رویشی
۱	<i>Ferula ovina</i>	Apiaceae	I	علفی
۲	<i>Prangus uloptera</i>	Apiaceae	I	علفی
۳	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceae	I	علفی
۴	<i>Lotus goebelia</i>	Fabaceae	I	علفی
۵	<i>Trifolium montanum</i>	Fabaceae	II	علفی
۶	<i>Melilotus officinalis</i>	Fabaceae	II	علفی
۷	<i>Sanguisorba minor</i>	Rosaceae	I	علفی
۸	<i>Stachys inflata</i>	Lamiaceae	III	علفی

## روش تحقیق

در هر مرحله رویشی، برای هر گونه سه تکرار بطور تصادفی و برای هر تکرار حداقل پنج پایه گیاهی از نقاط مختلف تیپ‌های گیاهی موجود در مناطق انتخاب و از یک سانتی متری سطح خاک برداشت گردید.

## اندازه‌گیری عناصر معدنی

جهت اندازه گیری عناصر کم مصرف (آهن، مس، روی، منگنز و کبات) در گونه های مورد مطالعه از دستگاه جذب اتمی مدل GBC 932 plus AB استفاده گردید، مقدار کلر، کلسیم و منیزیم در نمونه های گیاهی با روش تیتراسیون مشخص شد، برای اندازه گیری مقدار فسفر نمونه ها از دستگاه اسپکتروفوتومتر استفاده شد، مقدار سدیم و پتاسیم نمونه ها با استفاده از دستگاه فلیم فتوомتر مدل PFP7 اندازه گیری شد.

## محاسبات آماری

کلیه محاسبات آماری در نرم افزار SPSS و SAS انجام گرفت، ابتدا نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و همگن بودن واریانس ها توسط آزمون لیون بررسی شد، برای تعیین اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک از تجزیه واریانس دو طرفه استفاده شد، و در صورت معنی دار شدن اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک، از آزمون دانکن برای نشان دادن اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک استفاده شد.

نتایج نشان داد، بین مقدار روی، مس، منگنز، فسفر، کلر، پتاسیم و سدیم هشت گونه مورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژیک (اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک) اختلاف معنی داری وجود نداشت. بین مقدار منیزیم، کلسیم، آمن و کبات هشت گونه در مراحل مختلف فنولوژیک (اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک) تفاوت معنی دار در سطح ۹۹٪ وجود داشت، و با توجه به معنی دار شدن اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک در این چهار عنصر، از آزمون دانکن برای نشان دادن اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک این چهار عنصر با گونه های مورد مطالعه استفاده شد.

با پیشرفت مراحل رشد گیاه، میزان عناصر پر مصرف و کم مصرف کاهش پیدا کردند، به طوری که در ابتدایی رویش بیشترین و در انتهای رویش کمترین مقدار عناصر معدنی را به خود اختصاص داده، و میزان عناصر پر مصرف کلسیم، فسفر، پتاسیم، کلر، سدیم و منیزیم از مرحله رویشی به بذردهی به ترتیب ۴۵٪، ۴۹٪، ۳۶٪، ۳۴٪، ۱۷٪، ۳۴٪ کاهش پیدا کرد، و میزان عناصر کم مصرف آهن، منگنز، کبات، مس و روی به ترتیب از مرحله رویشی به بذردهی به ۳۰٪، ۲۳٪، ۵۱٪، ۳۴٪ و ۲۸٪ کاهش پیدا کرد.

نتایج بررسی اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک بر عناصر معدنی گیاهان مورد مطالعه در جداول ۲ تا

بررسی اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک در میزان عناصر معدنی گیاهان

جدول ۲ - اثر گونه و مرحله فنولوژیک در عنصر فسفر

منبع	میانگین مربعات	درجه آزادی	مقدار F
گونه	۱۵/۴۶	۷	۱۲/۷۳**
مرحله	۱۷/۰۴۹	۲	۱۴۰/۳۷**
گونه*مرحله	۰/۷۲	۱۴	ns .۰/۶
میزان خطا	۱/۲۱	۴۸	
کل		۷۲	

اختلاف معنی دار نیست<sup>ns</sup> \*\* معنی دار در سطح ۱٪ \* معنی دار در سطح ۵٪

جدول ۳ - اثر گونه و مرحله فنولوژیک در عنصر منیزیم

منبع	میانگین مربعات	درجه آزادی	مقدار F
گونه	۱/۵۵	۷	۱۱۷/۱۷**
مرحله	۱/۷۴	۲	۱۳۱/۵۸**
گونه*مرحله	۰/۰۴	۱۴	۳/۰۱**
میزان خطا	۰/۰۱	۴۸	
کل		۷۲	

\*\* معنی دار در سطح ۱٪ \* معنی دار در سطح ۵٪ ns اختلاف معنی دار نیست

جدول ۴ - نتایج آزمون دانکن برای اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک در عنصر منیزیم

گونه	مرحله رویشی	منیزیم (گرم بر کیلوگرم)
<i>F. ovina</i>	رویشی	۱/۵۶ ±۰/۰۶ cd
	گلددهی	۱/۰۳ ±۰/۰۴ f
	بذردهی	۰/۹۳ ±۰/۰۳ fg
	رویشی	۲/۱۲ ±۰/۰۷ a
<i>P. uloptera</i>	گلددهی	۱/۶۴ ±۰/۱۲ c
	بذردهی	۱/۳۳ ±۰/۰۲ e
	رویشی	۲/۰۸ ±۰/۰۹ a
	گلددهی	۱/۸۷ ±۰/۰۹ b
<i>M. sativa</i>	بذردهی	۱/۳۹ ±۰/۰۵ de
	رویشی	۰/۹۹ ±۰/۰۴ f
	گلددهی	۰/۷۶ ±۰/۰۲ gh
	بذردهی	۰/۵۴ ±۰/۰۶ i
<i>T. montanum</i>	رویشی	۱/۰۸ ±۰/۰۳ f
	گلددهی	۰/۹۱ ±۰/۰۲ fg
	بذردهی	۰/۷۴ ±۰/۰۱ ghi
	رویشی	۱/۹۳ ±۰/۱ ab
<i>S. minor</i>	گلددهی	۱/۴۳ ±۰/۰۲ de
	بذردهی	۱/۴۱ ±۰/۰۱ D E
	رویشی	۱/۰۵ ±۰/۰۳ f
	گلددهی	۰/۷۳ ±۰/۰۱ ghi
<i>S. inflata</i>	بذردهی	۰/۵۶ ±۰/۰۰ hi
	رویشی	۱/۱ ±۰/۱۴ e
	گلددهی	۰/۸۹ ±۰/۰۶ fg
	بذردهی	۰/۹۹ ±۰/۱۳ f
<i>M. officinalis</i>	رویشی	
	گلددهی	
	بذردهی	
	رویشی	

حرروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین گونه هاست

۴۱ ..... فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران، سال هفتم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۵

جدول ۵ - اثر گونه و مرحله فنولوژیک در عنصر پتابسیم

F مقدار	میانگین مربعات	درجه آزادی	منبع
۲۵/۳۵**	۱۳۲/۶۸	۷	گونه
۷۸/۲۷**	۴۰۹/۵۸	۲	مرحله
۰/۶۵ <sup>ns</sup>	۳/۴۲	۱۴	گونه * مرحله
	۵/۲۳	۴۸	میزان خطا
		۷۲	کل

\*\* معنی داری در سطح ۱٪ \* معنی دار در سطح ۵٪ <sup>ns</sup> اختلاف معنی دار نیست

جدول ۶ - اثر گونه و مرحله فنولوژیک در عنصر سدیم

F مقدار	میانگین مربعات	درجه آزادی	منبع
۴۸/۲۹**	۰/۰۳	۷	گونه
۲۴/۲۱**	۰/۰۲	۲	مرحله
۰/۵۴ <sup>ns</sup>	۰/۰۰۰	۱۴	گونه * مرحله
	۰/۰۰۱	۴۸	میزان خطا
		۷۲	کل

\*\* معنی داری در سطح ۱٪ \* معنی دار در سطح ۵٪ <sup>ns</sup> اختلاف معنی دار نیست

جدول ۷ - اثر گونه و مرحله فنولوژیک در عنصر کلسیم

F مقدار	میانگین مربعات	درجه آزادی	منبع
۲۳/۳۳**	۱۴/۵۲	۷	گونه
۲۰۰/۲۲**	۱۲۴/۶۲	۲	مرحله
۳/۱۱**	۱/۹۴	۱۴	گونه * مرحله
	۰/۶۲	۴۸	میزان خطا
		۷۲	کل

اختلاف معنی دار نیست<sup>ns</sup> \*\* معنی داری در سطح ۱٪ \* معنی دار در سطح ۵٪

جدول ۸ - نتایج آزمون دانکن برای اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک در عنصر کلسیم

کلسیم (گرم بر کیلوگرم)	مرحله رویشی	گونه
۹/۵۵ $\pm 0/۳۷\text{ c}$	رویشی	<i>F. ovina</i>
۷/۱۴ $\pm 0/۷۰\text{ efgh}$	گلدھی	
۵/۰۲ $\pm 0/۲۷\text{ ij}$	بذردهی	
۱۱/۰۹ $\pm 0/۳۲\text{ b}$	رویشی	
۷/۵۶ $\pm 0/۴۰\text{ def}$	گلدھی	<i>P. uloptera</i>
۶/۵۴ $\pm 0/۱۸\text{ fghi}$	بذردهی	
۱۲/۸۸ $\pm 0/۸۷\text{ a}$	رویشی	
۸/۷۰ $\pm 0/۳۷\text{ cd}$	گلدھی	
۵/۷۷ $\pm 0/۰۳\text{ hi}$	بذردهی	<i>M. sativa</i>
۷/۰۹ $\pm 0/۲۰\text{ efgh}$	رویشی	
۵/۹۶ $\pm 0/۱۱\text{ ghi}$	گلدھی	
۵/۰۶ $\pm 0/۱۳\text{ ij}$	بذردهی	
۹/۰۳ $\pm 0/۵۹\text{ c}$	رویشی	<i>L. goebelia</i>
۶/۱۲ $\pm 0/۱۹\text{ fghi}$	گلدھی	
۵/۱ $\pm 0/۷۸\text{ ij}$	بذردهی	
		<i>T. montanum</i>

بررسی اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک در میزان عناصر معدنی گیاهان ..... ۴۲

۱۰/۹۳	$\pm 0/۲۲ b$	رویشی	<i>S. minor</i>
۷/۳۶	$\pm 0/۵۸ defg$	گلدهی	
۵/۸۹	$\pm 0/۰۴ ghi$	بذردهی	
۷/۳۴	$\pm 0/۷۲ defg$	رویشی	<i>S. inflata</i>
۵/۵۶	$\pm 0/۲۷ i$	گلدهی	
۴/۰۵	$\pm 0/۰۵ j$	بذردهی	
۱۱/۵۹	$\pm 0/۶۹ ab$	رویشی	<i>M. officinalis</i>
۸/۴۱	$\pm 0/۷۰ cde$	گلدهی	
۶/۰۱	$\pm 0/۱۲ ghi$	بذردهی	

حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین گونه هاست

جدول ۹ - اثر گونه و مرحله فنولوژیک در عنصر کل

F	میانگین مربعات	درجه آزادی	منبع
۱۶/۲۵**	۱۲/۱۳	۷	گونه
۶۴/۴**	۴۸/۰۵	۲	مرحله
۷۵۶ ns	۱/۱۶	۱۴	گونه * مرحله
	۰/۷۵	۴۸	میزان خطا
		۷۲	کل

\*\* معنی دار در سطح ۱٪ \* معنی دار در سطح ۵٪ ns اختلاف معنی دار نیست

جدول ۱۰ - اثر گونه و مرحله فنولوژیک در عنصر آهن

F	میانگین مربعات	درجه آزادی	منبع
۱۹۲/۶۳**	۱۲۳۰۱۷/۹۸	۷	گونه
۷۵/۶۴**	۴۸۳۰۰۵/۹۹	۲	مرحله
۵/۰۵**	۳۲۲۶/۲۵	۱۴	گونه * مرحله
	۶۳۸/۶۲	۴۸	میزان خطا
		۷۲	کل

\*\* معنی دار در سطح ۱٪ \* معنی دار در سطح ۵٪ ns اختلاف معنی دار نیست

جدول ۱۱ - نتایج آزمون دانکن برای اثر متقابل گونه و مرحله رویشی عنصر آهن

آهن (میلی گرم بر کیلو گرم)	مرحله رویشی	گونه
۲۲۵/۰۷	$\pm ۱۷/۹۴ ij$	<i>F. ovina</i>
۱۹۳/۷۸	$\pm ۶/۸۰ jk$	
۱۶۰/۵۲	$\pm ۷/۴۰ k$	
۳۸۲/۳۴	$\pm ۱۳/۸۸ ef$	<i>P. uloptera</i>
۳۴۱/۲۴	$\pm ۲۴/۸۷ fg$	
۲۷۰/۱	$\pm ۱۷/۰۳ H$	
۴۹۷/۳۹	$\pm ۱۰/۰۶ c$	<i>M. sativa</i>
۴۱۱/۲۵	$\pm ۲۷/۷۴ de$	
۳۰۱/۳	$\pm ۸/۳۸ gh$	
۲۰۴/۸۹	$\pm ۲/۱۵ jk$	<i>L. goebelia</i>

۱۷۲/۶۹	$\pm 8/16 k$	گلدهی	
۱۷۲/۳۴	$\pm 1/97 k$	بذردهی	<i>T. montanum</i>
۳۴۱/۶	$\pm 16/89 fg$	رویشی	
۲۹۷/۹۵	$\pm 9/64 gh$	گلدهی	
۲۷۲/۷	$\pm 5/24 h$	بذردهی	
۳۱۱/۱	$\pm 1/41 gh$	رویشی	<i>S. minor</i>
۲۸۲/۴۵	$\pm 2/49 h$	گلدهی	
۲۷۵/۰۹	$\pm 9/62 h$	بذردهی	
۶۱۶/۱۳	$\pm 21/66 a$	رویشی	<i>S. inflata</i>
۵۷۱/۴۵	$\pm 6/88 b$	گلدهی	
۴۵۱/۴۸	$\pm 9/62 d$	بذردهی	
۳۰۷/۳۶	$\pm 2/47 gh$	رویشی	<i>M. officinalis</i>
۲۷۱/۲۶	$\pm 2/47 h$	گلدهی	
۲۶۴/۷۴	$\pm 2/47 hi$	بذردهی	

حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین گونه هاست

جدول ۱۲- اثر گونه و مرحله فنولوژیک در عنصر کبات

F مقدار	میانگین مربعات	درجه آزادی	منبع
۱۵/۵۱**	۲۴/۳۸	۷	گونه
۱۰۰/۴۵**	۱۵۷/۸۷	۲	مرحله
۳/۴۶**	۵/۴۴	۱۴	گونه** مرحله
	۱/۵۷	۴۸	میزان خطا
		۷۲	کل

\*\* معنی داری در سطح٪ ۱ \* معنی دار در سطح٪ ۵ ns اختلاف معنی دار نیست

جدول ۱۳- نتایج آزمون دان肯 برای اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک عنصر کبات

کبات (میلی گرم بر کیلوگرم)	مرحله رویشی	گونه
۲۲۵/۰۷ $\pm 0/66 ij$	رویشی	<i>F. ovina</i>
۱۹۳/۷۸ $\pm 0/68 jk$	گلدهی	
۱۶۰/۵۲ $\pm 0/41 k$	بذردهی	
۳۸۲/۳۴ $\pm 0/61 ef$	رویشی	<i>P. uloptera</i>
۳۴۱/۲۴ $\pm 0/66 fg$	گلدهی	
۲۷۰/۱ $\pm 0/96 h$	بذردهی	
۴۹۷/۳۹ $\pm 0/96 c$	رویشی	<i>M. sativa</i>
۴۱۱/۲۵ $\pm 0/83 de$	گلدهی	
۳۰۱/۳ $\pm 1/13 gh$	بذردهی	
۲۰۴/۸۹ $\pm 0/70 jk$	رویشی	<i>L. goebelia</i>
۱۷۲/۶۹ $\pm 0/64 k$	گلدهی	
۱۷۲/۳۴ $\pm 0/66 k$	بذردهی	

.....بررسی اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک در میزان عناصر معدنی گیاهان .....۴۴

۳۴۱/۶	$\pm 0.053 fg$	رویشی	<i>T. montanum</i>
۲۹۷/۹۵	$\pm 1.05 gh$	گلدهی	
۲۷۲/۷	$\pm 0.40 h$	بذردهی	
۳۱۱/۱	$\pm 1.35 gh$	رویشی	
۲۸۲/۴۵	$\pm 0.46 h$	گلدهی	<i>S. minor</i>
۲۷۵/۰۹	$\pm 0.62 h$	بذردهی	
۶۱۶/۱۳	$\pm 0.34 a$	رویشی	
۵۷۱/۴۵	$\pm 0.23 b$	گلدهی	<i>S. inflata</i>
۴۵۱/۴۸	$\pm 0.65 d$	بذردهی	
۳۰۷/۳۶	$\pm 1.22 gh$	رویشی	
۲۷۱/۲۶	$\pm 0.32 h$	گلدهی	<i>M. officinalis</i>
۲۶۴/۷۴	$\pm 0.32 hi$	بذردهی	

حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین گونه هاست

جدول ۱۴- اثر گونه و مرحله فنولوژیک در عنصر روی

F	مقدار	میانگین مربعات	درجه آزادی	منبع
۱۴/۳۱**		۳۴۴/۷۸	۷	گونه
۲۶/۸۷**		۶۴۶/۱۵	۲	مرحله
۰/۶۵ ns		۱۵/۷	۱۴	گونه * مرحله
		۲۴/۰۹	۴۸	میزان خطا
			۷۲	کل

\*\* معنی داری در سطح ۱٪ \* معنی دار در سطح ۵٪ ns اختلاف معنی دار نیست

جدول ۱۵- اثر گونه و مرحله فنولوژیک در عنصر منگنز

F	مقدار	میانگین مربعات	درجه آزادی	منبع
۱۹/۴۱**		۷۸۴/۴۴	۷	گونه
۶۸/۹**		۲۷۸۴/۳۱	۲	مرحله
۰/۸۷ ns		۳۵/۰۷	۱۴	گونه * مرحله
		۴۰/۴۱	۴۸	میزان خطا
			۷۲	کل

\*\* معنی داری در سطح ۱٪ \* معنی دار در سطح ۵٪ ns اختلاف معنی دار نیست

جدول ۱۶- اثر گونه و مرحله فنولوژیک در عنصر مس

F	مقدار	میانگین مربعات	درجه آزادی	منبع
۵۰/۷۷**		۲۳/۶۲	۷	گونه
۳۲۲/۹۵**		۱۵۰/۲۳	۲	مرحله
۱/۷ ns		۰/۷۹	۱۴	گونه * مرحله
		۰/۴۶	۴۸	میزان خطا
			۷۲	کل

\*\* معنی داری در سطح ۱٪ \* معنی دار در سطح ۵٪ ns اختلاف معنی دار نیست

طی رشد تحت تأثیر عوامل مختلف تغییرات زیادی می‌نمایند. مرحله بلوغ نیز تأثیر مهمی روی مواد معدنی دارد و غلظت عناصر در فضول مختلف و در گونه‌های مختلف پهنه‌برگ علفی و گندمیان تغییر می‌یابد. بالاترین سرعت جذب مواد معدنی تقریباً در مرحله رویشی گیاه صورت می‌گیرد. با افزایش سن گیاه در سرعت جذب مواد معدنی تغییراتی اساسی روی می‌دهد، این کاهش اصولاً به واسطه افزایش نسبی در مواد ساختمانی (دیوار سلولی و لیگنین) و ترکیبات ناشاسته‌های ایجاد می‌شود (۱۲، ۹، ۲). که این نتایج با تحقیقات و داولتشینا و یولچیوا، (۱۹۸۹)، برکن و استینس (۲۰۰۴)، استر پرز و همکاران (۱۹۹۸)، حیدریان و همکاران (۲۰۱۱) و سنجی و همکاران (۲۰۰۵) مطابقت دارد (۱۰، ۲، ۳، ۶، ۷، ۱۰). با توجه به اینکه میزان هر ۱۱ عنصر از مرحله رویشی به بذردهی کاهش پیدا می‌کند، چرا هر چه بیشتر در مراحل ابتدایی رشد گیاهان صورت گیرد دام میزان عناصر بیشتری را دریافت می‌کند ولی با توجه به آسیبهای که چرای دام در مرحله رویشی، به گیاهان وارد می‌کند توصیه می‌شود که چرای دام در ابتدا یا اواسط مرحله گلدهی صورت گیرد.

## بحث و نتیجه‌گیری

بین مقدار روی، مس، منگنز، فسفر، کلر، پتاسیم و سدیم هشت گونه مورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژیک (اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک) اختلاف معنی داری وجود نداشت، ابن عباس و ساعدی (۲۰۰۹) بیان کردند میزان مس در مرحله رویشی در گونه‌های مختلف اختلاف معنی داری ندارد (۴) و ورمقانی و همکاران (۲۰۰۶) نیز بیان کردند که اختلاف میانگین منگنز، مس و روی در مراحل مختلف اندازه‌گیری اختلاف معنی داری را نشان نمی‌دهد (۱۲). بین مقدار منیزیم، کلسیم، آهن و کبات هشت گونه در مراحل مختلف فنولوژیک (اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک) تفاوت معنی دار در سطح ۹۹٪ وجود داشت، که این نتیجه با نتایج عصری (۱۹۹۶) و اسفندیاری (۲۰۰۵) مطابقت داشت (۱، ۵).

در این تحقیق با پیشرفت مراحل رشد گیاه، میزان عناصر پر مصرف و کم مصرف کاهش پیدا کردند، به طوری که در ابتدایی رویش بیشترین و در انتهایی رویش کمترین مقدار عناصر معدنی را به خود اختصاص داده، که عنصر کبات با ۵۱٪ و عنصر سدیم با ۱۷٪ بیشترین و کمترین کاهش را از مرحله رویشی به بذردهی گونه‌های مورد مطالعه را داشتند. مواد معدنی گیاهان در

**References**

1. Asri ,y 1996.Content of water , ash and mineral elements of several species of halophyte plants . journal of research and constrauction.30(1): 46-50.( in persian)
2. Brekken, A & E. Steinnes. 2004. Seasonal concentrations of cadmium and zinc in native pasture plants: consequences for grazing animals, Science of the Total Environment, 181–195.
3. Davletshina M.N & M.T Yulchieva,. 1989. Chaemical and mineral composition of *Kochia prostrata (L.) Schrad. Subsp. Grisea pratov* and *salsola orientalis S.G.Gmel*, Journal of Problems of Desert Development, 5: 78-79.
4. Ebne abbasi,R& K Saeedi,. 2009.Quantitative Analysis of some micronutrients of three important rangeland species in different phonological stages (Saral ,Kurdistan). Rangeland journal3, 1. 69-78.(in persian)
5. Esfandiari kalaei, F. 2008. Compare quality indices among three species of forage in Sabzevar. A thesis for Master of Science. Tarbiat Modarres university, faculty of natural resources79 pages.( in persian)
6. Esther Perez Corona M.,. B.R., Vazquez de Aldana, B., Garcia Criado& A, Garcia Ciudad,. 1998. Variations in nutritional quality and biomass production of semiarid grasslands, Journal of Range management, 51(1) : 570-576.
7. Heidarian Aghakhani,M, G.H. Dianati Tilaki., A.A Nghiopor borj& H File kesh,. 2011 . AExamining some of the minerals of dominant halophyte species in Sabzevar desert rangelands. Rangeland journal,5(1): 27-34
8. McDowell, L.R. 1985. Nutrition of Grazing Ruminant in warm climate 1st ed. Academic Press Inc., California U.S.A., 443.
9. Ramirez-Orduna, R. R.G. Ramirez, H. Gonzalez-Rodriguez & G.F.W. Haenlein, 2005. Mineral content of browse species from Baja California Sur, Mexico. Small Ruminant Research 57: 1–10
10. Sanjay, K & A. Anjali., Gopal S. 2005. Biomass availability and forage quality of *Eurotia ceratoides* Mey in the rangelands of Changthang, eastern Ladakh. Current Science, 89: 201-204.
11. Taghavi, N& R. Nematzadeh. 2002. Erosion and sediment study at Taleghan town basin. A thesis submitted for bachelor of rangeland and watershed, university of Tehran, faculty of natural resources, 58 (in persian).
12. Varmaghani.S, M.A, Musavi, & H ,Jafari, (2006). Identifying the mineral elements of rangeland species of Ilam province journal of research and constrauction.73: 103-109 (in persian).