

مروری از تکنیک‌های "بایواسی" در تحقیقات علفکش‌ها

A Review of Bioassay Techniques in Herbicide Investigation

حسین موسوی نیا^۱

چکیده:

روش‌های "بایواسی" که در مطالعات علف‌کش‌ها بکار می‌روند بر اساس عکس‌العمل اورگانسیم‌های انتخاب شده - گیاهان عالی یا میکروارگانسیم‌ها - نسبت به مواد شیمیایی هستند. روش‌های مختلف ارزیابی بکار می‌رود: جوانه زنی، وزن یا اندازه قسمت‌های گیاه، تغییرات در فعالیت‌های فیزیولوژیکی نظیر فتوسنتز و تعرق، و علائم شاخص. چندین "بایواسی" خاص تشریح گردید. روابط دز-عکس‌العمل تحت تأثیر سن گیاه شاخص و شرایط محیطی رشد قرار می‌گیرند. نتایج می‌تواند بصورت صوری یا توسط اندازه‌گیری‌های واقعی محاسبه گردد، برای تفسیر صحیح میبایست شاهدها و استانداردهای مناسب در هر آزمایش شامل گردد. مثالهایی از روش‌های "بایواسی" داده شده است تا جنبه‌های مختلف رفتار علف‌کش‌ها تحقیق گردد: اثرات خاک روی علف‌کش‌ها، ناپدید شدگی علف‌کش‌ها از سطح خاک، حرکت علف‌کش‌ها در خاک، تجزیه و دوام علف‌کش‌ها.

مقدمه

در عمل، رشد گونه‌های حساس در خاک-های محتوی مقادیر بسیار کم علف‌کش می‌تواند یک روش آزمایش ساده، سرراست، و به آسانی قابل استفاده باشد. علیرغم پیشرفت‌هایی که در روش‌های "آنالیتیکی" بعمل آمده است، "بایواسی" ها همچنان یک وسیله عمده برای تعیین کیفی و کمی علف‌کش‌ها باقی می‌مانند (Horowitz, 1976).

مزایا و محدودیت‌های بایواسی‌ها قبلاً توصیف شده‌اند (Behrren, 1970) و (Santelmann, 1972). دلایل اصلی برای کاربرد وسیع بایواسی‌ها در تحقیقات علف‌کش‌ها احتمالاً سادگی نسبی و قابلیت تغییر آنها است.

کنترل گیاهان هرز در مزرعه توسط ترکیبات شیمیایی بر این اساس است که علف‌کش‌ها از خاک آلوده به داخل گونه‌های گیاهی حرکت خواهند کرد. یک کشاورز یا مزرعه‌دار، که تناوب‌های زراعی بکار می‌برد، می‌بایست بداند که خواص گیاه‌کشی (فیتوتاکسیک) یک ترکیب از خاکی که از قبل تحت کاربرد علف‌کش قرار گرفته است ناپدید گردیده است پیش از آنکه او یک گیاه زراعی حساس را در آن کشت نماید؟ یک "بایواسی"، با استفاده از یک نبات زراعی حساس در خاک آلوده بعنوان محیط رشد، می‌تواند اطلاعات مفیدی در این زمینه بدست دهد (Lavy and Santelmann, 1986).

۱- آزمایش جوانه زنی: بسیاری از علف کش-ها به شدت از جوانه زنی گونه های حساس جلوگیری می کنند ولی آزمایش های قلیلی بر اساس صرفاً تعداد جوانه زنی صورت گرفته است. غلظت های "سابلتال" ^۱ غالباً باعث بازداری طویل شدگی "رادیکل" ^۲ یا "شوت" ^۳ می شوند. حوزه غلظت ها به قدر کافی بزرگ گرفته می شود تا اندازه گیری های معتبر را اجازه دهد. بطور شاخص، طویل شدگی ریشه یا "شوت" بعد از یک "انیکوباسیون" ^۴ ۹۶-۲۴ ساعت مشاهده می شود (Horowitz, 1969). آزمایش های بایواسی بازداری طویل شدگی ریشه در سال های ۱۹۴۰ برای کشف سریع 2,4-D و با استفاده از ذرت (Swanson, 1946) و خیار (Ready and Grand, 1942) صورت گرفته است. در این آزمایش ها از "پتریدیش" استفاده شده است. "بایواسی" های پتریدیش ساده، سریع، و برای تعیین غلظت های علف کش در محلول آبی یا در خاک مفید هستند (Lavy and Santelmann, 1986). اندازه گیری طویل شدگی ریشه برای علف-کش هایی غیر از 2,4-D نیز گزارش شده است، از آن جمله برای "کاربامات ها" ^۵ (Roberts and Wilson, 1962) و "دای نایتروانیلین ها" ^۶ (Camper and Beckie et al., 1990) Jacques and Harvey, Carter, 1974 (1974). پارکر (Parker, 1966) در تکنیکی

هدف این مقاله نشان دادن این نکات، با مرور روش های مختلف ارزیابی و با ارائه مثال هایی از کاربردهای بایواسی ها در تحقیقات علف کش-هاست.

روش های ارزیابی:

انتخاب اورگانسیم های شاخص (گونه های بایواسی): اثرات علف کش روی گیاهان، عموماً، خاص نیست، و بنابراین اورگانسیم های مختلف می توانند بعنوان یک شاخص برای یک علف-کش معین بکار روند و بر عکس، بسیاری علف-کش ها، گاهی اوقات حتی متعلق به گروه های شیمیایی مختلف، می توانند توسط یک اورگانسیم آزمایش شوند. شاخص مناسب می بایست نسبت به مقادیر بسیار کم علف کش حساس باشد و توسط علائم واضح، به آسانی قابل مشاهده و قابل اندازه گیری، عکس العمل نشان دهد. میکرو-ارگانسیم ها در بعضی بایواسی ها بکار رفته اند (Thomas et al., 1973) ولی اکثر بایواسی-های علف کش گیاهان عالی را بکار می برند. یولاف (*Avena sativa*) احتمالاً متداول-ترین گیاه آزمایشی مورد استفاده است. زیرا نسبت به بسیاری از علف کش ها دارای حساسیت مشخص است و به آسانی رویانده می شود. "کرافتس" (Crafts, 1935) یک "بایواسی" برای مطالعه رفتار "آرسنیت سدیم" و "کلرات سدیم" در خاک های کالیفرنیا نشان داد. تعدادی گونه های دیگر بطور وسیع برای بیش از یک گروه از علف کش ها بکار رفته اند.

پارامترهای ارزیابی:

عکس العمل گیاه شاخص نسبت به علف-کش ها می تواند به طرق مختلف ارزیابی گردد.

¹- Sublethal

²- Radicle

³-Shoot

⁴- Incubation

⁵- Carbamates

⁶- Dinitroanilines

"پرونامید"^۵ (Roberts and Ricketts, 1973)، لولیوم برای "دایکلوبنیل"^۶ (Horowitz, 1966)، کاهو برای "پیکلورام"^۷ (Reid and Hurtt, 1969)، و کاهو برای "ای پی تی سی"^۸ (Donald, 1981) را نام برد.

۲- ارزیابی از روی گیاهان: تعیین وزن متداول-ترین ارزیابی است که در "بایواسی‌ها" بکار می‌رود. معمولاً قسمت‌های هوایی وزن می‌شوند چون جداسازی ریشه‌ها از خاک کار دشواری است. مشاهدات بر اساس وزن تر (تازه) و وزن خشک صورت می‌گیرد (Peek et al., 1989, Rogers et al., 1986) و معمولاً نتایج مشابه می‌دهند (Dubey and Freema, 1963, Santelmann et al., 1971) و بنابراین تعیین وزن خشک اغلب ضرورت ندارد.

برای بسیاری از مواد بازدارنده فتوسنتز رشد "شوت" قبل از ظهور علائم آسیب کاهش می‌یابد. از این رو اندازه‌گیری طول برگ یا ارتفاع گیاه می‌تواند بدون برهم زدن وضع طبیعی گیاه به کرات صورت گیرد، و بدین ترتیب ایجاد یک ارزیابی از فعالیت علف‌کشی یک علف‌کش می‌کند که ممکن است ارزیابی وزنی را تأیید یا جایگزین آن گردد. هنگامی که اندازه‌گیری‌های مکرر صورت می‌گیرد یا داده‌های یادداشت شده در سنین مختلف مقایسه می‌شوند تغییرات آشکار از لحاظ حساسیت با سن گیاه می‌بایست مورد توجه قرار داده شود (Horowitz, 1976). در-

که بکار برده است، پتریدیش‌هائی را که در آنها "سورگوم" کاشته شده بود در وضع ایستاده، تا حدی کج قرار دارد. این وضع سبب گردید که ریشه‌ها و شوت‌ها در امتداد سرپوش شفاف رشد نمایند، و بدین طریق طویل شدگی می‌تواند به آسانی در ماسه یا خاک دنبال گردد. (شکل ۱)

اثرات "اللوپاتیکی"^۱ عصاره‌های گیاهی روی جوانه‌زنی بذور را نیز می‌توان توسط "بایواسی‌های" پتریدیش تعیین نمود (Barnes et al., 1986 و Smith, 1989).

مزیت خاص در آزمایش‌های جوانه‌زنی سرعت و امکان نگهداری سرتاسر سیستم یعنی، علف‌کش، محیط کشت، گیاه شاخص - محصور شده تحت شرایط ثابت است (Horowitz, 1976). بنابراین، این آزمایش برای ترکیبات فرار نظیر "پبولیت"^۲ (Horowitz, 1966) یا علف-کش‌هائی که به آسانی نشت می‌شوند نظیر "دایفن-امید"^۳ (Horowitz and Hulin, 1971a) بکار رفته است.

خیار، سورگوم، و یولاف گونه‌های اصلی هستند که در آزمایش‌های جوانه‌زنی بکار می‌روند ولی آنها در آن مرحله نسبت به ترکیبات باز دارنده فتوسنتزی حساس نیستند (Kratky and Warren, 1971). در میان گونه‌های دیگری که برای جوانه‌زنی در "بایواسی‌های" پتریدیش" بکار رفته اند می‌توان کتان برای "اندوتال"^۴ (Hiltibran, 1962)، هفت بند برای

⁵ -Pronamide
⁶ -Dichlibenil
⁷ -Picloram
⁸ -EPTC

1 - Allelopathic effects
2 - Pebulate
3 -Diphenamid
4 - Endothal

برای "بایواسی" بکار رود (Lavy and Santelmann, 1986, Phillips, 1959).

۳- اثرات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی: تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، و ساختمانی گیاهان که توسط علفکش های " اترازین"^۲ و "مونورون"^۳ ایجاد می شود، مرور گردیده است (Ashton, 1965). بعضی از این اثرات با میزان دز مربوط است و بنابراین می توانند برای ارزیابی "بایواسی" بکار روند.

کاهش فعالیت فتوسنتزی توسط علفکش- های باز دارنده فتوسنتز روی دیسک های برگ (Eshel, 1969) یا روی گیاه دست نخورده (Van Oorschot, 1970) اندازه گیری گردید. تبادل CO₂ بعد از فقط چند ساعتی که دیسک ها یا گیاه دست نخورده در معرض علفکش قرار گرفت بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافت.

کلروسیس ممکن است توسط تعیین مقدار کلروفیل به طریق " اسپکتروفوتومتری "^۴ (Shea et al., 1983) یا بطریق صوری (Parker, 1965, Rogers et al., 1986) ارزیابی گردد. سانتلمان و همکاران (Santelmann et al., 1971) نشان دادند که مصرف آب گیاهان که در محیط کشت آلوده به " پرومترین "^۵ رویانده شدند چندین روز پیش از ظهور علائم آسیب تقلیل یافت و ارزیابی "تاکسیسیتی"^۶ بر اساس مصرف آب حساستر از ارزیابی استنتاج شده از داده های وزن یا طول بود.

حالیکه طول برگ روی گیاهان گراس به آسانی اندازه گیری می شود، روی گونه های دیگر اندازه گیری های دیگری می تواند مورد توجه واقع شود، مثلاً، طول دم برگ اولین برگ سه برگچه ای در لگوم ها.

مشاهدات وزن تر (تازه)، وزن خشک، و طول گیاه معمولاً نتایج مشابهی ایجاد می کنند (Dubey and Freema, Crafts, 1935) Lynd et al., Horowitz, 1976, 1963, 1966). هر چند در مورد علفکش هایی که ایجاد ناهنجاری در " شوت " می کنند، ارقام ارتفاع می بایست با دقت بکار روند. برای مثال، در مورد "تایوکاربامات ها"^۱ گزارش شده است که کاهش در ارتفاع بیشتر از کاهش در وزن بوده است (Koren et al., 1968). یادداشت هر دو ارزیابی در آزمایش هایی که انواع مختلف علف- کش بکار می رود مفید است (Horowitz and Blumenfeld, 1973).

بعضی محققین سیستم درجه بندی صوری تخمین رشد نسبی گیاه یا تخمین شدت آسیب ارزیابی می شود (Day et al., 1961, Horowitz and Blumenfeld, 1973, Scifres et al., 1972). لازم است که یک گروه تیمار نشده یا صفر دز از گیاهان در " بایواسی " شامل گردد تا هر عکس العمل طبیعی نسبت به شرایط محیط تعیین شود. یک چنین سیستم درجه بندی صوری می تواند همراه با وزن خشک " شوت " در یک شاخص رشد

²- Atrazine
³-Monuron
⁴-Spectrophotometry
⁵-Prometryn
⁶-Toxicity

¹-Thiocarbamate

کلروفیل به طریق "اسپکتروفتومتری" (Hess, 1980, Kratky and Warren, 1971), آزاد سازی o_2 (Kratky and Warren, 1971), و اندازه گیری یا تخمین صوری ناحیه بازداری (Helling et al., 1971), Templeton and Hurtt, 1973) را می‌توان ذکر نمود.

هلینگ و همکاران (Helling et al., 1971) در روش خود با استفاده از سوسپانسیون *Chlorella* حرکت علف‌کش‌ها را روی صفحات "کروماتوگرافی لایه-نازک"^۵ مشاهده نمودند. توماس و همکاران (Thomas et al., 1973) دیسک‌های کاغذی کوچک محتوی ترکیبات آزمایش شده را روی صفحات آگار که روی آنها *Chlorella pyrenoidosa* و *Bacillus subtilis* کشت شده بود، قرار دادند و ناحیه بازداری را اندازه گیری نمودند.

ترولاو و همکاران (Truelove et al., 1974) یک "بایواسی" دیسک لپه برای بازدارنده های فتوسنتز توصیف نمودند که هم حساس است و هم سریع. روش مزبور بر اساس توانایی دیسک-ها قرار دارد که در محلول‌های شاهد در نور شناور مانده و در تاریکی فرو می‌روند، در حالیکه در حضور علف‌کش‌هایی که روی آزاد سازی اکسیژن تأثیر می‌کنند، دیسک‌ها در نور و در تاریکی فرو می‌روند. از همین روش داسیلوا و همکاران (DaSilva et al., 1976) برای آزمایش چندین علف‌کش با نحوه‌های عمل متفاوت استفاده نمودند.

۴- علائم: علائم و نشانه‌هایی که شاخص یک گروه معین از علف‌کش‌ها یا یک ترکیب معین هستند می‌تواند برای یک "بایواسی" کیفی بکار روند و اگر شدت علائم با دز مربوط باشد، می‌تواند برای نتایج کمی نیز بکار رود. "اپیناستی"^۱ و بد شکلی ساقه‌های گوجه فرنگی (Leasure, 1958) و نقص شکل برگ‌های پنبه (Leonard et al., 1962) علائمی هستند که برای ارزیابی 2,4-D بکار رفته اند. علائم "فیتو تاکسیتی" "پیکلورام" روی لوبیا و سویا ارزیابی حساس‌تری از ارزیابی‌های وزن و ارتفاع هستند (Scifres et al., 1972). مشخصه سفید شدگی اولیه لپه‌های خردل که توسط "فلوئومتورون"^۲ ایجاد می‌گردد به طریق "اسپکتروفتومتری" اندازه گیری گردید و برای ارزیابی‌های کمی کار رفته است (Horowitz, 1976).

۵- تکنیک‌های خاص: "پارکر" (Parker, 1965) یک "بایواسی" سریع برای کشف علف‌کش‌های بازدارنده فتوسنتز بوجود آورد، که بر اساس "آنتاگونیسم" آنها با "پاراکوات" بود.

جلبک‌ها، و مخصوصاً *Chlorella*، برای بسیاری علف‌کش‌های بازدارنده فتوسنتز و تنفس مفید هستند. عکس‌العملشان توسط روش‌های مختلف اندازه گیری گردید، از آن جمله تعیین رشد به طریق "توربیدیمتری"^۳ (Addison and Bardsley, 1968) و به طریق "هموسیتومتری"^۴ (Hess, 1980)، تعیین

1 -Epinasti

2 -Fluometuron

3 -Turbidimetry

4 -Hemocytometry

5 -Thin-layer chromatography (TLC)

قلاب "هایوکوتیل"^۸ پنبه را، بعد از اینکه بذور از قبل در معرض نور ضعیف قرمز (۱۰ لوکس) قرار گرفتند، تحریک می کنند (Pillai and Davis, 1973).

شرایط آزمایش و توضیح نتایج

لازم است که در هر سری "بایواسی"، تیمارهای علفکش با شاهدهی بدون علفکش که تحت شرایط مشابه نگهداری شدند، مقایسه گردد (Anderson et Behrren, 1970). Lavy and Santelmann, al., 1968 (1986). داده های آزمایشی متعدد دال بر این است که شرایط محیطی که روی رشد و نمو گیاهان مورد آزمایش اثر می کنند، می توانند در توضیح فعالیت علفکش تأثیر نمایند.

فاکتورهایی که روی "فیتوتاکیسیستی" اثر می کنند شامل شدت نور (Ashton, 1965), Houseworth and Tweedy, 1971 Minshall, Lynch and Sweet, 1971 Stanger and Ridley, 1977, 1957 Van Oorschot, Appleby, 1972 Horowitz, 1970), طول روز (Horowitz, 1966), Burt et al., (Horowitz, 1966), حرارت (Houseworth and Tweedy, 1976, Mulder and Nalewaja, 1978, 1971 Wilson et al., Van Oorschot, 1970, Wu et al., 1974, 1976), مقدار آب محیط رشد (Horowitz, Dao and Lavy, 1978), Horowitz and Hulin, 1971a, 1966 Houseworth and Tweedy, 1971

اندازه گیری "فلورسنس"^۱ کلروفیل تکنیک دیگری است که در "بایواسی" علفکش های بازدارنده فتوسنتز بکار می رود. این تکنیک، که در آن از یک "فلورومتر"^۲ استفاده می شود، بر این واقعیت قرار دارد که علفکش های بازدارنده فتوسنتز فلورسنس کلروفیل را می افزایند. این تکنیک برای تعیین پتانسیل بازداری بعضی "ترای آزین ها"^۳ روی کلروپلاست های جدا شده نخود فرنگی (Brewer et al., 1979)، برای تعیین "بیوتیپ های"^۴ مقاوم به علفکش های "ترای آزین" (Ahrens et al., 1981)، و تأثیر علفکش های "بوتیدازول"^۵ و "اترازین" روی بعضی واکنش های نوری فتوسنتز در جلبک *Chlorella vulgaris* (Devlin et al., 1983) بکار رفته است. این تکنیک هم سریع است و هم معتبر است.

اثرات خاص متفاوتی که توسط علفکش ها ایجاد شده اند یادداشت شده است. این اثرات می توانند بصورت "بایواسی های" کمی توسعه یابند. برای مثال "امیترول"^۶ باعث از بین رفتن زمین گرائی و تغییر شکل توسعه تار کشنده ریشه در نشاهای پنبه می گردد (Counts, 1961). رشد بافت "کالوس"^۷ غیر فتوسنتزی توتون در تاریکی توسط چندین علفکش بازدارنده فتوسنتز کاهش می یابد (Jordan et al., 1966) و چند "ترای آزین" متقارن جوانه زنی بذور کاهو و باز شدن

¹- Fluorescence

²- Fluorometer

³- Triazines

⁴- Biotypes

⁵- Buthidazole

⁶- Amitrol

⁷-Callus

از صفر یا ۱ تا ۵ یا ۱۰، رو به بالا یا رو به پائین تغییر می‌کند. هر گیاه یا گلدان که تشکیل یک تکرار می‌دهد، می‌بایست در تیمارها و در شاهد بطور انفرادی درجه‌بندی گردد و محاسبه بر حسب میانگین یادداشت شده صورت پذیرد.

اندازه‌گیری‌های واقعی (وزن، طول، آزادسازی اکسیژن، و غیره) تیمارها عموماً بر حسب درصد شاهد مشابه توصیف می‌شوند. محاسبات اضافی بستگی به هدف و طرح آزمایش دارد. برای تعیین کمی علف کش، لازم است یک سری غلظت‌های استاندارد تحت شرایط محیطی مشابه تهیه گردد. هر چند، اگر هدف آزمایش مطالعه فاکتورهائی باشد که روی رفتار علف کش ها تأثیر می‌کنند، ممکن است مقایسه اثرشان روی ارگانسیم‌های شاخص بسنده باشد.

ارقام کاهش رشد، بر حسب درصد شاهد، برای بررسی نتایج یک آزمایش تحت شرایط استاندارد با ارزش هستند. هر چند، برای مقایسه بین فاکتورهائی که روی رشد اورگانسیم شاخص اثر می‌کنند (نظیر قسمت‌های تشکیل‌دهنده خاک)، یا مقایسه بین سری آزمایش‌ها (در مطالعات دوام علف کش‌ها در خاک)، استفاده از "ارقام فعالیت مشابه" بهتر است. ارقامی از ED50، GR50، ID50 (یعنی، دز علف کش مورد نیاز که به ترتیب ایجاد یک اثر ۵۰ درصد، یک کاهش رشد ۵۰ درصد، یک بازداری ۵۰ درصد در مقایسه با شاهد تیمار نشده نماید) غالباً در این نوع آزمایش بکار رفته است (Behrren, 1970, Lavy and Finney, 1964, Santelmann et al., Santelmann, 1986

Mulder, Kratky and Warren, 1973
Nelson et al., and Nalewaja, 1979
Wu et al., 1974, 1983، رطوبت نسبی
اتمسفر (Van, Lynch and Sweet, 1971)
Oorschot, 1970، نوع خاک (Harrison)
Mapplebeck and et al., 1976
Parochetti, 1973، Waywell, 1983
Rahman and Mattews, 1979
Upchurch et al., 1966، pH خاک
Ladlie et al., Colbert et al., 1975)
Weber et al., Weber et al., 1968, 1976
al., 1969) و تراکم گونه‌های گیاهی (Burrill)
Hoffman and Appleby, 1978
Lavy, 1978) هستند. محیط رشد اثر قابل
ملاحظه‌ای روی "فیتوتاکسیسیتی" دارد، اما
فاکتورهائی نظیر فشردگی خاک (Horowitz, 1966)
یا محل قرار گرفتن علف کش در خاک
Dawson, Appleby et al., 1968)
Nelson et al., Knake et al., 1967, 1963
Nishimoto et al., 1969, al., 1983
Parker, 1966) نیز ممکن است اثرات مهمی
اعمال کنند، فاکتورهای دیگری که دارای تأثیر
قابل ملاحظه‌ای است سن یا مرحله رشد گیاه تحت
آزمایش می باشد (Holly and Roberts, 1963, 1976, Horowitz)
هنگامیکه نتایج
آزمایش بطور صوری تخمین زده می شوند،
مهم است که دو منتهی الیه سطح درجه بندی به
روشنی تعریف شوند. سیستم عدد نویسی در میان
محققین فرق می‌کند، معمولاً سطح اندازه‌گیری

¹ - Phytotoxicity

Tompkin et al. and Santelmann, 1986
(al., 1968).

ناپدید شدگی از سطح خاک: "بایواسی" هائی در آزمایش هایی که با فرایند ناپدیدشدگی سر و کار دارند بکار رفته است. در مطالعات مربوط به تبخیر علفکش ها، یک "منبع"^۲ و یک "مقصد"^۳ برای بخارات علفکش می تواند در یک محفظه بسته بر قرار گردد، یا خاک تیمار شده (آلوده) می تواند در معرض یک جریان هوا قرار گیرد. غلظت علفکش که باقی می ماند یا از طریق بخار شدگی منتقل می گردد، توسط "بایواسی" اندازه گیری می شود (Burnside et al., 1961, Leasure, 1958, Horowitz, 1966, Talbert, Swann and Behrens, 1972 et al., 1971). (شکل های ۲ و ۳)

تجزیه نوری می تواند از طریق آزمایش توسط روشن سازی علفکش ها در محلول، روی سطح مصنوعی یا روی خاک، با لامپ های "ماوراء بنفش" یا نور خورشید ایجاد گردد. فعالیت علف-کشی، بعد از در معرض گذاری و مقایسه با تیمارهایی که در معرض نور قرار نگرفته اند، توسط "بایواسی" اندازه گیری می گردد (Comes and Timmons, 1965, Sheets, Parochetti and Hein, 1973, Weldon and Taylorson, 1966, 1963, Wright and Timmons, 1961, Warren, 1965). در آزمایش هایی که روی مجموعه اثرات در معرض گذاری در هوای آزاد انجام می شود عموماً تشخیص بین فاکتورهای

Templeton and Hurtt, al., 1971
(1973).

کاربرد "بایواسی ها" در تحقیقات علفکش ها
روش های "بایواسی" به کار رفته اند تا بسیاری جنبه های علمی رفتار علفکش در محیط تحقیق گردد. مونهایی از روش ها و برخوردها در تحقیقات علفکشی که بر اساس "بایواسی" قرار دارند در بخش های زیر خلاصه می شوند.

اثرات خاک: اثر فاکتورهای خاک روی فعالیت علفکشی می تواند توسط "بایواسی" با همبسته کردن "فیتوتاکسیسیتی" با مشخصات فیزیکی و شیمیائی مناسب خاک تعیین گردد (Harris and Groves et al., 1985, Horowitz and Hulin, Sheets, 1965, Rogers et al., Knake et al., 1967, 1971a, Rogers et al., 1986, al., 1986, Upchurch, 1958). "بایواسی ها" همچنین می توانند روی پریپاراسیون های مصنوعی خاک بکار روند (Coffey and Warren, 1969, Eshel, Doherty and Warren, 1969, Horowitz et al., and Warren, 1967, 1974, Lynd et al., 1966). چون رشد گیاه مورد آزمایش ممکن است طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قسمت های تشکیل دهنده خاک قرار گیرد، روش "پات"^۱ دو جنبه ای توسعه یافته است، که در آن شبکه درهم بافته ریشه گیاه که در خاک یکنواخت رویانده شده است فقط برای زمان کوتاهی (۲ تا ۳ هفته) در معرض محیط کشت (خاک) آلوده قرار داده می شود (Lavy

²- Sink
³- Source

¹-Pot

Weber et al., 1982)، (شکل‌های ۴ و ۵ تکنیک‌های "بایواسی" ای نیز توسعه یافت تا حرکت رو به بالا و جانبی علف‌کش‌ها (Harris, 1964, Ashton, 1961) و نشت از فرمولاسیون گرانول (Horowitz, 1966) آزمایش شوند.

مطالعات مقایسه‌ای حرکت علف‌کش‌ها بر اساس حرکت رو به بالا در ستون‌ها در اثر آبیاری از زیر (Harris, 1967) یا بوسیله "کروماتوگرافی لایه نازک" (Chapman et al., 1970, Helling et al., 1971) بوده است. تکنیک‌های مختلف نشت خاکی با یکدیگر مقایسه شده است (Wu and Santelmann, 1975).

تجزیه و دوام علف‌کش: اساساً در تحقیقات دوام علف‌کش در خاک سه برخورد وجود دارد: (الف) علف‌کش در مزرعه بکار می‌رود و بعد از دوره‌های مختلف، نمونه‌های خاک برای "بایواسی" در آزمایشگاه از عمق‌های مختلف گرفته می‌شود (Barrett et al., 1984, Burnside et al., 1963, Harris, 1964, Isensee et al., Holly and Roberts, 1963, Rogers et al., 1986, al., 1973). روشی مشابه بکار رفته است تا ناپدید شدن علف‌کش -ها در آب دنبال گردد (Hiltibran, 1962). برای مطالعات اثرات عمق، ظروف محتوی خاک آلوده را می‌توان در نقاط مختلف پروفیل خاک قرار داد و بعد از یک دوره معین برای "بایواسی" از زیر خاک خارج نمود.

(ب) برای مطالعات آزمایشگاهی، روشی که توسط "کرافتس" (Crafts, 1935) توسعه یافت

درگیر مشکل است، و شاهد می‌بایست با دقت طرح شوند. اثرات تابش "گاما" روی علف‌کش‌ها در محلول آبی و در خاک، نیز توسط "بایواسی" ارزیابی گردید (Horowitz and Blumenfeld, 1973, Horowitz and Hulin, 1971b).

حرکت در خاک: روش‌های "بایواسی" مختلفی برای مطالعه حرکت علف‌کش‌ها در خاک توسعه یافت. در آزمایش‌های مزرعه‌ای، بدنبال باران طبیعی یا مصنوعی نمونه‌های خاک ممکن است از عمق‌های مختلف گرفته شده، آزمایش گردند (Braverman et al., 1986, Weber et al., Burnside et al., 1961, Weber et al., 1982, 1982). در مطالعات نشت آزمایشگاهی با استفاده از ستون‌های خاک، روش‌های مختلفی بکار رفته است تا حرکت علف‌کش‌ها ارزیابی گردد. ستون خاک ممکن است به صورت بخش‌هایی قاش گردد (Crafts, 1935, Anderson et al., 1968, Jacques and Hurtt et al., 1958, Harvey, 1974)، (شکل ۴)، ممکن است شیار یا شکاف‌هایی در آن ایجاد گردد و در آن شیارها گونه‌های آزمایش می‌توانند کاشته شوند (Talbert et al., Lambert et al., 1956, Weber et al., 1971)، یا طولاً بریده شوند (Weber et al., 1986) (شکل ۵). روش دیگر این است که "لیچیت" جمع آوری و تحت "بایواسی" قرار گیرد (Eshel and Day et al., 1961, Weber et al., 1982, Warren, 1967).


¹ - Leachate

استنتاج

محدودیت‌هایی در استفاده از "بایواسی‌ها" وجود دارد که می‌بایست مورد بررسی قرار گیرند (Santelmann, 1972, Behren, 1970). "بایواسی‌ها" برای تعیین علف‌کش‌ها در عصاره‌های مواد بیولوژیکی کاملاً مناسب نیستند، زیرا وجود مواد تشکیل‌دهنده این عصاره‌ها قادر به دخالت در عکس‌العمل هستند. در "بایواسی" هائی که دارای زمان عکس‌العمل طولانی می‌باشند، قسمتی از علف‌کش ممکن است قبل از ظهور عکس‌العمل ناپدید شود. نسبتاً فقط حوزه‌های باریکی از غلظت می‌تواند مستقیماً توسط تکنیک‌های غلظت‌سازی "بایواسی" آزمایش گردد و تکنیک‌های رقیق‌سازی یا اغلب غیر عملی یا غیر قابل اطمینان هستند. هنگامی که محیط رشد کسری از علف‌کش را روشن می‌سازد، "بایواسی" فقط مقدار قابل دسترس اورگانیزم مورد آزمایش را اندازه‌گیری می‌کند و نه مقدار کل علف‌کش را که واقعاً وجود دارد. بر عکس، عکس‌العمل "بایواسی" بین ترکیب اصلی و مشتقات "بایواکتیو" تفاوتی قائل نمی‌شود (Horowitz, 1976). علیرغم این محدودیت‌ها، "بایواسی‌ها" تنها روش‌های مناسب برای تحقیق در فعالیت‌های بیولوژیکی علف‌کش‌ها هستند.


بوسیله بسیاری از محققین دنبال گردید. در خاک‌های آلوده شده با علف‌کش مورد آزمایش یک گیاه شاخص رویانده می‌شود و بعد از اندازه‌گیری عکس‌العمل (مثلاً در تحقیق "کرافتس" - ارتفاع و وزن تر (تازه) گیاهان یولاف ۱- ماهه که در سطح خاک قطع شدند) مواد گیاهی به خاک برگردانده می‌شوند. خاک را گذاشته تا خشک شود، سپس مخلوط نموده، برای یک دوره دیگر رشد مجدداً با گیاه شاخص کشت می‌نمایند. دوام علف‌کش توسط تعداد دفعاتی که ایجاد علائم "فیتوتاکیسیک" می‌کنند تخمین زده می‌شود (Rauser and Day et al., 1961). در تحقیقاتی که "هوروویتز" (Horowitz, 1969) و "هوروویتز" و "هرزلینگر" (Horowitz and Herzlinger, 1973) به عمل آوردند، همین روش با تغییر جزئی بکار رفت. بدین معنی که بدون برگرداندن مواد گیاهی، خاک با یا بدون مخلوط کردن در فواصل بین کشت، بسته به هدف آزمایش، مجدداً با گیاه شاخص کشت گردید.

(ج) خاک آلوده به علف‌کش ممکن است تحت شرایط کنترل شده متفاوتی قرار گیرد و غلظت با شاهد مقایسه گردد (Braverman et al., 1986, Burnside et al., 1961, Corbin, Burschel and Freed, 1959, Horowitz, and Upchurch, 1967, Jacques and Harvey, 1974, 1966).




شکل ۱- زیست سنجی رشد ریشه Sorghum؛ (a) نشاها بعد از ۱۸ ساعت، هنگامیکه موقعیت نوک ریشه‌ها علامتگذاری شد، (b) بعد از ۲۴ ساعت بیشتر هنگامیکه گسترش اندازه گیری شد.

- A. نشاهای گراس
- B. خاک تیمار نشده
- C. کارتن پوشیده شده با فویل آلومینیم
- D. بشر ۴۲۰ میلی لیتری
- E. پشم شیشه
- F. توری ۳ میلیمتری گالوانیزه
- G. فضای هوا
- H. قوطی با خاک تیمار شده یا نشده
- I. شن اشباع شده با آب




شکل ۲- طرحی از یک واحد بکار رفته برای ارزیابی اثر گیاه کشی بخار تراپفلورالین به ریشه‌ها

- A. فویل آلومینیم
- B. بشر ۱۰۰۰ میلی لیتری
- C. نشاهای گراس
- D. بشر ۱۰۰ میلی لیتری
- E. خاک تیمار نشده
- F. خاک تیمار شده یا نشده
- G. ورمیکولایت




شکل ۳- طرحی از یک واحد بکار رفته برای ارزیابی اثر گیاه کشی بخار تراپفلورالین به شاخ و برگ

"مروری از تکنیک های "بایواسی" در تحقیقات علفکش ها"



شکل ۴- مقطع عرضی ستون خاک (head packed) با استفاده از استوانه های متصل به هم. دستگاه برای افزایشهای اضافی آب در مطالعات جریان اشباع شده/ اشباع نشده مستقر می شود (A). استوانه ها با silicon و نوار پلاستیکی بهم متصل می شوند. بعد از نشست، استوانه ها بر حسب عمق خاک بطور انفرادی زیست سنجی می شوند (B).



شکل ۵- مقطع عرضی سیستم نشست ستون خاک طبیعی. دستگاه برای مطالعه یک جریان اشباع شده مداوم مستقر می شود. بعد از نشست خاک می بایست برای ارزیابی علفکش از ستون خارج گردد.

Reference

فهرست منابع

- Addison, D. A. and C. E. Bardsley. 1968. Chlorella Vulgaris. Assaay of the activity of soil herbicides. Weed Sci. 16: 427-429.
- Ahrens, W. H., L.M. Wax, and E. W. Stoller. 1981. Identification of triazine- resistant Anaranthus spp. Weed Sci. 29: 345-348.
- Anderson, R. N. 1981. Increasing herbicide tolerance of soybean (*Glycine max*) by increasing seeding rates. Weed Sci. 29: 336-338.
- Anderson, W. P., A. B. Richards, and J. W. Whiteworth. 1968. Leaching of trifluralin, benefit, and nitratin in soil columns. Weed Sci. 16: 165-169.
- Appleby, A. P., W. R. Furtick, and S. C. Fang. 1968. Soil placement studies with EPTC and other carbamate herbicides on Avena Sativa. Weed Res. 5: 115-122.
- Ashton, F. M. 1961. Movement of herbicides in soil with simulated furrow irrigation. Weeds 9: 612-619.
- Ashton, F. M. 1965. Physiological, biochemical, and structural modification of plants induced by atrazine and monuron. Proc. South. Weed Control Conf. 18: 596-602.
- Ashton, F. M. 1965. Relationship between light and toxicity symptoms caused by atrazine and monrun. Weeds 13: 164-169.
- Barnes, Jane P. and Alan R. Putnam. 1986. Evidence for allelopathy by residues and aqueous extracts of rye (*Secale cereale*). Weed Sci. 34: 384-390.
- Barrett, Michael R. and Terry L. Lavy. 1984. Effects of soil water content on oxidiazon dissipation. Weed Sci. 32: 697-701.
- Backie, Hugh J. and Robert B. Mckercher. 1989. Soil residual properties of DPX-A7881 under laboratory conditions. Weed Sci. 37: 412-418.
- Beckie, Hugh, F. Friesen, Ken M. and Ian N. Morrison. 1990. Rapid bioassay to detect trifluralin-resistant green foxtail (*Setaria viridis*). Weed Technol. 4: 505-508.
- Behren, R. 1970. Quantitative determination of triazine herbicides in soil by bioassay. Residue Rev. 32: 355-369.
- Braverman, Michael P., terry L. Lavy, and Clyde J. Barnes. 1986. The degradatio and bioactivity of metolachlor in the soil. Weed Sci. 34: 479-484.
- Brewer, P. E., C. J. Arntzen, and F. W. Slife. 1979. Effects of atrazine, cyanazine, and procyazine on the photochemical eractions of isolated chloroplasts. Weed Sci. 27: 300-308.
- Burnside, O. C., E. L. Schmidt, and R. Behrens. 1961. Dissipation of simazine from the soil. Weeds 9: 477-484.
- Burnside, O. C., C. R. Fenster, and G. A. Wicks. 1963. Dissipation and leaching of monuron, simazine, and atrazine in Nebraska soils. Weeds 11: 209- 213.
- Burrill, L. C. and A. P. Appleby. 1978. Influence of Italian ryegrass density on efficacy of diuron herbicide. Agron. J. 70: 505-506.
- Burschel, P. and V. H. Freed. 1959. The decomposition of herbicides in soils. Weed 7: 157-161.

- Burt, G. W. and A. D. Akinosorotan. 1976. Factors affecting thiocarbamate injury to corn. I. temperature and soil moisture. *Weed Sci.* 24: 319-321.
- Camper, N. D. and G. E. Carter, Jr. 1974. Biological activity of several dinitroaniline herbicides in bioassay tests. *Proc. South. Weed Sci. Soc.* 27: 359.
- Chapman, T. P. A. Gabbott, and S. M. Osgerby. 1970. Technique for measuring movement of herbicides in soil water leaching conditions. *Pestic. Sci.* 1: 56-58.
- Coffey, D. L. and G. F. Warren. 1969. Interaction of herbicides by activated carbon and other adsorbents. *Weed Sci.* 17: 16-19.
- Colbert, F. O., V. V. Volk, and A. P. Appleby. 1975. Sorption of atrazine, terbut-ryn, and Gs-14254 on natural and limeamended soils. *Weed Sci.* 23: 390-394.
- Comes, R. D. and F. L. Timmons. 1965. Effect of sunlight on the phytotoxicity of some phenylurea and triazine herbicides on soil surface. *Weeds* 13: 81-85.
- Corbin, F. T. and R. P. Upchurch. 1967. Influence of PH on detoxification of herbicides in soil. *Weeds* 15: 370-377.
- Counts, b. 1961. Loss of geotropism and modification of root hair development by amitrol. *Weeds* 9: 329-330.
- Crafts, A. S. 1935. The toxicity of sodium arsenite and sodium chlorate in four California soils. *Hilgardia* 9: 461-498. In "Weed Control", chapt. 17, by A. S. Crafts and W. W. Robbins. McGraw-Hill Book Company, 1962.
- Dao, T. H. and T. L. Lavy. 1978. Atrazine adsorption on soil as influenced by Temperature, moisture content and electrolyte concentration. *Weed Sci.* 26: 303-308.
- DaSilva, J. F., R. O. Fadayomi, and G. E. Warren. 1976. Cotyledon disc bioassay For certain herbicides. *Weed Sci.* 24: 250-252.
- Dawson, J. H. 1963. development of barnyardgrass seedlings and their response to EPTC. *Weeds* 11: 60-67.
- Day, B. E., L. S. Jordan, and R. T. Hendrixon. 1961. The decomposition of amitrol in California soils. *Weeds* 9: 441-456.
- Devlin, Robert M., Antoni J. Mukowski, Irena I. Zbiec, Stanislaw J. Karczmarz-yk, and Elizabeta M. Skorska. 1983. Influence of buthidazole, diuron, and atrazine on some light reactions of photosynthesis. *Weed Sci.* 31: 879-883.
- Doherty, P. J. and G. F. Warren. 1969. The absorption of four herbicides by different types of organic matter and a bentonite clay. *Weed Res.* 9: 20-26.
- Donald, William W. 1981. EPTC effects in the lettuce (*Lactuca Sativa*) hypocotyl bioassay for gibberellins. *Weed Sci.* 29: 490-499.
- Dowler, C. C. 1969. A cucumber bioassay test for the soil residues of certain herbicides. *Weed Sci.* 17: 309-310.
- Dubey, H. D. and j. F. Freeman. 1963. Bioassay of diphenamid and linuron in Soil. *Bot. Gaz.* 124: 388-392.
- Eshel, Y. 1969. Effect of pyrazon on photosynthesis of various species. *Weed Res.* 9: 167-172.

- Eshel, Y. and G. F. Warren. 1967. A simplified method for determining phytotoxicity, leaching, and adsorption of herbicides in soils. *Weeds* 15: 115-118.
- Finney, D. J. 1964. *Statistical Method in Biological Assay*. Charles Griffi.
- Gallandt, Eric R., Peter K. Fay, and William P. Inskip. 1989. Clomazone dissipation in two Montana soils. *Weed Technol.* 3: 146-150.
- Grover, Kent E. M. and R. K. Foster. 1985. A corn bioassay technique for measuring chlorsulfuron level in three Saskatchewan soils. *Weed Sci.* 33: 825- 828.
- Groves, Kent E. M. and R. K. Foster. 1985. A corn bioassay technique for measuring chlorsulfuron level in three Saskatchewan soils. *Weed Sci.* 23: 529-532.
- Harris, C. I. 1964. Movement of disamba and diphenamid in soils. *Weeds* 12: 112-115.
- Harris, C. I. 1967. Movement of herbicides in soil. *Weeds* 15: 214-216.
- Harris, C. I. and T. J. Sheets. 1965. Influence of soil properties on adsorption and phytotoxicity of CIPC, diuron, and simazine. *Weeds* 13: 215-219.
- Harrison, G. W., J. B. Weber, and J. V. Baird. 1976. Herbicide phytotoxicity as affected by selected properties of North Carolina soil. *Weed Sci.* 24: 120-126.
- Helling, C.S., D. D. Kaufman, and C. T. Dieter. 1971. Algae bioassay detection of pesticide mobility in soil. *Weed Sci.* 19: 685-690.
- Hess, F. D. 1980. A Chlamydomonas algal bioassay for detecting growth inhibitor herbicides. *Weed Sci.* 28: 515-520.
- Hiltibran, R. C. 1962. Duration of toxicity of endothal in water. *Weeds* 10: 17-19.
- Hoffman, D. W. and T. L. Lavy. 1978. Plant competition for atrazine. *Weed Sci.* 26: 94-99.
- Hollist, R. L. and C. L. foy. 1971. Trifluralin interaction with soil constituents. *Weed Sci.* 19: 11-16.
- Holly, K. and H. A. Roberts. 1963. Persistence of phytotoxic residues of triazine herbicides in soil. *Weed Res.* 3: 1-10.
- Horowitz, M. 1966. A rapid bioassay for PEBC its application in volatilization and adsorption studies. *Weed Res.* 6: 22-36.
- Horowitz, M. 1966. Experiments with granules of dichlobenil under glasshouse conditions. *Weed Res.* 6: 91-103.
- Horowitz, M. 1966. Breakdown of endothal in soil. *Weed Res.* 6: 168-171.
- Horowitz, M. 1969. Evaluation of herbicide persistence in soil. *Weed Res.* 9: 314- 321.
- Horowitz, M. 1976. Application of bioassay techniques to herbicide investigations. *Weed Res.* 16: 209-215.
- Horowitz, M. and T. Blumenfeld. 1973. Effect of gamma radiation on the bioactivity of herbicides. *Weed Sci.* 21: 281-284.
- Horowitz, M. and G. Herzlinger. 1973. Interaction between residual herbicides at low concentrations. *Weed Res.* 13: 367-372.
- Horowitz, M. and N. Hulin. 1971. A rapid bioassay for diphenamid and its application in soil studies. *Weed Res.* 11: 143-149.

- Horowitz, M. and N. Hulin. 1971. Effect of gamma on radiation on soil and diphenamid. *Weed Res.* 19: 294-296.
- Horowitz, M. T. Blumenfeld, G. Herzlinger, and N. Hulin. 1974. Effect of repeated application of ten soil-active herbicides on population residue accumulation on nitrification. *Weed Res.* 14: 97-109.
- Houseworth, L. D. and B. G. Tweedy. 1971. Interactions of light, Temperature, and moisture on terbutryn toxicity. *Weed Sci.* 19: 732-734.
- Hurt, W., J. A. Mead, and P. W. Santelmann. 1958. The effect of various factors on the movement of CIPC in certain soils. *Weeds* 6: 425-431.
- Isensee, A. R., W. C. Show, W. A. Gentner, C. R. Swanson, B. C. Turner, and E.A. Woolson. 1973. Revegetation following massive application of selected herbicides. *Weed Sci.* 21: 409-412.
- Jacques, G. L. and R. G. Harvey. 1974. A simple bioassay technique for dinitroaniline herbicides in soils. *North Cent. Weed Control Conf.* 29: 93.
- Jordan, L. S., T. Murashige, J. D. Mann, and D. E. Day. 1966. Effect of photosynthesis inhibiting herbicides on nonphotosynthetic tobacco callus tissue. *Weeds* 14: 134-136.
- Knake, E. L., A. P. Appleby, and W. R. Furtick. 1967. Soil incorporation and site of uptake of preemergence herbicides. *Weeds* 15: 228-232.
- Koren, E., C. Foy. And F. M. Ashton. 1968. Phytotoxicity and persistence of four thiocarbamates in five soil types. *Weed Sci.* 16: 172-175.
- Kratky, B. A. and G. F. Warren. 1971. The use of three simple, rapid bioassay on forty-two herbicides. *Weed Res.* 11: 257-262.
- Kratky, B. A. and G. F. Warren. 1971. A rapid bioassay for photosynthetic and respiratory inhibitors. *Weed Sci.* 19: 658-661.
- Kratky, B. A. and G. F. Warren. 1973. Water-soil-plant interactions with terbacil. *Weed Sci.* 21: 451-454.
- Ladlie, J. S., W. F. Meggitt, and D. Penner. 1976. Effect of PH on metribuzin activity in the soil. *Weed Sci.* 24: 505-507.
- Lambert, S. M., P. E. Porter, and R. H. Schieferstein. 1956. Movement and sorption of chemical applied to the soil. *Weeds* 13: 185-190.
- Lavy, T. L. and P. W. Santelmann. 1986. Herbicide bioassay as a research tool. Pages 201-217 in N. D. Camper (ed.) *Research Methods in Weed Science*, (3rd edition). South Weed Sci. Soc.
- Leasure, J. K. 1958. A study of some bioassay methods for herbicide volatility. *Weeds* 6: 310-314.
- Leonard, O. A., R. J. Weaver, and B. L. Kay. 1962. Bioassay method for determining 2,4-D in plant tissue. *Weeds* 10: 20-22.
- Lynch, M. R. and R. D. Sweet. 1971. Effect of environment on activity of diphenamid. *Weed Sci.* 19: 332-337.
- Lynd, J. Q., C. E. Rick, and P. W. Santelmann. 1966. Soil components determining bensulide phytotoxicity. *Agron. J.* 58: 508-510.

- Mapplebeck, L. and C. Waywell. 1983. Detection and degradation of linuron in organic soils. *Weed Sci.* 31: 8-13.
- Minshall, W. H. 1957. Influence of light on the effect of 3-p-(chlorophenyl)-1, 1-dimethylurea on plants. *Weeds* 5: 29-33.
- Mulder, C. E. G. and J. D. Nalewaja. 1978. Temperature wffect on phytotoxicity of soil-applied herbicides. *Weed Sci.* 26: 566-570.
- Mulder, C. E. G. and J. D. Nalewaja. 1979. Influence of soil moisture on soil-incorporated diclofop. *Weed Sci.* 27: 83-87.
- Nelson, J. E., W. F. Meggitt, D. Penner, and J. S. Ladlie. 1983. The influence of environmental factors on oryzalin activity. *Weed Sci.* 31: 752-758.
- Nishimoto, R. K., A. P. Appleby, and W. R. Furtick. 1969. Plant response to herbicide placement in soil. *Weed Sci.* 17: 475-478.
- Ogle, R. E. and G. F. Warren. 1959. Fate and activity of herbicides in soils. *Weeds* 3: 357-373.
- strowsky, J. and R. J. Hance. 1973. The influence of the method of application of promoton to the soil on its toxicity to white mustard. *Weed Res.* 13: 355- 358.
- Parker, C. 1965. A rapid bioassay method for detection of herbicides which inhibit photosynthesis. *Weed Res.* 5: 181-184.
- Parker, C. 1966. The importance of shoot entry in the action of herbicides applied to the soil. *Weeds* 14: 117-121.
- Parochetti, J. V. 1973. Soil organic matter effect on activity of acetanilides, CDAA, and atrazine. *Weed Sci.* 21: 157-160
- Parochetti, J. V. and E. R. Hein. 1973. Volatility and photodecomposition of trifluralin, benefin, and nitralin. *Weed Sci.* 21: 469-473.
- Peek, Daniel C. and Arnold P. Appleby. 1989. Effect of PH on phytotoxicity of Metribuzin and ethyl-metribuzin. *Weed Technol.* 3: 636-639.
- Phillips, W. M. 1959. Residual herbicidal activity of some chloro- substituted benzoic acids in soil. *Weeds* 7: 284-294.
- Pillai, C. G. P. and D. E. Davis. 1973. S-Triazine effects on seed germination and Hypocotyls opening. *Weed Sci.* 21: 461-464.
- Rahman, A. and L. J. Mattews. 1979. Effects of soil organic matter on the phytotoxicity of thirteen s-triazine herbicides. *Weed Sci.* 27: 158-161.
- Rausser, W. E. and C. M. Switzer. 1962. Factors contributing to the loss of amiben phytotoxicity in soils. *Weeds* 10: 62-64.
- Ready, D. and V. Q. Grand. 1942. A rapid sensitive method for determination of low concentration of 2,4-D in aqueous solution. *Bot. Gaz.* 109: 39-44.
- Reid, C. P. P. and W. Hurtt. 1969. A. rapid bioassay for simultaneous identification and quantitation of picloram in aqueous solution. *Weed Res.* 9: 136- 141.
- Ridley, S. M. 1977. Interaction of chloroplast with inhibitors. *Plant Physiol.* 59: 724-732.

- Roberts, H. A. and B. J. Wilson. 1962. Notes on the bioassay of chlorpropham in soil. *Weed Res.* 2: 60-65.
- Roberts, H. A. and M. E. Ricketts. 1973. Comparative tolerance of some dicotyledons to pronamide and chlorpropham. *Pest. Sci.* 4: 83-87.
- Rogers, C. Brent, Ronald E. Talbert, John D. Mattice, Terry L. Lavy, and Robert E. Frans. 1986. Residual fluometuron levels in three Arkansas soils under continuous cotton (*Gossypium hirsutum*) production. *Weed Sci.* 34: 122-130.
- Rogers, C. Brent, Ronald E. Talbert, and Robert E. Frans. 1986. Effect of cotton (*Gossypium hirsutum*) herbicides carry over on subsequent crops. *Weed Sci.* 34: 756-760.
- Santelmann, P. W. 1972. Herbicide bioassay. Pages 91-101 in R. E. Wilkinson (ed.) *Research Methods in Weed Science*. South. Weed Sci. Soc. POP Enterprises, Inc. Atlanta, GA.
- Santelmann, P. W., J. B. Weber, and A. F. Wiese. 1971. A study of soil bioassay technique using prometryne. *Weed Sci.* 19: 170-174.
- Scifres, C. F., R. W. Bovey, and M. G. Markle. 1972. Variations in bioassay attributes as quantitative indices of picloram in soils. *Weed Res.* 12: 158-190.
- Shea, Patrick J. and Jerome B. Weber. 1983. Effect of soil PH of fluoridone activity and persistence as determined by chlorophyll measurement. *Weed Sci.* 31: 347-350.
- Sheets, T. J. 1963. photochemical alternation and inactivation of amiben. *Weeds* 11: 186-190.
- Smith, Albert E. 1989. The potential allelopathic characteristics of bitter sneeze-weed I (*Helenium amarum*). *Weed Sci.* 37: 665-669.
- Stanger, C. E. and A. P. Appleby. 1972. A proposed mechanism for diuron-induced phytotoxicity. *Weed Sci.* 20: 357-363.
- Swann, C. E. and R. Behrens. 1972. Phytotoxicity of trifluralin vapors from soil. *Weed Sci.* 20: 357-363.
- Swanson, C. P. 1946. A simple bioassay for determination of low concentration of 2,4-D in aqueous solutions. *Bot. Gaz.* 107: 507-509.
- Talbert, R. E., D. R. Smith, and R. E. Frans. 1971. Volatilization, leaching, and adsorption of prometryn in relation to selectivity in cotton. *Weed Res.* 19: 6-10.
- taylorson, R. B. 1966. Decomposition of CDEC by far ultraviolet radiation. *Weed* 14: 155-157.
- Tchan, Y. T., J. E. Roseby, and G. R. Funnell. 1975. A new rapid specific bioassay method for photosynthesis inhibiting herbicides. *Soil Biol. Biochem.* 7: 39-44.
- Templeton, A. R. and W. Hurtt. 1973. A simple method for expressing the relative efficacy of plant growth regulators. *Proc. N. East Weed Control Conf.* 27: 127-135.
- Thomas, Meirion, S. L. Ranson, and J. A. Richardson. 1973. *Plant Physiology*. Chapter 25. Longman Group Limited, London.
- Thomas, V. M. Jr., L. J. Buckley, J. D. Sullivan Jr., and Ikawa Miyoshi. 1973. Effect of herbicides on growth of *Chlorella* and *Bacillus* using paper disk Method. *Weed Sc.* 21: 449-451.

- Tompkin G. A., T. A. McIntosh, and E. P. Dunigon. 1968. Use of Stanford-De-Ment Bioassay to study atrazine-soil interactions. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.* 32: 373-377.
- Truelove, B., D. C. Davis, and Larry R. Jones. 1974. A new method for detecting photosynthesis inhibitors. *Weed Sci.* 22: 15-17.
- Upchurch, R. P. 1958. The influence of soil factors on the phytotoxicity and plant selectivity of diuron.
- Upchurch, R. P., F. I. Selman, D. D. Mason, and E. J. Kamprath. 1966. The correlation of herbicidal activity with soil and climatic factors. *Weeds* 14: 42-49.
- Van Oorschot, J. L. P. 1970. Effect of transpiration rate of been plants on inhibition of photosynthesis by some root-applied herbicides. *Weed Res.* 10: 230-242.
- Walker, A., and H. A. Roberts. 1975. Effect of incorporation and rainfall on the activity of some soil-applied herbicides. *Weed Res.* 15: 263-269.
- Weber, J. B., P. W. Perry, and K. Ibaraki. 1968. Effect of PH on the phytotoxicity of prometryne applied to synthetic soil media. *Weed Sci.* 16: 134-136.
- Weber, J. B., S. B. Weed, and T. M. Ward. 1969. Adsorption of s-triazines by soil organic matter. *Weed Sci.* 17: 417-421.
- Weber, Jerome B. and David M. Whitacre. 1982. Mobility of herbicides in soil columns under saturated- and unsaturated flow conditions. *Weed Sci.* 30: 579-584.
- Weber, Jerome B. and Thomas F. Peeper. 1982. Mobility and distribution of buthidazole and metabolites in four leached soils. *Weed Sci.* 30: 585-588.
- Weber, Jerome B., Len R. Swain, Harry J. Streck, and Jose L. Sartori. 1986. Herbicides mobility in soil leaching columns. Pages 189-200. In N. D. Camper (ed.) *Research Methods in Weed Science*, 3rd. Ed. South. Weed Sci. Soc.
- Weidner, C. W. and T. L. Lavy. 1975. Use of an algae bioassay for determining trace amount of atrazine, alachlor, butylate, and picloram in water. *Res. Rep. North Cent. Weed Control Conf.* p. 41.
- Weldon, L. W. and F. L. Timmons. 1961. Photochemical degradation of diuron and monuron. *Weeds* 9: 111-116.
- Wilson, H. P., F. B. Stewart, and T. E. Hines. 1976. Effect of temperature on response of tomatoes to several dinitroaniline herbicides and phosphorus. *Weed Sci.* 24: 115-119.
- Winkle, M. E., J. R. C. Leavitt, and O. C. Burnside. 1981. Effect of weed density on herbicide absorption and bioactivity. *Weed Sci.* 29: 405-409.
- Witt, W., L. Evetts, J. M. Davidson, and P. W. Santelmann. 1970. Influence of herbicide application method on bioassay sensitivity. *Proc. Weed Sci. Soc.* 23: 338-342.
- Wright, W. L. and G. F. Warren. 1965. Photochemical decomposition of trifluralin. *Weeds* 13: 329-331.
- Wu, C., P. W. Santelmann, and J. M. Davidson. 1974. Influence of soil temperature and terbutryn activity and persistence. *Weed Sci.* 22: 571-574.
- Wu, Chu-Huang and P. W. Santelmann. 1975. Comparison of different soil leaching techniques with four herbicides. *Weed Sci.* 23: 508-511.